

то щетинисто опушенной, вместе с черешком 13 см дл. Орешки широко яйцевидные, 8—9 мм дл., в нижней части 7 мм шир., с б. м. вогнутым диском, по средней линии которого имеется, как бы киль из одиночных якорных шипиков; по бокам от кия рассеяны подобные же шипики. Края орешка приподняты и, так же как и бока и брюшко, покрыты короткими, в основании б. м. расширенными, треугольными якорными шипиками. Площадка прикрепления с остью от столбика. Столбик при плодах короткий 4 мм дл., довольно толстый.

Далее мы изучали гербарный материал, по которому В. И. Липский описал *Solenanthus Olgae* γ *Tschimganicus* Lipsky, и который Поповым также отнесен в синонимы к *Lindelofia Capusii*. В результате просмотра, мы пришли к заключению, что весь этот материал ничем не отличим от низкорослой, розовоцветной с длинным столбиком *Lindelofia* Западного Тянь-Шаня, некоторые экземпляры которой в гербарии БИН'а АН СССР рукою М. Г. Попова подписаны как *Lindelofia tschimganica* M. Pop.

Мы, выяснив это недоразумение, считаем, что за этим растением и следует закрепить название Попова *Lindelofia tschimganica* M. Pop. sp. nov. (= *Solenanthus Olgae* γ *Tschimganicus* Lipsky in ANP. 26 (1907—9) 461).

Ареал *L. tschimganica* необходимо расширить и на Памиро-Алай: хр. Карасан (Лепешкин), хр. Зеравшанский: Хазрет-Султан (К. Закиров) и хр. Кырктанур (Балабаев).

Что же касается *Paracaryum Capusii* Franch., то нам удалось выяснить, что это растение тождественно с описанным М. Г. Поповым *Cynoglossum tianschanicum*. Мы считаем правильным отнесение этого вида к роду *Cynoglossum*, но тогда, следуя правилам номенклатуры, *Cynoglossum tianschanicum* M. Pop. необходимо переименовать в *Cynoglossum Capusii* (Franch.) Pazij comb. nov. = *Paracaryum Capusii* Franch., 1. c. = *Cynoglossum tianschanicum* M. Pop. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. URSS. 14 (1951) 305, tabl. 1.

*Paracaryum Emiri* M. Pop. in Почв. эксп. басс. рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. 2 (1916) 66 tab. 16, sp. rest.

М. Г. Попов, как показали исследования, напрасно отказался от *Paracaryum Emiri*, поставив его в синоним к *P. himalayense* (Klotzsch.) C. B. Clarke<sup>1</sup>.

*P. Emiri* M. Pop. двулетнее растение обычно с одиночным стеблем (30—50 см выс.), маленьким (2,5—3 мм дл. и 2—2,5 мм в диам.) венчиком, и довольно крупными (7—9 мм дл., 7—8 мм шир.) орешками, обитающее на выходах пест-

<sup>1</sup> Фл. СССР. 19 (1953) 577.