Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

Bulletin de la Société Botanique de France

ISSN: 0037-8941 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg17

Nouvelles Localités Du Goodyera Repens R. Br.

M. Feuilleaubois

To cite this article: M. Feuilleaubois (1883) Nouvelles Localités Du Goodyera Repens R. Br., Bulletin de la Société Botanique de France, 30:7, 276-277, DOI: 10.1080/00378941.1883.10830079

To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1883.10830079


Published online: 08 Jul 2014.


Submit your article to this journal


Article views: 9


View related articles

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17

Download by: [108.61.117.164] **Date:** 06 June 2016, At: 22:05

du point de contact avec le support, plus tard elle peut s'étendre du côté opposé au support; cette extension se produit d'une façon irrégulière.

Pendant ce temps le méristème normal continue à fonctionner comme dans une tige ordinaire. En certains points il se produit donc chaque année deux couches de bois et deux couches de liber. Ce résultat est facile à constater en reconnaissant l'âge d'une de ces tiges anormales.

Lorsque la pression entre la tige voluble et son support devient très forte, il arrive souvent que le méristème normal cesse de fonctionner vis-à-vis des points comprimés. Les anneaux de bois sont alors incomplets. Mais lorsque la pression du support est faible, l'effet produit est contraire; loin d'éteindre l'activité de la couche génératrice, le contact la développe. On observe en effet que les couches de bois sont dans ce cas plus épaisses du côté du support.

Quelquefois une troisième couche génératrice apparaît dans le liber qui est extérieur à la seconde série de couches de bois. L'anomalie est alors double, et tous les ans il se produit dans une même section transversale trois couches de bois et trois couches de liber. Mais chacune de ces couches est loin de former un cercle complet.

Les tiges que j'ai observées étaient âgées de sept ans au plus. Peut-être dans les tiges très âgées les parties enroulées ou non enroulées présentent-elles d'autres modifications.

Le point qui me semble surtout digne de remarque dans ces observations, c'est que plusieurs couches génératrices peuvent fonctionner simultanément dans une même section transversale.

M. G.-Eg. Bertrand expose à la Société le résultat de ses recherches sur l'anatomie des *Phylloglossum* (1).

M. Malinvaud donne lecture des communications suivantes :

NOUVELLES LOCALITÉS DU *GOODYERA REPENS* R. Br.,

par **M. FEUILLEAUBOIS**.

Une des plantes phanérogames les plus intéressantes de la flore parisienne est sans contredit le *Goodyera repens* R. Br. Cette rare Orchidée n'était indiquée, dans la forêt de Fontainebleau, qu'au lieu dit « le Mail de Henri IV », sa localité classique. M. Edm. Bonnet, dans sa *Petite Flore parisienne* publiée au commencement de cette année, signale encore, outre le Mail de Henri IV, la route de Cupidon, où cette plante, introduite avec les graines de Conifères, est assez commune.

(1) La publication de cette note a été ajournée sur la demande de l'auteur. (*Note du Secrétariat.*)

Bulletin de la Société Botanique de France 1883.30:276-277.

Les botanistes parisiens me sauront gré de leur indiquer d'autres localités, toutes découvertes par un jeune et consciencieux botaniste, M. Léon Vigne, qui a passé le mois de juillet dernier à Fontainebleau dans le but d'explorer toute la forêt. Ses recherches ont été couronnées de succès ; car, outre bon nombre d'autres plantes rares, il a découvert et noté, avec le soin le plus scrupuleux, l'existence du *Goodyera repens* aux endroits ci-après :

1° Sous les Pins du côté de la MARE D'ÉPISY, où il croît abondamment en compagnie du *Phyteuma orbiculare*.

2° Sur le flanc septentrional du RESTANT DU LONG ROCHER, où il occupe deux circonscriptions restreintes sur le parcours du sentier Denecourt.

3° Aux environs du CARREFOUR DE LA PLAINE DE LA CHAMBRE, où il n'a été trouvé que trois exemplaires.

4° Sur le mont Ussy, près du BELVÉDÈRE DE MONTESPAN, où il est peu commun.

5° De l'autre côté de la Seine, dans le bois du HAUT-SAMOREAU, où il a été trouvé à quatre endroits différents.

6° Au commencement de la DESCENTE DU CHASSEUR NOIR, dans les GORGES D'APREMONT, où il paraît être assez abondant.

Dans toutes ces localités, le *Goodyera repens* a été trouvé dans les bois de Pins, et occupe de préférence ceux dont le sol couvert de Mousses conserve une certaine humidité.

Il est permis d'espérer que, dans un avenir très prochain, cette rare Orchidée deviendra une vulgarité sous les Conifères de la forêt de Fontainebleau et de ses environs.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE **M. Ch. ROYER** A M. MALINVAUD.

Quincy, le 3 novembre 1883.

Cher Monsieur,

Je vous prie d'annoncer à la Société la découverte, dans la Côte-d'Or, du *Ventenata avenacea* Kœl. Cette Graminée croissait en abondance dans la grande friche de la commune de Normier, canton de Semur, où elle a été récoltée en août par M. Fautrey, instituteur à Noidan, qui m'en a communiqué des échantillons.

Deux plantes qui n'avaient pas été revues depuis Lorey viennent d'être retrouvées dans le département : l'une, le *Cardamine amara* L. (pré de la source de Veuxhaules : Magdelaine !) ; l'autre, l'*Orchis coriophora* L. (prairies des environs de Moret : Dr Viallanes !). Lorey indiquait le *Cardamine amara* à Laroche en Breuil et à Saulieu, et l'*Orchis coriophora* L. dans les prés des environs de Dijon. . . . . .

Bulletin de la Société Botanique de France 1883.30:276-277.