

Nagy 1928  
Prodr. H. P. B. Belca 2

C. Sympetalae. VI. Tubiflorae.

montanum var  
parviflorum

51

Corolla 12—15 mm lata laete rubella. Nuculae muricatae<sup>1)</sup>. In calcareis. Bu.

1\* Nuculae facie exteriore nec concavae nec marginatae.

3. Plantae biennes vel perennes radice fusiformi. Flores non atrovioleae.

4. Folia supra pilosa<sup>2)</sup>.

3253. *C. creticum* Mill. Dict. Ed. 8 no. 2 (C. pictum Ait. H. Kew. I. 179). Radix crassa fusiformis. Caulis erectus tenuiter incano-puberulus. Folia tenuiter molliter tomentosa, inferiora oblonga in petiolum longum attenuata, superiora e basi semiamplexicauli lanceolata. Cincinni ebracteati. Corolla pallide azurea obscure venosa. Nuculae dense muricatae. In lapidosis, ad vias dit. medit. Q. Cro. Da. BH. Mt. Sb. Bu. Thra. Ma. Ep. The. Jon. Gr. Cre. Kpt.

b) pseudocheirifolium Brand Borag. Cynogl. 130. Folia densius tomentosa. Gr. Cre.

3254. *C. montanum*<sup>3)</sup> Höjer Demonstr. pl. 9 et in L. Amoen. III. 402 (C. nebrodense Boiss. Or. IV. 265, Vel. Fl. Bulg. 404, Hal. Consp. II. 359 et aut., non Guss.; C. hungaricum Simk. TF. II. 151; ? C. Haenkei Schult. Öst. Fl. Ed. 2. I. 361). ☉ Radix fusiformis. Caulis erectus cum foliis molliter pubescens pilis partim nodulo insidentibus. Folia basalia oblonga, caulina e basi semiamplexicauli oblongo-lanceolata. Cincinni ebracteati. Corolla sanguinea concolor, calyce parum longior, loricibus sinus loborum non superantibus. Nuculae dense et aequifiter glochidiato-muricatae. In graminosis, rupestribus, ad vias. BH. Mt. Sb. Bu. Ma. A. Ep. The. Gr.

B. parviflorum (Vis.) (C. officinale var. p. Vis. Dalm. II. 241; C. velebiticum Borb. ap. K. Maly VZBG. LIV. 239). Nuculae inter aculeos dense tuberculatae. Cro. Da. BH.

4\* Folia supra glabra.

3255. *C. germanicum* Jacq. Obs. II. 31 (C. officinale β sylvaticum Vis. Dalm. II. 240). ☉. Caulis erectus sparse villosus. Folia supra laete viridia ferè glabra, subtus pilis sparsis scabra, inferiora petiolata elliptica, superiora oblonga vel lanceolata basi lata subamplexicauli sessilia. Racemi ebracteati. Corolla sordide dilute coerulea 8—10 mm lata. Nuculae dense muricatae et inter aculeos tuberculis parvis obsitae. In silvis. Da? Bu.

2\* Planta perennis rhizomate ramoso squamato. Corolla atrovioleae.

<sup>1)</sup> Nuculae in speciminibus originalibus, nondum bene evolutae sunt, sed mihi marginatae esse videntur.

<sup>2)</sup> Conf. etiam C. rotatum Vel.

<sup>3)</sup> Conf. Lacaita, Aggiunte alla flora del principato Citra 40 in Bullet. orto bot. Napoli III.