Mersch

sowie

nächste u. weitere Umgebung,

zum Gebrauch für Naturfreunde,

von Dr. Ernest Feltgen.

B. Lagerpflanzen.

---

f) *Klasse der Tange (Algae).*

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit
	Gruppe der Chlorophyllaceae.		
236	**Melosira varians Ag.**	In Süsswasser.	In Bruch an ein Brunnenmauer. 7. 90.
237	**Navicularia viridula Kütz.**	In Süsswasser.	In Bruch an ein Brunnenmauer, gesell mit Melosira varians. 7. 90.
238	**Zygnema species.**	In Süsswasser.	Am Stamm einer alt Weide an einem Tei in Finsterthal. 10. 91.
239	**Oedogonium species.**	In Sümpfen, auf nassem Torfboden, in feuchten Gräben.	Auf einem faulend Brett in bewässert Wiese bei Bruch. 7. 92.
240	**Microspora vulgaris Rabh.**	In feuchten Gräben, Bächen, Sümpfen.	Oberhalb des Teich bei Meisenburg nach A gelsberg zu. 7. 90.
241	**Cladophora longissima Kütz.**	In Süsswasser.	In dem Manzenba zwischen Meisenburg Ernzen. 7. 90.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
242	**Cladophora fracta Kütz.**	In salzigem Wasser (Nieuport.)	An Felsen in feuchtem, sandigem Wald bei Fischbach. 9. 90.
243	**Chroolepus umbrinum Kütz.**	An Baumstämmen.	Auf einem feuchten Brett in Bissen, im Inneren eines Brunnens. 9. 91.
244	**Chroolepus aureum Kütz.**	An Felsen, Mauern, auf Moosen.	Auf Moosen, auf Wurzeln, in einer Waldschlucht bei Bruch. 12. 90.
245	**Pleurosigma attenuatum Kütz.**	In Süsswasser.	In einem Wasserbehälter zur Irrigation der Wiesen bei Bruch. 7. 92.
246	**Pl. acutum Kütz.**	In Süsswasser.	In einem Wasserbehälter zur Irrigation der Wiesen bei Bruch. 7. 92.
247	**Chaetophora pisiformis Ag.**	In Teichen, Gräben, an Pflanzen.	In einem Tümpel im Feld bei Glabach. 10. 92.
248	**Vaucheria terrestris DC.**	Auf feuchtem Boden.	Am Boden im Rollingerwald. 9. 90.
249	**Chara foetida A. Br.**	In Gräben, Sümpfen, Quellen, Bächen.	In Strassengräben bei Beringen, Reckingen, im Eischthal, häufig. —
250	**Chara fragilis Desv.**	In Gräben Teichen, Sümpfen, Bächen.	In Wiesenbewässerungs-Teichen im Eischthal und bei Bruch. —
251	**Nitella gracilis Ag.**	Teiche, Gräben.	Im Weggraben bei Reckingen nach Hosbich zu. —

Gruppe der Cyanophyceae.

252	**Nostoc commune Vauch.**	Auf feuchtem Boden.	An einem Strassenrand b. Reckingen, nach Regen. 6. 90.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
253	**Nostoc muscorum Ag.**	Auf feuchtem Boden und auf Moosen.	In Moos auf feuchte Erde in einer Wald schlucht bei Fischbach. 9. 90.
254	**Nostoc sphaericum Vauch.**	In Gräben, Sümpfen und auf Moosen.	Auf einem nassen Filz hut bei Bahnhof Colmar Berg. 9. 93.

g) *Klasse der Flechten (Lichenes).*

Familie der Usneaceae.

255	**Usnea barbata L.**	An Bäumen, alten Bretterwänden, Zäunen.	An Buchenaesten in Ansemburgerwald, häu auf dem ganzen Gebie 2. 89.
256	**Ramalina fraxinea L.**	An Laubbäumen, auf Holzdächern.	An einer Pappel a der Strasse in Binzer häufig. 3. 88.
257	**R. fraxinea varietas ampliata Schaer.**	An Laubbäumen.	An einer Pappel i Binzert. 86.
258	**R. fraxinea varietas fastigiata Schaer.**	An Laubbäumen.	An einer Pappel i Binzert. 87.
259	**R. farinacea L.**	An Laub- und Nadelholz.	An einem Baumstam an der Landstrasse b Bruch, im Wald zwisch Hosbich und Finstertha 2. 89. 1. 91.
260	**Evernia prunastri L.**	An Bäumen und bearbeitetem Holz.	An der Rinde eine Esche in Binzert, au Pinus silvaticus bei Co mar, am Brückenholz b der Grommeschmühle an einem Sandsteinfelse bei Lintgen. 3. 88. 2. 89. 4. 88. 7. 9
261	**E. divaricata L.**	Meist an Nadelholz.	An Buchenaesten i Wald bei Ansemburg. 2. 89.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
262	**E. furfuracea L.**	An Bäumen, Bretterwänden, Zäunen.	Auf Kiefernaesten bei Hohlenfels. 3. 88.
263	**Cornicularia aculeata Schreb.**	Auf sterilem Haideboden.	Bei Klingelscheuer, auf der Binzerter Höhe auf trockenem Sandboden, auf der «Lötzert» bei Gosseldingen. 5. 88. 4. 88. 6. 89.

Familie der Parmeliaceae.

264	**Cetraria glauca L.**	An Laub- und Nadelbäumen, Zäunen, Holzdächern, Felsen, auf blosser Erde.	Auf Nadelholz am Bahnhof von Colmar-Berg, an Buchen im Rollingerwald. 3. 90.
265	**C. pinastri Ach.**	An Nadelhölzern und anderen Bäumen, auch an Felsen.	Auf alter Birnbaumrinde in Tüntingen. 5. 90.
266	**C. aleurites Th. Fr.**	An Nadelholz, Zäunen, Bretterwänden.	An einem Zaunpfahl bei Kruchten. 3. 91.
267	**Sticta pulmonaria Schaer**	An Laubholz, auch an Felsen.	An ausländischen Eichenstämmen lagernd am Bahnhof Mersch. 89.
268	**Parmelia tiliacea Fr.**	An Laubbäumen, selten an Steinen.	An der Rinde einer Esche an der Strasse in Tüntingen, desgleichen in Bruch, an der Rinde eines Buchenstammes im Wald zwischen Ansemburg und Keispelt. 5. 89. 1. 89. 2. 89.
269	**P. perlata Ach.**	In Polstern an Laub- und Nadelhölzern.	An Zaunstangen an dem Manzenbach bei Meisenburg, bei Essingen an Tannennadeln, bei Lintgen im Wald auf Wurzeln, zwischen Bissen und Vichten an Buchen im Wald. 7. 90.
270	**P. revoluta Flk.**	An Bäumen u. Felsen.	An einem Buchenstamm im Rollingerwald

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
			nach Schoos zu, an einem Buchenstamm im Bahnhof von Colmar. 4. 88.
271	**Parmelia saxatilis Fr.**	An Stämmen, altem Holzwerk, auf Steinen, Felsen, auf der Erde, zwischen Moosen.	An einer Eschenrinde an der Landstrasse bei Angelsberg, an einem Ahornstamm bei Blascheid, an einem Pappelstamm im Park Joseph Pescatore in Bofferdingen. 3. 88. 1. 89. 4. 89.
272	**P. saxatilis varietas retiruga Th. Fr.**	Wie unter 271.	An einem Baumstamm zwischen Bissen und Vichten. 5. 88.
273	**P. physodes Ach.**	Auf Bäumen, Holz, Steinen, zwischen Moos auf der Erde.	An einem Buchenstamm im Wald bei Ansemburg, auf Kiefernaesten bei Colmar-Berg, desgleichen im Wald bei Fischbach, an einer Eschenrinde bei Bruch. 2. 89. 4. 89. 5. 90. 6. 90.
274	**P. physodes varietas labrosa Ach.**	Wie unter 273.	An einem Kiefernast bei Colmar. 3. 90.
275	**P. Borreri Turn.**	An Bäumen, auch an Felsen.	An einem Buchenstamm im Wald zwisch. Ansemburg u. Keispelt. 2. 89.
276	**P. ambigua Ach.**	An Rinden, abgestorbenen Stämmen, an Bretterwerk, selten an Steinen, häufig in Gebirgswäldern.	Am Grunde eines Kirschbaumstammes in einem Garten in Berschbach, an einem Baumstamm an der Strasse bei Schrondweiler. 8. 91. 10. 90.
277	**P. hyperopta Ach.**	Auf altem Holzwerk, an Nadelholz.	An einem Kiefernstamm lagernd am Bahnhof von Colmar. 8. 91.
278	**P. Sprengelii Flk.**	An Steinen u. Felsen.	Auf Dachschiefer in Berschbach. 9. 89.
279	**P olivacea Ach.**	An Bäumen, Holz und Steinen.	An einem Buchenstamm im Wald bei

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
			Bruch, an einem Baumstamm bei Finsterthal. 1. 89. 4. 90.
280	**Parmelia aspera Mass.**	An Bäumen, auch an Steinen.	An einem Buchenstamm im Rollingerwald, an einer Eschenrinde an der Strasse bei Angelsberg, desgleichen bei Lorentzweiler. 3. 90. 3. 88. 7. 88.
281	**P. aspera varietas exasperatula Nyl.**	An Bäumen, auch an Steinen.	Am Stamm einer Esche bei Kruchten. 12. 89.
282	**P. caperata Ach.**	An Bäumen, Holz und Steinen.	Auf Pappelrinde im Park Joseph Pescatore in Bofferdingen, an einem Bretterzaun b. Mersch. 4. 89. 5. 90.
283	**P. conspersa Ach.**	An Steinen u. Felsen.	An den Mauern der Langebrücke vor Mersch 3. 90.
284	**P. diffusa Th. Fr.**	An Rinden, abgestorbenen Stämmen, an Bretterwerk.	An einer Esche an der Strasse im Wald bei Angelsberg. 2. 90.
285	**P. ambigua Ach.**	An Rinden, abgestorbenen Stämmen, an Bretterwerk.	An einem Weidenstamm bei Berschbach. 8. 91.
286	**P. acetabulum Dub.**	An Laubbäumen, gern an Pappeln und Linden.	An einem Carpinusstamm bei der Grommeschmühle, bei Angelsberg, an der Strasse, häufig. 4. 88.
287	**Menegazzia pertusa Mass.**	An Laub- und Nadelholz.	An einem Kiefernstamm in Binzert, desgleichen bei der Schönfelser Schäferei. 7. 91. 9. 91.
288	**M. terebrata Mart.**	An Laubhölzern.	Auf einem Lärchenstamm bei Berg, a. einem Buchenstamm im Wald von Reckingen. 2. 90.
289	**Physcia ciliaris DC.**	An Bäumen, Sträuchern Holzwerk u. Steinen.	An einer Pappel im Wald a. d. Landstrasse bei Angelsberg. Bei Roost an dem Stamme

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
			einer Esche an der Strasse. 1. 90. 6. 91.
290	**Ph. ciliaris varietas leptophylla Wallr.**	An Bäumen, Sträuchern, Holzwerk und Steinen.	An einer Pappel an der Strasse in Binzert. 3. 89.
291	**Ph. ciliaris varietas crinalis Schleich**	Wie unter 289.	An einer Esche an d. Strasse bei Angelsberg. 6. 91.
292	**Physcia pulverulenta Nyl.**	An Bäumen, Mauern, Holzwerk, bemoosten Steinen und Felsen.	Am Stamm einer Esche bei Bofferdingen an der Strasse, desgleichen in Finsterthal, an einem Weidenstamm b. Schœnfels, bei Angelsberg und zwischen Hohlenfels und Tüntingen an Baumstämmen, bei Geismühl und Colmar an Rosskastanienstämmen. 4. 91. 7. 91. 3. 89. 5. 90. 7. 90.
293	**Ph. pulverulenta varietas pityrea Ach.**	Wie unter 292.	Auf Dachschiefer in Berschbach. 10. 89.
294	**Ph. caesia Nyl.**	An Steinen, Felsen, Ziegeln, auf Dächern, Holzwerk,	An einem Baumstamm an der Strasse bei Angelsberg, an einer Esche in Binzert und bei Bœwingen. 1. 89. 3. 88. 2. 89.
295	**Ph. stellaris Nyl.**	An Bäumen, Sträuchern, Holzwerk, Zäunen und Steinen.	An Baumstämmen an der Strasse von Bruch nach Säul, in Berschbach auf Hofpflastersteinen, an einem Lindenstamm an der Landstrasse in Roost, an an einem Pappelstamm bei Colmar, an einem Zaunpfahl am Bahnhof von Kruchten. 7. 90. 1. 89. 3. 89. 4. 91.
296	**Ph. stellaris varietas adscendens Th. Fr.**	Wie unter 295.	An Zweigen einer Hecke bei Büschdorf, 3. 91.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
297	**Physcia obscura Nyl.**	An Bäumen, Holz, Steinen, über Moosen.	An Zweigen einer Hecke in Berschbach, und an Steinplatten, an einem Pappelstamm an der Strasse b. Reckingen, an einem Baumstamm an der Strasse bei Kruchten, auf Dachschiefer in Schoos. 3. 92. 7. 90. 1. 89. 5. 91.
298	**Xanthoria parietina Th. Fr.**	An Bäumen, Brettern, Dächern, Mauern, Steinen.	An der Felserstrasse bei Berschbach an Pappeln, sehr häufig. 89.
299	**X. controversa Th. Fr. varietas pygmaea Bory.**	An Bäumen u. Steinen.	An Dachschiefer in Berschbach. 9. 89.
300	**X. controversa Th. Fr. var. stenophylla Wallr.**	An Bäumen u. Steinen.	An einer Esche an d. Strasse bei Kruchten. 12. 89.

Familie der Cladoniaceae.

301	**Cladonia papillaria Hoffm.**	Auf sterilem Boden, an Waldrändern, Dämmen, Wegen.	Am Rand eines Waldweges bei Kedingen u. Angelsberg, sowie bei Gosseldingen an Sandsteinfelsen. 11. 90. 9. 91.
302	**Cl. alicornis Flk.**	An sonnigen Hügeln, auf dürren Haiden, unfruchtbarem Boden.	In Binzert. 7. 91.
303	**Cl. alicornis Flk. varietas phyllocephala.**	Wie unter 302.	In Binzert auf Haideboden. 4. 88.
304	**Cl. turgida Hoffm.**	An Wegrändern, sonnigen Plätzen, Haiden, Sand- und Lehmgruben.	Zwischen Mœsdorf u. Scheuerhof an Moosen im Waldsandboden. 2. 92
305	**Cl. rangiferina Hoffm.**	An dürren Stellen, in Wäldern.	Auf Waldboden zw. Beringen und Angelsberg, in einem Kiefernwald in Binzert, bei Klingelscheuer. 4. 88. 86. 7. 88.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
306	**Cladonia uncialis Fr.**	Auf trockenem Sand- u. Haideboden, an Bergabhängen, in Schluchten, unter Gesträuch.	Unter Tannen zwisch. Moos bei Finsterthal, in einem Kiefernwald in Binzert. 7. 91.
307	**Cl. uncinata Hoffm.**	Auf Torf- u. Moorboden, in Nadelwäldern.	An einem absterbenden Stock im Wald bei Angelsberg, im Wald von Beringen an einem Wegrand. 4. 88.
308	**Cl. unc. varietas ventricosa Schaer.**	Wie unter 307.	Im Wald von Beringen an einem Wegrand. 4. 88.
309	**Cl. squamosa Hoffm.**	In Laub- und Nadelwäldern, zwisch. Moosen, an Holz und Steinen.	Auf beschattetem, moosigem Felsen im Wald b. Kedingen, unter Kiefern auf Moos im Wald bei Fischbach, auf der Erde am Bahnhof von Kruchten. 4. 88. 2. 92. 8. 90.
310	**Cl. squamosa varietas frondosa Nyl.**	Wie unter 309.	Im Rollingerwald auf Baumwurzeln in Moos. 5. 91.
311	**Cl. squamosa varietas lactea Flk.**	Wie unter 309.	Bei Nommern im Wald. 5. 91.
312	**Cl. furcata Fr.**	In Laub- und Nadelwäldern, in Haiden, an Abhängen, zwischen Moosen.	Auf sonniger Haide auf der «Lötzert» bei Gosseldingen. 5. 90.
313	**Cl. furcata varietas racemosa Hoffm.**	Wie unter 312.	Am Strassenrand bei Angelsberg im Wald auf Moosen, desgleichen bei Fischbach. 4. 88. 3. 92.
314	**Cl. furc. var. recurva Hoffm.**	Wie unter 312.	Im Wald bei Lintgen. 7. 91.
315	**Cl. furc. var. erecta Fw.**	Wie unter 312.	Im Wald bei Lintgen. 6. 91.
316	**Cl. furc. var. crispata Ach.**	Wie unter 312.	Auf den Binzerter Höhen nach Angelsberg zu. 86.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
317	**Cladonia furcata varietas cymosa Wallr.**	In Laub- und Nadelwälder, in Haiden, an Abhängen, zw. Moosen.	Im Wald von Angelsberg in der Richtung v. Beringen. 4. 88.
318	**Cl. furc. var. subulata Flk.**	Wie unter 317.	An lichten Stellen in Nadelwald in Binzert, unter Gebüsch bei Grewenknap. 7. 91. 3. 92.
319	**Cl. rangiformis Hoffm.**	An dürren Orten, in lichten Nadelwälder.	Auf der Binzerter Höhe. 7. 91.
320	**Cl. pungens Sm.**	An dürren, sterilen Stellen, in Nadelwälder.	Am Weilerbach. 5. 88.
321	**Cl. pyxidata Fr.**	Auf sterilem Wald- u. Haideboden, an Wegerändern, bemoosten Steinen, auf Schindel- und Strohdächern.	An einem Baumstamm im Rollingerwald, unter Gebüsch am Schwarzbach bei Geismühl, an Felsen in Binzert, auf Buchenstämmen in Finsterthal. 4. 92. 8. 91. 3. 88. 5. 90.
322	**Cl. pyxid. var. chlorophaea Flk.**	Wie unter 321.	In einem Kiefernwald in Binzert. 86.
323	**Cl. pyxid. var. neglecta Schaer.**	Wie unter 321.	Im Wald bei Angelsberg auf moosigem Felsen. 10. 91.
324	**Cl. pyxid. var. pocillum Fr.**	Wie unter 321.	An einer Hecke auf dem Boden bei Büschdorf, auf alter, moosiger Mauer in Mersch. 5. 91. 8. 91.
325	**Cl. pyxid. var. marginalis Hoffm.**	Wie unter 321.	Am Rand eines Grabens auf «Bullert» im Wald von Rollingen. 5. 91.
326	**Cl. fimbriata Fr. var. simplex Hoffm.**	Wie unter 321.	In Finsterthal. 6. 91.
327	**Cl. fimbr. var. cornuta Ach.**	In lichten Wäldern, zw. Moosen, an Baumstümpfen.	In Finsterthal. 3. 92.
328	**Cl. fimbr. var. radiata Schreb.**	Wie unter 321.	An Wegen im Rollingerwald. 3. 91.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
329	Cl. fimbr. var. tubæformis Hoffm.	Wie unter 321.	Am Wegrand im Wald von Rollingen in der Richtung nach Schoos. 4. 88.
330	Cl. fimbr. tubæformis subvarietas denticulata Flk.	Wie unter 321.	Auf Sandsteinfelsen bei Klingescheuer. 6. 88.
331	Cl. verticillata Flk.	In lichten Nadelwäldern, am Saume der Wälder, auf Haideplätzen.	An sonnigem Waldrand bei Klingelscheuer. 5. 90.
332	Cl. agariciformis Wulf.	In Nadelwäldern.	Auf morschem Baumstamm im Rollingerwald. 3. 92.
333	Cl. gracilis Cœm.	In lichten Nadelwäldern, am Rande der Wälder, auf Haiden.	Auf trockenem Haideboden in Binzert, häufig. 7. 91.
334	Cl. degenerans Flk.	In Nadelwäldern, an Waldrändern.	In einem Nadelwald, in Binzert auf moosigen Felsen. 7. 91.
335	Cl. deformis Hoffm.	In Wäldern u. lichten Schonungen zwischen Moosen.	In Binzert auf Haideboden. 4. 88.
336	Cl. pityrea Flk.	Auf faulenden Baumstümpfen in Wäldern.	Auf faulendem Weidenstamm bei Berschbach. 8. 91.
337	Cl. carneola Fr.	Auf humusreichem Waldboden, faulendem Holz.	Auf sandigem Hügel an Felsen bei Klingelscheuer, im Wald bei Fischbach. 6. 88.
338	Cl. cornucopioides Nyl.	Auf Sandboden, an Waldrändern, in Schonungen.	Am Waldrand bei Schönfels zwischen Moosen. 5. 88.
339	Cl. digitata Hoffm. var. simplex Wallr.	In Wäldern, a. Grunde alter Bäume, an schattigen Orten, an Grabenrändern.	Im Walde bei Fischbach auf moosigen Felsen. 3. 90.

Familie der Peltideaceae.

340	Peltigera canina Schaer.	In Wäldern, a. Haiden, an Wegerändern und Rainen.	In Binzert, sehr häufig auf dem ganzen Gebiet. 9. 91.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
341	**P. canina varietas crispata Rbh.**	Wie unter 340.	Auf bemoostem Stamm im Rollingerwald. 9. 91.
342	**P. aphthosa Hoffm.**	An Waldrändern, Abhängen, Böschungen, in Hohlwegen.	Auf den Binzerter Höhen, an einem Wegrand im Rollingerwald, im Wald bei Fischbach und bei Schoos. 4. 88. 5. 90. 3 88.
343	**P. venosa Hoffm.**	An schattigen, feuchten Orten, an Böschungen, in Hohlwegen, an Bergabhängen, in Felsritzen, in kleinen Höhlen.	In einem Hohlweg auf «Moschelt» im Wald bei Lintgen, bei Bruch und bei Angelsberg im Wald. 2. 90. 9. 97.
344	**P. horizontalis Hoffm.**	Auf bemoosten Felsen, auf Waldboden, an Baumwurzeln, auf Steinen.	An einem Baumstumpf im Wald bei Gosseldingen, auf einem bemoosten Stein am Bahnhof von Colmar im anliegenden Wald, im Wald bei Stuppig und Weyer. 9. 91. 89.
345	**P. polydactyla Hoffm.**	An bemoosten Stellen in Wäldern, auf Grasplätzen, an Felsen und Steinen.	Auf einer Kohlenstelle auf Sandboden im Walde in Binzert. 7. 91.
346	**P. rufescens Hoffm.**	An Waldrändern, auf Holzschlägen, auf Haideboden.	An der Landstrasse am Saume des Waldes bei Angelsberg. 3. 88.
347	**P. malacea Fr.**	An Waldrändern, auf Haideplätzen, zwischen Moosen.	Auf trockenem Sandboden in Binzert, an einem Baumstock im Wald bei Lintgen, im Wald von Fischbach. 6. 91. 7. 91.
348	**Solorina saccata Ach.**	Auf wenig feuchtem, kalkhaltigem Boden, an beschatteten Felsen und in Felsritzen.	Am Waldrand an der Landstrasse bei Reckingerbarrière, am Waldsaum an der Landstrasse bei Angelsberg. 5. 90. 3. 88.

№	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit
		Familie der Pannariaceae.	
349	**Pannaria rubiginosa Kbr.**	An bemoosten Bäumen und Felsen.	Im Walde bei Angel berg an einem alt Buchenstamm. 6. 91.
350	**P. lanuginosa Kbr.**	An schattigen Felswänden, über Moos, an faulendem Holz.	An einer Felswand Fischbach. 9. 91.
		Familie der Lecanoraceæ.	
351	**Placodium saxicolum Kbr.**	Auf Gestein, Gemäuer, Ziegeln, Schiefer und Holzwerk.	An einer alten Mau bei Colmar. 5. 92.
352	**Pl. saxicolum var. compactum Rbh.**	Wie unter 351.	An Mauersteinen b Colmar. 8. 91.
353	**Pl. lentigerum Th. Fr.**	Auf Kalkboden, auf abgestorbenen Moosen.	Auf abgestorbene Moospolstern auf d Binzerter Höhen üb Sandsteinfelsen. 6. 91.
354	**Pl. murorum Hoffm.**	An Felsen, Steinen, Mauern, Ziegeln, Schiefer, Holzwerk, Bretterwänden.	An einer Hofmauer Berschbach. 5. 88.
355	**Callopisma pyraceum Kbr.**	An glatten Baumrinden, besonders an Populus und Salix, an Holzwerk, Steinen, auf Moosen.	An einer Pappelwur bei Bissen. 9. 96.
356	**C. ferrugineum Th. Fr.**	An Baumrinden, Steinen, Felsen, Moosen.	An einer Eschenrin am Weiher in Finst thal. 7. 91.
357	**Icmadophila æruginosa Trev.**	An modernden Baumstümpfen, Holz, Steinen, Erde, über Moosen.	In einem Hohlweg Wald bei Lintgen Erde und Moos. 6. 91.
358	**Lecania fuscella Mass.**	An glatter Rinde von Laubbäumen.	An einer Syringari in Berschbach. 8. 91.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
359	**Lecanora subfusca Ach.**	Ueberall sehr häufig.	Am Fuss eines Rosskastanienstammes in Berschbach. 5. 92.
360	**L. subfusca varietas allophana Ach.**	An Holz und Rinden.	An einer Eschenrinde bei Bœvingen. 3. 91.
361	**L. subfusca allophana subvarietas campestris Schær.**	An Steinen.	An einem Sandsteinfelsen bei Beringerberg. 3. 91.
362	**L. subfusca allophana subvarietas muscicosa Ach.**	Auf Moosen.	Auf Moosen bei Meisenburg. 7. 90.
363	**L. pallida Kbr.**	An Baumrinden.	Auf Buchenrinden zw. Bissen und Vichten. 5. 88.
364	**L. pallida varietas angulosa Schreb.**	An Rinden.	An einer Prunusrinde in Berschbach. 5. 88.
365	**L. Hageni Kbr.**	An Rinden, Stämmen, altem Holzwerk und Steinen.	An Kiefernaesten und Tannenbrettern bei Mersch. 8. 91.
366	**L. varia Ach.**	An Laubbaumrinden, an altem Holzwerk.	Auf einer Kiefernrinde in Binzert, an einem Kiefernzaunpfahl bei Mersch. 4. 91.
367	**L. atra Ach.**	An Steinen, Felsen, selten an Rinden und Holz.	An einer Eschenrinde bei Meisenburg. 5. 91.
368	**Urceolaria scruposa Ach.**	An Steinen, Felsen, auf Sand, über Moosen, an Pflanzenresten.	Am Wegrand zwisch. Berschbach und Schoos am Eingang des Waldes, i. Rollingerwald a. einem Wegrand. 4. 88. 5. 91.
369	**U. scruposa varietas bryophila Ehrh.**	Wie unter 368.	Auf Haideboden in Binzert, an einem Wegrand im Rollingerwald. 6. 91.
370	**U. scruposa varietas arenaria Schær.**	Wie unter 368.	An Felsen auf der Binzerter Höhe. 5. 90.
371	**Ochrolechia tartarea Mass. var. muscicola Kbr.**	An Steinen und Felsen, selten an Rinden, auf Moosen.	Auf abgestorbenen Moosen über Sandsteinfelsen am Manzenbach bei Meisenburg.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
		Familie der Pertusariaceae.	
372	**Pertusaria communis DC.**	An Bäumen, besonders an Buchen u. Eichen.	An einer Buchenrind i. Wald zwischen Bersch bach u. Schoos, desg zwischen Bissen und Vichten. 4. 88.
373	**P. communis varietas variolosa Wallr.**	Wie unter 372.	An einer Eschenrind an der Landstrasse b Angelsberg, an alte Rinde zwischen de Weilerbach u. Roost. 4. 91. 90.
374	**P. ocellata Kbr. var. corallina Ach.**	An Sandsteinfelsen.	An Sandsteinfelsen a der Binzerter Höhe. 5. 90.
375	**P. ocel. var. discoidea Kbr.**	Wie unter 374.	An Sandsteinfelsen a der Binzerter Höhe. 5. 90.
376	**P. rupestris Kbr.**	An Felsen, Steinen, besonders an Sandstein.	An einem Sandstei felsen bei Weyer. 4. 89.
377	**P. multipunctata Nyl.**	An Birken u. Buchen.	An ein. Buchenstam im Rollingerwald. 5. 91.
		Familie der Lecideaceae.	
378	**Thallœdema cæruleonigrescens Lightf.**	An Kalkboden und Felsen.	In Binzert auf San steinfelsen in abgestor Moos. 6. 91.
379	**Bacidea fraxinea Lönnr.**	An Buchen, Linden, Ulmen, Weiden, Eichen, Eschen u. Hainbuchen, an altem Holzwerk.	An einer Eschenrind an der Strasse bei Kruchten. 12. 89.
380	**Biatorina pineti Ach.**	Auf Grund alter Baumstämme, besonders an Kiefern, Erlen u. auch auf der Erde u. zw. Moos.	An einer Kiefernrind in Binzert. 7. 91.
381	**Biatora rupestris Fr. var. incrustans DC.**	An Kalkfelsen.	An einem Kalkfels bei Tüntingen. —

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
382	**Bæomyces roseus Pers.**	Auf nackter Erde, an lichten Stellen, auf allen Haiden.	Auf Haiden und Grabenrändern besonders b. Rollingen, Lintgen, Nommern, Schönfels, Lorentzweiler, Finsterthal. 4. 90. 5. 90.
383	**Sphyridium byssoides Th. Fr. var. rupestre Pers.**	In schattigen Haiden, Laubwäldern, an Hohlwegen, auf Steinen.	Auf Sandsteinen im Wald bei Lintgen und Angelsberg. 4. 89. 10. 93.
384	**Buellia parasema Th. Fr.**	An Rinden.	Auf Prunusrinde in Berschbach, auf Buchenrinde bei Bœwingen. 5. 88. 3. 91.
385	**B. premnea Fr.**	An Rinden.	An Haselnussrinde in Berschbach. 4. 88.
386	**Lecidia contigua Fr.**	Auf Bergen im Gestein.	Auf Sandstein bei Mersch. 5. 90.
387	**L. fumosa Th. Fr.**	An Felsen und Steinen.	Im Keupersandstein b. Bissen. 4. 91.

Familie der Graphidaceae.

388	**Opegrapha varia Pers.**	An Baumrinden, selten an Nadelholz, Holzwerk und Steinen.	An abgestorbenem Weidenholz bei Berschbach. 9. 93.
389	**O. varia varietas diaphora Ach.**	Wie unter 388.	An abgestorbenem Weidenholz bei Berschbach. 8. 91.
390	**O. herpetica Ach.**	An Laubholzrinden.	An Buchenrinde im Wald bei Lintgen. 4. 91.
391	**O. atra Pers.**	An glatten Rinden alter Laubhölzer, selten an Nadelholz.	An Birkenrinde im Garten Fischer in Berschbach. 4. 91.
392	**Graphis scripta Ach.**	An Baumrinden.	An Buchenrinden bei Klaushof, an Eichenrinden bei Schœnfels, an Buchenrinden bei Bissen. 3. 89. 5. 88. 4. 91.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit
		Familie der Caliciaceae.	
393	**Coniocybe furfuracea Ach.**	Auf Sandstein, an Erde, entblössten Wurzeln, am Grunde alter Laubhölzer, a. trockenem faulem Holz.	Auf Sandstein zwisc Stuppig und Weyer, a faulendem Buchenho bei Bruch. —
394	**C gracilenta Ach.**	In hohlen Baumstämmen, an trockenfaulem Holz, entblössten Wurzeln.	An faulendem Weide holz bei Berschbach. —
		Familie der Pyrenulaceae.	
395	**Pyrenula nitida Ach.**	An glatten Buchenrinden, an Haseln und Eschen.	An Fagusrinde i Wald bei Ansemburg. 96
		Familie der Lecothecaceae.	
396	**Lecothecium corallinoides Kbr.**	An Kalk- und Sandsteinfelsen.	An Sandsteinfelsen i Angelsbergerwald an Strasse. —
		Familie der Collemaceae.	
397	**Physma compactum Kbr.**	An trockenen, sonnigen Felsen, zwischen Moosen auf der Erde.	Am Strassenrand z Mersch und Recking 7. 90.
398	**Synechoblastus flaccidus Kbr.**	An feuchtem Gestein, selten an Rinden und Steinen in Flussbetten.	Auf Eschen u. Papp rinde an der Strasse Wald bei Angelsbe auf Steinen b. Mari thal auf einer alt Mauer, in Berschba auf den Steinplatt einer Gartenmauer. 1. 90. 5. 90. 88.
399	**Collema cristatum Schær.**	An feuchten Kalkfelsen.	Am Wegrand im Sa im Rollingerwald. 3. 92.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort und Fundzeit.
400	**C. tenax Kbr.**	Auf feuchtem Lehm- und Kalkboden, zwischen Moosen.	Auf Mergel- u. Kalkboden bei Berschbach, an Gryphitenkalkfelsen bei Tüntingen. 3. 92. 4. 90.
401	**C. turgidum Ach.**	An Kalkfelsen.	An einem Wurzelstock bei Fischbach. 2. 92.
402	**C pulposum Ach.**	Auf wenig feuchtem Boden, auf Moosen, am Grund alter Stämme.	Auf einer Mauer in Berg u. desgl. in Mersch. 3. 90. 4. 88.
403	**C. pulposum var. granulatum Sw.**	Wie unter 401.	Auf feuchter Gartenmauer in Fischbach. 3. 91.
404	**C. pulposum var. nudum Schær.**	Wie unter 401.	Auf Boden an einem Wege bei Mersch. 4. 91.
405	**C. cheileum Ach.**	Auf nackter Erde, an Mauern, Felsen, zwischen Moosen.	Auf Mauerplatten über Moosen in Berg. 4. 89.
406	**Leptogium lacerum Fr.**	Auf Steinen und Felsen, auf Erde, zwischen Moosen, an Mauern.	In der Schlucht des Baches in Binzert bei Angelsberg unter Moosen, bei Lintgen unter Moosen an einem Waldweg. 5. 88. 6. 89.
407	**L. lacerum var. pulvinatum Ach.**	Wie unter 405.	Am Waldrand an der Strasse bei Angelsberg. 5. 88.
408	**L. lacerum var. majus Kbr.**	Wie unter 405.	Am Rande des alten Angelsberger Weges in Binzert. 4. 89.
409	**Synalissa ramulosa Kbr.**	Zwischen Moosen und anderen Flechten an Felsen	Auf Steinen der Langebrücke vor Mersch. 4. 88.

h) *Klasse der Pilze (Fungi.)*

A) — **Ascomycetes** (Schlauchpilze).

I. Discomycetes (Scheibenpilze).

№	Name.	Standort.	Fundort.
410	**Exoascus Pruni Fuckel.** Narrentasche.	Auf Prunus-Arten.	Auf Prunus domesti Lintgen, Mersc auf Prunus spino Lorentzweiler, Büschdo
411	**Morchella esculenta Persoon.** Morchel.	In lichten Wäldern, Gebüsch, Grasplätzen.	Schönfels, Marie thal, Ansemburg.
412	**Otidea cochleata Fuckel** Oehrling.	In Wäldern, auf dem Boden zwischen Moos und Laub, auch auf Brandstellen.	Auf lehmigem Wa boden b. Reckinge Schoos u. Mersch
413	**Pseudopeziza trifolii Fuckel.**	Auf lebenden Blättern (Oberseite) verschied., besonders cultivierter Trifoliumarten.	Auf Trifolium praten bei Berschbach u Mersch, auf T folium medium, a. W lerbach und bei Mersc
414	**Dasyscypha Willkommii Hartig.**	An abgestorbenen Zweigen von Larix decidua. Der vorausgehende Conidienpilz auf den lebenden Zweigen, die er abtödtet.	Schönfels, Finste thal, Berschbach
415	**Propolis faginea Karsten.**	Auf entrindeten Zweigen bes. von Quercus, Fagus, Betula, Salix, Carpinus. Hirnschnitt der Bäume, freiliegendem Holz, auf Stengeln grösserer Kräuter.	Auf Quercus (C mar), Fagus (Lintge Bruch), Salix (Bersc bach), ... Rubus f ticosus (Helperkna

II. Pyrenomycetes (Kernpilze).

416	**Clitheris quercina Fries.**	An abgestorbenen, berindeten Aesten von Quercus.	Ueberall in den W dern: Beringen Bruch, Schönfels Mersch, Rollinge

Nr.	Name.	Standort.	Fundort.
417	**Diaporthe strumella Fuckel.**	Auf abgestorbenen Zweigen von Ribes-Arten.	Klaushof, Beringen, Boevingen, Berschbach, Angelsberg.
418	**Pleospora herbarum Rabenhorst.**	Auf dürren Stengeln verschiedener Kräuter, auch deren Blättern, Schoten und Hülsen.	Berschbach, Colmar, Meisenburg, Rollingen, Mersch, Büschdorf, Lintgen, Lorentzweiler, Reckingen, Schönfels, Kruchten, u. s. w.
419	**Cucurbitaria Berberidis Gray.**	Auf dürren Berberisaesten.	Berschbach, Bissen.
420	**Nectria ditissima Tulasne.**	Auf Aesten u. Stämmen von Fagus silvatica und Pirus malus.	Berschbach.
421	**Erysibe pisi Schroeter.**	Auf Blättern u. Stengeln verschiedener krautartiger Pflanzen.	Berschbach, Colmar, Mersch, Meisenburg, resp. auf Pisum sativum, Orobus niger, Galium aparine, Trifolium pratense.

B) **Basidiomycetes** (Ständerpilze).

422	**Lycoperdon gemmatum Batsch.**	In Wäldern, auf Triften, Weiden, Haiden gemein.	Rollingen, Finsterthal.
423	**Amanita muscaria Persoon.**	In lichten Wäldern, bes. Birkenwäldern, Haiden, Waldwegen, gemein.	Rollingen, Finsterthal.
424	**Polyporus hirsutus Fries.**	Auf lebenden Stämmen und Zweigen verschiedener Laubbäume.	Fischbach, Kruchten, Mersch, Schoos, Büschdorf, Berschbach.

C) **Uredinacei.**

425	**Melampsora salicis capreæ Winter.**	Auf Blättern von Salix caprea.	Reckinger-Barrière.

Nr.	Name.	Standort.	Fundort.
426	**Puccinea compositarum Schlechtendal.**	Auf Compositen.	Berschbach.
	D) **Ustilaginacei.**		
427	**Ustilago segetum Persoon.**	Auf Getreide.	Lintgen.
	E) **Zygomycetes.**		
428	**Phytophthora infestans de Bary.**	Auf Kartoffeln.	Bruch.
429	**Cystopus candidus Léo.**	Auf Blättern.	Auf Cochlearia armoracea in Berschbach.
	F) **Oomycetes.**		
430	**Mucor mucedo L.**	Auf Hunde- u. Pferdemist.	Berschbach.
	G) **Chytridei.**		
431	**Synchytridium taraxaci de Bary.**	Auf Taraxacum officinale.	Berschbach.
	H) **Myxomycetes.**		
432	**Reticularia lycoperdon Bulliard.**	An altem Holz und Rinde lebender Bäume.	Bruch, Büschdorf Berschbach, Hünsdorf, Binzert.
433	**Lycogala Epidendron L.**	Baumstrünke.	Angelsberg, Geismühl, Berschbach*)

*) Siehe Fussnote zum Schluss der Einleitung von Kapitel 4. Bis dahin sind erschienen: I. Theil. Ascomycetes. Nachträge I und Nachträge II.