Article V. Cotisation des membres.

La cotisation s'élève à cinq francs pour les membres effectifs.

Article VI. Publications.

La société publie un bulletin mensuel.

Article VII. Modifications aux statuts.

Les propositions de changements à faire aux statuts doivent être annoncées par écrit au président, avant l'assemblée du mois de novembre; l'assemblée générale décide des changements proposés; les propositions ne sont admises qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents.

Article VIII. Dissolution de la Société.

La dissolution de la société ne peut être prononcée que par l'assemblée générale et à la majorité de deux tiers des voix de tous les membres effectifs. En cas de dissolution, la propriété de la société restera sous la garde du dernier président et si une nouvelle société, poursuivant le même but, n'est pas formée dans le délai d'un an, la propriété de celle-ci est mise à la disposition du Gouvernement.

Ainsi délibéré à l'assemblée générale du 3 février 1907.

Vorstudien zu einer Pilzflora

des Grossherzogthums Luxemburg.

II. Theil. Basidiomycetes et Auriculariei.

Von Dr. med. **Johann Feltgen.**
Herausgegeben von Dr. med. **Ernst Feltgen.**

Fortsetzung.

2. *Hygrocybe* Fries 1821. Fruchtkörper weich, wässerig-saftig, zerbrechlich. Hut feucht klebrig, trocken glänzend, selten flockig-schuppig. Stiel hohl, weich. Lamellen weich.

* Lamellen herablaufend.

433. **Hygrophorus ceraceus** Fries.
(Synon.: Agaricus c. Wulfen apud Jacquin 1788.)

In Wäldern und Gebüsch, auf Grasplätzen. August bis October.

Häufig (keine Fundorte angegeben). Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 31.

434. **Hygrophorus miniatus** (Scop.) Schrœter.

(Synon.: Agaricus m. Scop. 1772; Ag. coccineus Schæff. 1774; Ag. scarlatinus Bull.; Ag. multicolor Battara; Ag. kermesinus Flor. dan.; Hygrophorus coccineus Fries.)

Auf Wiesen, Triften, an Sümpfen u. s. w. August bis November.

Ohne Angabe von Fundorten. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 31, sub H. coccineus (Schæff.)

435. **Hygrophorus flammans** (Scop.) Schrœter.

(Synon.: Agaricus fl. Scop. 1772; Ag. coccinellus Ehrbg.; Ag. glutinosus Flor. dan.; Ag. miniatus Fr.; Hygrophorus miniatus Fries.)

Auf Gras- und Haideplätzen, zwischen Gras und Moos. Juli—October.

Ohne Angabe von Fundorten. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 31, sub Hygrocybe miniatus (Fries).

* Lamellen nicht herablaufend, lose oder schmal angeheftet.

436 **Hygrophorus puniceus** Fries.

(Synon.: Agaricus p. Fries 1821; Ag. aurantius Vahl.)

Auf Wiesen, Waldrändern, Haideplätzen. September, October.

Ohne Angabe von Fundort. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 31.

437. **Hygrophorus conicus** Fries.

(Synon.: Agaricus c. Scop. 1772; Ag. croceus Bull.; Ag. aurantiacus Sow.; Ag. hyacynthus Batsch; Ag. tristis Persoon.)

Auf Grasplätzen, Wiesen, Triften. Juni—November.

Clausen-Höhe, auf moosig-grasiger Felsplatte. IX. 99! — Ohne Fundort-Angabe. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 31.

438. **Hygrophorus chlorophanus** Fries.

(Synon : Agaricus ch. Fries 1821.)

Auf Grasplätzen zwischen Moos. August—October.

Tüntingen-Leesbach. VIII. 01!

439. **Hygrophorus psittacinus** Fries.

(Synon.: Agaricus ps. Schæffer 1774; Ag. psittacoides Battara; Ag. chamaeleo Bulliard.)

Auf Triften, Haideplätzen, Wiesen, zwischen Gras und Moos. September, October.

Ohne Angabe von Fundort. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 32. — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 278 (sub Ag. chamaeleo Bulliard).

LIII. Gattung. **Nyctalis** Fries 1825.

440. **Nyctalis parasitica** Fries.

(Synon.: Agaricus p. Bulliard 1791.)

Auf alten, faulenden Russula- und Agaricus-Arten. September—November.

Angelsberg, Wald, auf faulem Blätterpilz, IX. 96! Chlamidosporen hyalin bis hellbräunlich, elliptisch, mit hyalinem, kegelförmigem, geradem oder etwas gekrümmtem Apiculum; Sporen mit 1—3 Oeltropfen, 15/9 μ; Apiculum 6—8/5—7 μ, Stiel etwas breiter, verschieden lang. — Hut 1 cm breit, Stiel 1/2—1 cm lang.) — L. Md. Csp. in Bijdr. III. p. 279.

441. **Nyctalis lycoperdoides** (Bull.) Schroeter.

(Synon.: Agaricus l. Bull. 1783; Merulius l. DeC.; Asterophora l. Dittmar; Onygena agaricina Schwem.; Asterophora agaricoides, lycoperdoides, physaroides, trichioides Fr.; Asterophora agaricola, lycoperdoides Crd.; Asterotrichum Dittmari Bon.; Astrotrogus asterophorus Fr.; Sepedonium angulatum Klotsch; Nyctalis asterophora Fries.)

Auf alten, faulenden Russula- (adusta), Lactaria- (vellerea etc.) und Agaricusarten. September—November.

Auf Russula nigricans: Grünewald-Dommeldingen. IX. 01. Npp. — Auf Russula adusta: Grünewald-Helmsingen. IX. 01! — Auf Russula foetens. X. 1881. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 37, sub Nyctalis asterophora Fr.

LIV. Gattung. **Gomphidius** Fries 1838.

442. **Gomphidius viscidus** Fries.

(Synon.: Agaricus v. Linn. 1758; Ag. rutilus, ? rutilans Schæff.; Ag. lubricus Scop.; Ag. Gomphus Persoon.)

In Wäldern, besonders Nadelwäldern, zwischen Moos. August—November.

Baumbusch, in Nadelwald. XI. 99! — Beaufort-Haide, unter Kiefern. VIII. 01! — Reisdorf; Ansemburg; Kipenhof. Im Herbst. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 42.

443. **Gomphidius glutinosus** Fries.

(Synon.: Agaricus gl. Schæff. 1762; Ag. visidus Persoon.)

In Wäldern, Gebüsch, auf Grasplätzen, zwischen Moos und Gras. Juli—November.

Bruch (Mersch), in Nadelwald. VIII. 91! — Godbringen, in Nadelwald. IX. 92! — Mersch (Binzert), in Nadelwald. X. 93! — Luxemburg, Fort Thüngen. X. 99! — Baumbusch, in Laubwald. IX. 01! (var. roseus Fr.) — Grünewald-Dommeldingen, in Nadelwald. IX. 01! *(Forts. folgt.)*

Luxemburg. — Buchdruckerei P. Worré-Mertens.