insel Malakka und im indischen Archipel. Die Schwanzlosigkeit muß also doch wohl einen anderen Grund haben.

Die Katze ist nun Allerweltstier, Kosmopolit. Sie ist auch auf allen Schiffen zu Haus, insbesondere auf englischen (die Deutschen bevorzugen Hunde), wie ich 1905/06 in England oft beobachten konnte.



Vorstudien zu einer Pilzflora

des Grossherzogthums Luxemburg.

II. Theil. Basidiomycetes et Auriculariei.

Von Dr. med. **Johann Feltgen.**
Herausgegeben von Dr. med. **Ernst Feltgen.**

Fortsetzung.

LXVI. Gattung. **Ochroporus** Schrœter 1888.

1. Untergatt. **Poria** Pers. (in der Begrenzung von Karsten)

Fruchtkörper vollständig auf der Unterlage aufgewachsen, krusten oder polsterförmig.

568. **Ochroporus contiguus** (Pers.) Schrœter,
(Synon.: Boletus c. Pers. 1801; Polyporus croceus Karst.; Polyporus contiguus Fries.)

An altem faulendem Holz, auch an lebenden Stämmen, oft in weiter Ausdehnung. Das ganze Jahr hindurch.

Auf verwesenden Balken: Hüttenwerk Colmar. VII. 92! — Limpertsberg. In. Ctrb. p. 76.

569. **Ochroporus ferruginosus** (Schrad.) Schrœter.
(Synon.: Boletus f. Schrad.; Polyporus f. Fries.)

An faulendem Holz und alten Baumstämmen und Aesten.

Auf abgestorbenem Pappelstamm, lagernd im Bahnhof Colmar. V. 92! (Sporen hyalin, 5—7 / 4,5—5 μ.)

570. **Ochroporus umbrinus** (Pers.) Schrœter.
(Synon.: Boletus u. Pers.; Polyporus u. Rostkovius.)

An faulenden Baumstämmen (Sorbus, Acer u. s. w.).

Auf Rinde von Acer campestre: Mösdorf-Scheuerhof. VI. 93!

2. Untergatt. **Apodoporinus** Schroeter.

Fruchtkörper ungestielt, mit breitem Grunde aufsitzend und von der Unterlage abstehend. Röhren abwärts.

A. **CARNOSI.** Anfangs fleischig-saftig, später erhärtend.

* *Placodermei suberosi* Fries. Zuletzt korkig oder lederartig, mit dünner, kahler Rinde.

571. **Ochroporus pseudoigniarius** (Bull.) Schroeter.

(Synon.: Boletus ps. Bull. 1790; Bol. fomentarius γ Pers.; Bol. dryadeus Pers. 1799; Polyporus dryadeus Fries.)

Am Grunde alter Stämme von Quercus Robur. Einjährig, im Juli beginnend, zum Herbst reifend, im Winter vergehend. Arger Schädling.

Geismühl, in Eichen- und Buchenwald am Schwarzbach, am Grunde eines Eichenstammes. VIII. 92! — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 270.

572. **Ochroporus odorus** Linn.

(Synon.: Boletus o. Linn.; Bol. suberosus Bolt.; Polyporus o. Sommerf.; Trametes o. Fries; — Fungus salignus Linder Fl. Wicksberg.)

Auf Salix (caprea u. s. w.)

Auf altem Weidenstamm (S. alba): Berschbach. IX. 93! (Hut glatt, kahl, blaß, Substanz und Poren blaß ockerfarben.)

* *Anodermei* Fries. Ohne Rinde, aber in der Jugend oder dauernd filzhaarig oder zottig.

573. **Ochroporus nidulans** (Bulliard).

(Synon.: Boletus suberosus Bull.; Polyporus nidulans Fries.)

An Eichen und Buchen.

Grünewald-Helmsingen: auf Buchenast und über Reisig und Nadeln verbreitet. IX. 02! — Rollingergrund: an altem Buchenstamm auf einem Holzlager. Ln. Ctrb. 1er suppl. p. 85. — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 270 (sub Bol. suberosus Bull.).

B. **STUPPOSI.** Von Anfang an trocken, faserig, zuletzt fast wergartig weich oder korkartig. Hut filzig oder zottig, unberindet.

574. **Ochroporus vulpinus** (Fr.) Schroeter.

(Synon.: Polyporus v. Fries 1852; Pol. onticularis Wahlenbg.; Pol. hispidus Rostk.; Pol. fibrillosus Karsten.)

Auf alten Stämmen verschiedener Laub- (Populus, Prunus Padus u. s. w.) und Nadelhölzer. August bis November.

Auf altem Weidenstamm: Berschbach. IX. 61!

C. **LIGNOSI.** Bald holzartig erhärtend.

575. **Ochroporus radiatus** (Sow.) Schrœter.
(Synon.: Boletus r. Sow. 1799; Polyporus r. Fries.)

An alten Stämmen von verschiedenen Laubhölsern, besonders Alnus glutinosa. August—Dezember.

576. **Ochroporus cryptarum** (Bull.) Schrœter.
(Synon.: Boletus cr. Bull.; Polyporus nudatus Pers.; Polyporus cryptarum Fries.)

An faulendem Holz, besonders in Bergwerken.

Luxemburg-Fort Olizy: auf alten Eichenbalken einer Caponnière. IX. 1880. Ln. Ctrb. 1er suppl. p. 86. — „In cryptis", auf Balken. L. Md. Csp. in Bijdr. III, p. 269.

577. **Ochroporus triqueter** (A. S.) Schrœter.
(Synon.: Boletus tr. Alb. et Schw. 1805; Polyporus tr. Fries.)

An Aesten und Stämmen von Pinus silv. Herbst bis Frühling.

An Pinuspfählen eines Zaunes: Schönfels. XII. 92!

578. **Ochroporus salicinus** (Pers.) Schrœter.
(Synon.: Boletus s. Pers. pr. p. 1801; Polyporus salicinus Fries.)

An alten Stämmen von Salix (besonders Caprea und alba) und Carpinus. Das ganze Jahr hindurch.

Auf Salix alba: Lorenzweiler. VII. 91! — Berschbach. VIII. 91! und IV. 92! — Schrontweiler. VI. 62! — Im Innern hohler Stämme von Salix alba: zwischen Manternach und Mertert, am Ufer der Syr. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 43. — Walferdingen, vereinzelt auf Weidenbäumen. L. Md. Csp. in Bijdr. III. p. 270. — Exsicc. Rhdt.

579. **Ochroporus conchatus** (Pers.) Schrœter.
(Synon.: Boletus c. Pers. 1796; Polyporus c. Fries.)

An alten Stämmen, besonders von Weiden (fragilis, caprea, alba), auch Carpinus, Fagus. Das ganze Jahr, besonders im Herbst.

Auf Salix alba: Berschbach. X. 91! — Manternach, am Ufer der Syr. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 43.

580. **Ochroporus Ribis** (Schum.) Schrœter.
(Synon.: Boletus R. Schumacher 1803; Agaricus R. Duby; Polyporus ribesius Pers.; Polyporus Ribis Fries; Trametes R. Fries).

In Gärten, am Grunde alter Stöcke von Ribes (rubrum, Grossularia) und Rosa. Das ganze Jahr, besonders October und November.

Auf Ribes rubrum: Berschbach. X. 91! — Dickirch und Schloss Möstroff. 1863 und 1865. Ln. Ctrb. p. 76. — Exsicc. Tinant. — Exsicc. Koltz.

581. **Ochroporus fomentarius** (Linn.) Schrœter.
(Synon.: Boletus f. Linn. 1755; Bol. ungulatus Bull.; Polyporus fomentarius Fries.)

An alten Baumstämmen, besonders von Fagus und Betula. Das ganze Jahr hindurch.

Exsicc. Koltz: auf Fagus. — Auf Fagus und Quercus: Wald zwischen Junglinster und Altrier, rechts von der Straße Luxemburg-Echternach. Ln. Ctrb. 1er suppl, p. 86.

582. **Ochroporus nigricans** (Fr.) Schrœter.
(Synon.: Polyporus n. Fries.)

An Birken und andern Laubbäumen. — Wird von Schrœter (Crypt.-Fl. v. Schles. p. 486, Anmerkung) für eine Altersform von Polyp. fomentarius gehalten, von diesem nur durch eine glänzend schwarze, harte, glatte Oberfläche verschieden. Winter, Costantin et Dufour, Oudemans u. a. halten ihn für eine besondere Species und geben als Substrat an: Betula (Winter), Salix (Costantin), Betula und Salix (Oudemans).

Auf faulem Wurzelstock: Welscheidt. XI. 91! — Auf Salixstamm: Dommeldingen. XI. 99. F. Heuertz.

583. **Ochroporus igniarius** (Linn.) Schrœter.
(Synon.: Boletus i. Linn. 1755; Bol. obtusus Pers.; Polyporus loricatus α Pers.; Polypotus igniarius Fries.)

An verschiedenen Laubbäumen (und ihnen ein Schädling), besonders von Salix fragilis, Prunus domesticus und Pirus malus, aber auch an Cerasus avium, Syringa vulgaris, Robinia, Prunus spinosa, Salix caprea u. s. w. beobachtet. Das ganze Jahr hindurch.

Auf Prunus domestica: Berschbach, in Gärten. XI. 91! im Felde zwischen Nommern und Glabach. X. 91! — Auf Salixstamm: Böwingen. V. 92! — Auf Prunus spinosa: zwischen Dommeldingen und Beggen. XI. 99. F. Heuertz; Weimerskirch. III. 02! — Auf Cerasus spec. cult.: Luxemburg-Petrusspark. I. 00! — Auf Salix alba: zwischen Rüdelich und Schengen. IX. 01! — Auf alten Salixstämmen, an den Ufern der Mamer zwischen Marienthal und Hohlenfels. Ln. Ctrb. 1er suppl. p. 86. (Fortsetzg. folgt.)