die Taschen füllte. Hr. Jérôme und unser Sektionspräsident Hr. Lucius hatten durch ihre sachverständige Führung diesen Tag so interessant gestaltet, daß am Abend bei der Heimfahrt ihr Lob in aller Munde war, und man sich schon fragte, für wann der nächste Exitus in die ewig schönen Ardennen festgesetzt sei.

Edm. J. Klein.



Vorstudien zu einer Pilzflora

des Grossherzogthums Luxemburg.

II. Theil. Basidiomycetes et Auriculariei.

Von Dr. med. **Johann Feltgen.**
Herausgegeben von Dr. med. **Ernst Feltgen.**

Fortsetzung.

3. Untergatt. **Polystictus** (Fries) Karsten 1882.

Fruchtkörper gestielt. Stiel mittelständig.

584. **Ochroporus sistotremoides** (A. S.) Schrœter.

(Synon.: Boletus s. Alb. et Schwein. 1805; Daedalea epigaea Lentz; Sistotrema spadiceum Swartz; Polyporus Schweinitzii Fries.)

Unter und an alten Stöcken von Pinus silv. August bis October.

Bissen, in bewaldeter Schlucht unterhalb des Bahnhofs. X. 92 !

585. **Ochroporus perennis** (Linn.) Schrœter.

(Synon.: Boletus p. Linn. 1755; Bol. confluens Schum.; Bol. coriaceus Bull.; Bol. subtomentosus Bolt.; Boletus leucoporus Holmsk.; Bol. fimbriatus Secret.; Polyporus perennis, Pol. pictus, Trametes perennis Fries.)

In sandigen Wäldern, besonders Nadelwäldern, auf der Erde, auch an Stämmen. Juli—November.

Sehr häufig, u. a.: Rollingen ! Mersch ! Finsterthal ! Schönfels ! (Exemplar mit sehr zahlreichen und vielfarbigen Zonen). Ansemburg ! Fels ! Fischbach ! Grünewald ! Baumbusch ! Hesperingen ! Pulvermühl ! Cessingen ! Beaufort-Haide. VIII. 01. und Dommeldingen. IX. 01. F. Heuertz. (In beiden letztern Fällen mehrere Exemplare mit den Stielen und auch theil-

weise mit dem Hute untereinander verwachsen), u. s. w. — Mamer (Juckelsbusch); Strassener Busch; Grünewald; Baumbusch. Ln. Ctrb. p. 73. — Beaufort-Grundhof, auf altem Eichenstamm. Ln. Ctrb. 1er suppl. p. 87 (sub Trametes perennis Fries). — Auf alten Stämmen und auf der Erde. L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 270 (sub Boletus perennis L.). — Diekirch, auf der Erde, anfangs Frühling. L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271 (sub Boletus fimbriatus Bull.). — Exsicc. Tin., Exsicc. Rhdt.

LXVII. Gattung. **Phaeoporus** Schrœter 1888.

1. Untergatt. **Phaeoporella** Schrœt.

Fruchtkörper flach auf der Unterlage ausgebreitet, fast ganz aus Röhren bestehend.

586. **Phaeoporus obliquus** (Pers.) Schrœter.

(Synon.: Boletus o. Pers. 1801; Polyporus incrustans, umbrinus Pers.; Polyporus obliquus Fries.)

An alten Stämmen und Aesten von Laubhölzern, besonders Fagus. September—November.

Fischbach, auf alten Baum- (? Quercus-) Stämmen. I. 92! — Lintgen, auf Fagusstumpf. VII. 91! — Exsicc. Tinant.

587. **Phaeoporus subspadiceus** (Fr.) Schrœter.

(Synon.: Polyporus murinus Rostk.; Polyporus subspadiceus Fries.)

An moderndem Holz und Stämmen von Fagus, an Corylus-Zweigen u. s. w.

An faulendem Holzblock: Berg. I. 92!

2. Untergattung. **Apodoporella** Schrœter.

Fruchtkörper von der Unterlage abstehend, ungestielt. Röhren unterseits.

588. **Phaeoporus cuticularis** (? Bull.) Schrœter.

(Synon.: Boletus c. ? Bull. 1790; Bol. triqueter Pers.; Bol. impuber Sow.; Polyporus cuticularis Fries.)

An alten Stämmen von Quercus und Fagus. September—November.

Luxemburg-Limpertsberg: auf gefällten Stämmen in einem Holzlager. Ln. Ctrb. 1er suppl. p. 86. — Hamm: vereinzelt auf toten Bäumen. L. Md. Csp. in Bijdr. III. p. 270 (sub Bol. cuticularis Bull.).

589. **Phaeoporus hispidus** (Bull.) Schrœter.

(Synon.: Boletus h. Bull. 1785; Bol. villosus Huds.; Bol. hirsutus Scop.; Bol. spongiosus Lightf.; Bol. velutinus Sow.; Polyporus hispidus Fries.)

An Stämmen verschiedener Laubbäume, besonders Pirus malus (auch Ulmus, Platanus, Fraxinus u. s. w.). Schädling. Mycel perennirend. Fruchtkörper stirbt im Winter ab, bleibt aber hängen, bildet sich vom Juli an wieder aus.

Auf Pirus malus: Echternach. IX. 99. Koltz. — Auf Acer pseudo-platanus: Luxemburg-Stadtpark. IX. 03. Ernst Feltgen. — Auf Pirus malus und Quercus. L. Md. Csp. in Bijdr. III p. 270.

590. **Phaeoporus applanatus** (Pers.) Schrœter.

(Synon.: Boletus a. Pers. 1799; Polyporus dryadeus Rostk.; Pol. merismoides Corda; Polyporus applanatus Wallroth.)

An alten Stöcken von Laubbäumen, besonders Populus, Fraxinus und Fagus. Das ganze Jahr hindurch, von Mai bis October lebhaft wachsend.

Auf altem Buchen-Wurzelstock, im Walde zu Prettingen. IV. 92! — Aus Ritzen einer alten Stützmauer hervortretend und wohl unterirdischen Baumwurzeln aufsitzend: Clausen, bewaldeter Abhang im Würthsberg. X. 02!

3. Untergatt. **Pleuroporella** Schrœter.

Fruchtkörper seitenständig gestielt.

591. **Phaeoporus lucidus** (Leysser) Schrœter.

(Synon.: Boletus l. Leysser 1783; Bol. variegatus Schæff.; Bol. nitens Batsch; Bol. obliquatus Bull.; Agaricus pseudo-Boletus Jacq.; Polyporus laccatus Pers.; Polyporus lucidus Fries.)

Am Grunde alter Stämme verschiedener Laubbäume: Fagus, Quercus, Alnus. Das ganze Jahr hindurch. Reif im Herbst.

Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 43 (ziemlich selten auf alten Stöcken, ohne Angabe der Fundorte). — „In caudicibus." L. Md. III. p. 270.

592. **Polyporus Ptychogaster** Ludwig.

(Synon.: Ceriomyces albus Sacc.; Ptychogaster albus Corda; Oligoporus ustilaginoides Brefeld.)

Auf an der Luft liegender lebender Wurzel von Pinus silvestris: Schönfels. 23. IX. 91!

Fruchtkörper polsterförmig, ziemlich breit aufsitzend, 6 cm lang, 3—4 cm breit, 2—2 1/2 cm hoch; aussen hellbraun, stellenweisse dunkler marmorirt, etwas weichstachelig; innen ganz aus einer pulverigen Sporenmasse, mit sehr langen, einfachen, farblosen oder bräunlichen Mycelfäden vermischt, bestehend. Sporen (Chlamydosporen nach Brefeld) rundlich

bis ellipsoidisch oder oblong, braun, fast glatt oder sehr feinkörnig-stachelig, mit dicker Membran, 7—9/6—8 μ.

Das Exemplar stellt die Conidienform (status gasteroporus nach Ludwig) dar; an keiner Stelle der Oberfläche waren Poren (die Hymenialform) sichtbar.

LXVIII. Gattung. **Daedalea** Persoon 1801.

1. Sporentragende Höhlungen mit gerader Mündung (Trametes Fr., Kart. pr. p.).

593. **Daedalea gibbosa** Persoon.

(Synon.: Merulius g. Pers. 1796; Boletus suberosus Linn; Bol. sinuosus Sow.; Daedalea gibbosa var. sinuosa Pers.; Trametes gibbosus Fries.)

An alten Stämmen verschiedener Laubhölzer, das ganze Jahr hindurch, besonders August—October.

Schieren, auf Zaunpfählen. IV. 91! — Baumbusch-Reckenthal, auf Fagusstumpf. XI. 99! — Ln. Ctrb. 1er suppl., p. 87. — Exsicc. Koltz.

594. **Daedalea rubescens** Alb. et Schwein. 1805.

(Synon.: Trametes r. Fries.)

An abgestorbenen Stämmen von Salix, besonders Salix caprea. Herbst.

Hünsdorf, auf Salix alba. IX. 91!

2. Sporentragende Höhlungen labyrinthförmig gewunden.

595. **Daedalea unicolor** Fries.

(Synon.: Boletus u. Bull. 1790; Bol. decipiens Schrad.; Sistotrema cinereum Persoon.)

Am Grunde alter Stämme und Stümpfe verschiedener Laubbäume. August—November.

Rollingen (Bullert): auf Fagus und Carpinus. IX. 91! — Finsterthal: auf Fagus. XI. 91! — Beringen: auf Acer campestre in einer Gartenhecke. X. 93! — Strassen, am Rand der Landstrasse: auf Fraxinus. VII. 99! — Exsicc. Krbch.

596. **Daedalea quercina** Persoon.

(Synon.: Agaricus qu. Linn. 1755; Ag. labyrinthiformis Bull.; Ag. dubius Schæff.; Merulius quercinus Gmelin.)

An alten Stöcken und Stümpfen von Quercus, seltener von Fagus, auch an Pfählen und Balken. Das ganze Jahr hindurch. Das unfruchtbare Mycel bildet dicke, holzfarbene Häute (Xylostroma giganteum Tode).

An Quercusstöcken und -Stümpfen: Fischbach! Gossel-

dingen! Finsterthal-Hosbich! Lintgen! Baumbusch! Contern! Pulvermühl! Kockelscheuer! u. s. w. — Diekirch (Haardt), Grünewald; Beaufort. Ln. Ctrb. p. 76. — An Quercusbalken, verarbeitetem Holz, meistens zugleich mit Xylostroma giganteum Tode: Dommeldingen! Lintgen! Colmar-Berg! Bissen! Mersch! (in den entsprechenden Bahnhöfen); Meysemburg! Fischbach! Welsdorf! u. s. w. — An Eichenstämmen- und -Balken, eine ganz umgewendete Form (var. effuso-reflexa Schæff.), meist kreisrund und oft mehrere mit den Rändern verwachsen; Bissen! Büschdorf! Mersch! — An Fagusstumpf: Baumbusch-Reckenthal. 99! — L. Md. Csp. Bijdr. III, p. 272 (sub Merulius labyrinthiformis L. Md = Agaricus quercinus L.). — Exsicc. Tin., Exsicc. Koltz.

LXIX. Gattung. **Daedaleopsis** Schrœter 1888.

597. **Daedaleopsis confragosa** (Bolt.) Schrœter.

(Synon.: Boletus c. Bolt. 1791; Bol. labyrinthiformis Bull.; Daedalea confragosa Fries.)

An alten Laubholzstämmen. Herbst.

Schrassiger Wald: auf altem Fagusstumpf. X. 1881. Ln. Ctrb., 2e suppl. p. 44, sub Daedalea c. Fr. — Rodenhof und Düdelingen: auf altem Stamm von Sorbus torminalis. L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 270 (sub Bol. labyrinthiformis Bull.).

LXX. Gattung. **Lenzites** Fries 1838.

598. **Lenzites betulina** Fries.

(Synon.: Agaricus b. Linn. 1755; Ag. flabelliformis Scop.; Ag. quercinus Schæff.; Agaricus coriaceus Bull.; Daedalea betulina Rebentisch.)

An Stümpfen verschiedener Laubhölzer, besonders Betula und Quercus. Herbst—Frühjahr.

Auf Quercusstumpf: Bruch-Wald. VIII. 91! — Fischbach-Schoos. XI. 91! — Rollingen. I. 92! — Mersch. III. 94! — Contern. X. 99! — Baumbusch. XII. 01! — Auf Betulastumpf: Fischbach-Langengrund. V. 92! — Auf Carpinusstumpf. IX. 91! — Auf Corylusstumpf: Luxemburg-Stadtpark. XII. 99! und I. 00! — Auf Fagusstumpf: Wald zwischen Lintgen und Lorentzweiler. X. 95! — In Ardenner Wäldern. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 38. — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 272 (sub Merulius coriaceus L. Md. = Agaricus c. Bull.). — Excicc. Tin., Exsicc. Rhdt.

599. **Lenzites tricolor** Fries.

(Synon.: Agaricus tr. Bulliard.)

An Stämmen und Aesten von Cerasus, Quercus u. s. w.

An Birkenstamm. L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 272 (sub Merulius abietinus L. M. var. tricolor L. Md. = Agaricus tricolor Bulliard).

600. **Lenzites trabea** Fries.

(Synon.: Agaricus tr. Pers.; Daedalea tr. Fries.)

An entrindeten Stämmen und Balken von Quercus.

An entrindetem Eichenstamm: im Walde zu Finsterthal. VII. 91! — Auf eichenen Balken und Bahnschwellen: Bissen. II. 93! Böwingen. III. 94! — Limpertsberg. Ln. Ctrb. 2e suppl. p. 38.

601. **Lenzites variegata** Fries 1838.

(Synon.: Daedalea v. Fries.)

An Stämmen, besonders von Fagus, auch Populus, Cerasus u. s. w.

An Fagus-Wurzelstock: Bour. II. 91! — Finsterthal-Jungenbusch. I. 92! — Rollinger Busch. II. 92! — An Populusstumpf: Büschdorf. XII. 92! — Exsicc. Krbch., Exsicc. Rhdt.

LXXI. Gattung. **Gleophyllum** Karsten 1882.

602. **Gleophyllum sepiarium** Karsten.

(Synon.: Agaricus s. Wulf. ap. Jacq. 1786; Ag. betulinus Linn.; Ag. hirsutus Schæff.; Ag. quercinus Humb.; Merulius squamosus Schrad.; Merulius sepiarius Schrank; Daedalea s. Swartz; Ag. boletiformis Sow.; Lenzites sepiaria Fries.)

Auf alten Stümpfen von Pinus silvestris und andern Nadelhölzern, sowie an bearbeitetem Holz derselben. In Bergwerken oft monstruös gestaltet. Das ganze Jahr hindurch, besonders von Juni ab.

Meysemburg, auf Nadelholzpfahl. XII. 91! — Bissen, an der Pastoretmühle, auf Kiefernstamm. IV. 91! — Mühlenbach, auf Nadelholzstamm. XI. 99! — Auf Kiefernholz in Zäunen. Ln. Ctrb. p. 64, sub Lenzites s. Fries.

603. **Gleophyllum abietinum** Karsten.

(Synon.: Agaricus a. Bull. 1789; Ag. senescens Willd.; Ag. asserculorum Schrad.; Daedalea a. Fr.; Lenzites abietina Fries.)

Auf alten Stöcken und bearbeitetem Holz von Nadelbäumen (Picea excelsa und abies alba). Herbst.

Auf entrindeten Stämmen von Picea excelsa: Bissen-Bahnhof. IX. 93! — Böwingen-Bahnhof. 93! — Useldingen-Bahnhof. IX. 93! — Geismühl, am Hüttenwerk. 94! — Auf Tannenholz und Birkenstämmen. L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 273 (sub Lenzites abietina und Lenzites betulina).

III. Gruppe. **FISTULINEI.**

Hymenophorum anfangs mit warzen-, später zapfenartigen, gesonderten Erhabenheiten, die sich an der Spitze öffnen und gesonderte, innen mit dem Hymenium überzogene Röhren bilden.

LXXII. Gattung. **Porothelium** Fries 1818.

604. **Porothelium fimbriatum** Fries.

(Synon.: Poria f. Pers. 1797; Boletus f., Bol. byssinus Schrader.)

Auf abgefallenen Zweigen und faulendem Holz von Salix, Quercus u. s. w. Sommer und Herbst.

An faulendem Holz einer Stauvorrichtung in einem Wasserlauf im Walde zu Finsterthal. VII. 91!

LXXIII. Gattung. **Fistulina** Bulliard 1781,

605. **Fistulina hepatica** Fries. *

(Synon.: Boletus h. Schæff. 1763; ? Boletus h. Huds. sec. Streintz; Bol. buglossum Retz.; Fistulina buglossoides Bull.; Buglossus quercinus Wahlenbg.; Hypodrys hepaticus Persoon.)

An alten Stämmen verschiedener Laubhölzer besonders von Quercus. August—October.

Simmern, im Walde an dem alten Hüttenwerk, auf dem Stamm einer uralten Eiche. Ln. Ctrb. p. 76, sub Polyporus h. (Huds.). (Fruchtkörper mtr 0,3 lang, 0,1 breit, 0,05 dick.) — Bartringen, an Eichenstrünken und auf dem Boden zwischen faulenden Blättern. L. Md. Csp. in Bijdr. III. p. 269 (sub Bol. hepaticus Schæff.)

IV. Gruppe. **BOLETINEI.**

Fruchtkörper fleischig, regelmässig hutförmig, mit centralem Stiel. Hymenophorum unterwärts, aus zu einer zusammenhängenden Schicht vereinigten, von einander und vom Hutfleisch leicht trennbaren, abwärts gerichteten Röhren bestehend.

LXXIV. Gattung. **Suillus** Micheli 1729 (in der Begrenzung von Karsten 1882).

606. **Suillus cyanescens** Karsten. +

(Synon.: Boletus c. Bull. 1788; Bol. constrictus Pers.; Bol. lacteus Léveillé.)

In lichten Wäldern, besonders auf Sandboden. Juli bis October.

In den Wäldern der Umgebung von Schengen, Stadtbre-

dimus und Greiweldingen. Ln. Ctrb. p. 72. — Bastnach, in Wäldern. L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271.

607. **Suillus castaneus** Karsten. *
(Synon.: Boletus c. Bull. 1787.)

In lichten Laub- und gemischten Wäldern. Juni bis Oktober.

L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271.

LXXV. Gattung. **Tylopilus** Karsten 1882.

608. **Tylopilus felleus** Karsten. +
(Synon.: Boletus f. Bull. 1788.)

In Nadelwäldern, oft am Grunde alter Stämme und auf Stümpfen. Juli—October.

In Kiefernwäldern bei Kipenhof, Echternach und Bruch. Ln. Ctrb. p. 76. — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271 („ziemlich häufig").

LXXVI. Gattung. **Boletus** Dillenius 1719.

(Fries 1815 eingeschränkt. Suillus Micheli.)

1. **KROMBHOLZIA.** Röhren und Mündungen weiss oder grau werdend. Stiel ohne Ring.

609. **Boletus scaber** Bulliard 1782. *
(Synon.: Boletus bovinus Schæff.; Bol. leucopodius Pers.; Bol. niveus Fr.; Bol. holopus Rostkovius).

In Wäldern, Gebüsch, auf Haideplätzen. Juni bis November.

An Waldweg zwischen Rollingen und Schoos. VIII. 93! — Trift am Walde zu Kockelscheuer. IX. 99! — In den Wäldern bei Sandweiler, Oetringen, Itzig (Créquisbusch). Ln. Ctrb. p. 72. — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271.

610. **Boletus umbrinus** Persoon.

In Nadelwald, auf Bill (Grewenknap-Finsterthal). IX. 93! (Hut dunkelbraun, 4—6 cm breit, Fleisch weich, weiss; Stiel schwärzlich, nach oben zu verschmälert, schuppig-körnig ohne Ring; Röhren angewachsen, Poren weiss, später etwas gelblich.)

611. **Boletus rufus** Schaeffer 1763. *
(Synon.: Boletus aurantius Sow.; Bol. versicolor Fr.; Bol. scaber β.γ. Pers.; Bol. floccopus Rostkovius.)

Auf Haideplätzen, im Gebüsch und lichten Wäldern, besonders unter Birken. Juli—November.

In den Wäldern von Bereldingen, Rodenhof und Steinsel.

Ln. Ctrb. p. 72. — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271 (sub B. aurantiacus Bull.).

612. **Boletus rubiginosus** Fries. *

In Buchenwäldern.

Beaufort-Haide, unter Buchen. VIII. 01! — Grünewald-Dommeldingen, in Laubwald. IX. 01! (Hut polsterförmig, 5—8 cm breit, braungelb bis rostbraun, mit stumpfem Rande. Fleisch weiss, unverändert. Stiel nach oben verjüngt, netzig, weissgelblich. Röhren angeheftet, Poren rundlich, meist eckig, ungleich, weiss.)

2. **LEUCOCRICUS.** Röhren weiss oder grau, am Stiel angewachsen. Stiel mit Ring.

613. **Boletus viscidus** Linn. 1745.

(Synon.: Boletus aeruginascens Secret.; ? B. laricinus Berkeley.)

In Nadelwäldern, zwischen Moos. August, September.

Schleifmühl-Horbach, unter Kiefern, zwischen Gras und Moos. IX. 02!

3. **EUBOLETUS.** Röhren gleich anfangs oder erst bei der Reife gelb. Hut und Stiel ohne Schleier und Ring.

A. *Edules* Fries. Stiel knollenförmig, bauchig, dann keulenförmig, nie roth gezeichnet. Röhren nach dem Stiele zu verkürzt, scharf von diesem gesondert, zuletzt gelb, wie auch die Mündungen.

614. **Boletus bulbosus** Schæffer 1763. *

(Synon.: B. edulis Bull. 1781; B. esculentus Pers.; B. crassipes Schum.; B. aeneus Rostkovius.)

In Gebüschen, Laub- und Nadelwäldern, einzeln oder in kleinen Rasen. Juli—November und später.

Wald zwischen Lintgen und Lorentzweiler. VII. 92! — Zwischen Schoos und Rollingen. VIII. 93! — Dommeldingen. X. 97! — Rodenhof. IX. 98! — Kruchten. IX. 99! — Ansemburg. VIII. 01! — Grünewald-Neudorf. VIII. 01! — Kockelscheuer u. s. w. Ln. Ctrb.; L. Md. Csp. in Bijdr. D. III. p. 271; sub Bol. edulis Bull.

615. **Boletus aereus** Bulliard 1791.

In lichten Wäldern. August—October.

Auf dem Boden in Wäldern. L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271.

B. *Luridi.* Wie Edules, aber Poren roth und Fleisch an der Luft blau werdend.

616. **Boletus luridus** Schæffer 1763. +

(Synon.: B. rubeolaris Bull.; B. tuberosus Schrad.; B. subvescus

Schrank; B. nigrescens Pallas; B. mutabilis Schult.; B. Satanas Rostkovius.)

In Laub- und Nadelwäldern. Juli—September.

Fischbach, in Laubwald. IX. 90! — Ln. Ctrb. p. 72. — L. Md. Csp. Bijdr. III. p. 271.

617. **Boletus Satanas** Lenz 1831. +

(Synon.: B. sanguineus Krombholz; B. marmoreus Roques; B. luridus Viviani.)

In gemischten Wäldern, Gärten u. s. w. August, September.

In Laubwald: Rollingen! Bruch! Kockelscheuer! u. s. w. Harlingen: unter Tannen! — Baumbusch, Grünewald, Itzig, Beaufort, Greiveldingen, Remich. Ln. Ctrb. p. 71.

C. *Calopodes.* Stiel knollig, dick, grossentheils roth gefärbt, oben netzig. Röhren angewachsen, wie die Poren gelb.

618. **Boletus pachypus** Fries 1815. +

(Synon.: B. elatus Pers.; B. albus Venturi.)

In Wäldern, besonders unter Buchen. August bis October.

Im Wald zwischen Angelsberg und Beringen! — Büschdorf (Buchebusch)! — Schrassig, Pratz, Heffingen (Seitert). Ln. Ctrb. p. 71.

619. **Boletus calopus** Fries 1821. +

(Synon.: B. terreus Schæffer.)

In Laub- und Nadelwäldern, Gebüsch. Juli bis September.

Rollingen. V. 92! — Baumbusch; Grünewald-Stadterpad. Ln. Ctrb. p. 71.

620. **Boletus armeniacus** Quélet.

In Nadelwald; Beaufort-Eltersmoor. VIII. 01! (Hut stark gewölbt, aprikosengelb, stellenweise etwas röthlich, anfangs etwas sammetig-feinflaumig, später kahl, 4—6 cm breit; Fleisch gelbröthlich, an der Luft schwach blau werdend; Stiel oben fleischröthlich, nicht netzförmig gezeichnet, unten etwas angeschwollen und gelb. Poren gelb.)

(Fortsetzung folgt).