Catalogue des oiseaux

du Musée National d'Histoire Naturelle de Luxembourg

(Collection systématique)

par V. FERRANT.

Famille **Falconidae.**

Bec fort, crochu, presque toujours courbé dès son origine; griffes arquées, très aiguës, justifiant complètement leur nom de *serres*. Vue perçante; mouvements vifs, vol rapide. Presque tous sont chasseurs et joignent le courage à la force.

Sous-Famille. **Gypaëtinæ.**

Bec robuste, très comprimé, mandibule inférieure garnie d'un faisceau de poils dirigé en avant en guise de barbe; doigts courts; onglés forts et assez crochus.

Intermédiaires entre les vautours et les faucons, ils recherchent les mammifères vivants, mais ne dédaignent non plus les corps morts. Nichent dans les rochers escarpés.

63. *Gypaëtus barbatus* (Lin.). — Gypaète barbu. — Lämmergeier ou Bartgeier.

Europe centrale et méridionale (montagnes). Asie centrale, Himalaya, Chine N.

a. ♂ Suisse. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Polyborinae.**

Bec comprimé sur les côtés, légèrement crochu vers la pointe, la mandibule supérieure munie d'un léger feston; face et gorge nues; doigts médiocres; ongles courts et faibles.

Habitudes plus terrestres qu'aériennes. Chassent les petits et jeunes vertébrés ou les insectes, mais s'abattent de préférence sur les cadavres.

64. *Milvago chimachima* (Vieill.). — Caracara chimachima.

Brésil, Amazone, Guyane, Vénézuela, Colombie, Panama.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1878.

Sous-Famille. **Circinae.**

Bec court, mince, élevé à la base, comprimé sur les côtés; tarses longs, grêles; doigts médiocres; ongles ordinaires et très aigus; face entourée d'une collerette plus ou moins distincte.

Cosmopolites. Vivent dans le voisinage des marais et des plaines Nichent par terre. Se nourrissent de petits mammifères, de reptiles, de poissons, d'oiseaux de rivage et de leurs œufs. Très nuisibles.

65. *Circus cinerarius* (Mont.) var. *maurus* (Tem.).

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Sous-Famille. **Accipitrinae.**

Bec court, recourbé dès la base, crochu à la pointe; ailes plus courtes que la queue; tarses longs, grêles, élevés; doigts minces et allongés; ongles larges, longs, très recourbés et aigus.

Habitent toutes les parties du globe. Très agiles, rusés, intrépides et sanguinaires. Très nuisibles.

66. *Melierax polyzonus* (Rüpp.). — Méliérax polyzone. — Heuschreckenhabicht.

Afrique N.-E., Soudan, Sénégambie, Arabie S.

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

67. *Asturinula monogrammica* (Tem.).

Afrique tropicale.

a. ♂ Kondué, Congo-Belge. Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1908.

68. *Urospizias griseigularis* (Gray.).

Betjan, Halmahera, Nouvelle-Pomméranie.

a. ♂ Nouvelle Pomméranie. Acquisition du Musée.

69. *Urospizias approximans* (Vig. et Horsf.).

Australie.

a. ♂ Queensland, Australie. Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1910.

70. *Cooperastur cooperi* (Bp.).

Amérique du N. tempérée.

a. ♂ Texas. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1878.

71. *Accipiter fuscus* (Gm.).

Amérique sept., Mexique, Guatemala, Argentine.

a. ♂ Guatemala. Don de Mr. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1878.

b. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

72. *Accipiter minulus* (Daud.). — Épervier minulle. — Zwergsperber.

Afrique S. jusqu'au Mozambique et l'Angola.

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

73. *Accipiter Hartlaubi* (Verr.). — Épervier de Hartlaub.

Afrique W. de Sénégambie au Gabon.

a. ♂ Kondué, Congo-Belge. Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1908.

74. *Accipiter melanoleucus* Smith.

a. ♂ Konduó, Congo-Belge. Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1908.

Sous-Famille. **Aquilinae.**

Bec en partie droit, non denté, mais festonné; tarses courts, emplumés jusqu'à la naissance des doigts; ceux-ci très forts et armés d'ongles recourbés et acérés.

Vue perçante, vol rapide. Se nourrissent d'animaux vivants et même de corps morts. Les plus puissants des rapaces.

75. *Spizaëtus tyrannus* (Max.). — Spizaëte tyran.

Amérique centrale et méridionale jusqu'au S. du Brésil.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

76. *Ictinaëtus malayensis* (Tem.). — Ictinaëte ovivore. — Indischer Fischadler.

Inde, Ceylan, Indo-Chine W., Malacca, grandes îles de la Sonde, Célèbes, Ternate, Halmahera, Nias.

a. ♂ Halmahera. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

77. *Aquila chrysaëtus* (Lin.). — Aigle royal. — Steinadler.

Europe N., de l'Asie jusqu'au N. de la Chine, Amérique N. jusqu'au Mexique.

a. ♀ Limbourg Belge. Don de M. le baron de Marche, Colpach, 1864.

78. *Haliaëtus albicilla* Lin. — Pygargue d'Europe. — Seeadler.

Europe, Asie N., Grœnland, Islande, N. de l'Inde et de la Chine.

a. ♂ Afrique N. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Sous-Famille **Buteoninae.**

Bec recourbé dès la base; ailes presque aussi longues que la queue; jambes fortes; tarses plus ou moins emplumés; doigts robustes, surtout le pouce; tête large, corps trapu.

Allures lourdes. Air indolent. Vol lourd et pesant.

79. *Buteo augur* Rüpp. — Buse augur.

Afrique N.-E. et équatoriale.

a. ♂ Konduó, Congo-Belge. Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1908.

80. *Buteo borealis* (Gm.). — Buse boréale.

Amérique N.-E., Antilles.

a. ♂ Etats-Unis. Don de M. Aug. Dutreux, Luxembourg, 1870.

81. *Leucopternis lacernulata* (Tem.). — Leucopternis lacernulé.

Brésil S.

a. ♂ Brésil. Acquisition du Musée.

82. *Urobotinga zonura* (Shaw). — Urobitinga zonure. — Urobitinga.

Amérique méridionale du Paraguay au Vénézuéla et jusqu'au Costa-Rica.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Milvinae.**

Bec relativement court, faible, incliné dès la base, à pointe crochue et aiguë : ailes très longues et pointues ; queue toujours longue, le plus souvent échancrée ; tarses courts, peu robustes ; doigts faibles, allongés ; ongles minces.

Ne passent pas pour les plus braves et les plus intrépides des rapaces. Se nourrissent au besoin de charogne, la faiblesse de leurs armes ne leur permettant guère d'attaquer que des reptiles, taupes, rats, mulots et gros insectes. Vol rapide et élégant. Sociables.

83. *Haliastur indus* (Bood). — Haliautour des Indes.

Inde, Ceylan, Birmanie.

a. ♂ Ceylan. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

84. *Haliastur sphenurus* (Vieill). — Haliautour sphénur.

Australie, Nouvelle-Calédonie.

a. ♂ Nouvelle-Calédonie. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

85. *Milvus covinda* Sykes. — Milan traqueur. — Jagdmilan.

Inde, Birmanie.

a. ♂ Iles de la Sonde. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

86. *Milvus aegyptius* (Gm.). — Milan d'Égypte. — Schmarotzermilan.

Europe S.-E., Afrique, Madagascar.

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

b. ♂ juv. Afrique S. Don de M. Emile Holub. Vienne. 1894.

87. *Elasas furcatus* (Lin.). — Naucler à queue fourchue. — Schwalbenweih.

Etats-Unis, Amérique centrale et méridionale jusqu'au Brésil.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1878.

88. *Ictinia plumbea* (Gm.).

Amérique centrale et méridionale jusqu'au Brésil.

a. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

89. *Leptodon uncinatus* Tem. — Leptodon unciné.

Amérique centrale, Colombie, Vénézuéla, Guyane, Brésil, Bolivie, Equador.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

90. *Baza subcristata* (Gould). — Baza huppé.

Palawan, Australie, Nouvelle-Guinée S.-E.

a. ♀ Nouvelle-Guinée. Don de M. Hubert Linden. Bruxelles, 1884

91. *Baza Reinwardti* (Müll. et Schl.). — Baza de Reinwardt.

Australie, Moluques.

a. ♂ Queensland, Australie. Don de M. Aug. Homes, Grosbous, 1911.

Sous-Famille. **Falconidae.**

Bec court, courbé dès la base, à pointe crochue, la mandibule supérieure armée d'une ou de plusieurs dents; ailes longues et aiguës, tarses plus ou moins longs; doigts longs et déliés à ongles longs, courbés et acérés, le postérieur le plus fort.

Chasseurs audacieux, à vol rapide et soutenu, appelés par les anciens auteurs „nobles", soit à cause de leur courage, soit à cause de leur éducabilité pour la chasse dite de „fauconnerie".

92. *Harpagus diodon* (Tem.). — Diodon du Brésil.

Brésil. Argentine.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

93. *Tinnunculus rupicoloides* (Smith). — Crésserelle rupicoloïde.

Afrique S.

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

94. *Tinnunculus Naumanni* (Fleisch). — Crésserelle de Naumann.

Europe S. et S.-E., Afrique, Asie S.-W.

a. ♂ Turquie. Acquisition du Musée.

95. *Erythropus vespertinus* (Lin.). — Faucon Kobez. — Rotfußfalk.

Europe S. et S.-E., Afrique W.

a. ♂ Espagne. Don de MM. de Selys et Longchamps, Bruxelles. 1864.

96. *Falco Feldeggii* Schl. — Gerfaut de Feldegg. — Feldeggsfalk.

Afrique N. et N.-E., Europe S., Asie Mineure jusqu'en Perse.

a. ♂ Égypte. Acquisition du Musée.

97. *Hierofalco rusticollis* (Lin.), *var. gyrfalco* (Lin.). — Faucon Gerfaut. — Gierfalk.

N. de l'Europe, accidentellement Europe centrale.

a. ♂ Suède. Acquisition du Musée.

Strigiformes.

Yeux situés en avant de la tête, entourés d'un cercle de plumes effilées, raides, formant par leur rayonnement circulaire un disque plus

ou moins complet ; tête volumineuse ; bec court, courbé dès sa racine, comprimé, crochu, garni d'une cire molle cachée par les plumes du disque ; doigt externe réversible en arrière ; tarses emplumes, ongles très forts, très aigus, rétractiles ; plumage mou.

Chassent au clair de lune ou pendant le crépuscule et sont un objet d'aversion pour les autres oiseaux, qui tous les harcellent et les importunent pendant le jour. Se nourrissent de petits mammifères, quelquefois d'insectes et d'oiseaux. Saisissent leur proie à l'improviste, favorisés par les ténèbres et par leur vol silencieux. Avalent le butin en entier et rejettent en boules les parties non digérables, tel que les poils, plumes, os. Voix sinistre. Vue excellente. Emigrent et voyagent souvent en grandes bandes. Cosmopolites.

Famille **Strigidae.**

Caractère de la Tribu.

Sous-Famille **Asioninæ.**

Disque facial complet ; aigrettes plus ou moins prononcées ; doigts emplumés seulement jusqu'à la dernière phalange.

98. *Asio capensis* (Smith). — Brachyote du Cap. — Cap'sche Sumpfeule.

Afrique, Espagne S.

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Sous-Famille **Buboninae.**

Disque facial incomplet, aigrettes plus ou moins prononcées ; queue courte, tronquée.

99. *Ninox boobook* (Lath.). — Ninox boobook.

Australie.

a. ♂ Queensland. Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1910.

100. *Ninox strenua* (Gould). — Ninox courageux.

Australie.

a. ♂ Australie. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

Sous-Famille **Syrniinae.**

Disque facial presque complet ; tête dépourvue d'aigrettes ; doigts emplumés.

101. *Ciccaba suinda* (Vieill). — Ciccaba.

Amérique centrale, Colombie, Vénézuéla.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

Sous-Famille **Surniinae.**

Disque facial incomplet ; tête sans aigrettes ; queue longue.

102. *Surnia ulula* (Lin.). — Surnie caparacoch. — Sperbereule.

Europe N., Sibérie, Kamtschatka, Alaska.

a. ♂ Livonie. Acquisition du Musée.

103. *Glaucidium perlatum* (Vieill). — Chevêche du Cap. — Cap-Zwergeule.

Afrique N.-E., et E. et S.

a. ♂ Don de M. Emile Holub. Vienne, 1894.

Sous-Famille **Striginae.**

Disque facial complet, composé de plumes effilées, plus étendu que chez les autres nocturnes; tête sans aigrettes; tarses emplumés, doigts seulement poilus.

104. *Strix flammea* (Lin.). var. *maculata* Brm. — Effraye mouchetée. — Perleule.

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Ordre IV. Echassiers.

Doigts antérieurs ordinairement réunis par une très courte palmure; pouce dirigé en arrière, inséré à un niveau supérieur à celui des autres doigts, souvent réduit; lorum emplumé; plumage variant surtout avec les saisons; jeunes couverts de duvet au sortir de l'œuf; nids ordinairement grossiers et établis sur le sol.

Presque tous sont des oiseaux de rivage. Ils ont les tarses généralement longs, ce qui leur permet d'entrer dans l'eau jusqu'à une certaine profondeur sans se mouiller les plumes, d'y marcher à gué et d'y pêcher leur nourriture au moyen de leur long bec et de leur long cou proportionné à leurs jambes. La plupart est vermivores et insectivores, d'autres sont quelque peu piscivores, d'autres encore choisissent les coquillages, les mollusques, les batraciens et jusqu'aux petits rongeurs. Cosmopolites, ils abondent jusque dans les solitudes des pôles, mais surtout dans les régions tempérées; aux premiers froids ils émigrent vers le Sud. Ne perchent pas.

Tribu. **Charadreiformes.**

(Limicolæ).

Pouce très petit ou nu; doigt médian le plus souvent plus court que le tarse; ailes bien développées, triangulaires.

Polygame.

Famille **Himantopidae.**

Bec allongé, deux fois aussi long que la tête, mince, arrondi, pointu, cannelé latéralement jusqu'au milieu; jambes presque entière-

ment nues ; tarses longs, grêles, flexibles, réticulés ; doigt médian uni à l'externe par une large palmure et à l'interne par une petite; pouce nu.

Oiseaux tristes, silencieux, solitaires. Vivent dans les marais et sur les rivages de la mer, la faiblesse de leurs jambes les rendant propres seulement à marcher dans la vase, mais non sur la terre ferme. Se nourrissent de vers et de petits mollusques. Vol très rapide.

105. *Himantuopus mexicanus* (P. L. S. Müller). — Échasse du Mexique. — Mexikanischer Strandreiter.

Etats-Unis, Amérique centrale et méridionale jusqu'au Pérou et à l'Amazone, Antilles, Galapagos.

a. ♂ Mexique. Don de M. Aug. Dutreux, Luxembourg, 1870.

Famille **Scolopacidae.**

Bec grêle, au moins aussi long que la tête et au moins en partie mou; peu ou à peine recourbé vers le bout; pieds sans palmure ou à palmure très légère; pouce rarement nu.

Oiseaux d'une mobilité excessive, qui changent continuellement de place et voyagent presque l'année entière. Fins gibiers. Beaucoup d'espèces sont polygames, toutes nichent à terre.

106. *Numenius tenuirostris* Vieill. — Courlis ténuirostre. — Dünnschnäbeliger Bracher.

Europe méridionale et centrale, Afrique N., région Uralo-Caspienne.

a. ♂ Italie. Acquisition du Musée.

107. *Arenaria interpres* (Lin.). — Tourne-pierre à collier. — Steinwälzer.

Cosmopolite.

a. ♂ Côte de la Belgique. Acquisition du Musée.

108. *Gallinago paraguayae* (Vieill.). — Bécassine du Paraguay. — Wilson's Schnepfe.

Amérique méridionale jusqu'à l'Argentine.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

109. *Crymophilus fulicarius* (Lin.). — Phalarope dentelé. — Pfuhlwassertreter.

Zone arctique jusqu'au $82^1/_2{}^0$ latitude N., en hiver dépasse rarement vers le S. le 50° latitude N.

a. ♂ Suède. Acquisition du Musée.

Famille **Charadriidae.**

Oiseaux de taille petite ou médiocre ; bec plus ou moins robuste, non ou à peine recourbé vers le bout, jamais mou, plus court que la tête, rarement plus long qu'elle et alors pouce absent.

Fréquentent en général les lieux bas et humides, les plaines marécageuses et les bords sablonneux des rivières. Se nourrissent d'insectes, de vers et de crustacés. Plusieurs espèces vivent solitaires ou par couples, quelques autres par petites troupes. Nichent à terre. Fin gibier.

110. *Haematopus palliatus* Tem. — Huîtrier à manteau. — Brasilianischer Austernfischer.

États-Unis, Amérique centrale, Antilles, Amérique méridionale jusqu'au S. du Brésil.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

111. *Sarciophorus albiceps* (Gould). — Sarciophore.

Afrique W., de Libéria au Congo, à l'E. jusqu'au Nil blanc.

a. ♂ Konduó (Congo Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1911.

112. *Hoplopterus speciosus* (Wagl.). — Hoploptère d'Afrique. — Afrikanischer Spornkiebitz.

Afrique S. et E.

a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1891.

113. *Hoplopterus cayanus* (Lath.). — Hoploptère d'Amérique. — Amerikanischer Spornkiebitz.

Amérique méridionale jusqu'au S. du Brésil.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

114. *Squatorala helvetica* (Lin.). — Squatorale helvétique.

Presque cosmopolite.

a. ♂ Suède. Acquisition du Musée.

115. *Aegialitis alexandrina* (Lin). — Pluvier à collier interrompu. — Weißstirniger Regenpfeifer.

Europe, Asie et Afrique (côtes) au N. jusqu'au 60° latitude.

a. ♂ Côte adriatique. Acquisition du Musée.

116. *Aegialitis collaris* (Vieill.). — Pluvier gracieux.

Amérique centrale et méridionale jusqu'à l'Argentine, petites Antilles.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

b. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

Famille **Cursoriidae.**

Bec médiocre, presque cylindrique, un peu déprimé à la base, légèrement voûté et courbé vers la pointe; narines ovales, couvertes d'un petit tubercule; tarses longs, grêles, scutellés ainsi que les doigts.

Vivent dans les lieux secs, sablonneux et loin des eaux. Courent avec une vitesse étonnante. Habitent l'Afrique et l'Asie.

117. *Pluvianus aegyptius* (Lin.). — Pluvian d'Egypte. — Krokodilwächter.

Contrées entourant la Méditerrannée, Afrique W. et S.-E.

a. ♂ Égypte. Don de M. Martin Richard, Luxembourg, 1864.

118. *Cursorius rufus* Gould. — Pluvian du Cap. — Kap-Krokodilwächter.

Afrique S.

a. ♂ Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Famille **Glariolidae.**

Bec court, arqué, rétréci vers le front, renflé au milieu, comprimé vers la pointe; tarses allongés, doigts grêles, le médian et l'externe unis par une petite membrane; ailes très longues, aiguës; queue fourchue.

Fréquentent les bords des rivières et des lacs ou les côtes de la mer. Volent à la manière des hirondelles en décrivant toutes sortes de figures et en remplissant l'air de leurs cris. Se nourrissent d'insectes et de vers. Courent avec aisance et rapidité en agitant la queue à l'instar des Saxicoles. Nichent à terre, parmi les roseaux. Voyagent en petites bandes.

119. *Glareola pratincola* (Lin.). — Perdrix de mer. — Halsbandstrandläufer.

Europe méridionale, Asie centrale, Inde N.-W., Afrique.

a. ♂ Espagne. Acquisition du Musée.

Famille **Oedicnemidae.**

Bec renflé au bout, au-dessus comme au-dessous, fendu jusqu'au delà de l'angle antérieur des yeux, qui sont très grands; tarses allongés, queue dépassant les ailes.

Oiseaux se rattachant aux Gallinacés par leur bec, leur corps massif et leur régime, mais s'en éloignant par leurs jambes nues au-dessus de l'articulation tibia-tarsienne comme par toute leur anatomie. Sociables, timides, défiants et très rusés. Volent peu et ne se servent le plus souvent de leurs ailes que pour accélérer leur course. Ne perchent jamais. Se nourrissent de grains, de vers et d'insectes. Déposent leurs œufs à terre dans un trou au milieu de l'herbe. Polygames. Gibier exquis.

120. *Esacus recurvirostris* (Cuv.). — Esaque recurvirostre. — Krummschnäbeliger Brachvogel.

Inde, Ceylan, Birmanie, Ténasserim.

a. ♂ Ceylan. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

Tribu. **Gruiformes.**
(Alectorides).

Cou et pattes très allongés; bec un peu plus long que la tête; robuste, conique, tranchant sur le bord; pouce court, articulé à un

niveau élevé, touchant à peine le sol ; ailes grandes ; doigts antérieurs réunis à leur base.

Monogames.

Famille **Aramidae.**

Bec plus grêle et un peu plus fendu que celui des grues, renflé vers le dernier tiers de sa longueur ; doigts très longs, à palmure à peine indiquée.

Vivent solitaires ou par couple au bord des eaux. Se nourrissent de grenouilles et de vers. Perchent au sommet des arbres.

121. *Aramus scolopaceus* (Lin). — Courlan bécassin.

Amérique méridionale, Guyane, Vénézuéla et Pérou, jusqu'au N. de l'Argentine.

a. ♂ Pérou. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1878.

Tribu. **Raliformes.**
(Fulicariæ).

Doigts allongés, le médian au moins de la longueur du tarse ; pouce bien développé, reposant plus ou moins sur le sol ; ailes assez courtes, arrondies.

Monogames. Mauvais voiliers, nageurs et coureurs.

Famille **Parridae**

Tarses longs, grêles, annelés ; doigts déliés, munis d'ongles extrêmement longs, styliformes, celui du pouce plus long que le doigt auquel il appartient ; ailes munies d'un éperon pointu.

Oiseaux criards et querelleurs. Vivent sur les bords des eaux stagnantes, où ils marchent légèrement sur les feuilles flottantes des plantes aquatiques pour y chercher les insectes qui forment leur nourriture.

122. *Metopedius indicus* (Lath.). — Metopède des Indes. — Blätterhühnchen.

Inde, Indo-Chine, grandes îles de la Sonde.

a. ♂ Iles de la Sonde. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

123. *Parra jacana* Lin. — Jacana commun. — Gemeiner Jassana.

Amérique méridionale.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Famille **Rallidae.**

Bec convexe, comprimé ; jambes de médiocre longueur, nues dans leur partie inférieure ; ongles assez courts, robustes.

Habitent les bords fangeux des étangs et des rivières où ils se tiennent cachés dans les grandes herbes. Quelques espèces seulement se rencontrent dans les prairies. Marchent avec agilité et courent avec une rapidité extrême, la queue relevée et l'étalant par de petits mouvements brusques. Se nourrissent d'insectes, de vers et de mollusques.

Sous-Famille **Rallinae.**

Doigts antérieurs non bordés d'une membrane festonnée; bec sans plaque frontale.

124. *Gymnocrex plumbeiventris* (Gray). — Gymnocrex à ventre gris. — Graubäuchiger Nacktaugknarrer.

Halmahera, Marosai, Nouvelle Guinée, Mysol, îles Arou et Salomon.

a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

125. *Aramides ypacaha* (Vieill.). — Aramide ypacaha.

Brésil S., Argentine.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1874.

126. *Amaurornis molucana* (Wall.). — Amaurornis des Moluques.

Moluques, Nouvelle-Guinée, Archipel Bismark, Australie N.

a. ♂ Nouvelle Poméranie. Acquisition du Musée.

Sous-Famille **Gallinulinae.**

Bec avec plaque frontale.

127. *Porphyrio caeruleus* (Vaud.). — Porphyre bleu.

Europe méridionale, Mésopotanie, Afrique N.

a. ♂ Algérie. Acquisition du Musée.

128. *Porphyrio smaragdinus* Tem. — Porphyre smaragdin.

Célébès, petites îles de la Sonde, Nouvelle Guinée, Archipel Bismark, îles Fidji, Nouvelle Poméranie etc.

a. ♂ Nouvelle Poméranie. Acquisition du Musée.

(A suivre).

Literarisches.

Der Vogelschutz im Grossherzogtum Luxemburg. — Theoretisch-praktische Anleitung für Jung und Alt von Mathias Sünnen, Lehrer zu Luxemburg. Druck und Verlag von Gebrüder Nimax, 1911. Preis 1 Mk.

Den freundlichen Leser dieser Zeilen bitte ich, mir im Geiste nach Luxemburg zu folgen; in den städtischen Park möchte ich ihn führen, zu uralten, epheuumschlungenen Ulmen, riesigen Eichen, dunkelgrünen Tannen, schattigen Roßkastanien, zahllosen hohen und niedrigen Sträuchern, weit ausgedehnten Grasflächen, hell aufleuchtenden Blumenbeeten, schaurigen, alten Festungsmauern. Weit entrückt wird er sich glauben, versetzt in tiefes Waldesdunkel, in stille Haine, auf grüne Fluren. Und der Zauber wird ihn vollends umfangen beim Gesang der Hunderte von gefiederten Bewohnern dieser idyllischen Anlagen, deren