Kanton Vianden.
(3 Gemeinden).

Gemeinden	Ortschaften	Zahl der Antworten
Vianden	Vianden	2
Fuhren	Bettel	1
2 Gemeinden	2 Ortschaften	3 Antworten

Kanton Clerf.
(10 Gemeinden).

Gemeinden	Ortschaften	Zahl der Antworten
Consthum	Consthum	1
Hosingen	Hosingen	1
Clerf	Clerf	6
Helzingen	Helzingen	1
Asselborn	Asselborn	1
Heinerscheid	Hüpperdingen	1
	Fischbach	1
Ulflingen	Ulflingen	1
7 Gemeinden	8 Ortschaften	13 Antworten

Das Gesamtmaterial, auf welches die nachfolgenden Zahlen sich stützen, besteht also aus 243 Berichten, welche aus 141 Ortschaften herstammen, die 98 Gemeinden angehören.

(Forts. folgt).

Catalogue des oiseaux

du Musée National d'Histoire Naturelle de Luxembourg

(Collection systématique)

par V. FERRANT.

Ordre: Columbæ.

Colombins. — Tauben.

Corps ramassé; bec médiocre, bombé, plus ou moins crochu à l'extrémité, mou à la base; les narines percées dans un espace mem-

braneux et couvert d'une écaille renflée; pattes courtes, trois doigts dirigés en avant, bordés par une légère membrane. Jeunes très faibles, à peine couvert d'un duvet au sortir de l'œuf.

Cosmopolites à l'exception des régions boréales du globe. Doux, familiers; les deux époux montrent l'un pour l'autre une tendresse remarquable et leur première alliance est ordinairement la seule qu'ils contractent dans leur vie. Fougueux amoureux dont la passion anime surtout le mâle. Se nourrissent de graines et de baies, auxquelles ils ajoutent quelquefois des mollusques et des insectes.

Famille. **Peristeridae.**

Corps voûté; bec mince, droit, formé comme de deux pièces; ailes effilées; tarses nus et de moyenne longueur.

Habitudes terrestres. Se réunissent en petites troupes, composées ordinairement d'une couvée et du père et de la mère. Se nourrissent de semences, de baies et mêmes d'insectes. Se tiennent communément par terre où ils courent comme le gallinacé. Passent la nuit sur les arbres. Nichent également par terre ou sur les rochers et pondent un certain nombre d'œufs.

Sous-Famille. **Geotrygoninae.**

Queue courte et pendante; tarses allongés nus.

S'approchent par leurs mœurs terrestres aux gallinacés. Courent avec aisance et vitesse. Poursuivis, ils préfèrent se sauver en courant et ne prennent le vol qu'à la dernière extrémité.

145. *Eutrygon terrestris* (Jacq. et Pucher). — Eutrygon terrestre.

Nouvelle-Guinée, Salawati.

a. ♂ Nouvelle-Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Nouvelle-Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

146. *Leptophila ochroptera* Pelz. — Leptophile ochroptère.

Brésil.

a. ♂ Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Sous-Famille. **Phabinae.**

Bec robuste, droit, renflé au bout; ailes longues, queue souvent allongée; tarses courts; doigts longs. Plumage teint de couleurs vives.

Habitent l'ancien continent et l'Australie. Vivent par paires au milieu des jongles et des buissons. Se nourrissent de graines et de petites semences qu'ils recherchent sur le sol.

147. *Chalcophaps chrysochlora* (Wagl.). — Turvert de Java.

Petites îles de la Sonde, Moluques, Nouvelle-Guinée S.-E., Nouv. Hébrides, Nouv.-Calédonie, Australie.

a. ♂ Nouvelle-Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Nouvelle-Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

148. *Chalcophaps afra* (Lin.). — Turvert d'Afrique.

Toute l'Afrique au S. du 17° latitude N.

a. ♂ Vallée du Limpopo (Afr.-S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Sous-Famille. **Chamepeliinae.**

Bec long, grêle, légèrement convexe à la pointe; tarses longs, grêles, complètement nus; doigts faibles; ailes longues et pointues; queue médiocre et légèrement arrondie.

Habitent les bois d'où ils visitent les champs qu'ils parcourent à la recherche de leur nourriture qui consiste en graines. Chair exquise.

149. *Claravis Geoffroyi* (Tem. et Knip.). — Claravis de Geoffroy.

Brésil S.-E.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

150. *Claravis cinerea* (Tem. et Knip.). — Claravis cendré.

Mexique S., Amérique centrale et Amérique méridionale jusqu'au Paraguay et Pérou.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

151. *Uropelia campestris* (Spix). — Uropélie turteline.

Brésil, Bolivie.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Famille. **Columbidae.**

Corps ramassé au plumage variant du gris ardoisé au marron; bec mince, formé comme de deux pièces; narines couvertes d'une lame renflée et convexe, séparée de celle du côté opposé par un sillon profond; tarses généralement emplumés; ailes longues et pointues.

Cosmopolites.

Sous-Famille. **Macropygiinae.**

Queue large, allongée, étagée.

Habitent l'Océanie. Vivent ordinairement par paires sur les crêtes des hauts rochers dans les bois d'où ils se jettent sur les plantations de poivriers qu'ils ravagent en mangeant les graines encore vertes. Se nourrissent en outre de diverses graines acres qu'ils recherchent dans les forêts et qui donnent à leur chair un goût d'une saveur très haute.

152. *Turacoena menadensis* Guoy. et Gaim. — Turaco de Menade.

Célèbes, îles Togian.

a. ♂ Célèbes. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Célèbes. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

Sous-Famille. **Colombinae.**

Queue ample, arrondie ou rectiligne.

Comptent parmi les meilleurs voiliers. Leur faculté d'orientation

les fait employer comme moyen de correspondance (pigeons voyageurs). Granivores, extrêmement voraces, ils sont de sérieux ennemis des récoltes.

153. *Columba leucomela* Tem. — Colombe leucomèle.

Australie.

a. ♂ Queensland. Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1911.

Famille. **Treronidae.**

Formes ramassées ; bec court, très robuste ; tarses courts, épais à doigts larges et plats, réunis en partie à leur base. Plumage superbe.

Habitent les grands bois des régions tropicales de l'ancien continent, surtout ceux des îles de l'Océanie. Se nourrissent de fruits et de baies.

Sous-Famille. **Carpophagidae.**

Pigeons de grande taille, présentant souvent une tubérosité arrondie sur la cire du bec.

Certaines espèces se nourrissent de noix-muscades, dont-ils ne digèrent que l'enveloppe extérieure et qu'ils rendent entières, à l'enveloppe près, sans que les noix aient éprouvé une altération qui les empêcherait de germer, quand elles sont déposées sur un terrain favorable à leur développement. Roucoulent comme les pigeons ordinaires.

154. *Carpophaga polyocephala* Gray. — Muscadivore polyocéphale.

Négros, Dinagat, Mindanao, Basilan.

a. ♂ Négros, Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

Sous-Famille. **Ptilopodinae.**

Bec légèrement renflé ; tarses courts, épais, emplumés jusqu'au milieu. Offrent aux yeux les couleurs les plus vives où le vert domine généralement.

Les *Kouroukourous* des Malais. Fréquentent les côteaux boisés ou les valons déserts. Vivent exclusivement de fruits.

155. *Megaloprepia puella* Less. — Megaloprépie tendre.

Nouvelle Guinée W., Salavati, Batanta, Waigeœ, Gemien.

a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

156. *Megalaprepia magnifica* Tem. — Megaloprépie magnifique.

Australie E.

a. ♂ Queensland. Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1911.

157. *Megalaprepia formosa* Gray. — Megaloprépie de Formose.

Halmahera, Ternate, Batjan, Obi.

a. ♂ Batjan. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

158. *Ptilopus ionogaster* (Tem., ex Reinw.). — Ptilope ionogastre. — Gelbbäuchige Gewürztaube.

Halmahera, Batjan.

a. ♂ Halmahera. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.
b. ♀ Halmahera. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

159. *Ptilopus prasinorrhus* Gray. — Ptilope de Rivoli.
Iles Papou W., Moluques.
a. ♂ Moluques. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

160. *Ptilopus monachus* (Reinw.). — Ptilope monacale. — Mönchs-Gewürztaube.
Halmahera, Batjan, Ternate, Kaisan.
a. ♂ Batjan. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

161. *Ptilopus coronulatus*, var. *gemina* Salv. — Ptilope couronée. — Gekrönte Gewürztaube.
Nouvelle Guinée, îles Jobi et Krudu.
a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

162. *Ptilopus pulchellus* (Tem.). — Ptilope mignon. — Kleine Gewürztaube.
Nouvelle Guinée, Waigion. Batanta, Salavati, Mysol.
a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

163. *Ptilopus superbus* (Tem. et Knip.). — Ptilope poukiopou.
Moluques, îles Papou, Australie.
a. ♂ Moluques. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

Sous-Famille. **Treroninae.**

Se distinguent par un bec fort dont les deux mandibules, se renflant au bout, forment ensemble une pince solide qui sert à pincer les fruits dont ils se nourrissent. Se tiennent toujours au bois. Vivent isolément par paires, mâle et femelle. Nichent dans les trous des arbres. Leur ramage est une espèce de mugissement qui diffère de beaucoup du roucoulement vif et cadencé des autres Colombes.

164. *Vinago Delalandei.* — Colombar de Delalande.
Afrique E. et S., Niasaland.
a. ♂ Afrique S. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Ordre VII. Paseres.

Passereaux. — Sperlingsvögel.

Bec polymorphe; pattes médiocrement allongées ou courtes; doigts ordinairement tout-à-fait libres; pouce articulé au niveau des doigts antérieurs; jambes emplumées jusqu'au talon; jeunes nus au sortir de l'œuf.

Varient par leurs mœurs comme par leur conformation. La plupart sont de petite taille; quelques-uns ont un chant agréable et la chair de beaucoup d'entre eux fournit à l'homme un aliment délicat.

Sous-Ordre. Coraciiformes.

Pouce seul dirigé en arrière; doigt externe uni au médian par les deux premières phalanges; bec allongé.

Oiseaux criards répandus dans le monde entier, surtout dans les pays chauds. Nourriture et nidification anormales.

Famille. Alcedinidae.

Bec fort et droit, plus long que la tête; tarses minces et courts, ordinairement à quatre doigts, dont l'externe est réuni au médian dans la plus grande étendue; plumage richement coloré.

Solitaires et méfiants. Vol rapide, droit et court. Cri perçant, qui chez certaines espèces, ressemble à un éclat de rire. Nichent dans les trous des berges ou dans les vieux troncs d'arbres.

Sous-Famille. Alcedinae.

Bec très long, presque le double de la longueur de la tête, droit effilé, anguleux ou tetragone, pointu, à mandibules égales, avec une arête déprimée sur la mandibule supérieure; queue courte, cunéiforme, plumage métallique.

Vagabonds, farouches. Piètres marcheurs. Fréquentent les rivages où ils se nourrissent de petits poissons et d'insectes aquatiques, de là leur nom *Martin pêcheurs*. Nichent dans les trous des berges qui existent ou qu'ils se creusent.

165. *Ceryle americana* Gm. — Céryle d'Amérique. — Amerikanischer Stoßfischer.

Amérique méridionale, tropicale.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
b. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
c. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

166. *Ceryle alcyon* (Lin.). — Céryle alcyon. — Alcyon.

Amérique septentrionale, centrale, Antilles.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
a. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

167. *Ceryle torquata* (Lin.). — Céryle à collier. — Halsband-Stoßfischer.

Amérique centrale et méridionale.

a. ♂ Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

168. *Ceryle rudis* (Lin.). — Céryle pie. — Graufischer.

Europe S.-E., Asie S.-W., Afrique.

a. ♂ Égypte. Don de M. Martin Rischard, Luxembourg, 1868.

(A suivre).