Catalogue des oiseaux

du Musée National d'Histoire Naturelle de Luxembourg

(Collection systématique)

par V. FERRANT.

Sous-Famille. **Daceliininae.**

Bec à mandibule supérieure plus ou moins large et déprimé à la base, plus ou moins arrondie en dessus, la pointe généralement infléchie et légèrement crochue ; queue assez longue, régulière, parfois étagée et présentant deux brins.

Appelés *Martin chasseurs*. Habitent constamment dans l'épaisseur des forêts près des lieux humides et frais. Se nourrissent de vers et d'insectes. Nichent dans les trous des arbres.

169. *Syma torotoro* Less.. — Symé torotoro. — Torotoro.
Nouvelle Guinée, Mysol, Waigion.
a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

170. *Halcyon funebris* (Bp.). — Halcyon funèbre. — Trauer-Baumlist.
Halmahera, Ternate.
a. ♂ Halmahera. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

171. *Halcyon salomonis* Rams. — Halcyon des Salomons.
Iles Salomon, Louisiades, Nouvelle Bretagne, Nouvelle Irlande et Nouvelles Hébrides.
a. ♂ Iles Salomon. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

172. *Halcyon nigrocyaneus* Wall. — Halcyon bleu foncé. — Dunkelblauer Baumlist.
Nouvelle Guinée. N.-W., Salawati, Batanta.
a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

173. *Halcyon Macleayi* Jard. et Selby. — Halcyon de Macleay. — Maclay's Baumlist.
Australie, Nouvelle Guinée S.-E.
a. ♂ Queensland. Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1910.

174. *Halcyon diops* (Tem). — Halcyon bicolor. — Zweifarb-Baumlist.
Moluques.
a. ♂ Moluques. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

175. *Halcyon albicillus* (Cuv.) var. *saurophaga* Gould. — Halcyon à tête blanche. — Weißköpfiger Baumlist.
Iles Moluques, Papous, Louisiades, Salomon, Nouvelle Irlande.
a. ♂ Moluques. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

176. *Halcyon senegalensis* (Lin.). — Halcyon à tête grise. — Senegal-Baumlist.

Afrique tropicale.

a. b. ♂♂ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1911.

c. ♀ Matabeleland (Afr. S.). Don de M. E. Holub, Vienne 1894.

177. *Tanysoptera dea* (Lin.). — Tanysoptère à longs brins.

Amboine, Ceram, Monawolka, Boano, Manipa.

a. ♂ Ceram. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Ceram. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

178. *Tanysoptera galatea* Geray. — Tanysoptère à dos brun.

Nouvelle Guinée, Salawati, Batanta, Waigiou, Guoboh.

a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden. Bruxelles, 1884.

179. *Melidora macrorhina* (Lin.). — Mélidore d'Euphrosine.

Nouvelle Guinée, Salawati, Waigiou, Mysol.

a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

Famille. **Irrisoridae.**

Bec long, grêle, plus ou moins recourbé, caréné en dessus, déprimé latéralement; tarses plus courts que le doigt médian; doigts munis d'ongles forts et recourbés; queue très allongée, large, étagée.

Habitent les forêts de l'Afrique. Se réunissent en petites troupes dont les membres sont étroitement unis et manifestent beaucoup d'attachement les uns pour les autres. Volent d'arbre en arbre en poussant des cris assourdissants. Se nourrissent surtout de fourmis et nichent dans les creux des arbres.

180. *Scoptelus aterinus* Steph. var. *notata* Salv. — Scoptèle noir. — Schwarzer Baumhopf.

Afrique N.-E., Orange-River-Colonie.

a. ♂ Orange-River-Colonie. Don de M. E. Holub, Vienne, 1891.

Famille. **Meropidae.**

Bec long, légèrement recourbé, pointu, à carène tranchante, la mandibule supérieure plus longue que l'inférieure: tarses grêles, courts, doigts faibles, le médian presque entièrement soudé au doigt interne; queue souvent prolongée en arrière en deux brins effilés.

Désignés sous le nom commun de *Guêpiers*. Chassent les guêpes et les abeilles ce qui les fait considérer comme nuisible dans certains pays, mais en Afrique ils détruisent une grande quantité de sauterelles et de criquets et rendent ainsi de grands services. Déposent leurs œufs dans des trous qu'ils se creusent dans les berges.

181. *Melithophagus pusillus* (P. C. S. Müller). — Mélithophage nain. — Zwerg-Honigsauger.

Afrique N.-E. et W. de Sénégambie à Caméron.

a. ♂ Vallée du Mo-tetse (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

182. *Melithophagus Lafresnayei* (Guér.). — Mélithophage de La Fresnaye. — La Fresnaye's Honigsauger.

Abyssinie, Choa.

a. ♂ Abyssinie. Don de M. Oscar Thilges, Dudelange, 1912.

b. ♀ Abyssinie. Don de M. Oscar Thilges, Dudelange, 1912.

183. *Melithophagus bullockoides* (Smith). — Mélithophage bullocoide. — Weißstirniger Honigsauger.

Afrique S. et S.-E.

a. ♂ Vallée du Limpopo (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

184. *Merops nubicoides* (Des M.). — Guêpier de la Nubie. — Nubischer Bienenfresser.

Afrique S.-E. et S.-W. jusqu'au Congo.

a. ♂ Gaschungula (Afr. S.). Don de M. E. Holub, Vienne, 1894.

Famille. **Bucerotidae.**

Bec toujours grand, à substance cellulense, très élevé, la partie supérieure arquée et souvent surmontée de protubérances énormes, les bords sinueux inégalement dentés, la commissure dépassant les yeux; tarses épais, écussonnés; doigts courts et gros.

Oiseaux d'un naturel taciturne, qui vivent par troupes nombreuses dans les forêts des contrées chaudes de l'ancien continent et de l'Australie. Leur vol est pesant et court, leur démarche laborieuse; ils sautent comme les corbeaux et se tiennent perchés sur les arbres peu élevés et peu touffus. Produisent par le claquement de leurs mandibules un bruit singulier qui s'entend de loin. Se nourrissent de fruits, de graines et d'insectes; mais ils se repaissent également de chair fraîche et putréfiée. Passent pour des modèles d'époux. Nichent dans le creux des arbres où le mâle mure souvent la femelle avec du mortier durant l'incubation et la nourrit par une petite ouverture ménagée dans la cloison. Leur chair est comestible et délicate, surtout celle des espèces qui vivent de graines aromatiques.

185. *Alophius camurus* (Cass.). — Alophus vouté.

Afrique W. et centrale.

a. b. ♂♂ Kondué (Congo Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1906.

c. ♀ juv. Kondué (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1906.

186. *Lophoceros fasciatus* (Shaw.). — Lophocère fascié.

Afrique tropicale centrale.

a. ♂ Konduć (Congo-Belge), Don de M. Ed. Luja, Luxembg., 1911.

187. *Lophoceros nasutus* (Lin.) var. *epichina* (Sund). — Lophocère nez.

Afrique N.-E. et W.

a. ♂ Alberts-Country, Zambèse. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

188. *Anorrhinus albocristatus* (Cass). — Anorrhinus à huppe blanche.

Gabon, Caméron, Congo.

a. ♂ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1911.

189. *Rhytidoceros undulatus* Shaw. — Rhytidocère à bec ondulé. — Jahrvogel.

Indo-Chine W., Malacca, îles de la Sonde.

a. ♂ Iles de la Sonde. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

b. ♀ Iles de la Sonde. Don de M. Hub. Linden, Bruxelles, 1884.

190. *Bycanistes albotibialis* (Tem.). — Bycaniste à culottes blanches.

Du Gabon à Libéria.

a. ♂ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1909.

b. ♀ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1909.

191. *Bycanistes cristatus* (Rupp.). — Bycaniste huppé.

De l'Abyssinie au Zambèze.

a. ♀ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg. 1909.

192. *Ceratogymna elata* (Tem.). — Cératogymne noble.

Afrique W.

a. ♀ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1909.

193. *Ceratogymna atrata* (Tem.). — Cératogymne noir.

Afrique tropicale et centrale.

a. b. ♂♂ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1909.

c. ♀ Konduć (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg, 1909.

Famille. **Coraciidae.**

Bec fort, convexe, crochu, souvent dilaté à la base; narines nues, placées au bord des plumes; tarses courts et robustes; plumage rigide et découpé.

Appelés vulgairement *Rolliers*. Habitent l'ancien continent et l'Australie. Insectivores et frugivores. Nichent dans les trous des arbres ou de ruines et souvent mêmes dans les trous percés aux flancs des berges de rivières. Vol elevé, rapide et soutenu.

Sous-Famille. **Coraciinae.**

Bec large et épais, généralement coloré en rouge ; pattes réduites ; queue courte, coupée à angle droit ou à peine échancrée.

Se nourrissent d'insectes qu'ils poursuivent d'un vol rapide principalement au lever et au coucher du soleil. Nichent dans le creux des arbres.

194. *Eurystomus afer* Lath. — Eurystome d'Afrique. — Afrikanische Rachenracke.

Afrique tropicale.

a. ♂ Vallée du Buschumo (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

195. *Eurystomus orientalis* (Lin.). — Eurystome de l'Orient. — Orientalische Rachenracke.

a. Var. *pacifica* (Lath.).

Australie, Moluques jusqu'à Célébès.

a. ♂ Queensland (Austr.). Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1910.

b. ♀ Queensland (Austr.). Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1910.

b. Var. *cranirostris* Sclat.

Nouv. Guinée, Waigion, Nouv. Irlande et Nouv. Bretagne.

a. ♂ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

Famille. **Monotidae.**

Bec allongé, légèrement incliné, régulièrement crénelé ou denticulé aux bords des mandibules dans les deux tiers de leur longueur ; tarses relativement minces, écussonnées ; doigts faibles, grêles ; queue longue et étagée.

Représentent en Amérique les *Rolliers* de l'ancien continent. Habitent l'intérieur des forêts, sont très défiants et ne se posent que sur les branches basses des arbres. Vivent de petits mammifères et d'insectes auxquelles ils ajoutent quelque fois une nourriture végétale. Nichent dans les trous creusés par les Tatous ou autres mammifères et qu'ils garnissent d'herbes sèches.

196. *Momotus brasiliensis* Lath. — Motmot du Brésil. — Brasilianischer Motmot.

Guyane, Amazone jusqu'au Rio Négro.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

197. *Baryphthengus ruficapillus* (Vieill.).

Brésil. Argentine N.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

Tribu. Gypseliformes.
(Macrochires).

Bec faible, peu saillant, mais largement fendu pour pouvoir prendre la nourriture en volant; ailes longues à squelette allongé d'une manière particulière; pouce dirigé ou réversible en avant.

Criards. Vrais insectivores. Utiles.

Famille Podargidae.

Bec plus large que long, très déprimé et épais, marqué en dessus d'une arête qui se termine en pointe recourbée et aiguë, la commissure excessivement fendue; ailes allongées, puissantes; doigts libres, à ongles comprimés.

Habitent les îles de l'Asie et l'Australie. Nocturnes.

Sous-Famille. Podarginae.

Bec démesurément fendu et très ample, atteignant l'angle interne de l'œil, garni à sa base supérieure seulement de longues plumes décomposées, sétacées, presque piliformes, dirigées et recourbées en avant; tarses robustes.

Habitent les grands bois où ils se tiennent constamment dans les lieux exposés au soleil et aux intempéries de l'air. Perchent le jour sur les grosses branches horizontales des vieux arbres immobiles, les plumes ébouriffées, le cou rentré. Pénètrent, la nuit venue, dans les buissons pour y chercher des insectes qui forment leur nourriture principale. Avalent aussi des limaçons et, à l'époque de la ponte, des petits oiseaux qu'ils prennent au nid. Poussent des cris rauques et désagréables. Nichent sur les arbres.

198. *Podargus strigoides, megacephalus et gracilis* Lath. — Podarge trapu. — Eulenschwalm.

Australie, Tasmanie.

a. ♂ Australie. Don de M. Hubert Linden, Bruxelles, 1884.

199. *Podargus ocellatus* Quoy et Gaim. — Podarge moucheté. — Augénschwalm.

Nouvelle Guinée et les îles voisines.

a. ♀ Nouvelle Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

Famille. Caprimulgidae.

Bec faible, énormement fendu et dilaté à la base; ailes ne dépassant pas la queue, qui est arrondie au bout; tarses plus ou moins courts, les doigts antérieurs réunis à la base par une membrane; plumage lâche, mollet et duveteux comme celui des hiboux.

Insectivores nocturnes ou crépusculaires. Cosmopolites.

Sous-Famille. Caprimulginae.

Bec garni latéralement de poils gros et raides; tarses courts,

entièrement ou à moitié emplumés, le doigt médian beaucoup plus long que les latéraux.

Vivent isolés ou par couple dans les bois ou au milieu des steppes. Chassent dans les ténèbres d'un vol silencieux, les insectes de nuit qui voltigent dans les airs et les engloutissent dans leur large bec dont les parois sont tapissés d'une viscosité qui les retient comme de la glu. Émettent en volant un bourdonnement assez fort qui leur a valu le nom d'*Engoulevent.* Appelés vulgairement *Crapauds volants* ou *Tète-Chèvre* parce qu'on les accuse à tort de téter les chèvres. Ce préjugé auquel le nom latin *Caprimulgus* fait également allusion, tire son origine de leur habitude de fréquenter les paturages pour y chasser les insectes coprophages. Pondent sur la terre nue. Migrateurs.

200. *Podager nucunda* Vieill. — Podager diurne.

Amérique méridionale tropicale jusqu'en Patagonie.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

201. *Caprimulgus ruficollis* Tem. — Engoulevent ruficolle. — Rothalsnachtschatten.

Europe S., Afrique N.-W., Europe N.-W., Europe S.-W.

a. ♂ Portugal. Acquisition du Musée.

292. *Caprimulgus Fossii* Hartl. — Engoulevent de Fossi. — Fossi's Nachtschatten.

Afrique tropicale entre le 4° latitude N. et le 18° latitude S.

a. ♀ Haut-Notuang. Afrique S. Don de M. E. Holub, Vienne, 1894.

Famille **Cypselidae.**

Bec petit déprimé et triangulaire à la base, fendu jusqu'aux yeux, la mandibule supérieure crochue; tarses très courts, emplumés jusqu'aux doigts; pouce dirigé en avant; ongles étroits et crochus; ailes immenses, dépassant la queue qui est fourchue; plumage serré.

Habitent à l'exception de l'Australie toutes les parties du globe et se trouvent aussi bien dans les îles de l'Océan que sur les grands continents, sur les bords de la mer aussi bien que sur les hautes montagnes et jusque dans le voisinage des neiges éternelles. Ceux des tropiques n'effectuent que des déplacements d'une étendue fort restreinte, tandisque ceux qui habitent l'été la zone tempérée, exécutent des migrations lointaines Voyagent de nuit et en grandes bandes. Leurs pieds ne sont pas faits pour la marche et ne leur servent que pour se suspendre aux aspérités d'un mur ou d'un rocher. Pour reprendre le vol, qui dépasse en puissance celui de tous les autres oiseaux, ils se laissent tomber dans le vide en étendant les ailes. Se nourrissent d'in-

sectes ailés qu'ils happent au vol avec une incroyable dextérité. Nichent dans les trous des murs, des rochers et des arbres ou prennent possession d'un nid abondonné. Très utiles.

Sous-Famille. **Cypselinæ.**

Tarses emplumés jusqu'à la première articulation, pouce dirigé en avant.

Habitent l'intérieur des villes, des bourgs, les montagnes rochouses et les bois. Chassent communément à la nuit tombante et à la pointe du jour. Naturel querelleur. Cris stridents.

203. *Cypselus melba* (Lin.). — Martinet alpin. — Alpensegler.

Région alpine de l'Europe centrale et méridionale, de l'Asie S.-W. et de l'Afrique N.

a. ♂ Suisse. Acquisition du Musée.

b. ♀ Suisse. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Macropteryginæ.**

Tarses plus ou moins nus ou en partie emplumés; pouce séparé et non versatil.

Chassent communément pendant le jour sur les lieux marécageux du bord de la mer et au-dessus des petites rivières.

204. *Macropteryx mystacea* Lin. — Macroptérix des papous. — Papu-Zwergsegler.

Iles Papous, Salomon et du Duc York.

a. ♂ Iles Papous. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

Famille. **Trochilidae.**

Bec grêle, cylindrique, allongé, droit ou recourbé vers la base, quelquefois finement dentelé ou scié vers la pointe; langue extensible, tubuleuse, bifide; ailes longues, pointues, suraigues; queue de forme variable; pattes très courtes, à doigts longs et minces; ongles crochus. Plumage relevé chez le mâle de plastrons de plumes écailleuses à reflets brillants et irisés où toutes les couleurs du prisme sont représentées du violet au bleu saphir en passant par le grenat, l'améthyste, le rubis, la topaze et l'émeraude. Femelles plus simplement vêtus. Les jeunes, jusqu'à l'âge de deux à trois ans, et les mâles en dehors du temps des amours, ressemblent aux femelles.

Oiseaux essentiellement américains, les plus petits connus, pétulants, querelleurs. Visitent pendant le jour les plantes couvertes de fleurs en faisant miroiter au soleil les plastrons de leur plumage qui jettent des feux comme des pierres précieuses. Leur vol bourdonnant trahit souvent leur présence et rappelle le bruit de notre sphinx bourdon. Leurs mouvements ressemblent surtout à ceux de cet insecte, alors qu'ils se maintiennent avec de rapides coups d'ailes devant les fleurs tubuleuses, enfonçant leur bec au fond de la corolle pour y

saisir les insectes. Nids artistement tressés de matériaux les plus fins, fixés à l'écorce d'une branche, à la face inférieure d'une grande feuille lancéolée, aux rochers ou bien suspendus à quelques roseaux par des fils d'araignée ou de la soie de chenille. Cri strident, mais faible. Chant monotone.

205. *Rhamphodon naevius* (Dunst). — Ramphodon tacheté.
Brésil.
a. ♂ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. ♀ Brésil. Acquisition du Musée.

206. *Phaethornis Guyi* (Less.). — Phæthornis de Guy. — Guy's Sonnenkolibri.
Vénézuéla, Trinidad.
a. ♂ Vénézuéla. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

207. *Phaethornis pygmaeus* (Spix). — Phætornis pygmé. — Zwerg-Sonnenkolibri.
Guyane, Brésil, Haute-Amazone, Bolivie.
a. ♂ Guyane. Don de M. L.-A. Picard, Bruxelles, 1872.

208. *Eutoxeres aquila* Bourc. — Eutoxère bec d'aigle. — Adlerschnabel.
Var. *heterura* Gould.
Ecuador E.
a. ♂ Ecuador. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.
b. ♀ Ecuador. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg. 1903.

209. *Campylopterus lazulus* Vieill. — Campyloptère lapis.
Vénézuéla, Colombie, Ecuador.
a. ♂ Ecuador. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

210. *Eupetomena macrura* (Gm.). — Eupetomène à queue fourchue.
Brésil E.
a. ♂ Brésil E. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

211. *Florisuga fusca* (Vieill.). — Florisuge brun-noir. — Schwarzbrauner Blütensauger.
Brésil.
a. ♂ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. ♀ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

212. *Argyrtria candida* (Bourc. et Muls.). — Argyrtrie à gorge blanche.
Amérique centrale.
a. ♂ Panama. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

213. *Saucerottea erythronotha* Less. — Saucérotté erythronote.
a. ♂ Trinidad. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. ♀ Trinidad. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

214. *Hylocharis saphirina* (Gm.). — Hylocharis saphir.
Guyane, Vénézuéla, Brésil.
b. c. ♀ ♀ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

215. *Chlorostilbon auriceps* Gould. — Chlorostilbon tête d'or.
Mexique.
a. ♂ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
a. b. ♀ ♀ Mexique. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903

216. *Chlorostilbon Poortmani* Bourc. — Chlorostilbon de Poortman.
Colombie, Écuador.
a. b. c. ♂ ♂ Colombie. Don de Mlle M. Saur, Luxembourg, 1903.
d. ♀ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

217. *Timolia bicolor* (Gm.). — Timolie bicolor.
Ile Dominica.
a. ♂ Ile Dominica. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. ♀ Ile Dominica. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

218. *Thalurania glaucopis* (Gm.) — Thaluranie aux yeux gris.
Brésil.
a. ♂ Brésil. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

219. *Chalybura Buffoni* (Less.). — Chalybure de Buffon.
Vénézuéla, Colombie.
a. ♂ Vénézuéla. Don de Mlle Marie Saur. Luxembourg, 1903.

220. *Petasophora thalassina* Sw. — Pétasophore anaïs.
Mexique, Guatémala.
a. ♂ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. c. ♂ ♂ Mexique. Don de Mlle M. Saur, Luxembourg, 1903.
d. ♀ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
e. f. ♀ ♀ Mexique. Don de Mlle M. Saur, Luxembourg. 1903.

221. *Petasophora cyanotis* (Bourc. et Muls.). — Pétasophore bleu d'azure.
Mexique, Guatémala.
a. ♂ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

222. *Lampornis nigricollis* (Vieill.). — Lampornis mango. — Schwarzhalsiger Schimmerkolibri.
Amérique tropicale.
a. b. ♂ ♂ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

223. *Lampornis Prevosti* (Less.). — Lampornis de Prevost. — Prevost's Schimmerkolibri.

Mexique, Amérique centrale, Vénézuéla.

a. ♂ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

b. ♀ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

224. *Polytmus viridissimus* (Vieill.). — Polytme vert.

Guyane, Vénézuéla E.

a. b. ♀ ♀ Vénézuéla. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

225. *Leucochloris albicollis* (Vieill.). — Leucochlore à plastron blanc.

Brésil S., Paraguay.

a. ♂ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

226. *Oreotrochilus chimborazo* (Del. et Bourc.). — Oréotrochile de Chimborazo. — Chimborazovogel.

Var. *Pichincha* (Bourc. et Muls).

Écuador.

a. ♂ Écuador. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles. 1872.

227. *Clytolaema rubinia* (Gm.). — Clytolème rubis.

Brésil S.

a. ♂ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

228. *Phaeolaemea rubinoides* (Bourc. et Muls.). — Phaeolème rubinoïde. — Granat.

Colombie.

a. b. ♂ ♂ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

229. *Helianthea lutetiae* (Del. et Bourc.).

Colombie, Écuador.

a. ♂ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

230. *Helianthea insignata* (Du Bus). — Hélianthe diadème.

Colombie.

a ♂ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

231. *Helianthea Bonapartei* (Briss.). — Hélianthe de Bonaparte.

Colombie.

a. ♂ Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

232. *Bourcieria torquata* (Boiss.). — Bourcieria à plastron.

Colombie, Écuador.

a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

233. *Lafresnaya flavicauda* (Fras.). — Lafresnaya à queue jaune.

Colombie.

a. b. ♀ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

233. *Aglaeactis cupreipennis* (Bourc. et Muls.). — Agléactis cuivreux.
Colombie, Écuador, Pérou.
a. ♂ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

235. *Panoplites flavescens* Bodd. — Panoplite jaunâtre.
Vénézuéla, Colombie, Écuador.
a. ♀ Écuador. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. ♀ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

236. *Eriocnemis vestita* (Longuem.). — Eriocnème vêtu.
Vénézuéla, Colombie, Écuador.
a. ♂ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872,
b. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903,
c. d. ♀ ♀ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1792.

237. *Eriocnemis cupreiventris* (Fras.). — Eriocnème à ventre cuivreux.
Vénézuéla, Colombie, Écuador.
a. ♀ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

238. *Eriocnemis luciani* (Bourc.). — Eriocnème brillant.
Écuador.
a. b. ♂ ♂ Écuador. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

239. *Heliangelus exortis* (Fras.). — Héliangèle exorte.
Colombie, Écuador.
a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

240. *Heliangelus clarissae* (Long.). — Héliangèle brillant.
Colombie, Vénézuéla.
a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

241. *Metallura tyrianthina* (Bodd.). — Métallure tyrianthine.
Vénézuéla, Colorado, Écuador, Pérou, Bolivie.
a. b. ♀ ♀ Vénézuéla. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

242. *Cyanolesbia cœlestis* (Gould.). — Cyanolesbe céleste.
Colombie S., Écuador.
a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

243. *Psalydoprymna Victoriae* (Bourc. et Muls.). — Psalydoprymne Victoria.
Colombie, Écuador.
a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

244. *Psalydoprymna Gouldi* (Lodd.). — Psalydoprymne de Gould.
Colombie.

a. ♀ juv. Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. ♀ Colombie. Don de Mlle M. Saur, Luxembourg, 1903.

245. *Rhamphomicron microhynchum* (Boiss). — Rhamphomicron microrhynque.
Colombie, Écuador, Vénézuéla, (Merida).
a. ♂ Colombie. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

246. *Oxypogon Guerini* (Boiss). — Oxypogon de Guérin. — Guerin's Helmkolibri.
Colombie.
a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

247. *Heliothrix auritus* (Gm.). — Jacobine à oreillons noirs. — Blumenküsser.
Amérique méridionale et tropicale jusqu'à l'Amazone.
a. b. ♀♀ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

248. *Thaumastura cora* (Less. et Garn.). — Thaumasture cora.
Pérou W.
a. b. ♂♂ Pérou. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
c. ♂ Pérou. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

249. *Trochilus colubris* Lin. — Colibri petit rubis. — Kolibri.
États-Unis, Amérique centrale, Bermuda, Baham.
a. ♂ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.
b. ♀ Mexique. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

250. *Acestrura heliodori* (Bourc.). — Acestrure héliodor.
Colombie, Écuador, Bolivie, Pérou, Haut-Amazone.
a. ♀ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

251. *Cephalolepis Delalandei* (Vieill.). — Cephalolépis de Delalande.
Brésil S.
a. ♂ Brésil. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

252. *Abeillia typica* Bp. — Coquet typique.
Mexique, Guatémala.
a. ♂ Mexique. Don de Mlle Marie Sauer, Luxembourg, 1903.

253. *Lophornis ornatus* (Bodd.). — Coquet orné. — Schmuckelfe.
Trinidad, Vénézuéla, Guyane, Amazone inférieure.
a. ♂ Vénézuéla. Don de M. L.-A. Piccard, Bruxelles, 1872.

(A suivre).