Société des Naturalistes luxembourgeois
(Anc. Société g.-d. de Botanique et anc. Fauna fusionnées).

N° 9. **15. 9.** **1912.**

Inhaltsverzeichnis. — *V. Ferrant*: Catalogue des oiseaux du Musée d'Histoire Naturelle de Luxembourg (Suite). — *Ern. Faber:* Die Baumriesen des Großherzogtums Luxemburg. (Forts.).

Zu Limpertsberg verschied unser Vereinsmitglied, Hr. Evrard KETTEN, Gemeinderatsmitglied und Rosenzüchter. Der Verstorbene ruhe sanft!

Catalogue des oiseaux

du Musée National d'Histoire Naturelle de Luxembourg

(Collection systématique)

par V. FERRANT.

III. Tribu. **Cuculiformes.**

(Zygodactyles).

Pouce et doigt externe dirigés en arrière; face postérieure du tarse offrant des écailles séparées par des sutures; langue non extensible; régime insectivore.

Famille. **Capitonidae.**

Corps lourd, ramassé; bec moyen, robuste, plus ou moins renflé sur les côtés, terminé en pointe conique, à bords festonnés et dentés, garni à la base de soies raides; tarses moyens ou courts, robustes, pourvus de quatre doigts dont deux dirigés en avant et deux en arrière.

Habitent, à l'exception de l'Australie, les régions chaudes des deux continents. Se nourrissent d'insectes, de baies et de fruits. Nichent dans les trous d'arbres. Vol tortueux.

Sous-Famille. **Megalæminæ.**

Bec renflé sur les côtés, garni à la base de soies raides, droites, courbées en avant et souvent disposées par paquet; ailes aigues.

Habitent les contrées des régions tropicales de l'ancien continent. Criards, bruyants, alertes, sociables. Se nourrissent d'insectes, de baies et de fruits qu'ils recherchent dans les buissons et les cimes des arbres le long desquelles ils grimpent à l'instar des pics.

254. *Pogonorhynchus Levaillanti* (Vieill.). — Barbican de Levaillant. — Levaillant's Bartvogel.

Congo W., Zambèze.

a. ♂ Vallée du Zambèze. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

255. *Tricholaema leucomelas* (Bodd.). — Barbican leucomèle.
Afrique S.
a. ♂ Vallée du Zambèze. Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Sous-Famille. **Capitoninae.**

Bec plus comprimé, garni à la base de poils courts; ailes obtues.

Habitent les contrées tropicales de l'Amérique. Patients, silencieux. Restent des heures entières perchés sur une branche d'où ils se lancent sur les insectes qui passent à leur portée. Souvent ils s'élèvent perpendiculairement en l'air pour saisir leur proie après quoi ils redescendent à leur premier poste et reprennent leur immobilité.

256. *Capito Bourcieri et Hartlaubi* (Lafr.). — Barbacou de Bourcier.
Colombie, Ecuador.
a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.
a. ♀ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

Famille. **Rhamphastidae.**

Bec volumineux, plus long que la tête, garni à la base d'une peau nue, la mandibule supérieure recourbée et à bords dentés; langue barbetée sur les bords comme une plume; tarses assez robustes, les deux doigts antérieurs soudés jusqu'à leur milieu. Plumage brillant.

Vivent en petites troupes de six à dix individus dans les contrées chaudes de l'Amérique. Très défiants, très vigilants et criards. Vol lourd et pénible. Sautillent obliquement, d'assez mauvaise grâce, les jambes très écartées. Perchent vers le haut des plus grands arbres en sautant d'une branche à l'autre. Errent de canton en canton pour chercher leur nourriture, qui consiste, selon la saison en fruits, en bourgeons d'arbres, en insectes et en petits oiseaux; ils attaquent les parents de ces derniers, les chassent de leur nid et mangent leurs œufs et leurs petits. Jettent leur nourriture en l'air pour la saisir et l'engloutir plus facilement. Nichent dans des trous d'arbres.

257. *Rhamphastos culminatus* Gould.
De Colombie au Pérou E.
a. ♂ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

258. *Rhamphastos ariel* Vig. — Toucan ariel.
Brésil E.
a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

259. *Rhamphastos dicolorus* Lin. — Toucan dicolore.
Brésil S.-E., Paraguay.
a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

260. *Andigena Bailloni* (Vieill.). — Andigène de Baillon.
Brésil S.-E., Argentine N.-E.
a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

261. *Pteroglossus aracari* (Lin.). — Ptéroglosse aracari. — Arassari.

Guyane, Bas-Amazone.

a. ♂ Guyane. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

b. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

262. *Selenidera maculirostris* (Licht.). — Sélénidère maculirostre.

Brésil S., Argentine N.

c. b. c. ♂♂ Argentine. Acquisition du Musée.

d. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

263. *Aulocorhamphus sulcatus* (Sw.). — Aulocorhamphe silloné.

Vénézuéla.

a. ♂ Vénézuéla. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Famille. **Galbulidae.**

Corps élancé; bec long, entier, étroit, quadrangulaire, pointu, garni de soies sur les côtés, mandibule supérieure à arête vive; tarses courts, en partie emplumés, pourvus de quatre doigts, dont deux en avant et deux en arrière, ou de trois doigts seulement, dont un seul postérieur; plumage à reflets métalliques.

Habitent l'Amérique tropicale. Imprudents, indolents, paresseux. Vivent isolés ou par couples, et s'écartent peu du canton qu'ils ont choisi; les uns préfèrent les bois, les autres les plaines, d'autres les lieux humides. Perchent sur les branches basses et guettent dans l'air les insectes qui passent à leur portée, pour se lancer dessus à propos. Nichent dans des trous d'arbres.

Sous-Famille. **Galbulinae.**

Quatre doigts dont deux en avant et deux en arrière.

264. *Galbula viridis* Lath. — Jacamar commun. — Gemeiner Jakamar.

Guyane, Bas-Amazone, Vénézuéla.

a. ♂ Guyane. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

b. ♀ Brésil. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

265. *Galbula tombacca* Spix. — Jacamar a tête brune. — Braunscheiteliger Jakamar.

Var. *fuscicapilla* Scl.

Colombie.

a. b. c. ♂♂ Colombie. Don de Mlle M. Saur, Luxembourg, 1903.

a. ♀ Colombie. Don de Mlle Marie Saur, Luxembourg, 1903.

266. *Galbula albirostris* Lath. — Jacamar à bec blanc. — Weißschnabeliger Jakamar.

Guyane, Amazone, Écuador E.

a. ♂ Guyane. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
b. ♀ Guyane. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Famille. **Bucconidae.**

Corps massif; tête grosse; bec de différente longueur, pointu; la mandibule supérieure convexe, recourbée en pointe à son sommet, à bords entiers et comprimés, garnie à la base de poils raides; tarses faibles, pourvus de quatre doigts, dont le premier et le quatrième dirigés en arrière.

Habitent les forêts de l'Amérique méridionale. Sédentaires, solitaires, indolents, paresseux, silencieux. Se tiennent des heures entières, perchés sur une branche sèche, d'où ils se lancent sur les insectes qui passent à leur portée. Ils sont peu farouches et se laissent facilement approcher. Nichent dans les trous des arbres ou dans des cavités qu'ils creusent dans le sol.

267. *Bucco Swainsoni* Gray. — Barbacou de Swainson. — Swainson's Bartkukuk.

Brésil S.-E., Argentine N.-E.
a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.
b. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

268. *Chelidoptera tenebrosa* (Pall.). — Chélidoptère ténébreux.

Var. *brasiliensis* Sc.

Brésil S.-E.
a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Famille. **Cucculidae.**

Bec robuste ou médiocre, notablement fendu et comprimé, la mandibule supérieure à arête arquée, la pointe crochue ou recourbée; ailes courtes; queue longue et souvent très étagée; doigt externe dirigé en arrière.

Oiseaux omnivores de formes massives. Plusieurs sont remarquables par une telle inaptitude à l'acte de l'incubation, qu'ils déposent leurs œufs au milieu de ceux et dans le nid d'un autre oiseau, d'un genre tout différent du leur, et d'abandonner ainsi à celui-ci, et les soins de l'incubation et, en grande partie, ceux de l'éducation de leurs petits. Le plus grand nombre au contraire, pondent et nichent à la manière des autres oiseaux.

Sous-Famille. **Cuculinae.**

Tête avec ou sans aigrettes; bec de la longueur de la tête, large, un peu déprimé à la base, légèrement arqué, entier et lisse; bouche fendue; ailes subobtuses ou subaiguës; queue arrondie, allongée; tarses courts, plus ou moins complètement emplumés.

Habitent les contrées boisées des deux continents, mais sont surtout représentés dans les Indes et l'Afrique. Ceux des tropiques n'effectuent pas de déplacement tandis que ceux qui habitent l'été la zone tempérée, exécutent des migrations assez lointaines. Vivent solitaires, occupant chacun une sorte de canton. Ne construisent pas de nids, mais déposent leurs œufs dans les nids étrangers, laissant aux propriétaires les soins de l'incubation et de l'éducation de leur progéniture; ils n'en déposent qu'un dans chaque nid, et leur intelligence les porte toujours à choisir celui d'un oiseau insectivore. Dans la saison des amours les mâles font entendre leur chant monotone, composé de quelques notes seulement. Le mot *cuculus*, vocalisé à la romaine, est comme le mot français *coucou*, une onomatopée exprimant le cri de l'espèce européenne. Exclusivement insectivores. Utiles.

269. *Cacomantis insperatus* (Gould.).

Iles Papous, Salomon, Arrou, Moluques, Nouvelle-Poméranie.

b. ♀ Nouvelle-Poméranie. Acquisition du Musée.

270. *Chrysococcyx cupreus* (Bodd.). — Chrysococcyx cuivreux. — Goldkukuk ou Ditrik.

Afrique tropicale et méridionale.

a. ♂ Afrique (Sud.). Don de M. E. Holub, Vienne. 1894.

271. *Coccyzus melanocoryphus* Vieill. — Coulicou à queue noire. — Schwarzschwänziger Fersenkukuk.

Amérique méridionale, tropicale et tempérée.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

272. *Endynamis cyanocephala* (Lath.). — Coucou gros bec à tête bleue. — Blauköpfiger Gukel.

Australie, Nouvelle-Guinée jusqu'à Goram à Timor.

a. ♂ Nouvelle-Guinée. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

273. *Eudynamis melanorhyncha* S. Müller. — Coucou gros bec melanorhynque. — Schwarzschnabeliger Gukel.

Célébès, îles Soula, Nouvelle-Poméranie.

b. ♀ Nouvelle-Poméranie. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Centropodinæ.**

Bec fort, de la longueur de la tête; courbé dès la base, comprimé latéralement; paupière supérieure ciliée; tarses plus long que le doigt externe antérieur, forts, robustes, dénués de plumes; l'ongle du pouce droit et allongé. Plumes de la tête et de toute la moitié antérieure du corps raides comme du crin.

Habitent les bois des régions chaudes des deux continents. Modestes par le plumage, par le son de leur voix et par la douceur de leurs habitudes. Volent mal et descendent assez souvent à terre. Nichent dans des trous d'arbres. Insectivores.

274. *Centropus Goliath* Rp. — Coucou Goliath. — Goliath-kukuk.

Iles Batjan et Halmahera.

a. ♂ Halmahera. Don de M. H. Linden, Bruxelles, 1884.

275. *Centropus phasianus* (Lath.). — Coucou faisan. — Fasan-kukuk.

Australie.

a. ♂ Queensland (Austr.). Don de M. Aug. Hemes, Grosbous, 1910.

Sous-Famille. **Phœnicophainæ.**

Corps élancé; bec généralement plus long que la tête, très solide, recourbé dès la base, très comprimé sur les côtés; tour des yeux nu; tarses moyens, pas plus long que le doigt externe antérieur, ongles aigus; queue longue et étagée. Plumage soyeux.

Habitent les forêts des contrées chaudes des deux continents. Très défiants et solitaires. Se nourrissent d'insectes auxquels quelques espèces ajoutent des petits mammifères et des petits lézards. Nichent sur les arbres.

276. *Piaya minuta et rutilus* Vieill. — Piaya minuscule. — Kleiner Buschkukuk.

De Panama et Guyane au 16° l. S.

a. ♂ Guyane. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

b. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

277. *Rhamphococcyx curvirostris* (Shaw. et Nod.). — Rhamphococcyx à bec recourbé.

Java.

a. ♂ Java. Don de M. Hubert Linden. Bruxelles, 1884.

Sous-Famille. **Neomorphinæ.**

Bec plus long que la tête, solide, comprimé latéralement, droit, recourbé brusquement vers la pointe; tarses solides, plus longs que le doigt externe antérieur; queue longue et étagée; tête avec ou sans aigrette.

Habitent les contrées chaudes des deux continents. Se tiennent dans les endroits secs couverts de broussailles. Courent avec rapidité et portent la queue relevée. Perchent rarement. Se nourrissent d'insectes et de mollusques. Nichent sur les arbres.

278. *Neomorphus Geoffroyi* (Tem.). — Néomorphe de Geoffroy.

Brésil.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Sous-Famille. **Crotophaginæ.**

Bec très élevé, très comprimé formant une carène arquée très mince qui se prolonge entre les plumes du front; tarses élevés; largement écussonnés; doigts minces à ongles faibles; queue étagée.

Habitent l'Amérique équatoriale où on les rencontre dans les cantons chauds et humides par troupes de quinze à vingt. Se tiennent dans les lieux découverts, sur les buissons des savanes et les lisières des forêts sans y pénétrer et sans y chercher les grands arbres. Se nourrissent de maïs, de riz, de fruits et surtout d'insectes ; s'abattent même souvent sur le dos des bœufs, qu'ils débarrassent des larves d'insectes parasites logées sous leur peau. Nichent dans les buissons. Un seul et même nid reçoit toutes les couveuses de la troupe ; il est proportionné au nombre d'œufs et offre quelquefois plus d'un mètre de circonférence.

279. *Crotophaga major* Lin. — Ani des palétuviers. — Grosser Ani.

Amérique méridionale jusqu'à la Plata.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

280. *Crotophaga ani* Lin. — Ani des savanes. — Kleiner Ani.

Amérique centrale et méridionale.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Famille. **Trogonidae.**

Bec court, gros voûté, convexe, plus large que haut, courbé à la pointe, dentelé sur les bords et garni de longs poils à la base ; queue longue et étagée ; tarses courts, grêles, presque entièrement emplumés ; deux doigts disposés en arrière et deux en avant, l'externe antérieur plus long que l'interne. Plumage doux et soyeux, orné de couleurs les plus brillantes.

Appartiennent à la zone intertropicale de l'ancien et du nouveau continent. Très solitaires et très silencieux. Vivent dans les endroits les plus retirés des forêts où ils se tiennent sur les branches à moyenne hauteur. Ne sortent que le matin et le soir, pour faire la chasse aux insectes et aux chenilles, qui font leur nourriture presque exclusive. Ne volent pas loin, d'un arbre à l'autre seulement. Font entendre à l'époque des amours un cri grave et monotone, qui exprime chez la plupart des espèces, les syllabes *cou-rou-couou*, auquel ils doivent leur nom vulgaire *Couroucou*. Pondent deux fois par an, dans une cavité que le mâle creuse dans un tronc d'arbre pourri.

281. *Pharomacrus pavoninus* (Spix). — Pharomacre paon.

Haut-Amazone, Rio-Négro.

e. ♂ Brésil. Don de Mlle M. Saur, Luxembourg. 1903.

282. *Trogon atricollis* Vieill. — Couroucou à collier noir. — Halsband-Suruku.

Amérique méridionale jusqu'au 30° lat. S.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.
b. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

283. *Trogon viridis et strigilatus* Lin. — Couroucou verdin. — Grüner Suruku.

Amérique méridionale jusqu'au 25° l. S.
a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

Famille. **Musophagidae.**

Bec plus court que la tête, fort, large, comprimé, denteló sur les bords ; doigt externe versatile, soudé à celui du milieu par un petit repli membraneux ; queue arrondie, très développée, étagée.

Oiseaux d'Afrique. Peu farouches, confiants, curieux, vifs, agiles. Vol lourd, bruyant, peu soutenu. Sautent de branche en branche sans déployer les ailes. Se suspendent parfois verticalement à la manière des pics le long des arbres. Vivent presque exclusivement de fruits, notamment de dattes et de bananes, auxquelles quelques espèces joignent des mollusques terrestres et fluviatiles. Nichent dans les trous des arbres. Monogames. Chair très délicate.

284. *Turacus persa* (Lin.). — Touraco loury.

De Sénégambie au Congo.
a. ♂ Rodésia (Afr. S.). Acquisition du Musée.

285. *Corythaeola cristata et gigantea* (Vieill.). — Corythéole huppé. — Großer Helmvogel.

Afrique W. et centrale, de Sénégambie au Congo, Niam-Niam.
a. ♂ Kondué (Congo-Belge). Don de M. Ed. Luja, Luxembourg 1907.

286. *Schizohris concolor* (Smith). — Schizohris concolore. — Einfarbhelmvogel.

Afrique S. du 10° l. S. au Cap.
a. ♂ Vallée du Haut-Notuang (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

Famille. **Colliidae.**

Corps très élancé ; tête orné d'une huppe ; bec court, gros, fort, fléchi dès la base, un peu comprimé à la pointe, arqué, voûté ; le bord de la mandibule supérieure couvre celui de l'inférieure ; pieds médiocres ; tarses fortement écussonnés ; ongles très arqués. Plumage soyeux.

Vivent en compagnie dans les contrées boisées de l'Afrique. Grimpent le long des branches, la tête en bas. Voix triste et monotone. Se nourrissent de fruits et de bourgeons. Nichent en commun, sur un même buisson. Dorment ensemble, la tête en bas, et pressés les uns contre les autres. Chair délicate.

287. *Colius capensis et erythropus* Gm. — Coliou du Cap. — Cap-Mäusevogel.

Afrique S.

a. ♂ Letze Giftfarm (Afr. S.). Don de M. E. Holub, Vienne 1894.

288. *Colius erythromelon* Vieill. — Coliou du Sénégal. — Senegal-Mäusevogel.

Afrique S. à partir du Zambèze et de l'Angola.

a. ♂ Forêts des lacs salifères Ma-Karri-Karri (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne 1894.

289. *Colius leucotis* Rüpp. — Coliou à joues blanches. — Weißwangiger Mäusevogel.

Var. *affinis* Sharp.

a. ♂ Abyssinie. Don de M. Oscar Thilges, Dudelange, 1912.

IV. Tribu. **Piciformes.**

Bec droit, conique ou pyramidale ; langue longue, très extensible ; deux doigts dirigés en avant et deux ou un seul en arrière, les doigts antérieurs unis à leur base.

Cosmopolites. Grimpeurs émérites, au moyen de leurs ongles crochus et en s'appuyant sur leur queue rigide. Passent leur existance attachés aux troncs des vieux arbres, qu'ils creusent de leur bec en pioche, qui fonctionne comme une cognée. Happent de leur langue rétractile engluée les insectes qui en sortent. Ne viennent que rarement à terre pour y chercher nourriture. Courageux. Très utiles.

Famille. **Picidae.**

Caractères de la tribu.

Sous-Famille. **Picinae.**

Bec droit aussi haut que large, robuste en forme de coin ; langue très mobile, armée d'aiguillons courbés en arrière, et cornée vers le bout ; tarses forts, pourvus de quatre doigts, dont le postérieur externe est plus long que l'antérieur correspondant ; ongles aplatis, aigus ; ailes obtuses ; queue composée de pennes à tiges raides et élastiques.

Cosmopolites, inquiets, farouches, solitaires. Se tiennent dans les bois. Marchent difficilement à terre et volent par saccades. Possèdent au plus haut degré la faculté de grimper. Parcourent les troncs au moyen de petits sauts brusques et saccadés, en s'accrochant par les ongles aux aspérités et en appliquant contre le tronc l'extrémité de leur queue. Se nourrissent principalement d'insectes, qui vivent entre le bois et l'écorce des arbres ; ils s'en emparent, soit en frappant avec leur bec sur le tronc, et produisant une secousse qui fait sortir l'insecte de son trou, soit en enfonçant rapidement leur langue gluante dans les fentes de l'écorce ; quelques espèces y ajoutent des fruits.

Nichent dans les cavités naturelles qu'ils rencontrent au soin des vieux arbres, et, quand cette cavité est recouverte par l'écorce ou une portion de bois sain, ils attaquent le tronc par leur bec vigoureux et l'entaillent à coups redoublés, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la partie cariée.

290. *Chloronerpes flavigula* (Bodd.). — Chloronerpe à gorge jaune.

Guyane et Amazone jusqu'au Pérou N.-E.

a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

291. *Chrysoptilus icteromelas* (Vieill.). — Chrysoptile ictéromèle.

Matto-Grosso (Brésil).

a. ♂ Matto-Grosso (Brésil). Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

292. *Melanerpes flavifrons* (Vieill.). — Mélanerpe à front jaune.

Brésil S., Paraguay, Argentine N.

a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

293. *Centurus carolinus* (Lin.).

Amérique N.-E. du Texas au Canada.

a. ♀ Texas. Acquisition du Musée.

294. *Picus leuconotus* Bechst. — Pic leuconote. — Weißspecht.

Europe centrale jusqu'au 66° l. N., Sibérie S., Corée.

a. ♂ Suède, Europe. Acquisition du Musée.

295. *Tridactylia tridactylus* Lin. — Pic tridactyle. — Dreizehspecht.

Europe, Sibérie méridionale, Amour, Mongolie.

a. ♂ Sibérie. Acquisition du Musée.

296. *Dendropicus cardinalis* (Gm.). — Dendropic cardinal.

Afrique méridionale de l'Angola et du Zambèze au Cap.

a. ♂ Vallée du Lorenzriver (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

b. ♀ Vallée du Lorenzriver (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1874.

297. *Dendropicus namaquus* (Licht). — Dendropic moucheté.

Afrique centrale et méridionale, de la colonie du Cap au 8° l. S.

a. ♂ Vallée du Lochuma (Afr. S.). Don de M. Emile Holub, Vienne, 1894.

298. *Eleopicus spilogaster* (Wagl.).

Brésil méridional, Uruguay, Argentine.

a. ♀ Argentine. Acquisition du Musée.

299. *Eleopicus maculifrons* Spix. — Eléopic à front maculé.
Bahia (Brésil).
a. ♀ Bahia (Brésil). Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

300. *Celeus flavescens* (Gm.).
Brésil E. et S. jusqu'à Bahia.
a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

301. *Campophilus robustus* (Licht.).
Brésil S. et E, Paraguay, Argentine.
a. ♂ Argentine. Acquisition du Musée.

302. *Geophlœus lineatus* (Lin.).
Amérique méridionale du 10° l. N. au 20° S.
a. ♂ Brésil. Acquisition du Musée.
b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
c. ♂ Brésil. Acquisition du Musée.

303. *Dryocopus martius* (Lin.). — Dryocope noir. — Schwarzspecht.
Région paléarctique du 38° au 60° latitude N.
a. ♂ Forêt noire. Acquisition du Musée.
b. ♀ Forêt noire. Acquisition du Musée.

Sous-Famille. **Picumininæ.**

Bec court, droit, conique, pointu sans arête; tour des yeux nu; queue très courte, arrondie, à pennes non usées; tarses écailleux, pourvus de trois doigts seulement, dont deux antérieurs et un postérieur.

Habitent les forêts de la zone intertropicale des deux mondes. Grimpent le long des petites tiges dans les forts buissons. Sautent d'une branche à l'autre en les saisissant fortement avec les doigts et en tenant le corps à travers. Ne s'aident pas de leur queue pour grimper. Nichent dans des trous qu'ils creusent avec le bec dans la partie cariée des vieux arbres.

304. *Picumnus Temmincki* Lafr. — Picumne de Temminck.
Brésil S. Paraguay, Argentine N.
a. ♂ Argentine N. Acquisition du Musée.
b. ♀ Argentine N. Acquisition du Musée.

305. *Picumnus minutus* (Lin.). — Picumne minuscule. — Zwergspecht.
Brésil jusqu'au Pérou.
a. ♂ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.
b. ♀ Brésil. Don de M. Jules Saur, Rio de Janeiro, 1879.

(A suivre).