Als neue Mitglieder wurden vorgeschlagen die HH.: Fr. Theisen, Oberlehrer in Mersch, Ern. Demuth, Apotheker in Düdelingen, Eugen Bisdorff, Minenaufseher in Diekirch.

Der Naturschutz in unserem Lande bildete dann während längerer Zeit das Thema lebhafter Auseinandersetzungen. Energische Worte fielen, daß dem Vandalismus, der in letzter Zeit sich unheimlich mehrt und sports- wie geschäftsmäßig betrieben wird, von in- und ausländischen Naturräubern, doch endlich energisch entgegengearbeitet werden soll durch gesetzliche und erzieherische Maßregeln. Schließlich wird der Antrag Ludovicy (Fels) einstimmig angenommen, gemäß dem eine Resolution an Kammer und Regierung zu richten sei, es mögen die gesetzgebenden Körperschaften ohne Verzug alle gesetzlichen und erzieherischen Maßnahmen treffen, damit diesem Unfug gesteuert werde, im Interesse des Schutzes unserer herrlichen Fauna und Flora.

Darauf erhielten die Herren Vortragenden das Wort. Hr. Faber sprach über „Pflanzengrün", Hr. E. J. Klein über „Der Frost und die Pflanzen", und Hr. Ph. Baden über „die Naturwissenschaft und die moderne Kriminalistik". Den Vorträgen, die nächstens im Vereinsorgan erscheinen werden, wurde sehr viel Interesse entgegengebracht, und der lebhafteste Beifall ward den einzelnen Herren zuteil.

Nach Absingen des Vereinsliedes wurde die Sitzung geschlossen.

Der Schriftführer: Prof. F. Heimbertz.

---

# Lampyrides nouveaux du Musée de Luxembourg

décrits par **Ernest OLIVIER.**

*Pyrocœlia Ferranti.* nov. sp.

Oblongo-ovalis, nigra; antennis fuscis, ultimo articulo apice testaceo, ultimo palporum articulo testaceo; prothorace testaceo, rotundato, crebre punctato, plaga discoïdali fere lævi, longitudinaliter carinato, margine antico erecto, basi vix sinuato, angulis obtusis; scutello triangulari, punctato, testaceo; elytris prothorace latioribus, dein ampliatis, ad apicem simul rotundatis, tenuiter, crebre punctatis, nigris, margine externo tenuissime flavo limbato; pectore, femoribus et quatuor ultimis ventris segmentis testaceis; abdomine supra fusco, segmentis flavido marginatis et pygidio omnino flavido. — Long. 11—13 millim.

Sumatra: Palembang.

Voisin de *P. tonkinensis* Ern. Oliv., dont il est surtout différent par sa forme plus ovalaire, ses élytres à suture noire

n'ayant de couleur testacée que l'extrême bord marginal, ses segments du dessus de l'abdomen bruns, bordés de jaunâtre, etc.

Je suis heureux de dédier cette espèce à Mr. Errant, conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Luxembourg qui a bien voulu me communiquer les Lampyrides de ses collections.

*Luciola Stanleyi*, nov. sp.

Oblonga, fulvo testacea, pubescens; palpis et ore piceis; antennis et capite nigris; prothorace fulvo testaceo, transverso, convexo, antice attenuato et rotundato, basi sinuato, angulis fere rectis, subtiliter punctulato, in medio longitudinaliter sulcato; scutello triangulari, fulvo; elytris oblongis, prothorace vix latioribus, apicem versus simul rotundatis, crebre et profunde punctatis, quadricostatis, costa tertia breviore, fulvo testaceis, macula parva juxtascutellari et altera magna apicali nigris, sutura et margine non opertis; quatuor primis ventris segmentis nigris, lateraliter testaceo tenue marginatis, quinto cereo, nitido, sexto nigro, basi cereo, postice emarginato, ultimo obconico nigro apice inciso; femorum dimidia parte apicali, tibiis, tarsisque nigris. — Long. 13,5 millim.

Congo belge: Stanley falls, une seule ♀.

D'un testacé fauve, à l'exception des antennes, de la tête, de deux taches sur chaque élytre, des premiers segments du ventre, des tibias, des tarses et de la moitié apicale des fémurs qui sont noirs. Les élytres sont chargés de 4 côtes, la 1re se joignant à la 4me près du sommet, la 3me qui est la plus courte, jointe à la 2me. En outre, ils ont chacun: 1° une tache noire juxtascutellaire, courte, triangulaire, occupant à sa base la moitié de leur largeur; 2° une grande tache noire apicale remontant jusqu'au tiers de leur longueur et occupant toute leur largeur en laissant cependant la suture et la marge étroitement fauves.

---

# Das Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
## als Forstschädling.

Das zierliche, muntere und bewegliche Eichhörnchen ist nicht so harmlos wie es aussieht, denn es ist der vielseitigste Schädling des Waldes. Kaum ein Baumteil ist vor seinen Angriffen sicher. Es zerstört die männliche Blüte (Kätzchen) der Eiche häufig in großer Menge. Es bricht die Schuppen der Nadelholzzapfen ab und frißt den Samen. Es vertilgt