bung von subsp. *atrospinosa* bei den beiden unter 1 und 2 aufgeführten *Megacephala*-Formen *(regalis* und subsp. *angulicollis)* die Fundorte Kafakumba gestrichen werden, da es sich bei beiden Zitaten um die neue Rasse handelt, wie sich bei einer Prüfung herausstellte. Da auch die Möglichkeit besteht, dass das als *regalis* Boh. zitierte Exemplar von «Katanga X» ein Exemplar von *atrospinosa* gewesen ist, ist damit zu rechnen, dass die Prioritätsform *regalis* Boh. überhaupt nicht in Katanga vorkommt. Auf jeden Fall wäre erst ein erneuter exakter Nachweis notwendig.

2) *Myrmecoptera nigroplagiata* **dilacerata** m. (nov. subsp.). Differt a forma typica fascia albescente longitudinali elytrorum pone medium late interrupta: parte anteriore magis tenui magisque a margine remota, parte posteriore margini ut in typo approximata sed a spina suturali longius distante; ♂ dimidia parte antica labri albescente, basali nigricante. — Long. 10—12½ mm (sine labro).

♂ ♀; S-W-Katanga (Sandoa am Oberen Lulua) X. 1930 und 10. XI. 1920 von G. F. Overlaet gesammelt.

Die Kombination zweier heterogener Charaktere ist für die Rasse charakteristisch: 1) die in zwei Teile zerrissene etc. Flügeldeckenbinde, 2) die halb weiss gefärbte Oberlippe beim ♂. Die Prioritätsform des ♂ hat eine ganz schwarze Oberlippe, welche höchstens 2 bräunliche Flecke nahe den vorderen Aussenecken zeigt, die sich manchmal allmählich verschwindend bis zur Basis der Oberlippe verlängern. Die Stammform hat im allgemeinen die Taster etwas heller, die Rasse *dilacerata* dieselben etwas dunkler gefärbt. Besonders prägt sich dies in der Färbung des vorletzten Gliedes der Lippentaster aus, welches bei der Prioritätsform meist hellgelb, bei der Rasse *dilacerata* oft mehr oder weniger schwärzlich gefärbt ist.

Deux Cosmiomorpha nouveaux de Formose.

(Col. Scarabaeidae, Cetonidae)

par **A. Bourgoin,** Moulignon par Pouthierry (France).

1) **Cosmiomorpha Sauteri** n. sp. — ♀. Je n'ai pas vu le type de *C. similis* décrit par Fairmaire comme provenant de Formose (Ann. Soc. ent. Fr. [1899] p. 621), aussi je me contente ici de suivre, point par point, la description publiée par cet auteur.

Long. totale: 21 mm.; du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres: 18,6 mm.; largeur aux épaules 10,2 mm.

Kosempo (Formosa), H. Sauter, V. 1912. Une femelle. Couleur marron, luisante, étroitement noire sur les bords. Forme un

peu plus allongée que celle de *C. modesta* Saund., sans soies rousses visibles (individu frotté??), très luisant, surtout sur le pronotum; la tête est ponctuée comme celle de *C. modesta,* nullement rétrécie en avant, les côtés du clypéus exactement rectilignes, les bords plus élevés que sur *modesta* ♀, la partie antérieure sur le même plan que la postérieure, mais à rebord tranchant, sinué en son milieu, plus élevé que celui du mâle de *C. modesta,* et à angles moins arrondis; vertex ayant un espace médian lisse, caréniforme, assez large; pronotum à peu près semblable à celui de *modesta,* à angles postérieurs à la fois saillants et plus arrondis, sa ponctuation à peu près semblable, mais parcouru en son milieu par une ligne longitudinale lisse; écusson un peu moins large, modérément ponctue, moins densément que sur *modesta;* les élytres de la femelle sont atténués en arrière comme ceux du mâle de *C. modesta;* le pygidium ♀ des deux espèces est à peu près semblable, mais la faible dépression latérale et la carène obtuse sont mieux marquées sur *C. Sauteri;* les poils très pâles, peu serrés, très courts, ne sont guère visibles qu'avec un fort grossissement. Dessous concolore, rembruni sur les côtés du sternum et des pattes, à pubescence molle, flave, couchée, modérément dense; tibias antérieurs tridentés, leurs tarses à premier article simple; mais il n'est élargi au sommet que chez les mâles de *modesta,* ainsi du reste que les tibias portant un fort appendice à leur extrémité interne. Par les caractères ci-dessus indiqués, cette espèce diffère de *C. similis* Fairm.; elle n'est pas couverte de la pubescence squamiforme serrée qui se trouve sur *C. modesta* Saund. et espèces affines.

2) **Cosmiomorpha Horni** n. sp. ♀. Long. totale 19 mm.; Long. du bord antér. du pronot. à l'extr. des élytres 17,5 mm.; Largeur max. 10,5 mm. Kosempo (Formosa) H. Sauter, V. 1912.

Tout noir, presque mat en dessus, peu brillant en dessous. Faciès très distinct; ne ressemble à aucune autre espèce du genre *Cosmiomorpha.*

Tête à peu près également et très densément couverte de gros points arrondis, profonds; sans aucune carène ou partie lisse. Clypéus à côtés imperceptiblement excurvés, à rebord antérieur très peu élevé, à angles arrondis; pronotum mat, transversal, très ponctué, bien moins finement que celui des femelles des autres espèces, à peu près deux fois aussi large à sa base que long, très arrondi sur ses côtés, ses angles postérieurs plus obtus que ceux de *C. Sauteri;* écusson peu ponctué, lisse au sommet; élytres ayant chacun deux grosses côtes bien marquées, à ponctuation dense et grosse dans les intervalles, plus fine sur les bords. Pygidium densément et sinueusement striolé en travers. Saillie mésosternale plus courte que celle de *C. Sauteri.*