

QUELQUES GROUPES INFRA-SPÉCIFIQUES LUXEMBOURGEOIS DE *FUMARIA OFFICINALIS* L.

PAR

FR. LÉON LIEFORT

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES NATURALISTES LUXEMBOURGEOIS

<i>Fumaria officinalis</i> L.	{	<i>Ssp. officinalis</i> (L.) [inclus. <i>forma media</i> (Lois.)] <i>Ssp. tenuiflora</i> (Fries) Neuman
-------------------------------	---	---

Remarques.

1. — La sous-espèce *officinalis* (L.) est très commune dans les champs, les cultures, les vignes, les jardins, les lieux incultes, etc. Elle est extrêmement polymorphe et reste à étudier au sujet des variétés existant au Luxembourg.

2. — Il y a lieu de rattacher, croyons-nous, sous le nom de *forma media* (Lois.), à la sous-espèce *officinalis* (L.) le *Fumaria media* Lois. De cette forme, l'herbier TINANT (Musée d'Histoire naturelle de Luxembourg) contient un spécimen correspondant au No 1039 de la Flore Luxembourgeoise de 1836 : la plante est plus rameuse que le type de la sous-espèce, aux tiges plus longues, plus grêles, paraissant grimpantes, munies de feuilles à segments ordinairement plus larges et ⁺ en forme de vrilles, aux fleurs relativement petites, disposées en grappes plus lâches.

Le *Fumaria officinalis* L. *Ssp. officinalis* (L.) *forma media* (Lois.) est cité dans la littérature botanique luxembourgeoise :

- a) par TINANT (Flore Luxembourgeoise, 1836, p. 355) sous les noms de *Fumaria media* DC. = *Fumaria capreolata* Smith ;

- b) par KOLTZ (Prodrome de la Flore du Grand-Duché de Luxembourg, 1873, p. 30) sous le nom de *Fumaria capreolata* L. ;
- c) par KROMBACH (Flore du Grand-Duché de Luxembourg, 1875, p. 81) sous les noms de *Fumaria media* Lois. = *Fumaria capreolata* Thuill., non L. ;
- d) par KLEIN (Flora der Heimat, 1897, p. 203) sous le nom de *Fumaria media* Lois..

3. — Nous n'avons pu examiner la plante que COURTOIS (*Verslag van een plant- en landbouwkundig reisje, gedaan in juli 1826, langs de oevers der Maas, van Luik naar Dinant, in het groothertogdom Luxemburg*, Amsterdam, 1827) appelle *Fumaria capreolata* et qu'il dit avoir recueillie, en 1826, au Mont-Saint-Jean, près de Dudelange. Il y a lieu de penser qu'il s'agit également du *Fumaria officinalis* L. *Ssp. officinalis* (L.) *f. media* (Lois.). Le véritable *Fumaria capreolata* L. n'aurait, dans ces conditions, pas été observé jusqu'ici au Luxembourg.

4. — La sous-espèce *tenuiflora* (Fries) Neuman (Syn. : *Fumaria Wirtgeni* Koch) a été signalée par ASCHMAN dans la région mosellane luxembourgeoise et par ROSBACH aux environs de la ville de Luxembourg ; elle a été observée également, en 1873, aux alentours d'Esch s. Alzette (cf. KOLTZ, Plantes phanérogames découvertes dans le Grand-Duché depuis la publication de la Flore Luxembourgeoise de Tinant, in : Rec. Mém. et Trav. Soc. Bot. Lux., I, 1874, p. 16).