L'ANNÉE LÉPIDOPTÉROLOGIQUE 1958 AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

PAR

CAMILLE WAGNER-ROLLINGER

Dans le but de simplifier les choses, nous avons décidé de supprimer dorénavant dans notre étude l'introduction « saisonnière » (qui faisait en somme double emploi avec la liste détaillée des Lépidoptères observés qui suivait), ainsi que les tableaux météorologiques en annexe.

Nous nous bornerons donc à donner simplement la liste des papillons observés pendant l'année en question, suivant en cela le système adopté par nos collègues botanistes.

ABRÉVIATIONS

RPDB.	=	Révérend Père dom Benoit (Clervaux)
MB.	=	Michel Benoit
CO.	=	Francis Conrot
ETR.	=	Marcel Etringer
MH.	=	Marcel Heuertz
KU.	=	Alfred Kuntgen
MA.	=	J.-P. Mamer
LR.	=	Léopold Reichling
WA.	=	Camille Wagner-Rollinger
WE.	=	Raymond Weiller

RHOPALOCERA (DIURNA)

I. *PAPILIONIDAE*

1 *Papilio machaon* L. ssp. *gorganus* FRÜHST. — N'a pas été observé au printemps (1re génération); en été (2e génération), signalé seulement des environs de Luxembourg: Route d'Arlon (27. 7. CO.), Gasperich-Zwickau (juillet, LR.).

2 *Iphiclides (Papilio) podalirius* L. — Aucune observation n'a été faite en ce qui concerne l'imago; la chenille a été trouvée à Clervaux (RPDB).

II. *PIERIDAE*

3 *Aporia crataegi* L. — Dans l'Oesling: assez commun à Kautenbach (15. 6. WA.), quelques exemplaires à Dirbach (9. 7. WA.), signalé aussi de Clervaux (RPDB.); dans le Bon Pays, rare comme d'habitude: 2 ♂♂ dans les prés sylvatiques du Bois de Leudelange (9. 7. CO.).

4 *Pieris brassicae* L. — Assez commun partout, du 4. 5. au 2. 9.

5 *Pieris rapae* L. — Commun partout, du 20. 4. au 26. 9.

6 *Pieris napi* L. — Commun partout, du 20. 4. au 26. 9.

7 *Anthocharis (Euchloë) cardamines* L. — Pas rare dans les différentes parties du pays et dans les environs immédiats de Luxembourg, du 30. 4 au 17. 6.

8 *Gonepteryx rhamni* L. — Assez commun partout, surtout en mai et en août; à noter les dates extrêmes: 15. 2. à Lintgen (WE.) et 24. 10. au Limpertsberg (WA.).

9 *Colias hyale* L. — Au printemps (1re génération), rare: Gypsmühle-Walferdange (14. 5. WA.); en été (2e génération), assez commun à Gypsmühle (18. 8. et 28. 8. WA.), dans le Bassin Minier (août et septembre, ETR.) et à Clervaux (RPDB.); en automne (3e génération), observé sur le Plateau du Rham (23. 10. ETR.).

Idem pour *australis ssp. calida* VRTY.

10 *Colias croceus* FOURCR. *(edusa* F.). — La 1re génération (mai, juin) n'a pas été observée dans le pays; la 2e génération était assez commune: Gypsmühle (24. 7., 18. 8. et 28. 8. WA.), Gasperich-Zwickau (fin juillet, LR.), Junglinster (début août, WA.), Clervaux (RPDB.); la 3e génération était rare: 1 exemplaire dans le Parc de Luxembourg (7. 10. WA.).

11 *Leptidea sinapis L.* — N'a pas été signalé, mais était certainement présent.

III. *LYCAENIDAE*

Groupe Theclini

12 *Thecla (Zephyrus) quercus* L. — Très rare: 1 exemplaire dans le Bois de Leudelange (19. 7. WA.).

Remarque: Thecla (Zephyrus) betulae L. n'a pas été signalé.

13 *Callophrys rubi* L. — Peu commun: Gypsmühle (4. 5. et 6. 7. WA.), Clervaux (RPDB.).

Groupe Heodinae

14 *Heodes (Chrysophanus) virgaureae* L. — Assez commun à commun dans l'Oesling: Dirbach-Ringel (26. 7. WA. et fin juillet, J. Mollet), Clervaux (RPDB.).

15 *Heodes (Chrysophanus) tityrus* PODA *(dorilis* HUFN.). — Rare, observé seulement sur le Kirchberg (22. 5. WA.).

16 *Lycaena (Heodes, Chrysophanus) phlaeas* L. — Toujours rare: Dirbach (26. 7. WA.), Clervaux (RPDB.).

17 *Palaeochrysophanus (Heodes, Chrysophanus) hippothoë* L. — Signalé de Kayl (29. 6. ETR.) et de Clervaux (RPDB.).

Groupe Plebeinae (Lycaenini)

18 *Cupido (Lycaena, Zizera) minimus* FUESSL. — Répandu dans les environs de Luxembourg: Kirchberg (22. 5. et 4. 7. WA.), Limpertsberg (22. 6. WA.), Gypsmühle (6. 7. WA.).

19 *Celastrina (Cyaniris, Lycaenopsis) argiolus* L. — Observé une seule fois: Limpertsberg (27. 8. WA.).

20 *Glaucopsyche (Lycaena) alexis* PODA *(cyllarus* ROTT.) — Plus rare que les années précédentes; observé seulement à Gypsmühle (6. 7. WA.).

21 *Maculinea (Lycaena) arion* L. — Toujours en nombre à Gypsmühle (6. 7., 18. 7. et 24. 7. WA. ainsi que fin juillet, J. Mollet).

22 *Lycaeides (Lycaena) idas* L. *(argyrognomon* auct.) — Peu répandu: Limpertsberg - Bois de la Faïencerie (20. 5. WA.).

23 *Plebejus (Lycaena) argus* L. ssp. *aegon* SCHIFF. — Peu fréquent, signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

24 *Aricia (Lycaena) agestis* SCHIFF. *(astrarche* BGSTR.) — Généralement rare dans le pays; rencontré 1 exemplaire à Gypsmühle (18. 8. WA.).

25 *Cyaniris (Lycaena) semiargus* ROTT. — Rare, 1 exemplaire à Gypsmühle (6. 7. WA.).

26 *Polyommatus (Lycaena) icarus* ROTT. — Assez commun dans le Bon Pays, surtout en août.

27 *Lysandra (Lycaena) bellargus* ROTT. — Toujours rare, signalé seulement de Kayl, Mesobrometum sur Dogger (28. 8. ETR.).

28 *Lysandra (Lycaena) coridon* PODA — Assez commun à Gypsmühle (24. 7., 18. 8. et 28. 8. WA.), commun dans le Bassin Minier (juillet, août, ETR.).

Remarque: à noter la rareté des Plebeinae dans l'Oesling!

IV. *NYMPHALIDAE*

Sous-famille Nymphalinae

29 *Apatura iris* L. — Comme d'habitude, assez commun dans l'Oesling, à Dirbach (13. 7. et 26. 7. WA., 25. 7. Félix Margue, 19. 7. — 1 ♀ ! — et 31. 7. CO.) et à Clervaux (RPDB.); signalé dans le Bon Pays du Bois de Leudelange (début juillet, J. Mollet) et de la Vallée de la Mamer (29. 7. et 30. 7. CO.).

30 *Apatura ilia* DENIS et SCHIFF. — Moins rare que les autres années, à Dirbach (19. 7. et 31. 7. CO.).

31 *Apatura ilia* DENIS et SCHIFF. ssp. *clytie* SCHIFF. — Assez commun à Dirbach (13. 7. WA. et CO., 25. 7. Félix Margue, 19. 7. et 31. 7. CO.) ainsi que dans le Bois de Leudelange (9. 7., 10. 7. et 16. 7. CO.).

32 *Limenitis camilla* L. *(sibilla* L.) — Pas bien fréquent: Bois de Leudelange (9. 7. et 16. 7. CO., 19. 7. WA.), Kayl (22. 7. ETR.).

33 *Limenitis populi* L. — Toujours très rare dans le pays: 1 ♀ dans le Bois de Leudelange (10. 7. CO.), 1 exemplaire observé à Gypsmühle, à l'entrée du bois (juillet, J. Mollet).

34 *Vanessa (Pyrameis) atalanta* L. — Peu commun au printemps; en été, très répandu dans les différentes régions du pays, notamment dans les environs de Luxembourg (jusqu'à la mi-octobre).

35 *Vanessa (Pyrameis) cardui* L. — Très commun dans le Bon Pays (7. 6. — 15. 9.) et particulièrement dans le Bassin Minier (ETR.), rare dans l'Oesling. Migrations massives observées partout en Europe!

36 *Aglais (Vanessa) urticae* L. — Commun partout (30. 3. — 26. 9.).

37 *Inachis (Nymphalis, Vanessa) io* L. —Assez répandu, sans être commun toutefois (mi-février à fin août).

38 *Nymphalis (Vanessa) polychloros* L. — Plutôt rare et signalé seulement au printemps (= exemplaires hibernants): Bridel (1. 5. WA.), Limpertsberg (20. 5. WA.), Dudelange Mont-St-Jean (1. 5. ETR.), Clervaux (RPDB.).

39 *Nymphalis (Vanessa) antiopa* L. — Toujours rare dans le pays: hauteurs de Dommeldange (16. 7. CO.), Vallée de la Mamer (29. 7. CO.), Clervaux (printemps et été RPDB.).

40 *Polygonia c-album* L. — Peu fréquent: Limpertsberg (20. 5. et 15. 9. WA.), Dirbach (26. 7. WA.), Hollerich (KU), Kayl (28. 7. ETR.), Clervaux (RPDB.).

41 *Araschnia levana* L. (gen. vern.) et *prorsa* L. (gen. aest.) — Rare en général: levana au printemps à Clervaux (RPDB.), prorsa à Leudelange-Abweiler (10. 8. ETR.).

42 *Euphydryas (Melitaea) aurinia* ROTT. — Assez commun à Gypsmühle (14. 6. WA.).

43 *Melitaea diamina* LANG *(dictynna* ESP.) — Clairsemé: Dirbach (9. 7. et 13. 7. WA.).

44 *Melitaea athalia* ROTT. — Assez répandu: Kautenbach (15. 6. WA.), Dirbach (9. 7. et 13. 7. WA.), Clervaux (RPDB.), Steinsel, pelouse sur Keuper (juillet ETR.).

45 *Melitaea parthenie* BKH. *(aurelia* NICK.) — Pas rare: Gypsmühle (6. 7. WA.).

Remarque: Melitaea cinxia L. et *phoebe* SCHIFF. n'ont pas été signalés.

46 *Mesoacidalia* (Argynnis) *charlotta* HAW. *(aglaja* L.) — Assez commun à Gypsmühle (6. 7., 18. 7. et 24. 7. WA.), Kleinbettingen (1. 7. WA.), Dirbach (26. 7. WA.).

47 *Fabriciana* (Argynnis) *niobe* L. *(adippe* L.) — Signalé seulement de l'Oesling: Dirbach (9. 7., 13. 7. et 26. 7. WA.).

48 *Argynnis (Dryas) paphia* L. — Répandu partout (9. 7. — 18. 8.). La *f. valesina* ♀ ESP., très rare dans le pays, nous a été signalée de la Vallée de la Mamer (30. 7. CO.). A noter 1 ex. du Limpertsberg (mi-août WA.).

49 *Brenthis (Argynnis) ino* ROTT. — Observé seulement dans l'Oesling: Dirbach (9. 7. et 13. 7. WA.).

50 *Clossiana (Argynnis, Brenthis) selene* SCHIFF. — Assez rare: Dirbach (9. 7. et 13. 7. WA.), Bois de Leudelange (19. 7. WA.).

51 *Clossiana (Argynnis, Brenthis) euphrosyne* L. — Rare: Dirbach (9. 7. et 13. 7. WA.).

52 *Issoria (Argynnis) lathonia* L. — Continue à être très rare; signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

Remarque: Clossiana (Argynnis, Brenthis) dia L. ne nous a pas été signalé.

Sous-famille Satyrinae

53 *Erebia medusa* SCHIFF. — Assez commun: Gypsmühle (14. 6. WA.), Kautenbach (15. 6. WA.).

54 *Agapetes (Melanargia) galathea* L. — Très commun dans toutes les régions du pays (29. 6. — 18. 8.) et particulièrement à Gypsmühle (18. 7. et 24. 7. WA.).

55 *Hipparchia (Satyrus) semele* L. — Assez commun à Gypsmühle (18. 7. et 24. 7. WA), Tétange (30. 7. ETR.), Kayl et Rumelange (août ETR.).

56 *Aphantopus hyperanthus* L. — Commun à très commun dans les environs de Luxembourg, à Kayl et dans l'Oesling (9. 7. — 29. 7.).

57 *Pararge aegeria ssp. egerides* STGR. — N'a pas été signalé, mais était certainement présent.

58 *Dira (Pararge) megera* L. — Assez commun dans le Bon Pays (environs de Luxembourg surtout) et dans l'Oesling (14. 6. — 28. 8.).

59 *Dira (Pararge) maera* L. — Beaucoup moins fréquent que le précédent: Kautenbach (15. 6. WA.), Göbelsmühle (9. 7. WA.), Kayl (19. 8. ETR.), Mühlenbach-Faïencerie (27. 8. WA.).

60 *Maniola (Epinephele) jurtina* L. — Commun partout (22. 6. — 18. 8.).

61 *Pyronia (Epinephele) tithonus* L. — Continue à être rare dans le pays: quelques exemplaires à Kayl (23. 7. et 29. 7. ETR.).

62 *Coenonympha arcania* L. — Assez commun dans le Bon Pays (14. 6. — 6. 7.); moins fréquent que d'habitude dans l'Oesling (15. 6. — 13. 7.).

63 *Coenonympha pamphilus* L. — Commun dans tout le pays (22. 5. — début septembre).

V. *HESPERIIDAE*

64 *Erynnis (Thanaos, Nisoniades) tages* L. — Assez commun: Gypsmühle (4. 5. et 6. 7. WA.), Kirchberg (22. 5. WA.).

65 *Pyrgus (Hesperia) carthami* HB. — Rare: Gypsmühle (14. 6. WA.), Clervaux (RPDB.).

66 *Pyrgus (Hesperia) malvae* L. — Pas rare: Kirchberg (22. 5. WA.), Gypsmühle (14. 6. WA.), Kautenbach (15. 6. WA.).

67 *Adopaea lineola* O. — Moins rare que les autres années: Munsbach (13. 7. ETR.), Kayl (28. 7. ETR.) et Rumelange (20. 8. ETR.).

68 *Adopaea silvester* PODA *(thaumas* HUFN.) — Assez commun: Dirbach (9. 7. et 13. 7. WA.), Kayl et Tétange (juillet et août ETR.).

69 *Ochlodes (Augiades) venata* BREMER & GREY *(sylvanus* ESP.) — Pas rare: Gypsmühle (14. 6. et 6. 7. WA.), Mühlenbach-Faïencerie (22. 6., WA.), Clervaux (RPDB.).

70 *Hesperia (Augiades) comma* L. — Assez commun dans tout le pays (15. 6. — 31. 7.).

Remarque: Carterocephalus (Pamphilus) palaemon PALL. n'a toujours pas été retrouvé dans le pays.

HETEROCERA

VI. *SPHINGIDAE*

71 *Hyloicus (Sphinx) ligustri* L. — Signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

72 *Mimas (Dilina, Smerinthus) tiliae* L. — Chenille trouvée à Mondorf (KU.).

73 *Amorpha (Smerinthus) populi* L. — Signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

74 *Sphinx (Smerinthus) ocellata* L. — Signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

75 *Haemorrhagia (Hemaris) tityus* L. *(scabiosae* Z.) — 1 exemplaire à Gypsmühle (24. 7. = époque très tardive, WA.).

76 *Macroglossum stellatarum* L. — Peu fréquent: Junglinster (mi-juin WA.), Kirchberg (4. 7. WA.), Gypsmühle (6. 7. WA.), Limpertsberg (26. 8., 5. 9. et 12. 9. WA.), Luxembourg (12. 9. WE.), Clervaux (RPDB.).

77 *Pergesa (Chaerocampa) elpenor* L. — Signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

Remarque: Herse (Protoparce) convolvuli L., *Celerio (Deilephila) euphorbiae* L. et *Pergesa (Metopsilus) porcellus* L. n'ont pas été signalés.

VII. *ATTACIDAE (SATURNIIDAE)*

78 *Eudia (Saturnia) pavonia* L. — Signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

79 *Aglia tau* L. — Moins commun dans le Bon Pays que les autres années; dans l'Oesling, a été observé encore en juin à Kautenbach (MA.).

VIII. *LASIOCAMPIDAE*

80 *Eriogaster lanestris* L. — Signalé de Clervaux (RPDB.).

81 *Lasiocampa quercus* L. — Pas rare dans l'Oesling: Dirbach (13. 7. et 26. 7. WA.), Clervaux (RPDB.).

82 *Macrothylacea rubi* L. — Mühlenbach-Faïencerie (20. 5. WA.), Clervaux (RPDB.).

IX. *NOTODONTIDAE (CERURIDAE)*

83 *Stauropus fagi* L. — La fantastique chenille qui ressemble à un scorpion a été trouvée à Hohlay-Aesbach (17. 7. HOUTMAN, Hoorn, Pays-Bas, cit. MH.).

84 *Phalèra bucephala* L. — Rare: Limpertsberg (22. 6. WA.), Clervaux (RPDB.).

X. *LYMANTRIIDAE (LIPARIDAE)*

85 *Orgyia antiqua* L. — Signalé seulement de Clervaux (RPDB.).

Remarque: Dasychira pudibunda L. et *Lymantria dispar* L. n'ont pas été signalés.

XI. *NOCTUIDAE (PHALAENIDAE)*

Sous-famille Noctuinae (Phalaeninae, Agrotinae, Euxoinae)

86 *Noctua (Agrotis) pronuba* L. — Luxembourg (16. 8. ETR.), Limpertsberg (18. 8 et 13. 9. WA.).

87 *Amathes (Agrotis)* c-nigrum L. — Limpertsberg (18. 8., 30. 8. et 31. 8. WA.).

Sous famille Hadeninae (Mamestriinae)

88 *Mamestra (Miselia) contigua* SCHIFF. — Kayl (30. 7. ETR.).

89 *Mythimna (Leucania) albipuncta* SCHIFF. — Gypsmühle (6. 7. WA.).

90 *Mythimna (Leucania) pallens* L. — Dirbach (26. 7. WA.).

Sous-famille Zenobiinae (Amphipyrinae)

91 *Amphipyra pyramidea* L. — Limpertsberg (6. 9. WA.).

92 *Phlogophora (Trigonophora, Brotolomia) meticulosa* L. — Plus rare que les années précédentes: Limpertsberg (29. 8. et 6. 9. WA.).

93 *Cosmia (Calymnia) trapezina* L. — Limpertsberg (17. 8. et 18. 8. WA.).

Sous-famille Jaspidiinae (Erastriinae)

94 *Jaspidia (Erastria) deceptoria* SCOP. — Gypsmühle (14. 6. et 6. 7. WA.), Mühlenbach-Faïencerie (22. 6. WA.).

Sous-famille Plusiinae (Phytometrinae)

95 *Autographa (Plusia) gamma* L. — Commun partout (20. 5. — 14. 9.).

96 *Plusia chrysitis* L. — Limpertsberg (29. 8., 6. 9. et 7. 9. WA.).

Sous-famille Catocalinae

97 *Callistege (Euclidia) mi* CL. — Gypsmühle (14. 6. WA.), Mühlenbach-Faïencerie (22. 6. WA.).

98 *Ectypa (Euclidia) glyphica* L. — Assez commun à commun: Kirchberg (22. 5. WA.), Gypsmühle (14. 6. et 6. 7. WA.), Mühlenbach-Faïencerie (22. 6. WA.).

Sous-famille Othreinae (Ophiderinae)

99 *Scoliopteryx libatrix* L. — Baumbusch-Pavillon de Chasse (14. 9. WA.).

100 *Acontia luctuosa* SCHIFF. — Gypsmühle (14. 6. WA.).

Sous-famille Hypeninae (Polypogoninae)

101 *Hypena proboscidalis* L. — Limpertsberg (6. 9. WA.).

XII. *ARCTIIDAE (LITHOSIIDAE)*

Sous-famille Lithosiinae

102 *Eilema (Ilema) griseola* HB. — Clervaux (RPDB.).

Sous-famille Arctiinae

103 *Callimorpha (Hypocrita) jacobaeae* L. — Assez commun: Mühlenbach-Faïencerie (20. 5. et 22. 6. WA.), Clervaux (RPDB). La chenille était extrêmement commune au Titelberg à Niedercorn (11. 7. CO. et WE.) ainsi qu'à Kayl-Kahlenberg (23. 7. ETR.).

104 *Spilosoma lubricipeda* L. *(menthastri ESP.)* — Kautenbach (15. 6. WA.).

105 *Spilosoma lutea* HUFN. — Kautenbach (15. 6. WA.), Limpertsberg (11. 7. WA.).

106 *Diacrisia sannio* L. — Rare dans le pays; signalé de Clervaux (RPDB.).

107 *Parasemia plantaginis* L. — Plus rare que les autres années: Kautenbach (15. 6. WA.), Clervaux (RPDB.).

108 *Arctia caja* L. — Limpertsberg (7. 9. WA.), Clervaux (RPDB.).

109 *Atolmis (Gnophria) rubricollis* L. — Kautenbach (15. 6. WA.).

Sous-famille Aganainae (Hypsinae)

110 *Panaxia (Callimorpha) dominula* L. — Dirbach (19. 7. CO., 26. 7. WA.), Luxembourg - vallée de la Pétrusse (9. 7. ETR.).

111 *Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria* PODA *(hera* L.) — Dasbourg s/Our (RPDB.).

XIII. *GEOMETRIDAE*

Sous-famille Geometrinae (Boarmiinae)

112 *Abraxas grossulariata* L. — Mühlenbach-Faïencerie (27. 7. WA.), Junglinster (début août WA.).

113 *Cabera exanthemata* SCOP. — Limpertsberg (4. 7. WA.), Dirbach (13. 7. WA.).

114 *Campaea (Metrocampa) margaritata* L. — Limpertsberg (6. 7. et 9.7. WA.), Côte d'Eich (24. 7. WA.), Dirbach (9. 7. WA.), Luxembourg -vallée de la Pétrusse (7. 7 .ETR.).

115 *Ourapteryx sambucaria* L. — Clervaux (RPDB.).

116 *Opistograptis luteolata L.* — Kautenbach (15. 6. WA.).

117 *Pseudopanthera (Venilia) macularia* L. — Assez commun à Kautenbach (15. 6. WA.), Vallée de l'Our (22. 6. ETR.).

118 *Erannis (Hibernia) aurantiaria* HB. — Limpertsberg (10. 11. WA.) ; beaucoup plus rare que les autres années.

119 *Erannis (Hibernia) defoliaria* CL. — Luxembourg (10. 11. WA.) ; beaucoup plus rare que les autres années.

120 *Biston (Amphidasis) betularia* L. Pas signalé de Clervaux où il était toujours commun!

121 *Boarmia repandata* L. — Dirbach (13. 7. WA.).

122 *Isturgia (Fidonia) limbaria* F. — Pas observé dans l'Oesling où l'espèce devait pourtant se trouver?

123 *Ematurga atomaria* L. — Assez commun dans les environs de Luxembourg (20. 4 — 18. 7. WA.).

124 *Bupalus piniarius* L. — Pas signalé, mais était certainement présent.

125 *Chiasma (Phasiane) clathrata* L. — Pas rare: Gypsmühle (4. 5. WA.), Mühlenbach-Faïencerie (22. 6. WA.), Dirbach (9. 7. WA.), Tétange (31. 7. ETR.).

126 *Siona (Scoria) lineata* SCOP. — Assez commun à Gypsmühle (14. 6. WA.) et à Gasperich (17. 6. ETR.).

127 *Aspitates gilvaria* SCHIFF. —
f. sublataria FUCHS: Limpertsberg (29. 8. WA.).

Sous-famille Larentiinae

128 *Ortholitha mucronata* SCOP. *(plumbaria* F.) — Gypsmühle (14. 6. WA.), Kautenbach (15. 6. WA.), Steinsel, pelouse sur Keuper (6. 7. ETR.).

129 *Ortholitha chenopodiata* L. *(limitata* SCOP.) — Dirbach (26. 7. WA.).

130 *Ortholitha moeniata* SCOP. — Gypsmühle (18. 8. WA.).

131 *Ortholitha bipunctaria* SCHIFF. — Gypsmühle (28. 8. WA.).

132 *Operophtera (Cheimatobia) brumata* L. — Assez commun: Limpertsberg (10. 11. WA.).

133 *Lygris testata* L. — Limpertsberg (1. 7. WA.).

134 *Cidaria (Larentia) truncata* HUFN. — Limpertsberg (6. 9. WA.).

135 *Cidaria (Larentia) bilineata* L. — Gypsmühle (6. 7. WA.).

136 *Cidaria (Larentia) corylata* THNBG. — Dirbach (9. 7. et 13. 7. WA.).

137 *Cidaria (Larentia) alternata* MULLER *(sociata* BKH.) — Kirchberg (22. 5. WA.), Gypsmühle (14. 6. WA.).

Sous-famille Sterrhinae (Acidaliinae)

138 *Rhodostrophia vibicaria* CL. — Kayl (30. 7. ETR.).

139 *Timandra amata* L. — Kayl (29. 7. ETR.).

Sous-famille Oenochrominae

140 *Odezia atrata* L. — Commun à Dirbach (9. 7. WA.), Clervaux (RPDB.), assez commun à Kleinbettingen, dans prairies marécageuses le long de l'Eisch! (1. 7. ETR.).

Sous-famille Brephinae

141 *Brephos parthenias* L. — Plutôt rare: Trois-Glands (30. 3. WA.), Clervaux (RPDB.).

XIV. *DREPANIDAE*

142 *Drepana cultraria* F. — N'a pas été signalé, mais devait être présent.

XV. *ZYGAENIDAE*

143 *Procris (Ino) pruni* SCHIFF. — Gypsmühle (6. 7. WA.); assez commun à Kleinbettingen (1. 7. ETR.).

144 *Procris (Ino) statices* L. — Kirchberg (4. 7. WA.).

145 *Lictoria (Zygaena) achilleae* ESP. — Gypsmühle (14. 6. et 6. 7. WA.).

146 *Agrumenia (Zygaena) carniolica* SCOP.
f. hedysari HB. — Commun à Gypsmühle (6. 7. et 18. 7. WA.);
f. carniolica carniolica SCOP. — Gypsmühle (24. 7. WA.).

147 *Thermophila (Zygaena) meliloti* ESP. — Gypsmühle (8. 7. WA.).

148 *Thermophila (Zygaena) filipendulae* L. — Commun partout dans le pays (14. 6. — 18. 8.).

149 *Thermophila (Zygaena) trifolii* ESP. — Assez commun: Leudelange (30. 6. WA.), Kleinbettingen (1. 7. ETR.), Steinsel, pelouse sur Keuper (6. 7. ETR.), Gypsmühle (18. 7. WA.), Kayl-Dudelange (29. 7 .ETR.).

MICROLEPIDOPTERES

XVI. *PYRALIDAE*

150 *Crambus pinellus* L. — Dirbach (9. 7. WA.).

151 *Pyralis farinalis* L. — Limpertsberg (22. 7. WA.).

152 *Eurrhypara urticata* L. — Luxembourg, vallée de la Pétrusse (19. 6. ETR.).

153 *Pyrausta cespitalis* SCHIFF. — Mühlenbach-Faïencerie (20. 5. WA.).

XVII. *TORTRICIDAE*

154 *Tortrix viridana* L. — Extrêmement commun à Luxembourg, vallée de la Pétrusse (7. 7. ETR.).

XVIII. *ORNEOIDAE*

155 *Alucita pentadactyla* L. — Kayl (1. 6., ETR.), plusieurs exemplaires à Hunsdorf-Steinsel (6. 7. ETR.), Côte d'Eich (9. 7. WA.).

XIX. *TINEIDAE*

156 *Adela viridella* Z. — Mühlenbach-Faïencerie (20. 5. WA.).

CONCLUSIONS

L'année lépidoptérologique 1958 a été meilleure que l'année 1957, mais moins bonne que l'année 1956.

Comme faits saillants, il y a lieu de signaler:

la rareté de Papilio machaon L. ssp. gorganus FRUHST., Iphiclides (Papilio) podalirius L., Araschnia levana L. et prorsa L., Biston (Amphidasis) betularia L.;

l'abondance de Vanessa (Pyrameis) cardui L., Heodes (Chrysophanus) virgaureae L., Agapetes (Melanargia) galathea L., Aphantopus hyperanthus L., Autographa (Plusia) gamma L. et des ZYGAENIDAE en général;

la capture de Argynnis paphia L. f. valesina ♀ ESP., Pyronia (Epinephele) tithonus L. et Diacrisia sannio L.