

Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg 9^e série: 1992

par

Jean WERNER ¹⁾

Abstract: Bryofloristic research in Luxembourg yielded five new species in 1992: *Cephaloziella stellulifera*, *Lophozia capitata*, *Grimmia affinis*, *Orthotrichum pallens* and *Warnstorfia fluitans*. Several other collections of rare or neglected species are reported, many of them being new to the Oesling district (Luxembourg Ardennes).

Introduction

Comme l'année précédente (Werner, 1992), les recherches bryofloristiques se sont concentrées avant tout sur l'Oesling; quelques belles récoltes sont dues à mes collègues F. Hans, P. De Zuttere et I. Holz.

Comme il n'est pas indispensable de consacrer un commentaire individuel à chaque récolte, fût-elle remarquable, j'ai regroupé les observations d'espèces nouvelles, rares ou méconnues dans un tableau (tabl. 1). Il reprend les noms des taxons observés (nomenclature selon Corley & al., 1981; Corley & Crundwell, 1991; Grolle, 1983), le carré de l'Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois (mailles de 1 x 1 km), le nom du récoltant (JW = J. Werner, FH = F. Hans, PDZ = P. De Zuttere, JS = J. Schotel, IH = I. Holz), ainsi que le numéro d'herbier de l'auteur, s'il y a lieu.

Des notes individuelles ou générales complètent ces tableaux.

Pour quatre espèces (*Metzgeria temperata*, *Lophozia obtusa*, *Grimmia crinita*, *Rhynchostegiella curviseta*), des cartes de répartition ont été dressées (figs 1-2).

Notes au tableau 1

(1) Espèce nouvelle pour le pays: un commentaire individuel leur est consacré plus loin.

¹⁾ 32, rue Michel-Rodange, L-7248 Bereldange

(2) Espèce nouvelle pour le district ardennais luxembourgeois (Oesling).

Parmi les nouveautés, on remarquera *Metzgeria temperata*, épiphyte subocéanique connu seulement de la Petite Suisse; c'est une espèce aérohygrophile, caractérisant bien la vallée moyenne de l'Our et ses denses forêts.

Dans la région de Wiltz quelques espèces calcicoles, remarquables pour l'Oesling, ont été trouvées (*Rhynchostegiella tenella*, *Eucladium verticillatum*, *Eurhynchium schleicheri*).

Racomitrium fasciculare, sur un rocher schisteux à Clervaux, est remarquable, alors que cette rare grimmiacée a disparu du Gutland.

Autre "nouveau" intéressante: *Fissidens viridulus*, espèce rare, mais pouvant passer inaperçue; récoltée à Perlé (ancienne ardoisière), t. Bruggeman-Nannenga.

(3) Espèce nouvelle pour le district lorrain luxembourgeois (Gutland).

A noter l'hépatique *Cephalozia connivens*, trouvée à l'Elteschmuer (Beaufort), connue seulement d'une autre localité luxembourgeoise, dans le N de l'Oesling (De Zuttere & al., 1985).

(4) Espèce rarement observée.

(5) Espèce plutôt méconnue.

Parmi les espèces méconnues, je n'hésite pas à classer *Leptodontium gemmascens*, rare en Europe et récemment découverte chez nous (Werner, 1992), dont l'écologie et la sociologie restent à décrire pour la Sarre et le Luxembourg (Werner & Sauer, en prép.).

(6) Espèce fugace.

En ce qui concerne *Lophozia obtusa* (4^e localité luxembourgeoise), I. Holz l'a trouvée en grande abondance à Dasbourg-Pont (talus herbacé humide, soc. *Rhodobryum roseum*); l'hépatique a disparu des autres sites, découverts il y a quelques années seulement.

(7) Récoltée avec sporogones.

(8) Remarque.

La découverte de cette remarquable orthotrichacée océanique près de Consdorf a été publiée sans indication exacte du carré IFBL (De Zuttere, 1992); ayant pu examiner le matériel, je puis confirmer sans restriction; notre Petite-Suisse possède décidément une flore bryologique extraordinaire!

Tabl. 1: Bryophytes rares, nouvelles ou remarquables observées en 1992.

Espèce	IFBL	leg.	No herb.	note
<i>Cephalozia connivens</i>	K85813	JW & JS	5 5 9 7	(3)
<i>Cephaloziella hampeana</i>	K84214	JW	5 5 6 7	(4)
<i>Cephaloziella stellulifera</i>	K85232	JW	5 5 5 3	(1)
<i>Cephaloziella stellulifera</i>	K738	PDZ		(1)
<i>Jungermannia hyalina</i>	K82534	JW	5 5 8 1	(2)
<i>Lophozia badensis</i>	N81413	JW & al.	5 5 8 0	
<i>Lophozia bicrenata</i>	J85231	JW	5 6 2 2	(4)
<i>Lophozia bicrenata</i>	J85413	FH	5 6 2 7	(4)
<i>Lophozia capitata</i>	K85232	JW	5 5 4 3	(1)
<i>Lophozia obtusa</i>	J84532	IH & al.	5 6 2 8	(4)(7)
<i>Lophozia sudetica</i>	K82323	JW	5 6 0 0	
<i>Lunularia cruciata</i>	M845	FH		(4)(7)
<i>Marsupella funckii</i>	K84333	JW	5 5 6 1	(4)
<i>Metzgeria temperata</i>	J84513	JW	5 6 5 4	(2)
<i>Pedinophyllum interruptum</i>	K82341	JW	5 5 4 5	(2)
<i>Reboulia hemisphaerica</i>	K84123	JW	5 5 1 6	(4)
<i>Amblystegium humile</i>	K84423	JW	5 5 5 8	(2)(4)
<i>Brachythecium mildeanum</i>	K71823	JW	5 5 4 9	(2)
<i>Bryum elegans</i>	L71714	JW	5 5 0 4	(5)
<i>Bryum rutilans</i>	K81423	FH	5 5 7 9	(2)(4)
<i>Bryum tenuisetum</i>	J84242	JW	5 6 3 7	(4)
<i>Campylopus fragilis</i>	K83424	JW	5 5 3 0	
<i>Cynodontium polycarpon</i>	K82341	JW	5 5 5 2	(2)
<i>Dicranella cerviculata</i>	K85813	JW & JS	5 5 9 8	(3)
<i>Entodon concinnus</i>	K83524	JW	5 5 7 1	(2)
<i>Ephemerum minutissimum</i>	K75742	JW	5 5 3 6	
<i>Eucladium verticillatum</i>	K71844	FH		(2)
<i>Eurhynchium schleicheri</i>	K81411	JW	5 5 5 9	(2)
<i>Eurhynchium schleicheri</i>	K71844	FH & JW	5 5 9 6	(2)
<i>Fissidens viridulus</i>	L71714	JW	5 5 0 6	(2)
<i>Grimmia affinis</i>	K83411	JW	4 6 4 1	(1)
<i>Grimmia crinita</i>	L83642	JW	5 5 0 9	(4)
<i>Grimmia torquata</i>	K82341	JW	5 5 9 9	(4)
<i>Leptodontium gemmascens</i>	K73842	JW	5 5 4 7	(5)
<i>Leptodontium gemmascens</i>	K82114	JW	5 6 6 6	(5)
<i>Leptodontium gemmascens</i>	K74732	JW	5 6 3 0	(5)
<i>Leptodontium gemmascens</i>	K83242	JW	5 6 3 3	(5)
<i>Leptodontium gemmascens</i>	K83524	JW	5 6 5 7	(5)
<i>Neckera pumila</i>	N813	FH	5 6 2 9	(7)
<i>Orthotrichum pallens</i>	K81423	JW	5 6 5 6	(1)
<i>Orthotrichum pumilum schimp.</i>	K84123	JW	5 5 1 5	(4)
<i>Orthotrichum pumilum schimp.</i>	J85433	JW	5 5 6 0	(4)
<i>Orthotrichum pulchellum</i>	K83524	JW	5 5 6 8	(4)
<i>Orthotrichum rivulare</i>	K71823	JW	5 5 5 0	(4)
<i>Orthotrichum rivulare</i>	K84423	JW	5 5 5 5	(4)
<i>Orthotrichum speciosum</i>	K81223	JW & LR	5 5 3 9	(4)

Tabl. 1 (suite)

Espèce	IFBL	leg.	No herb.	note
<i>Philonotis caespitosa</i>	K81111	JW & LR		
<i>Plagiomnium ellipticum</i>	K75742	JW	5 5 3 7	(4)
<i>Pottia davalliana</i>	K85411	JW	5 5 4 4	
<i>Pottia davalliana</i>	L95222	JW	5 6 2 5	
<i>Racomitrium fasciculare</i>	J84323	JW	5 5 2 4	(2)
<i>Rhynchostegiella curviseta</i>	M95311	JW	5 5 9 0	
<i>Rhynchostegiella tenella</i>	K81138	FH		(2)
<i>Schistidium strictum</i>	J85413	JW & al.	5 6 2 6	(4)
<i>Sphagnum fimbriatum</i>	L82843	JW	5 5 1 3	
<i>Trichostomum crispulum</i>	K83424	JW	5 5 2 9	(4)
<i>Warnstorfia fluitans</i>	L82843	JW	5 5 1 2	(1)
<i>Weissia longifolia</i>	J83512	JW	5 6 6 2	(2)
<i>Weissia squarrosa</i>	K84333	JW	5 5 6 2	(2)(4)
<i>Zygodon conoldeus</i>	L92111	PDZ	5 5 4 6	(8)

Espèces nouvelles pour le Luxembourg

a) Hepaticae

Cephaloziella stellulifera

Déterminée sans confusion possible, grâce à la présence des grands périanthes ciliés, la découverte de cette minuscule hépatique est due aux prospections parallèles de P. De Zuttere (bord de route rocheux-argileux à Bavigne, Oesling) et à celles de l'auteur (carrière abandonnée à Grosbous, sol argilo-sablonneux triasique). La détermination fut confirmée par R. Schumacker.

Lophozia capitata

C'est une hépatique longtemps méconnue en Europe, par manque de prospection des anciennes carrières en milieu arénacé humide. Après qu'elle fut trouvée en Sarre (Sauer & Hans, comm. pers.), je l'ai systématiquement recherchée et fini par la dénicher dans une ancienne carrière des sols sablonneux triasiques, en bordure de l'Ardenne. Le site est à quelques km au N de Grosbous (espèces compagnes: *Pohlia annotina*, *Cephaloziella stellulifera* - voir ante, *Scapania irrigua*).

b) Musci

Grimmia affinis

Récoltée déjà en 1988, mais déterminée à tort comme *G. trichophylla* (rev. H. Greven, 1992), cette grimmiacée rare en Belgique (De Zuttere & Schumacker, 1984) et dans les pays limitrophes se trouvait sur un rocher schisteux-quartzitique exposé près de Dirbach. La récolte porte l'indication du carré K8.34.11, mais K8.34.13 est plus probable.




Fig. 1. Cartes de répartition de *Rhynchostegiella curviseta* et de *Grimmia crinita* au Grand-Duché de Luxembourg (réseau IFBL de 4 x 4 km). Les carrés représentent des récoltes récentes herborisées, les triangles des données d'herbier anciennes (< 1975) et les cercles des observations récentes de F. Hans.




Fig. 2. Cartes de répartition de *Metzgeria temperata* et de *Lophozia obtusa* au Grand-Duché de Luxembourg (réseau IFBL de 4 x 4 km). Les carrés représentent des récoltes récentes herborisées, les triangles des données d'herbier anciennes (< 1975) et les cercles des observations récentes de F. Hans.

Orthotrichum pallens

Déjà trouvé en Belgique il y a quelques années (De Zuttere & Sotiaux, 1986), cet épiphyte subarctique-subalpin est très rare en Europe extra-alpine. Récolté sur *Sambucus*, au bord d'un ruisseau, dans une combe humide, à 480 m d'altitude. La détermination fut confirmée par H. Lauer.

Dans le même carré de Holztum, F. Hans avait trouvé *Bryum rutilans* (*Bryum oeneum* auct., herb. Werner), nouveau pour l'Oesling (tabl. 1).

Warnstorfia fluitans

Bryophyte aquatique des eaux dystrophes, cette mousse était à rechercher au Luxembourg, mais elle y est certainement très rare, par manque de sites adéquats (l'eutrophisation des mares par les eaux de ruissellement chargées de nitrates est évidente partout!). Elle se trouve cependant en abondance dans les restes de marécage du Ripsmuier, près de Colbette. Son observation met en valeur ce site négligé de la zone forestière du Marscherwald, qui constitue la zone méridionale de la Petite Suisse luxembourgeoise. Détermination confirmée par H. Lauer.

Remerciements

Mes collègues I. Bruggeman-Nannenga (NL - Utrecht), H. Greven (NL - Wageningen), R. Schumacker (B - Liège) et H. Lauer (D - Kaiserslautern) ont bien voulu revoir du matériel critique; qu'ils soient sincèrement remerciés. Un merci s'adresse aussi à F. Hans (D - Sinz), P. De Zuttere (B - Braine-le-Château) et I. Holz (D - Trier), qui m'ont autorisé à publier quelques récoltes intéressantes.

Un grand merci s'adresse à mon frère H. Werner (L - Bereldange), qui m'a été d'un grand secours dans le domaine informatique.

Bibliographie

- Corley, M. F. V., A. C. Crundwell, R. Düll, O. Hill & A. J. E. Smith., 1981. - Mosses of Europe and the Azores; an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. - *J. Bryol.*, 11: 609-689.
- Corley, M. F. V. & A. C. Crundwell, 1991. - Additions and amendments to the mosses of Europe and the Azores. - *J. Bryol.*, 16: 337-356.
- De Zuttere, P., 1992. - Les *Orthotrichaceae* (Musci) de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. - *Now. bryol.*, 2: 1-32.
- De Zuttere, P. & R. Schumacker, 1984. - Bryophytes nouvelles, méconnues, rares ou disparues de Belgique. - *Min. Rég. wall. Serv. Cons. Nat., trav.*, 13: 160 p. + 40 cartes.
- De Zuttere, P. & A. Sotiaux, 1986. - Mousses nouvelles pour la Belgique. Découvrel. - *Bull. Inf. S.N.B.W.*, 1-2: 1-8.
- De Zuttere, P., J. Werner & R. Schumacker, 1985. - La bryoflore du Grand-Duché de Luxembourg, taxons nouveaux, rares ou méconnus. - *Trav. Sc. Musée Hist. Nat. Luxembourg*, 5: 153 p., 42 cartes.
- Grolle, R., 1983. - Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. - *J. Bryol.*, 12: 403-459.

- Werner, J., 1992a. - Observations bryologiques au Grand-Duché de Luxembourg. 8e série:
1991. - *Bull. Soc. Nat. luxemb.*, 93: 139-145.
- Werner, J., 1992b. - *Leptodontium gemmascens* (Mitt. ex Hunt) Braithw. (Musci) dans
l'Oesling luxembourgeois. - *Dumortiera*, 52: 10.