STUDIA BOTANICA HUNGARICA

Antea: Fragmenta Botanica

Tom. XIII 1979 p. 75-77

Neue floristische Angaben von Ungarn

Ferenc NÉMETH

ABSTRACT: (New floristical data from Hungary) 26 new floristical data have been published from Hungary giving by the codes of the Central European Floristic Mapping.

Während der botanischen Exkursionen der letzteren Jahre habe ich einige neue Fundorte von selteneren Gefässpflanzen gefunden, teils ich selbst, teils mit Unterstützung von Kollegen. Ich spreche Frau J. SZUJKÓ-LACZA, Direktorin der Botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums, Budapest, Herrn L. GOZMÁNY, Lepidopterolog in der Zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums, Budapest und Herrn L. HAJTÓ, Forstmann im Institut VITUKI, Szigetszentmiklós meinen Dank aus für die Erlaubnis zur Mitteilung ihrer Entdeckungen.

Die Arten, die wir in sehr kleinen Beständen fanden, wurden nicht gesammelt, sondern auf Farbdias festgehalten. Im Zusammenhang mit der Kartogrammierung der Flora Mitteleuropas (NIKLFELD 1971) - die von einer Arbeitsgemeinschaft unter Leitung von A. BORHIDI in Ostungarn durchgeführt wird - gebe ich nach den lateinischen Pflanzennamen und den ungarischen Namen der Fundorte auch die vierstelligen Kodezählen der Fundorte an. Die Teile der NIKLFELD's Grundquadrate sind mit grossen Buchstaben bezeichnet und zwar das nordwestliche Subquadrat mit A, das nordöstliche mit B, das südwestliche mit C und das südöstliche mit D.

Weitere Abkürzungen:

Balatonv.: Balatongebiet (Balatonicum)
DDt.: Südliches Transdanubien (Praeillyricum)
DK.: Transdanubisches Mittelgebirge (Bakonyicum)
D-T.: Donau-Theiss Zwischenstormland (Praematricum)
Dunav.: Donauland (Colocense)

Tt.: Transtheissische Tiefebene (Crisicum)
BP.: Herbarbeleg im Naturhistorischen Museum, Budapest
HZ.: Herbarbeleg im Naturhistorischen Museum, Zirc
HL.: Farbdia in der Sammlung von L. HAJTÓ, Szigetszentmiklós
NF.: Farbdia in der Sammlung von F. NÉMETH, Budapest

Dicotyledones

Chamaenerion angustissimum (WEB.) SOSNOVSKIJ (Epilobium dodonaei VILL.): Balatonv.: Pécsely (9072B). Pionier auf Kalkstein. BP.

Cicuta virosa L.: Tt.: Lakitelek (9185B). In Magnocaricion des Waldes Tőserdő. BP.

Digitalis lanata EHRH.: Dunav.: Káposztásmegyer (8380D). Auf degradierten Sandhügeln. BP, gesammelt von L. GOZMÁNY.

Diplotaxis muralis (L.) DC.: Dunav.: Fülöpszállás (9181C). Ruderal. BP.

Erucastrum nasturtiifolium (POIR.) O.E. SCHULTZ: Dunav.: Fülöpszállás (9281A). Ruderal. BP.

Euphrasia tatarica FISCH.: Dunav.: Szabadszállás, Fülöpszállás (9181A, 9181C). In Agrosti-caricetum distantis und Achilleo-festucetum pseudovinae. BP.

Gentiana pneumonanthe L.: DK. Bakonygebirge: Agártető (9071A), D-T.: Bugacpuszta (9384). Beide in Molinietum coeruleae, die letztere von J. SZUJKÓ-LACZA, M. BABOS, Zs. KOMÁROMY gesammelt BP.

Lathyrus sphaericus RETZ: Balatonv.: Szentgyörgyhegy (9170D), NF.

Leontodon nudicalyx (LAG.) H. P. FUCHS: Dunav.: Szabadszállás, Fülöpszállás (9181A, 9181C, 9281A, 9281B). In Agrosticaricetum distantis und Achilleo-festucetum pseudovinae. BP.

Malcolmia africana (L.) R. BR.: Dunav.: Fülöpszállás (9280B, 9281A). Pionier auf degradierten Sodaböden. BP.

Oenanthe silaifolia M.B.: DK. Bakonygebirge: Agártető (9071A). In Magnocaricion. HZ.

Orobanche minor SM.: DDt. Mecsekgebirge: Pécs (9875D). Gesammelt von REUTER C. BP.

Sagina micropetala RAUSCHERT: DK. Bakonygebirge: Agártető (9071A). Pionier auf trockendem Schlamm. HZ.

Senecio silvaticus L.: Dunav.: Fülöpszállás (9281A). Ruderal. BP.

Senecio vernalis W. et K.: in den letzteren Jahren sehr verbreitet angetroffen im Donau-Theiss Zwischenstromland, hauptsächlich auf Sand, in Wein- und Obstgärten. Einige neuere Fundorte: D-T.: Dabas (8881), Hernád-Örkény-Pusztavacs (8882), Tatárszentgyörgy (8982), Lajosmizse (8983), Fülöpháza-Ágasegyháza (9182), Dunavidék: Fülöpszállás (9181). BP.

Sonchus palustris L.: Dunav.: Balatonaliga (9075A). Im Röhricht des Balatons.

Thymus montanus W. et K.: DK. Bakonygebirge: Bakonybél und Tekereskut (8772A). Auf degradierten Bergwiesen. HZ.

Allium paniculatum L. ssp. marginatum (JANKA), SOÓ: Dunav.: Szabadszállás (9181A). In Astragalo-festucetum rupicolae. BP.

Calamagrostis canescens (WEBER ex WIGG.) ROTH em. DRUCE: Balatonv.: Monoszló (9071D). Im Bergteich Hegytó. BP. Über das Balatongebiet publizierte auch schon BOROS (BOROS-VAJDA 1957), und zwar: Szentbékkálla (9171).

Muscari botryoides (L.) MILL. ssp. kerneri (MARCHES) HEGI: D-T.: Bugacpuszta (9383B), in Astragalo-festucetum rupicolae. NF.

Ophrys apifera HUDS.: Dunav.: Dunaharaszti (8680C). In Moorwiese. Gefunden von HAJTÓ L. HL.

Orchis timbalii VELEN. (Orchis coriophora L. x O. laxiflora LAM. ssp. palustris (JACQ.) A. et G.): Dunav.: Szabadszállás (9181A). In Agrosticaricetum distantis. BP, NF.

Phalaris canariensis L.: Dunav.: Fülöpszállás (9281B). BP.

Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB. ex MÖSSLER: DK. Keszthelyer Gebirge: Gyenesdiás (9269B). In Querco petreae-carpinetum. BP.

Potamogeton acutifolius LINK ex R. et SCH.: Balatonv.: Monoszló (9071D). Im Bergteich Hegytó. BP.

Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL.: Dunav.: Szabadszállás (9181A). In Achilleo-festucetum pseudovinae. BP.

LITERATUR

BOROS, Á. - VAJDA, L. (1957): A Bakony és a Balatonfelvidék Sphagnumos lápjai. - Ann. Inst. Biol. Tihany, 24: 283-288.

NIKLFELD, H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. - Taxon, 20: 545-571.

SOÓ, R. (1964-1973): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I-V. (Synopsis systematico-geobotaniae florae vegetationisque Hungariae I-V.) - Akadémiai Kiadó, Budapest.

Angekommen: 30 November 1978

F. NÉMETH
Botanische Abteilung des Ungarischen
Naturwissenschaftliches Museums
H-1406 Budapest, Pf.: 36
UNGARN