А. Н. Беркутенко,
А. Н. Полежаев

A. Berkutenko,
A. Polezhaev

CAREX MICROGLOCHIN WAHLENB. (CYPERACEAE) И VIOLA VARIEGATA FISCH. EX LINK (VIOLACEAE) — НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

CAREX MICROGLOCHIN WAHLENB. (CYPERACEAE) ET VIOLA VARIEGATA FISCH. EX LINK (VIOLACEAE) — SPECIES PRO FLORA PROVINCIAE SAKHALIN NOVAE

В ходе полевых работ на Сахалине в сентябре 1998 г. в окр. пос. Катангли (восточное побережье) нами был найден новый вид для флоры Сахалинской области — *Carex microglochin* Wahlenb. Вид был обнаружен на осоково-сфагновом болоте в стадии зрелых плодов. В этой стадии вид легко идентифицировался даже в полевых условиях, так как у него отклоненные вниз мешочки с осевым придатком, выступающим из мешочка почти на 2 мм. А. П. Хохряков (1985), А. Е. Кожевников (1988) и Т. В. Егорова (1999) указывают его для российского Дальнего Востока на основании единственных сборов в 1981 г. в континентальной части Магаданской области: верховья р. Таскан в Сусуманском районе. Этот район изобилует выходами карбонатных пород. Позднее, в 1998 г., вид был найден авторами данной публикации на юге Магаданской области в Кава-Челомджинском участке заповедника «Магаданский» (кордон «72 км»), также на осоково-сфагновом болоте. Несмотря на широкий ареал *C. microglochin* (Егорова, 1999: 575), на Дальнем Востоке России этот вид является редким, возможно, его пропускают при гербаризации из-за небольших размеров растения.

В августе 2000 г. при посещении парка им. Гагарина в г. Южно-Сахалинске в пихтово-еловом лесу у ручья был обнаружен новый вид для Сахалинской области — *Viola variegata* Fisch. ex Link, отсутствующий в последней сводке по флоре Сахалина (Смирнов, 2002). Растения были обильны и выделялись на фоне зеленых мхов, которые обрамляли берега ручья, своими пестрыми листьями с красивым мраморным рисунком из-за осветления вдоль жилок, несколько напоминая листья цикламена. Вместе с фиалкой здесь же в глубокой тени произрастает *Asarum heterotropoides* F. Schmidt. *V. variegata* была описана из Даурии (typus: Dahuria, prope Doroninsk — LE!). Согласно литературным данным и гербарному материалу, хранящемуся в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (БИН), ареал *V. variegata* охватывает в Восточной Сибири Иркутскую и Читинскую области, Республику Бурятию, север Красноярского края (Эвенкия), а на Дальнем Востоке России — Нижне-Зейский, Буреинский и Уссурийский ботанико-географические районы (Юзепчук, 1949;

Безделева, 1987; Зуев, 1996). За пределами российского Дальнего Востока Ови (Ohwi, 1965) указывает *V. variegata* var. *nipponica* для островов Хонсю и Сикоку, замечая, что типичные растения встречаются в Корее, Маньчжурии и Сибири.

Судя по этикеткам в Гербарии БИН, экологическая амплитуда *V. variegata* довольно широкая — растение встречается на каменистых склонах в дубовых лесах, на базальтовых обнажениях, галечных наносах, близ сфагновых болот, на выходах известняка (сбор В. Л. Комарова: Уссури-Да-збих, 26 VI 1913 LE!), на глинистых обнажениях, в расселинах скал.

Этот декоративный вид легко поддается культивированию. Взятые в небольшом количестве корневища в климатических условиях Магадана на берегу бухты Нагаева прижились, дали обильную поросль, цвели и плодоносили, но после необычной одной из зим, когда до 7 января не было снега, произошел выпад растений (Беркутенко, 2004).

Литература

Безделева Т. А. *Violaceae* // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Л., 1987. Т. 2. С. 93–131.

Беркутенко А. Н. Некоторые результаты интродукции растений в Магадане // Бюл. Главн. бот. сада. 2004. Вып. 188. С. 3–10.

Егорова Т. В. Осоки (*Carex* L.) России и сопредельных государств. СПб.; Сент-Луис, 1999. 772 с.

Зуев В. В. *Violaceae* // Флора Сибири. Новосибирск, 1996. Т. 10. С. 82–101.

Кожевников А. Е. *Cyperaceae* // Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Л., 1988. Т. 3. С. 175–403.

Смирнов А. А. Распространение сосудистых растений на острове Сахалин. Южно-Сахалинск, 2002. 245 с.

Хохряков А. П. Флора Магаданской области. М., 1965. 396 с.

Юзепчук С. В. *Violaceae* // Флора СССР. М.; Л., 1949. Т. 15. С. 350–479.

Ohwi J. Flora of Japan. Washington, 1965. 1066 p.

Институт биологических проблем Севера
Дальневосточного отделения РАН
685000, Магадан, Портовая, 18
E-mail: berkuten@online.magadan.su