Д. Ю. Цыренова **D. Tzyrenova**

НОВЫЙ ВИД РОДА GERANIUM L. (GERANIACEAE) ИЗ БАССЕЙНА РЕКИ АМУР

GENERIS GERANIUM L. (GERANIACEAE) SPECIES NOVA E SYSTEMATE FLUVII AMUR

При изучении гербарного материала по роду *Geranium* L., хранящегося в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) были обнаружены среди синтипов *G. pseudosibiricum* J. Mayer var. *striatum* Regel два экземпляра, которые, как и остальные синтипы рассматриваемого таксона, не принадлежат к южносибирскому виду *G. pseudosibiricum* J. Mayer. По данным Г. А. Пешковой (1996), восточная граница последнего вида проходит в Шилко-Аргунском флористическом районе Сибири (оз. Арей, Улетовский р-н Читинской обл.), полностью расположенном в даурском секторе бассейна Амура.

Следует сказать, что *G. pseudosibiricum* J. Mayer, ошибочно приведенный Э. Л. Регелем в «Tentamen Florae Ussuriensis» (Regel, 1861: 39) для бассейна р. Уссури, был основан на весьма разнородном материале, представленным несколькими гербарными образцами, хранящимися теперь в Гербарии LE. По нашему мнению, один из синтипов *G. pseudosibiricum* J. Mayer var. *striatum* Regel («Уссури, устье р. Кхча, 1859, Р. К. Маак» (LE!) в действительности относится к маньчжуро-корейско-японскому виду *G. sieboldii* Maxim.; другой синтип («Уссури, устье р. Бикин, Р. К. Маак» (LE!) — к монголо-даурскому виду *G. dahuricum* DC.; а экземпляры синтипа («Уссури, устье р. Абдери, 1859, Р. К. Маак» (LE!) мы принимаем в качестве нового вида.

Geranium ussuriense Tzyren. sp. nova. — *G. pseudosibiricum* J. Mayer var. *striatum* Regel, 1861, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys.-Math.), sér. 7, 4, 4 (Tent. Fl. Ussur.): 39, p. p. — Стебли прямостоячие, вильчато ветвящиеся наверху, покрытые короткими, вниз направленными простыми волосками. Нижние стеблевые листья с черешками 5–6 см дл., 7-глубокораздельные, со слабо вогнутым основанием; доли их узкоромбические в очертании, в верхней половине перистонадрезанные с ланцетными цельными дольками; верхние листья 3–5-раздельные, с черешками 0.5–1 см дл. Пластинки листьев сверху по всей

поверхности опушены полуприлегающими короткими простыми, с расширенным основанием волосками, снизу жилки сплошь покрыты более длинными тонкозаостренными с узким основанием волосками, а между жилками волоски рассеянные. Цветоносы пазушные, одиночные, 7–8 см дл., с двумя цветками. Цветоножки 3–4 см дл. Цветки 1.5–2 см в диам. Чашелистики с остью около 1 мм дл., снаружи с короткими прижатыми простыми волосками. Лепестки бледно-розовые, интенсивно окрашенные по жилкам, внизу в области ноготка с внутренней стороны и по краям длинноволосистые. Нити тычинок наружного круга в нижней половине внезапно расширенные, внутреннего круга — постепенно расширенные книзу, по краям реснитчатые.

Lectotypus (Tzyrenova, hic designatus): бассейн реки Амур, «Уссури, устье р. Абдери, 1859, Р. К. Маак» (LE).

В качестве лектотипа вида мы выбрали экземпляр, цитированный при первоописании разновидности *G. pseudosibiricum* J. Mayer var. *striatum* Regel, на котором базируется новый вид.

G. ussuriensis близок к *G. dahuricum* DC., от которого отличается опушением жилок на нижней стороне листа, состоящим из многочисленных более или менее коротких прижатых (а не одиночных, длинных и оттопыренных) волосков; коротко прижатоволосистыми (а не оттопыренно длинноволосистыми) чашелистиками; нитями тычинок наружного круга внезапно (а не постепенно) расширенными книзу.

Автор признателен Т. В. Егоровой и А. Н. Сенникову за консультации по вопросам номенклатуры.

Литература

Пешкова Г. А. Сем. *Geraniaceae* // Флора Сибири. Новосибирск, 1996. Т. 10. С. 8–22.

Regel E. Tentamen Florae Ussuriensis // Mém. Acad. Sci. Pétersb., Sér. 7. 1862. T. 4. N 4. P. 1–228.

Дальневосточный государственный гуманитарный университет
Биолого-химический факультет, кафедра ботаники
680000, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68