А. П. Серёгин **A. Seregin**

VALERIANELLA ECHINATA (L.) DC. (VALERIANACEAE) — НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ РОССИИ

VALERIANELLA ECHINATA (L.) DC. (VALERIANACEAE), A NEW SPECIES TO THE FLORA OF RUSSIA

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Биологический факультет, кафедра геоботаники,
Гербарий им. Д. П. Сырейщикова (MW)
119991, Москва, Ленинские горы
allium@hotbox.ru

Для флоры России впервые приводится вид *Valerianella echinata* (L.) DC.
Ключевые слова: *Valerianella echinata*, флора России.

С 1997 г. нами совместно с Е. Г. Сусловой ведется флористическое изучение окрестностей пос. Малый Утриш (Анапский и Новороссийский районы Краснодарского края) в связи с возможным созданием здесь Утришского заповедника. Список выявленных сосудистых растений, насчитывающий 848 видов, опубликован (Серёгин, Суслова, 2007; Seregin, Suslova, 2007).

В мае 2005 г. совместно с briологами М. С. Игнатовым и Е. А. Игнатовой мы посетили с очередным визитом биологическую станцию ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН в окрестностях пос. Малый Утриш. На «лысой» горе выше этого поселка нами был собран новый для флоры России и Кавказа вид рода *Valerianella* — *V. echinata* (L.) DC. Приведем описание вида по кавказским образцам, которые в целом более субтильные, чем экземпляры из Крыма и Средиземноморья (ср. описание, приведенное И. А. Линчевским (1958) во «Флоре СССР»).

Valerianella echinata (L.) DC., 1805, Fl. Fr. 4: 242. — Однолетник 4.5–8 см выс. Нижние 2–3 междоузлия очень короткие, и нижние листья сближены в розетку. Стебель в нижней части (первое и/или второе из расставленных междоузлий) с двумя рядами мелких (до 0.1 мм), вниз обращенных шипиков, в верхней части голый, единожды-дважды дихотомически ветвистый, с булавовидно вздутыми плодоносными веточками. Листья голые: нижние — лопатчатые или продолговато-лопатчатые, до 2 см дл., с длинными черешками, равными пластинке или превышающими ее, почти цельнокрайные, по



Рис. *Valerianella echinata* (L.) DC.

краю иногда с редкими ресничками; верхние — продолговатые и продолговато-линейные, до 1.8 см дл., расставленно-зубчатые, в основании иногда перистонадрезанные. Цветки в малоцветковых полу-

зонтиках (до 10 цветков) на верхушках веточек и одиночные в верхних развилинах стебля. Венчик голубой, 1–1.2 мм в диам., с трубкой около 1 мм дл. Плод продолговато-яйцевидный, около 3 мм дл. (без отгиба чашечки) и 1 мм в диам., по спинке серповидно изогнутый к длинному зубцу, голый. Отгиб чашечки в виде 3 неравных зубцов, из которых задний (средний) — шиловидный, длинный, до 2(2.5) мм дл., отогнутый, а два боковых — короткие, едва заметные, 0.1–0.2 мм дл. (иногда до 0.5 мм и тогда тоже отогнутые). — Рис.

Изученный образец: Краснодарский край, Анапский район, Утришский заповедник (проектируемый), 0.5 км к СВ от пос. Малый Утриш, основание осыпи под «лысой» горой, 44°42′50″ с. ш., 37°27′50″ в. д., 90 м над ур. м., 4 V 2005, № С-746, А. Серегин, М. Игнатов, Е. Игнатова (MWG, MW, LE).

Вид распространен по всему Средиземноморью, включая Северную Африку, на восток до Ливана и Сирии. На территории бывшего СССР известны сборы из западной части горного Крыма: Севастополь, Севастополь — Балаклава, Севастополь — Георгиевский монастырь, Казачья бухта, Балаклава, Чернореченское, Широкое, Ласпи, Гурзуф, Краснокаменка, Артек (LE, MW, YALT).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (НШ4243.2008.4).

Литература

Линчевский И. А. Род валерианелла — *Valerianella* Mill. // Флора СССР. Т. 23. М.; Л., 1958. С. 642–681. — Привалова Л. А. Сем. *Valerianaceae* DC. — валериановые // Е. В. Вульф. Флора Крыма. Т. 3, вып. 3. Ялта, 1969. С. 113–127. — Серёгин А. П., Суслова Е. Г. Флора сосудистых растений окрестностей пос. Малый Утриш // Ландшафтное и биологическое разнообразие Северо-Западного Кавказа: Сб. науч. тр. М., 2007. С. 104–174. — Seregin A. P., Suslova E. G. A checklist of the vascular plant flora of the Utrish area (Russian Black Sea Coast): An electronic supplement to: Seregin A. P., Suslova E. G. Contribution to the vascular plant flora of the Utrish area, a relic sub-Mediterranean ecosystems of the Russian Black Sea Coast // Willdenowia. 2007. Vol. 37, N 2. P. 451–463. Mode of access: http://www.bgbm.org/bgbmpress/willd37/Seregin+Suslova_Utrish_checklist.pdf.

Summary

Valerianella echinata (L.) DC. is recorded for the first time to the flora of Russia.

Keywords: *Valerianella echinata*, flora of Russia.