

**НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ
БАССЕЙНА РЕКИ БОЛЬШАЯ ЛАБА (ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)**

**SOME NEW AND RARE SPECIES FROM THE BOLSHAYA
LABA RIVER BASIN (WEST CAUCASUS)**

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
Эколого-ботаническая станция
357506, Пятигорск, пос. Энегретик
demons2002@rambler.ru

Сообщается о находках в бассейне реки Большая Лаба редких и новых видов растений: *Muscari coeruleum* Lozinsk., *Fritillaria orientalis* Adams, *Corydalis teberdensis* A. P. Khokhr., *C. emanueli* C. A. Mey., *Pulsatilla violacea* Rupr., *Luzula sylvatica* L., *Poterium sanguisorba* L., *Saxifraga juniperifolia* Adams, *Sedum album* L., *Laurocerasus officinalis* L., *Colchicum speciosum* Steven.

Ключевые слова: Бассейн реки Большая Лаба, новые и редкие виды.

В 2006–2007 гг. при исследовании флоры бассейна реки Большая Лаба, расположенного в пределах Карачаево-Черкесской Республики и Краснодарского края, нами были обнаружены некоторые виды растений, которые в ботанической литературе для этого района не указывались или являются редкими как для флоры Большой Лабы, так и для флоры Кавказа в целом (Гроссгейм, 1948; Галушко, 1979–1980; и др.). Образцы, подтверждающие эти находки, переданы в Гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE).

Muscari coeruleum Lozinsk. — довольно редкий вид, эндемик Северного Кавказа. Ранее указывался только для территории Северной Осетии, Адыгеи и Краснодарского края (Мордак, 2006б). Нами найден в верхней части Скалистого хребта по всему междуречью рек Большой Лабы и Урупа над южными скалистыми склонами. По всей видимости, на Скалистом хребте встречается спорадически вплоть до Северной Осетии.

Fritillaria orientalis Adams — редкий кавказский эндемик с дизъюнктивным ареалом. Для Северного Кавказа ранее был известен из Осетии, Кабардино-Балкарии (Малка) и Фишт-Оштенского известнякового массива в Адыгее, где произрастает на крутых скалистых склонах (Мордак, 2006а). Нами найден в районе Россыпной поляны

в устье р. Россыпной (правого притока Большой Лабы), в 300 м от дороги на пос. Пхия. Интересно, что здесь вид произрастает не на карнизах скал, а в смешанном буково-пихтовом лесу. Популяция насчитывает около 15 особей.

Corydalis teberdensis A. P. Khokhr. — редкий вид, эндемик Западного Кавказа. Ранее был известен только из бассейна р. Кубань, откуда и был описан (Хохряков, 1971). Нами был найден в окр. станицы Ахметовской в урочище Жиланов Родник, на хр. Черноморском, по северным склонам Скалистого хребта в междуречье Большой Лабы и Урупа. Затем обнаружен в верховьях р. Россыпной (правый приток Большой Лабы) и на плато Дженту в окрестностях пос. Рожкао. В бассейне Большой Лабы наиболее характерен для субальпийского и альпийского пояса, поднимаясь до 2800 м; также встречается в лесном поясе в смешанных и лиственных лесах. В высокогорьях обычный вид, в лесном поясе встречается рассеянно.

C. emanueli C. A. Mey. — очень редкий вид, эндемик Кавказа. Найден в незначительном количестве в верховьях р. Левый Рожкао (в 16 км от пос. Рожкао и в 3 км от вершины г. Дженту) на плато Дженту, в составе альпийского луга и зарослей *Rhododendron caucasicum* Pall. В ЛЕ сборы из этой части Кавказа отсутствуют. Произрастает вместе с *Anemonoides caucasicus* (Rupr.) Holub, *Corydalis teberdensis*, *Dentaria bipinnata* C. A. Mey., *Primula algida* Adams, *P. amoena* Bieb.

Pulsatilla violacea Rupr. — кавказский вид, обычный в альпийском и субальпийском поясах на Центральном Кавказе и в бассейне Кубани. Для бассейна Большой Лабы ранее не приводился. В Гербарии Ставропольского государственного университета имеются сборы А. Л. Иванова из бассейна р. Закан (левого притока р. Большая Лаба). Наши исследования показали, что это вид обычен не только в верхнем течении Большой Лабы, но и на Скалистом хребте, в междуречье рек Большая Лаба и Уруп, где встречается в составе субальпийских лугов.

Luzula sylvatica L. — европейский лесной вид. На Кавказе прежде был известен только из Колхидской провинции (Гроссгейм, 1949), для Северного Кавказа в то время не указывался, хотя в Гербарии ЛЕ имеются сборы из бассейна Большой Лабы. Один из них: «Северный Кавказ, бассейн р. Лабы, Загедан, северо-восточный склон, левый берег р. Большая Лаба, поляна среди елового леса, 14 VIII 1945, Е. П. Матвеева» — был определен коллектором как *L. pilosa* L.,

в 1997 г. переопределен Н. Н. Портениером как *L. sylvatica*. Второй образец был собран Ю. П. Юдиным и определен А. Лесковым: «Северо-Западный Кавказ, бассейн р. Большая Лаба, еловый лес по склону и левому берегу р. Пхии, 13 VIII 1938, Ю. П. Юдин». Впервые приводится для Большой Лабы в «Конспекте флоры Кавказа» (Новиков, 2006). Нами обнаружен в междуречье рек Загеданка и Большая Ажога в составе пихтового леса. Реликт.

Poterium sanguisorba L. — европейский луговой вид. В России был известен только из европейской части (Юзепчук, 1941), для Кавказа не приводился. Нами обнаружена небольшая популяция в среднем течении р. Большая Лаба в 400 м от поселка Рожкао.

Saxifraga juniperifolia Adams — рассеянно встречается в горной части Центрального Кавказа. Для Западного Кавказа вид ранее был неизвестен (Кудряшова, 1995). Обнаружен на скалах известняка джентинской свиты в истоках р. Правый Рожкао на хр. Дженту, где произрастает совместно с близкородственным видом *S. scleropoda* Sommier et Levier.

Sedum album L. — европейский вид, известный на Северном Кавказе из бассейна Кубани, а также из Центрального и Восточного Кавказа (Кудряшова, 2002). Для бассейна Большой Лабы был неизвестен. Исследования показали, что он довольно обычен на скалах из пермских конгломератов в окрестностях пос. Рожкао (по р. Шантацара, Золотой Ключ). Имеются также устные указания А. Д. Михеева о нахождении его в районе Грушевой поляны, расположенной в устье р. Грушевой (4 км выше пос. Азиатского).

Laurocerasus officinalis L. — обычный вид лесной флоры Эвксинской провинции. На Западном Кавказе рассеянно встречается в бассейне р. Белой (Адыгея) в составе широколиственных и смешанных лесов. На восток доходит только до бассейна Большой Лабы, где достаточно редок и произрастает только в самом верхнем течении под перевалами Главного Кавказского хребта. Нами найден по р. Санчаро (в 15 км южнее пос. Пхия) в устье р. Адзапш, а также в верховьях одного из притоков р. Санчаро под перевалом Студенческий. В обоих случаях встречен в составе криволесий в местах схода лавин.

Colchicum speciosum Steven — горно-колхидский вид, распространенный в высокогорьях Западного Кавказа. На запад встречается до бассейна р. Афиц. В бассейне Большой Лабы собран в устье р. Адзапш в 16 км от пос. Пхия, в составе субальпийского высокотравья.

Автор выражает большую благодарность А. Д. Михееву, Т. Н. Поповой и М. А. Михайловой за проверку определения гербарных материалов.

Литература

Г а л у ш к о А. И. Флора Северного Кавказа. Определитель. Ростов-н/Д. Т. 1. 1979. 317 с.; Т. 2. 1980. 350 с.; Т. 3. 1980. 327 с. — Г р о с с г е й м А. А. Определитель растений Кавказа. М., 1949. 747 с. — К у д р я ш о в а Г. Л. Конспект видов семейства *Saxifragaceae* и *Parnassiaceae* флоры Кавказа // Ботан. журн. 1995. Т. 80, № 8. С. 104–108. — К у д р я ш о в а Г. Л. Конспект видов рода *Sedum* L. (*Crassulaceae*) во флоре Кавказа // Новости систематики высших растений. Т. 34. СПб., 2002. С. 79–93. — М о р д а к Е. В. *Fritillaria* L. // Конспект флоры Кавказа / Отв. ред. А. Л. Тахтаджян. Т. 2. СПб., 2006а. С. 76–79. — М о р д а к Е. В. *Muscari* Mill. // Конспект флоры Кавказа / Отв. ред. А. Л. Тахтаджян. Т. 2. СПб., 2006б. С. 134–140. — Н о в и к о в В. С. *Juncaceae* Juss. // Конспект флоры Кавказа / Отв. ред. А. Л. Тахтаджян. Т. 2. СПб., 2006. С. 172–179. — Х о х р я к о в А. П. О связи флор Северо-Восточной Сибири и Кавказа // Биологические проблемы севера. Магадан, 1971. С. 174–176. — Ю з е п ч у к С. В. *Poterium* L. // Флора СССР. Т. 10. М.; Л., 1941. С. 429–431.

Summary

Records of rare and new plant species in the Bolshaya Laba River basin (West Caucasus) are reported: *Muscari coeruleum* Lozinsk., *Fritillaria orientalis* Adams, *Corydalis teberdensis* A. P. Khokhr., *C. emanueli* C. A. Mey., *Pulsatilla violacea* Rupr., *Luzula sylvatica* L., *Poterium sanguisorba* L., *Saxifraga juniperifolia* Adams, *Sedum album* L., *Laurocerasus officinalis* L., *Colchicum speciosum* Steven.

Key words: Bolshaya Laba River, new and rare species.