

ЗАМЕТКИ О ФЛОРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
И ОБЛАСТИ ПЬЕМОНТ В ИТАЛИИNOTES ON THE FLORA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
AND PIEDMONT REGION IN ITALY

Ботанический сад (институт) АН Республики Молдова
Республика Молдова, MD-2002, Кишинев, ул. Лесная, 18
p_panzaru@yahoo.it

Из Республики Молдова описаны одна новая разновидность и две новые формы: *Astragalus vesicarius* L. var. *angelicae* Pînzaru var. nova, *Campanula glomerata* L. var. *cervicarioides* (Schult.) Pînzaru f. *xeniae* Pînzaru et A. Ruschuk forma nova, *Iris aphylla* L. f. *iulitae* Pînzaru forma nova; из Италии описана новая разновидность *Thalictrum foetidum* L. var. *delponteanum* Pînzaru var. nova. Обнародованы две новые комбинации: *Astragalus vesicarius* var. *pseudoglaucus* (Klokov) Pînzaru comb. et stat. nov., *Centaurea orientalis* L. f. *rubescens* (DC.) Pînzaru comb. et stat. nov. Для флоры Молдовы приведено 11 новых таксонов: *Aconitum eulophum* Rechb., *Anthriscus longirostris* Bertol., *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., *Carduus acanthoides* L. f. *albiflorus* Schur, *Centaurea orientalis* f. *rubescens*, *Chaerophyllum nodosum* (L.) Crantz, *Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph var. *tricolor* (Bernh. ex Besser) Ledeb., *Orobanche hederæ* Duby, *Pulmonaria officinalis* L. f. *albiflora* (Tausch) Beck, *Thalictrum foetidum* var. *foetidum* и *Veronica prostrata* L. f. *albiflora* J. Keller. Обнародованы два заменяющих названия: *Stipa moraldoi* Pînzaru nom. nov. и *Viola danielae* Pînzaru nom. nov.

Ключевые слова: *Aconitum*, *Anthriscus*, *Astragalus*, *Bromopsis*, *Campanula*, *Carduus*, *Centaurea*, *Chaerophyllum*, *Glaucium*, *Iris*, *Orobanche*, *Pulmonaria*, *Stipa*, *Thalictrum*, *Veronica*, *Viola*, новые разновидности и формы, флористические находки, Республика Молдова, Пьемонт, Италия.

В статье представлены результаты флористических исследований, проведенных нами на территории Республики Молдова и области Пьемонт в Италии и изучения материалов Гербариев Ботанического сада (института) в Кишиневе (CHIS) и Гербария Департамента биологии растений Университета Турина (TO-HG). Гербарный материал, собранный нами по приведенным в статье таксонам, хранится в собственной коллекции в Кишиневе (CHIS-PP), изотипы и паратипы некоторых новых таксонов, а также дубликаты новых находок будут передаваться в Гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE).

1. Об *Astragalus vesicarius* L.

Astragalus vesicarius L. 1753, Sp. Pl.: 760. — Полукустарничек 15–30 см выс. Листочки листьев эллиптические, опушенные. Чашеч-

ки при плодоношении яйцевидно вздутые, с треугольными неравными зубцами (2–3 до 4 мм), обычно опушенные белыми и черными волосками. Флаг 20–22 мм дл. Бобы оттопыренно-беловолосистые, немного превышающие по длине чашечку.

Полиморфный по окраске венчика и волосков вид, в пределах которого мы предлагаем выделить три разновидности:

a. var. **vesicarius**. — *Astragalus albidus* Waldst. et Kit. 1800, Descr. Icon. Pl. Hung. 1: 39. — Венчик двухцветный: флаг пурпурный, лодочка и крылья беловатые. Волоски чашечки белые с примесью черных.

Распространение и местообитание. Понтическо-средиземноморский таксон, в Молдове встречается только в долине р. Реут (правого притока Днестра). Произрастает на известняково-каменистых склонах, в травянистых сообществах, характерен для союза *Genisto tetragonae* — *Seselion peucedanifolii*.

b. var. **pseudoglaucus** (Klokov) Pinzaru comb. et stat. nov. — *Astragalus pseudoglaucus* Klokov, 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15: 152. — *A. vesicarius* L. subsp. *pseudoglaucus* (Klokov) Beldie, 1977, Fl. Român. determ. 1: 412. — Венчик желтоватый. Волоски на чашечке белые с примесью черных и желтых.

Распространение и местообитание. Западнопонтический таксон, встречается в Румынии, Молдове и Украине (Beldie, 1977; Гейдеман, 1975; Крицкая, 1987); в Молдове встречается только на левобережье Днестра. Произрастает на известняково-каменистых и песчано-глинистых склонах, в травянистых сообществах, характерен для союза *Genisto tetragonae* — *Seselion peucedanifolii*.

c. var. **angelicae** Pinzaru var. nova. — A var. *vesicarius* corolla alba, nec bicolor differt. — От var. *vesicarius* отличается беловатым, а не двухцветным венчиком. — Рис. 1.

Typus: «Moldova, comuna Prodăneștii Vechi distr. Florești, collibus calcareus, 47°43.560' lt., 28°24.794' lg. or. (GPS notitiae), alt. 74 m s. m., 28 IV 2009, P. Pinzaru» (CHIS-PP).

Distributio. Sporadicus, districtis: Florești (Prodănești, Prodăneștii Vechi), Telenești (Ordășei), Orhei (Orhei, Trebugeni), Municipiul Chișinău (Făurești).

Nomen in memoriam Angela Verdeș (comune Cuhureștii de Sus, distr. Florești) nominatur.

Тип: «Молдова, село Старые Продэнешты Флорештского района, известняковый склон, 47°43.560' с. ш., 28°24.794' в. д. (данные GPS), 74 м над ур. м., 28 IV 2009, П. Пынзару» (CHIS).



Рис. 1. *Astragalus vesicarius* L. var. *angelicae* Pinzaru.

Распространение и местообитание. Молдова, Флорештский (сс. Продэнешть, Старые Продэнешты), Теленештский (с. Ордашены), Оргеевский (г. Оргеев, с. Требужены), Кишиневский (с. Фэурешты) районы. Ксерофит, рассеянно произрастает на известняково-каменистых склонах в долинах притоков правобережья Днестра: Реут, Икель и Черна; характерен для союза *Genisto tetragonae* — *Seselion peucedanifolii*.

Таксон назван в память моей ученицы Анжелы Вердеш (с. Верхние Кугурешты Флорештского р-на).

2. О *Thalictrum foetidum* L.

Thalictrum foetidum L. 1753, Sp. Pl.: 545.

Полиморфный вид, в пределах которого мы предлагаем выделить две разновидности:

a. var. *foetidum*. — Растение 20–70 см выс. Прикорневые листья до 10–15 см дл. Конечные сегменты листьев почти яйцевидные, 3–8 мм дл., 2–6 мм шир., неравномерно тупозубчатые.

Распространение и местообитание. Евразийский горно-альпийский вид; произрастает иногда и ниже — на каменистых склонах долин рек. Для Молдовы приводится впервые: природный памятник «Стынка Наславчя» (на скалах близ с. Наславчя Окницко-



Рис. 2. *Thalictrum foetidum* L. var. *delponteanum* Pinzaru.

го р-на) (2 VII 1996, П. Пынзару — CHIS, CHIS-PP). Возможно, этот вид проник из Карпат.

b. var. **delponteanum** Pinzaru var. nova. — Caulis 100–225 cm altus. Folia radicalia 45 cm lg., 56 cm lt., segmentis 22–28 mm lg. et lt., apice grosse crenato-dentatis; folia superiora segmentis 10–18 mm lg., apice acuto-dentatis. — Растение 100–225 см выс. Прикорневые листья до 45 см дл. и 56 см шир.; конечные листовые сегменты 22–28 мм дл. и шир., тупозубчатые; верхние листья более короткие, их конечные сегменты 10–18 мм дл., на верхушке острозубчатые. Плоды 3 мм дл. — Рис. 2.

Typus: «Italia, radure in parco Miraflores, valli fl. Sangone, prope comune Nichelino, prov. Torino, 45°00.555' lt., 07°37.976' lg. (GPS notatione), 229 m s. m., 12 VI 2011, Pinzaru» (CHIS-PP, isotypus — LE). — Paratypus: Ibid., leg. G. B. Delponte saeculo XIX (TO-HG).

Distributio. Taxon solum in loco classico cognitum.

Nomen in memoriam botanici Giovanni Battista Delponte (1812–1884), qui planta in parco Miraflores collegit.

Тип: «Италия, лесные поляны в парке Мирафлорес, в долине притока Сангоне, вблизи города Никелино, провинция Турин, 45°00,555' с. ш., 07°37,976' в. д. (данные GPS), 229 м над ур. м., 12 VI 2011, Пынзару» (CHIS-PP, изотип — LE). — Паратип: Там же, собр. в XIX в. G. B. Delponte (TO-HG).

Распространение и местообитание. Таксон известен только из типового местонахождения. Произрастает на полянах в пойменном лесу.

Название дано в память итальянского ботаника Giovanni Battista Delponde (1812–1884), который впервые собрал растение этой разновидности в парке Мирафлорес.

3. Новые формы *Campanula glomerata* L. и *Iris aphylla* L.

***Campanula glomerata* L. var. *cervicarioides* (Schult.) Pinzaru f. *xeniae* Pinzaru et A. Ruschuk forma nova.** — A f. *cervicarioides* differt corolla alba, nec violacea. — От f. *cervicarioides* отличается белой, а не сиреневой окраской венчика. — Рис. 3.



Рис. 3. *Campanula glomerata* L. var. *cervicarioides* (Schult.) Pinzaru f. *xeniae* Pinzaru et A. Ruschuk.

Typus: «Moldova, ad meridiem Grigoriopol, in collibus calcareis, 12 VI 2005, P. Pînzaru, A. Ruschuk» (CHIS-PP).

Distributio. Taxon solum in loco classico cognitum.

In honorem botanici Ksenia Vitko (Chişinău) nominatur.

Тип: «Молдова, южнее города Григориополя, на известняковом склоне, 12 VI 2005, П. Пынзару, А. Рушук» (CHIS-PP).

Распространение и местообитание. Таксон известен только из типового местонахождения. Ксерофит, рассеянно произрастает совместно с типичной формой на среднесарматских известняках, характерен для ассоциации *Sileno supinae* — *Pimpinellietum tragii*.

Таксон назван в честь кишиневского ботаника Ксении Витко.

***Iris aphylla* L. f. *iulitae* Pînzaru forma nova.** — A forma typica corolla atrovioacea, nec violacea differt. — От типовой формы отличается темно-фиолетовой, а не фиолетовой окраской венчика. — Рис. 4.

Typus: «Moldova, villag. Târgul Vertiujeni, distr. Floreşti, 48°01.482' lt., 28°32.063' lg. (GPS “Gecko 301” notitiae), alt. 63 m s. m., ass. Vinco hederaceae — Iridetum aphyllae, 29 IV 2009, P. Pînzaru» (CHIS-PP).

Distributio. Moldova: commune Târgul Vertiujeni, distr. Floreşti; commune. Ciorescu prope Chişinău.



Рис. 4. *Iris aphylla* L. f. *iulitae* Pînzaru.

Nomen in honorem eruditi geografici Iulita Russu (Universita nomine T. G. Shevčenko in Tiraspol) nominatur.

Тип: «Молдова, село Тыргул-Вертюжень Флорештского р-на, 48°01.482' с. ш., 28°32.063' в. д. (данные GPS “Gecko 301”), 63 м над ур. м., лесные поляны в лесу из *Quercus pubescens* + *Cerasus mahaleb*, 29 IV 2009, П. Пынзару» (CHIS-PP).

Распространение и местообитание. В Молдавии эта форма отмечена нами вблизи с. Тыргул-Вертюжень Флорештского р-на и около с. Чореску близ Кишинева. Произрастает совместно с типичной формой на крутых каменистых склонах рек Днестр и Икель, характерен для ассоциации *Vinco hederaceae* — *Iridetum aphyllae*.

Таксон назван в честь географа Иулиты Руссу (Приднестровский университет им. Т. Г. Шевченко, Тирасполь).

4. Новые флористические находки в Республике Молдова

Aconitum eulophum Rchb. 1819, Uebers. *Aconitum*: 15. — *A. anthora* auct. non L.: Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. Молд. ССР, изд. 3: 207.

Обнаружен в Окницком (сс. Климэуць, Наславча, Савка), Бричанском (сс. Баласинешть, Беявинцы, Котюжаны), Единецком (сс. Фетешть, Почумбень, Русень), Дондюшанском (с. Редю-Маре), Сорокском (с. Тэтэрзука Веке), Рышканском (сс. Боросений Ной, Пыржота, Рышкань), Флорештском (Вертюжаны), Сынжерейском (с. Рэдоая), Шолданештском (с. Шестачь) и Каменском (г. Каменка, с. Рашково) районах (CHIS, CHIS-PP). Произрастает на лесных полянах, среди кустарников на каменистых склонах Днестра и Прута.

Указан для сопредельных областей Украины (Besser, 1822; Морозюк, 1987; Термена та ін., 1992).

Отличается от *A. anthora* L. осью соцветия, цветоножками и околоцветниками, опушенными короткими курчавыми волосками (а не короткими курчавыми и отстоящими волосками), и шлемом равной длины и ширины — 15–18 мм (а не 7.5–10 мм дл. и 15 мм шир.). — Рис. 5.

Anthriscus longirostris Bertol. 1837, Fl. Ital. 3: 197. — *A. cerefolium* auct. non (L.) Hoffm.: Гейдеман, 1986, Опред. высш. раст. Молд. ССР, изд. 3: 392.

Встречается рассеянно во всех районах Молдовы (CHIS, CHIS-PP). Произрастает вдоль дорог, в разреженных лесах.

Известен с сопредельной территории Украины (Котов, 1987: 229).




Рис. 5. Различия *Aconitum anthora* L. (1) и *A. eulophum* Rchb. (2).

У *A. longirostris*, в отличие от *A. cerefolium* (L.) Hoffm., стебель 1–1.5 мм в диам. (а не 4–5 мм), цветоносы 6–8 мм дл. (а не 3–4 мм), плоды 7–9 мм дл. (а не до 7.5 мм) со щетинками на бугорках (а не голые и гладкие), стилодии 1 мм дл. (а не 0.5 мм). — Рис. 6.

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 1869, Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 17: 187. — *Bromus erectus* Huds. 1762, Fl. Angl.: 39.

Обнаружен в Флорештском (сс. Кэпрештъ, Домулжень, Продэнешть, 17 VII 2009; сс. Кашунка, Рошиетичий Векъ, 21 V 2009), Теленештском (сс. Ордэшень, Пиструень, 20 V 2009), Ореевском (сс. Пэхэрничень, Пятра, 12 V 2009) и Резинском (сс. Сахарна, Бичушка × Ципова, 19 V 2009) районах (CHIS-PP). Произрастает на известняково-каменистых склонах, маломощных карбонатных черноземах, характерен для союзов *Genisto tetragonae* — *Seselion peucedanifolii* и *Festucion valesiacaе*.

Т. Săvulescu и Т. Rayss (1924) вид был указан для окрестностей приграничного с Молдовой села Колачивка Тарутинского р-на Одесской обл., но в «Определителе...» Т. С. Гейдеман (1975) он не приведен.




Рис. 6. Плоды *Anthriscus longirostris* Bertol. (1)
и *A. cerefolium* (L.) Hoffm. (2).

***Carduus acanthoides* L. f. *albiflorus* Schur.**

Отмечен на известняках в долине Реута близ с. Штефэнешть Флорештского р-на (17 VII 2009) (CHIS-PP).

***Centaurea orientalis* L. f. *rubescens* (DC.) Pinzaru comb. et stat. nov. — *Centaurea rubescens* DC. 1838, Prodr. 6: 587.**

Очень редко встречается совместно с типовой формой, от которой отличается краснеющими (а не желтыми) цветками, на лесных полянах в долине Днестра в Сорокском (с. Рудь, 13 VI 1988) и Каменском (с. Рашково, 17 VI 1989) районах (CHIS-PP).

***Chaerophyllum nodosum* (L.) Crantz, 1767, Cl. Umbell. Emend.: 76. — *Scandix nodosa* L. 1753, Sp. Pl.: 257. — *Physocaulis nodosus* (L.) Tausch, 1834, Flora (Regensb.), 16: 342. — *Myrrhoides nodosa* (L.) Canon, 1968, Feddes Repert, 79: 65, id. 1968, in Fl. Europ. 2: 324.**

Отмечен в заповеднике «Сэрата Галбенэ» близ с. Брэтяновка Хынчештского р-на (3 VII 2009) (CHIS-PP). Ксеромезофит, произрастает обильно под пологом леса в сообществе *Cotino — Quercetum pubescentis*.

Средиземноморский вид, приводится для флоры Румынии (Ciocârlan, 2000; Chifu et al., 2006).

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph var. ***tricolor*** (Bernh. ex Besser) Ledeb. 1842, Fl. Ross. 1: 93. — *G. tricolor* Bernh. ex Besser, 1822, Enum. Pl.: 69.

Обнаружен в Глодянском (с. Душмань, опред. Т. Гейдеман как *G. corniculatum*), Флорештском (сс. Кэпрешть, Продэнешть, 17 VII 2009, Пынзару), Теленештском (с. Ордашей, 17 VII 2009, Пынзару), Сынжерейском (с. Рэдоая, 11 VIII 1948, собр. и опред. В. Андреев как *G. corniculatum*), Резинском (с. Сахарна, 8 VIII 1947, собр. и опред. В. Андреев как *G. corniculatum*), Унгенском (с. Костулень, опред. Т. Гейдеман как *G. corniculatum*), Новоаненском (с. Рошкань, 15 VII 1950, собр. В. Морару, опред. Т. Гейдеман как *G. corniculatum*), Кишиневском (г. Кишинев, с. Будешть, опред. Т. Гейдеман как *G. corniculatum*), Тараклийском (с. Софиевка, опред. Т. Гейдеман как *G. corniculatum*), Дубоссарском (с. Калиновка, 14 IX 1948, собр. М. Тымко, опред. Т. Гейдеман как *G. corniculatum*) и Григориопольском (с. Бычок, 1989, собр. и опред. Пынзару как *G. corniculatum*) районах (CHIS, CHIS-PP). Произрастает вдоль полей, на сорных местах, на каменистых склонах с деградированным травостоем, характерен для фитоценозов класса *Stellarietea mediae*.

Понтическо-среднеевропейский таксон, известный из Румынии и Украины (Besser, 1822; Săvulescu, Rayss, 1924; Borza, 1947).

От типовой разновидности отличается лепестками 10–16(25) мм дл. (а не 25–40 мм), по краю желтыми, в середине красноватыми, при основании с черным пятном (а не красными с черным пятном при основании).

Orobanche hederæ Duby, 1828, Bot. Gall. 1: 350.

Найден в заповеднике «Ципова» близ одноименного села Резинского р-на (21 VI 2009, Пынзару — CHIS-PP). Паразитирует на *Hedera helix* L.

Pulmonaria officinalis L. f. ***albiflora*** (Tausch) Beck.

Обнаружен в заповеднике «Рудь-Арионешть» (квартал № 20) близ с. Арионешть Дондюшанского р-на (20 V 1992) (CHIS-PP). Произрастает под пологом леса в сообществе *Ulmo — Fraxinetum*.

Veronica prostrata L. f. *albiflora* J. Keller.

Несколько экземпляров отмечено между селами Вэрвэреука и Стырчень Флорештского р-на (1 V 2009, Пынзару — CHIS-PP). Произрастает на известняково-каменистом склоне в сообществе *Teucrii pannonicі* — *Caricetum humilis*.

Предлагаем включить в список охраняемых видов флоры Молдовы *Aconitum eulophum* Rechb. (категория редкости VU), *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr. (VU), *Chaerophyllum nodosum* (L.) Crantz (EN), *Orobanche hederæ* Duby (DD) и *Thalictrum foetidum* L. (CR).

5. Номенклатурные новации

Поскольку названия двух таксонов, обнаруженных нами ранее, оказались поздними омонимами, мы обнарудуем для них заменяющие названия.

Stipa moraldoi Pinzaru nom. nov. — *Stipa montana* (Moraldo) Pinzaru, 2012, Новости сист. высш. раст. 43: 99, nom. illeg., non Phil. 1896, Anales Univ. Chile, 93: 723. — *S. epilosa* Martinovsky subsp. *montana* Moraldo, 1986, Webbia, 40(2): 258.

Viola danielae Pinzaru nom. nov. — *Viola mariae* Pinzaru, 2012, Новости сист. высш. раст. 43: 95, nom. illeg., non W. Becker, 1916, Feddes Repert. 14: 322.

Taxon in honorem meae filiae Daniela Pinzaru nominatur.

Автор выражает благодарность редакторам издания за помощь при подготовке работы и Д. Пынзару за выполненные рисунки к статье.

Литература

Гейдеман Т. С. Определитель высших растений Молдавской ССР. 2-е изд. Кишинев, 1975. 576 с.; 3-е изд. Кишинев, 1986. 638 с. — Котов М. И. Семейство зонтичные — *Apiaceae* // Определитель высших растений Украины. Киев, 1987. С. 225–239. — Крицкая Л. И. Род астрагал — *Astragalus* // Определитель высших растений Украины. Киев, 1987. С. 193–197. — Морозюк С. С. Семейство лютиковые — *Ranunculaceae* // Определитель высших растений Украины. Киев, 1987. С. 46–53. — Термена В. К., Стефаник В. І., Серпокрилова Л. С. та ін. Конспект флори Північної Буковини (судинні рослини). Чернівці, 1992. 227 с. — Beldie A. Flora României: determinator ilustrat al plantelor vasculare. București, 1977. Vol. 1. 412 p. — Besser W. S. J. G. Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, gub. Kiioviensi, Bessarabia, cis-Tyraica... Vilnae, 1822. 111 p. — Borza A. Conspectus florae României. Regionumque affinum. Cluj-Napoca, 1947. 360 p. —

Chifu T., Mânzu C., Zamfirescu O. Flora și vegetația Moldovei (România). Vol. 1. Iași, 2006. 373 p. — Ciocârlan V. Flora ilustrată a României. *Pterodophyta* et *Spermatophyta*. 2nd ed. București, 2000. 1138 p. — Săvulescu T., Rayss T. Materiale pentru flora Basarabiei. Partea I-a. București, 1924. 80 p. (Supliment la «Buletinul Agriculturii». Vol. 2).

Summary

A new variety *Astragalus vesicarius* L. var. *angelicae* Pinzaru var. nova and two new forms *Campanula glomerata* L. var. *cervicarioides* (Schult.) Pinzaru f. *xeniae* Pinzaru et A. Ruschuk forma nova and *Iris aphylla* L. f. *iulitae* Pinzaru forma nova are described from the Republic of Moldova; a new variety *Thalictrum foetidum* L. var. *delponteanum* Pinzaru var. nova is described from Italy. Two new combinations *Astragalus vesicarius* var. *pseudoglaucus* (Klokov) Pinzaru comb. et stat. nov. and *Centaurea orientalis* L. f. *rubescens* (DC.) Pinzaru comb. et stat. nov. are published. 11 taxa are cited as new to the Republic of Moldova: *Aconitum eulophum* Rchb., *Anthriscus longirostris* Bertol., *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr., *Carduus acanthoides* L. f. *albiflorus* Schur, *Centaurea orientalis* f. *rubescens*, *Chaerophyllum nodosum* (L.) Crantz, *Glaucium corniculatum* (L.) Rudolph var. *tricolor* (Bernh. ex Besser) Ledeb., *Orobanche hederæ* Duby, *Pulmonaria officinalis* L. f. *albiflora* (Tausch) Beck, *Thalictrum foetidum* var. *foetidum* and *Veronica prostrata* L. f. *albiflora* J. Keller. Two nomina nova are published: *Stipa moraldoi* Pinzaru nom. nov. and *Viola danielae* Pinzaru nom. nov.

Keywords: *Aconitum*, *Anthriscus*, *Astragalus*, *Bromopsis*, *Campanula*, *Carduus*, *Centaurea*, *Chaerophyllum*, *Glaucium*, *Iris*, *Orobanche*, *Pulmonaria*, *Stipa*, *Thalictrum*, *Veronica*, *Viola*, new varieties and forms, floristic records, Republic of Moldova, Piedmont, Italy.