Г. А. Лазьков **G. Lazkov**

НОВЫЙ ВИД РОДА DELPHINIUM L. (RANUNCULACEAE) ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

A NEW SPECIES OF THE GENUS DELPHINIUM L. (RANUNCULACEAE) FROM KYRGYZSTAN

Биолого-почвенный институт НАН Кыргызстана, лаборатория флоры
Кыргызстан, 720071, Бишкек, проспект Чуй, 265
glazkov1963@mail.ru

Из Кыргызстана описан новый вид *Delphinium ferganicum* Lazkov sp. nova. Показаны его отличия от близкого вида *D. nikitinae* Pachom.

Ключевые слова: *Delphinium*, новый вид, Кыргызстан.

В 2006 г. проводилось исследование флоры гор Баубаш-Ата, расположенных в северной части системы Ферганского хребта. Наряду с другими материалами нами были собраны образцы вида *Delphinium* L., в изобилии произраставшего на известняковых склонах. Сравнение этих растений с уже известными видами рода, распространенными в Кыргызстане, показало, что они относятся к новому для науки виду, который описывается ниже.

Delphinium ferganicum Lazkov sp. nova. — Perennial. Caudex covered with the remains of last year leaves and stems. Stem 40–60 cm tall, simple or branching from the middle, sparsely pubescent with rather long, deflected or down directed hairs. Basal leaves few, blade with a wide excavation at the base, usually pentagonal in outline, 3.5–7 cm long, 6–12 cm wide, to the middle or slightly deeper divided into five lobes, at the top toothed or short-bladed, on the upper side green, with sparse hairs, on the inferior side paler, with denser hairs especially along the veins, petioles pubescent like stems, about 3 times longer than blade; upper stem leaves 3–6 cm long, 6–12 cm wide, with a wide excavation at the base, blade up to ¾ dissected into three unequal lobes which are toothed on the top, petiole short; uppermost stem leaves with blade 2–5 cm long, toothed or lobed, sessile or on a short petiole. Flowers in racemes at the top of the stem, on arcuate branches 5–8 cm long, or uppermost flowers aggregated in a «corymb». Bracts 1–2 cm long, lanceolate, sessile. Bracteoles 0.5–1 cm long, lanceolate, opposite or slightly distant, often membranous, pubescent with short non-glandular hairs. Pedicels 0.5–2 cm long, covered with short, non-glandular, usually downward directed hairs. Perianth leaves violet-blue, obovate or broadly obovate, 1.5–1.8 cm long, 0.7–1 cm wide, with

rather short hairs on the outside, the upper ones with a spur 1.2–1.8 cm long, often curved at the end. Nectaries blackish, margin with long hairs. Filaments slightly hairy. Ovaries 3, shortly densely pubescent.

Type: «[Kyrgyzstan] Fergana Mt. Range, Baubash-Ata Mts., alt. about 2800 m, on rocks, 41°24′ N, 72°58′ E, 7 VIII 2006, G. A. Lazkov» (LE; isotypes — ALTB, FRU, MW). — Plate I.

Affinity. The new species differs from *D. nikitinae* Pachom. in larger, thin, pubescent leaves and leafy stems.

Многолетник. Каудекс покрыт остатками листьев и прошлогодних стеблей. Стебель 40–60 см выс., простой или от середины ветвящийся, негусто опушенный довольно длинными, отклоненными или вниз направленными волосками. Прикорневые листья с пластинкой в основании с широкой выемкой, в очертании обычно пятиугольной, 3.5–7 см дл., 6–12 см шир., до середины или несколько глубже разделенной на пять лопастей, на верхушке зубчатых или коротколопастных, на верхней стороне зеленой, с редкими волосками, снизу более светлой, с довольно густыми, особенно по жилкам, волосками, на черешках, опушенных подобно стеблю, примерно в 3 раза превышающих по длине пластинку; верхние стеблевые листья с пластинкой 3–6 см дл., 6–12 см шир., в основании с широкой выемкой, до ¾ рассеченной на три неравные, на верхушке зубчатые лопасти, на более коротком черешке; самые верхние листья с пластинкой 2–5 см дл., зубчатой или лопастной, сидячие или на коротком черешке. Цветки в кистевидном соцветии на верхушке стебля на дуговидно отогнутых веточках 5–8 см дл., или верхние цветки собраны в «щиток». Прицветные листья 1–2 см дл., ланцетные, сидячие. Прицветнички 0.5–1 см дл., ланцетные, супротивные или слегка расставленные, часто пленчатые, опушенные короткими нежелезистыми волосками. Цветоножки 0.5–2 см дл., опушенные короткими, нежелезистыми, обычно вниз направленными волосками. Листочки околоцветника фиолетово-синие, обратнояйцевидные или широко-обратнояйцевидные, 1.5–1.8 см дл., 0.7–1 см шир., снаружи опушенные довольно короткими волосками, верхние со шпорцем 1.2–1.8 см дл., на конце часто изогнутым. Нектарники черноватые, по краю с длинными волосками. Нити тычинок слабо волосистые. Завязи 3, коротко и густо опушенные.

Тип: «[Кыргызстан] Ферганский хребет, горы Баубаш-Ата, h ~ 2800 м, скалы, 41°24′ N, 72°58′ E, 7 VIII 2006, Г. А. Лазьков» (LE; изотипы — ALTB, FRU, MW). — Табл. I.

Родство. От *D. nikitinae* Pachom. отличается более крупными, тонкими и опушенными листьями и облиственными стеблями.

По-видимому, является эндемичным видом, произрастающим в северной части Ферганского хребта.

Summary

A new species *Delphinium ferganicum* Lazkov sp. nova is described from Kyrgyzstan. Its differences from a related species *D. nikitinae* Pachom. are given.

K e y w o r d s : *Delphinium*, new species, Kyrgyzstan.