В. М. Васюков **V. Vasjukov**

THYMUS × *TZVELEVII* VASJUKOV (*LAMIACEAE*) — НОВЫЙ НОТОВИД ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

THYMUS × *TZVELEVII* VASJUKOV (*LAMIACEAE*), A NEW NOTHOSPECIES FROM EUROPEAN RUSSIA

Институт экологии Волжского бассейна РАН
Лаборатория проблем фиторазнообразия
Россия, 445003, Тольятти, ул. Комзина, 10
vvasjukov@yandex.ru

Из Европейской России описывается *Thymus* × *tzvelevii* Vasjukov, происходящий от гибридизации *T. dubjanskyi* Klokov et Des.-Shost. (секция *Subbracteati* Klokov) и *T. marschallianus* Willd. (секция *Verticillati* Klokov).

Ключевые слова: *Thymus*, гибрид, нотовид, новый таксон, Европейская Россия.

Род *Thymus* L. во флоре России включает около 125 достаточно дифференцированных в морфологическом отношении, приуроченных к определенным экологическим условиям и обладающих вполне очерченными ареалами видов (Клоков, 1954, 1973).

В степной зоне Среднего Поволжья обнаружен тимьян со своеобразными морфологическими признаками, промежуточными между такими далекими друг от друга видами, как *T. dubjanskyi* Klokov et Des.-Shost. (эндемик Среднего Поволжья) из секции *Subbracteati* Klokov и *T. marschallianus* Willd. из секции *Verticillati* Klokov. Считаем его происходящим от гибридизации этих видов и приводим его описание под бинарным названием, данным в честь выдающегося российского ботаника Николая Николаевича Цвелёва.

Thymus × tzvelevii Vasjukov, nothosp. nova (*T. dubjanskyi* Klokov et Des.-Shost. × *T. marschallianus* Willd.). — Suffruticulus; trunculi 2–10 cm longi, 1–2 mm diam., caulis florifero terminati. Ramuli floriferi ascendentes 5–12 cm alti, sub inflorescentiam pilis subpatentibus ca. 1 mm longis dense pubescentes, caulibus in partibus media et inferiore pilos deorsum directi ca. 0.5 mm longis gerunt. Folia linearioblonga 5–15 mm longa, 1.5–3(4) mm lata, subsessilia, basi cuneata, apice obtusiuscule acutata, utrinque glabra, grandulis punctatis distinctis, margine basi ciliata. Inflorescentia interrupta breviuscula 1.5–5 cm longa, verticillastri infimis 1–3 dissitis; pedicelli 1.5–4 mm longi; calyx tubuloso-campanulatus 2–3.5 mm longus, plerumque violaceus, tubo squarroso-piloso, dentibus labii superioris lanceolati, margine longiciliati;

corolla ca. 5 mm longa, roseolo-lilacina. Floret VI–VII. — Полукустарничек; деревянистые стволики 2–10 см дл., 1–2 мм в диам., заканчивающиеся цветоносным побегом. Цветоносные побеги 5–12 см выс., приподнимающиеся, под соцветием густо опушены полуоттопыренными волосками ок. 1 мм дл., в средней и нижней части стебля покрыты вниз прижатыми волосками ок. 0.5 мм дл. Листья линейно-продолговатые, 5–15 мм дл., 1.5–3(4) мм шир., почти сидячие, с клиновидным основанием и туповато заостренной верхушкой, с обеих сторон голые, с хорошо заметными точечными железками, по краю у основания с ресничками. Соцветие довольно короткое, 1.5–5 см дл., прерванное, с 1–3 отодвинутыми нижними мутовками; цветоножки 1.5–4 мм дл.; чашечка трубчато-колокольчатая, 2–3.5 мм дл., обычно фиолетовая, трубка оттопыренно-волосистая, зубцы верхней губы чашечки ланцетные, по краю длиннореснитчатые; венчик около 5 мм дл., розовато-лиловый. Цв. VI–VII.

Holotypus (голотип): «Regio Saratoviensis, prope opp. Volsk, in declivibus steppaceis, 6 VII 1968, Ju. Menitsky». — «Саратовская обл., бл. г. Вольска, степные склоны, 6 VII 1968, Ю. Меницкий» (LE 01013875; iso (fragm. typi) — PVB).

Paratypi (3): «Саратовская обл., Хвалынский р-н, окр. с. Елшанка, нац. парк “Хвалынский”, меловые обнажения, 30 VI 2007, В. Васюков, Н. С. Раков, А. Иванова, О. Савенко, С. Сенатор» (PVB).

Affinitas (родство). A *T. marschallianus* Willd. trunculis elongatis, caulibus sub inflorescentia pilis subsquarrosis obtecta, inflorescentiis abbreviatis, calycibus violaceis diversum est; a *T. dubjanskyi* Klokov et Des.-Shost. foliis subsessilibus, inflorescentiis ramificatis, dentibus labii calycis superioris margine longiciliatis. — Отличается от *T. marschallianus* Willd. удлиненными стволиками, побегами, покрытыми под соцветием полуоттопыренными волосками, укороченными соцветиями, фиолетовой чашечкой; от *T. dubjanskyi* Klokov et Des.-Shost. — почти сидячими листьями, разветвленными соцветиями, длиннореснитчатыми по краю зубцами верхней губы чашечки.

Описываемый нотовид приурочен к меловым обнажениям центральной части Приволжской возвышенности.

Автор благодарит за ценные консультации Н. Н. Цвелёва, М. С. Князева, С. В. Саксонова, И. В. Соколову, А. П. Сухорукова, И. В. Татанова.

Работа частично выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-04-97072).

Литература

Клоков М. В. Род Тимьян — *Thymus* L. // Флора СССР. Т. 21. М.; Л., 1954. С. 470–590.

Клоков М. В. Расообразование в роде тимьянов — *Thymus* L. — на территории Советского Союза. Киев, 1973. 190 с.

Summary

A new nothospecies *Thymus* × *tzvelevii* Vasjukov is described from European Russia. Its postulated parent species are *T. dubjanskyi* Klokov et Des.-Shost. (sect. *Subbracteati* Klokov) and *T. marschallianus* Willd. (sect. *Verticillati* Klokov).

K e y w o r d s : *Thymus*, hybrid, nothospecies, new taxon, European Russia.