SAXIFRAGA NIVALIS L. (*SAXIFRAGACEAE*) — НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Ю. Доронина

ул. Стремянная, д. 14, кв. 4, Санкт-Петербург, 191025, Россия
baccador@mail.ru

В статье приведены сведения о находке *Saxifraga nivalis* L. в Ленинградской области. Ранее вид приводился для Ленинградской области ошибочно. Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области.

Ключевые слова: Ленинградская область, новый вид для флоры, Красная книга Ленинградской области.

В результате инвентаризации флоры планируемой к созданию ООПТ регионального значения «Карельский лес», расположенной на севере Карельского перешейка на границе с Финляндией, автором был найден новый для Ленинградской области вид — *Saxifraga nivalis* L.

Местонахождение: 61°06.064′ с. ш., 29°06.933′ в. д., Выборгский р-н, примерно в 12 км к северо-востоку от пос. Лесогорский, планируемая ООПТ «Карельский лес», средняя часть высокой отвесной скалы, обращенной к сев.-вост. берегу оз. Ворошиловское, 24 VI 2015 (гербарный образец в LE). Обнаружен 1 экземпляр в стадии плодоношения и 12 вегетативных розеток на площади не более 1 кв. м (табл. I). На этой же скале найдены и другие редкие в Ленинградской области виды — *Asplenium trichomanes* L. и *Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.

Ранее *S. nivalis* указывался для Ленинградской области лишь по литературным данным на берегах и островах Ладожского озера на границе с Карелией (Sokolovskaya, 1957; Dobryakov, 1981; Tzvelev, 2000; Sennikov, 2006). Это указание основано исключительно на неправильном толковании данных монографии I. Hiitonen (1946). Hiitonen — финский исследователь флоры Карельского перешейка в период, когда большая его часть входила в состав Финляндии, — под территорией Карельского перешейка подразумевал в том числе берега и острова Ладожского озера, в настоящее время административно входящие в состав Республики Карелия. В LE, LECB, H, HEL, KUO, OULU, TMP, TUR, TURA, S гербарные образцы *S. nivalis* с территории Карельского перешейка в современных границах Ленинградской области нами обнаружены не были. В связи с этим ранее мы (Doronina, 2007) *S. nivalis* рассматривали в числе видов, ошибочно приводи-

мых для Карельского перешейка, и видов, местонахождения которых сомнительны.

Вид произрастает в основном в зоне тундры и в Ленинградской области находится на южной границе ареала. Ближайшие местонахождения — северо-восточная Финляндия, где *S. nivalis* также встречается редко (Moosberg et al., 1995; Mäkinen, Hämet-Ahti, 1998), и Приладожский флористический район Карелии, где вид произрастает довольно редко (Kravchenko, 2007).

В 2015 г. при подготовке переиздания Красной книги Ленинградской области *S. nivalis* рекомендован к занесению в нее с категорией статуса редкости CR — вид, находящийся на грани полного исчезновения.

Литература

Dobryakov P. M. 1981. Sem. *Saxifragaceae* Juss. — Kamnelomkovye [Fam. *Saxifragaceae* Juss. — Saxifrage Family] // Opredelitel vysshikh rastenii Severo-Zapada evropeiskoi chasti RSFSR (Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti) [Guide to the higher plants of the North-West of the European part of the RSFSR (Leningrad, Pskov and Novgorod Regions)] / N. A. Minyaev (ed.). Leningrad: Leningrad University. P. 206–207. [In Russian] (Добряков П. М. 1981. Сем. *Saxifragaceae* Juss. — Камнеломковые // Определитель высших растений Северо-Запада европейской части РСФСР (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) / Под ред. Н. А. Миняева. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. С. 206–207).

Doronina A. Yu. 2007. Vascular plants of the Karelian Isthmus (Leningrad Region). Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 574 p. [In Russian with English abstract] (Доронина А. Ю. 2007. Сосудистые растения Карельского перешейка (Ленинградская область). М.: Т-во науч. изд. КМК. 574 с.).

Hiitonen I. 1946. Karjalan kannas kasvien vaellustienä lajien nykylevinneisyyden vallosa // Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo. Vol. 22, № 1. 206 s.

Kravchenko A. V. 2007. A compendium of Karelian flora (vascuar plants). Petrozavodsk: Karelskii nauchnyi tsentr RAN. 403 p. [In Russian with English abstract] (Кравченко А. В. 2007. Конспект флоры Карелии. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН. 403 с.).

Moosberg B., Stenberg L., Ericsson L. 1995. Den Nordiska Floran. Turnhout: Wahlström & Widstrand. 696 s.

Mäkinen Y., Hämet-Ahti L. 1998. *Saxifragaceae* — rikkokasvit // Retkeilykasvio = Field Flora of Finland. 4th ed. / Eds. L. Hämet-Ahti, J. Suominen, T. Ulvinen, P. Uotila. Helsinki: Kasvimuseo. P. 226–230.

Sennikov A. N. 2006. Sem. *Saxifragaceae* Juss. — Kamnelomkovye [Fam. *Saxifragaceae* Juss. — Saxifrage Family] // Illyustrirovannyi opredelitel rastenii Leningradskoi oblasti [Illustrated guide to the plants of the Leningrad Re-

gion] / Eds. A. L. Budantsev, G. P. Yakovlev. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 272–273. [In Russian] (Сенников А. Н. 2006. Сем. *Saxifragaceae* Juss. — Камнеломковые // Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области / Под ред. А. Л. Буданцева, Г. П. Яковлева. М.: Т-во науч. изд. КМК. С. 272–273).

Sokolovskaya A. P. 1957. Sem. Kamnelomkovye — *Saxifragaceae* [Saxifrage Family — Fam. *Saxifragaceae*] // Flora Leningradskoi oblasti [Flora of the Leningrad Region] / B. K. Shishkin (ed.). Vol. 2. Leningrad: Leningrad University. P. 217–221. [In Russian] (Соколовская А. П. 1957. Сем. Камнеломковые — *Saxifragaceae* // Флора Ленинградской области / Отв. ред. Б. К. Шишкин. Вып. 2. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. С. 217–221).

Tzvelev N. N. 2000. Opredelitel sosudistykh rastenii Severo-Zapadnoi Rossii (Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti) [Guide to the vascular plants of the Northwestern Russia (Leningrad, Pskov and Novgorod Regions)]. St. Petersburg: Chemical-Pharmaceutical Academy. 781 p. [In Russian] (Цвелёв Н. Н. 2000. Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области). СПб.: Изд-во С.-Петерб. хим.-фарм. акад. 781 с.).

SAXIFRAGA NIVALIS L. (*SAXIFRAGACEAE*), A NEW SPECIES TO THE FLORA OF THE LENINGRAD REGION

A. Yu. Doronina

Stremyannaya Str., 14-4, St. Petersburg, 191025, Russia
baccador@mail.ru

The article provides information on the first record of *Saxifraga nivalis* L. in the Leningrad Region. Earlier, this species was cited for the Leningrad Region on the basis of a misinterpreted data of the monograph by I. Hiitonen (1946). *S. nivalis* has the southern limit of its range in the Leningrad Region. The species is recommended to include the Red Data Book of the Leningrad Region.

K e y w o r d s : Leningrad Region, new species for the flora, Red Data Book of the Leningrad Region.