Новости систематики высших растений
Novitates Systematicae Plantarum Vascularium
2018
49: 130–132
ISSN 0568-5443

Новый вид рода *Thymus* (*Lamiaceae*) из Республики Алтай

A new species of the genus *Thymus* (*Lamiaceae*) from the Altai Republic

В. М. Васюков

Институт экологии Волжского бассейна РАН
Лаборатория проблем фиторазнообразия
ул. Комзина, 10, Тольятти, 445003, Россия
vvasjukov@yandex.ru

V. M. Vasjukov

Institute of Ecology of the Volga River Basin, Russian Academy of Sciences
Department of Problems of Phytodiversity
Komzina Str., 10, Tolyatti, 445003, Russia
vvasjukov@yandex.ru

https://doi.org/10.31111/novitates/2018.49.130

Аннотация. С плоскогорья Укок в Республике Алтай описан новый вид *Thymus kamelinii* Vasjukov, отличающийся от наиболее близкого *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger заканчивающимися генеративным побегом стволиками и более широкими листьями.

Ключевые слова: *Thymus*, Республика Алтай, новый вид.

Abstract. A new species *Thymus kamelinii* Vasjukov is described from Ukok Plateau in the Altai Republic. It differs from the closest *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger by stems ending with generative shoots and wider leaves.

Keywords: *Thymus*, Altai Republic, new species.

При изучении материалов по роду *Thymus* L. с Алтая в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) выявлен новый для науки вид, описываемый ниже.

Thymus kamelinii Vasjukov, sp. nova (sect. *Serpyllum* (Mill.) Benth.).

Dwarf semishrub with quite short horizontal stalks ending with a generative shoot. Generative shoots ascending, 3–8 cm tall, pubescent under the inflorescence with rather short hairs directed downward. Leaves elliptic to subrhombic, light green, 5–10 mm long, 2–5 mm wide, petioles 1.5–2.5 mm long, ciliate at margins up to $^1/_3$; with weakly prominent veins and distinct glandules beneath. Inflorescence capitate, with more or less distant verticil. Flowering calyces green, 3.5–4 mm long, hairy beneath, glabrous above; scallops of upper lip with short bristles at margin; pedicels about 3 mm long; corollas 6–7 mm long, pink-lilac. Fl. VII–VIII.

Holotype (Fig.): «Altai Republic, Kosh-Agach District, Ukok Plateau, the mid-course of the Kalguta River, the left and right bank, 49°17.5′ N, 88°03′ E, 20 VII 1998, R. V. Kamelin, A. I. Shmakov, S. Smirnov, S. Dyachenko, D. Tikhonov, E. Antonyuk» (LE: LE01042905, with isotype).

Affinity. Differs from the closest *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger s. str. by stems ending with generative (not vegetative) shoots and wider leaves (2–5 mm wide, not 1.5–3.5 mm wide).

Distribution. Rocky slopes of the Ukok Plateau in the Altai Republic.

Etymology. The species is named in honor of an outstanding Russian botanist Rudolf Vladimirovich Kamelin.

Полукустарничек с недлинными стволиками, заканчивающимися генеративным побегом. Генеративные побеги восходящие, 3–8 см выс., опушенные под соцветием недлинными, вниз направленными волосками. Листья 5–10 мм дл., 2–5 мм шир., светло-зеленые, с эллиптическими до почти ромбических пластинками, с черешком 1.5–2.5 мм дл., по краю в нижней трети реснитчатые, на поверхности голые, боковые жилки слабо выдающиеся, в числе 2–3 пар, точечные железки заметные. Соцветие головчатое, с более или менее отодвинутой обедненной ложной мутовкой. Чашечка трубчато-колокольчатая, во время цветения около 3.5–4 мм дл., зеленая, внизу рассеянно-волосистая, сверху голая; зубцы верхней губы с короткими щетинками; цветоножки до 3 мм дл.; венчик бледно-лиловый, 6–7 мм дл. Цв. VII–VIII.

Голотип (рис.): «Республика Алтай, Кош-Агачский район, плоскогорье Укок, среднее течение реки Калгуты, левый и правый берег, 49°17.5′ с. ш., 88°03′ в. д., 20 VII 1998, Р. В. Камелин, А. И. Шмаков, С. Смирнов, С. Дьяченко, Д. Тихонов, Е. Антонюк» (LE: LE01042905, с изотипом).

Поступила в редакцию | Submitted: 18.06.2018
Принята к публикации | Accepted: 16.10.2018



Рис. Голотип *Thymus kamelinii* (LE01042905).
Fig. Holotype of *Thymus kamelinii* (LE01042905).

Родство. От наиболее близкого *T. mongolicus* (Ronniger) Ronniger s. str. отличается стволиками, заканчивающимися генеративным (а не вегетативным) побегом и более широкими листьями (2–5 мм шир., а не 1.5–3.5 мм шир.).

Распространение. Растет на каменистых склонах плоскогорья Укок в Республике Алтай.

Этимология. Вид назван в честь выдающегося российского ботаника Рудольфа Владимировича Камелина.

Благодарности

Автор выражает благодарность И. В. Татанову за консультации и помощь при подготовке иллюстративного материала.