

Veröffentlichungen zu Flora und Vegetation von Südwestdeutschland 1999

Zusammengestellt von ANDREAS KLEINSTEUBER unter Mitarbeit von THOMAS BREUNIG und THOMAS WOLF.

ADAM THOMAS 1999: Das Entstehen der Streuobstwiesen in Südwestdeutschland. – Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemberg 73: 21-37; Karlsruhe.

ALEKSEJEW PETER & RODI DIETER 1999: Relikte von Zwergbinsengesellschaften an den Rückhaltebecken und ihren Vorbecken. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 13; Schwäbisch Gmünd.

ALEKSEJEW PETER, GEDACK UDO, PAYERL HANS & RODI DIETER 1999: Die Pflanzengesellschaften beim Naturdenkmal „Horner Schlinge“. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 68-71; Schwäbisch Gmünd.

ALEKSEJEW PETER, BUSCH-NOWAK ALEXANDER, DAMMEN-MILLER ARMIN, HOLSTEIN JOACHIM, MÜLLER MANFRED, POSSELT KLAUS & RODI DIETER 1999: Der Schechinger Weiher im Gröninger Feld (Sulzbachweiher), eine für den Naturschutz wichtige Neuanlage. – Unicornis 10 (Das Leintal, 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 73-78; Schwäbisch Gmünd.

ANSTETT DAGMAR (Zusammenstellung) 1999: Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen in Zeitschriften des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (ehem. Badische Landessammlungen für Naturkunde). 1936-1997. – Caroleina, Beih. 7: 119 S.; Karlsruhe.

BAUMANN BRIGITTE & BAUMANN HELMUT 1999: Ein verschollenes naturkundliches Manuskript von Württemberg aus dem frühen 18. Jahrhundert. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 51-61; Stuttgart.

BAUMANN HELMUT & WAHRENBURG WOLFRAM 1999: Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften und Arten sandiger Äcker am nördlichen Schönbuchrand. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 63-80; Stuttgart.

BECHTER WOLFGANG 1999: Waldbiotope und Aufbau von Verbundsystemen. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54 (24): 1299-1301; München.

BENNERT H. WILFRIED unter Mitarbeit von HORN KARSTEN, BENEMANN JENS & HEISER THOMAS (Hrsg.:

Bundesamt für Naturschutz) 1999: Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands – Biologie, Verbreitung, Schutz. – 381 S.; Bonn-Bad Godesberg.

BERCHTOLD JEAN-PIERRE 1999: *Linaria simplex*, une Linaire nouvelle pour la flore d'Alsace. – Bull. Ass. philomat. Alsace Lorraine 34: 33-36; Strasbourg „1998“.

[*Linaria simplex* mehrfach in der elsässischen Rheinebene gefunden. Zwei Exemplare mit Silhouetten abgebildet, Detailzeichnungen einer Blüte und eines Samens.]

BISS REGINA 1999: Quellen und Quellbereiche. – Biotope in Baden-Württemberg 12 (Hrsg.: Ministerium Ländlicher Raum): 39 S.; Karlsruhe.

BOMBLE WOLFGANG & SCHOLZ HILDEMAR 1999: Eine neue Unterart des *Bromus secalinus* (Gramineae) – ein Sekundäres Unkraut. – Feddes Repert. 100 (5-6): 425-438; Berlin.

[*Bromus secalinus* subsp. *decipiens* wird neu beschrieben. Von der bisher in Europa, dem Nahen Osten und der USA nachgewiesenen Sippe werden auch mehrere geprüfte Herbarbelege aus Baden-Württemberg aufgelistet.]

BREUNIG THOMAS & DEMUTH SIEGFRIED 1999: Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württemberg (3. Neubearb. Fassung, Stand 15.4.1999). – Naturschutz-Praxis Artenschutz 2 (Hrsg.: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg): 161 S.; Karlsruhe.

BRIEMLE GOTTFRIED 1999: Aulendorfer Extensivierungsversuch: Ergebnisse aus 10 Jahren Grünlandausmagerung. – Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemberg 73: 95-101; Karlsruhe.

BÜLTMANN HELGA & GERINGHOFF HEINER 1999: *Cladonia decorticata* und *Cladonia polycarpoides* im Südschwarzwald. – Caroleina 56: 119-120; Karlsruhe „1998“.

BUJNOCH WALTER (Zusammenstellung) 1999: Farnfunde im Regierungsbezirk Trier. 15. Nachtrag. – Dendrocopos 26 (2): 358-364; Trier.

BUTTLER KARL PETER 1999: Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 553-570. – Bot. Natursch. Hessen 11: 105-109. Frankfurt am Main.

[*Amaranthus emarginatus* subsp. *emarginatus* bei Heddesheim]

DEMUTH SIEGFRIED & BREUNIG THOMAS (Hrsg.: Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe) 1999: Schutzgebietskonzeption Hardtplatten. Textband und Kartenband. – 141 S.; Karlsruhe.

DIENT MICHAEL & STRANG IRENE 1999: Zum Zustand des Deschampsietum rhenanae am Bodensee. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. 17 (2) (Im Zwergengarten der Geobotanik. Ökologische

- see. – *Carolinea* 56: 111-115; Karlsruhe „1998“.
- HAHN HANS JÜRGEN, PREUSS GÜNTER & FRIEDRICH ECKHARD 1999: Wie sauer ist das Wasser im Pfälzerwald tatsächlich? Betrachtungen zum Versauerungsgeschehen im Pfälzerwald. – Mitt. Pollichia 85 (1998): 19-34; Bad Dürkheim.
- HAMMEL STEFFEN 1999: Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Schützinger Spiegel“ und seiner Randgebiete. – Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemberg 73: 175-198; Karlsruhe.
- HAMMEL STEFFEN 1999: Der Gewöhnliche Schlupfsame (*Crupina vulgaris*) im Stromberg-Gebiet. – *Carolinea* 56: 116-118; Karlsruhe „1998“.
- HAND RALF (Zusammenstellung) 1999: Neues aus der Flora der Region Trier (Spermatophyta). – *Dendrocopos* 26 (2): 347-357; Trier.
- HANKE URS & PISOKE THOMAS 1999: Der Sturmwurf-bannwald „Teufelsries“. Waldstrukturhebung mit Forstlicher Grundaufnahme und Luftbilddokumentation. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 6: 80 S.; Freiburg i. Br.
- HEINRICH WOLFGANG & VOELCKEL HERMANN 1999: Die Bocks-Riemenzunge [*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng.] - Orchidee des Jahres 1999. – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 16 (1): 83-123; (ohne Erscheinungsort).
[Daten zur aktuellen Verbreitung, Bestandsituation und Ökologie – auch aus Südwestdeutschland – werden zusammengestellt.]
- HIRNER VEIT 1999: Beispiel Forstbezirk Immendingen: Biotop- und Artenschutz in Wald- und Offenlandbiotopen. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54(24): 1296-1298; München.
- HODVINA SYLVAIN, JUNG KLAUS-DIETER 1999: Zur ehemaligen und aktuellen Verbreitung von *Orobancha arenaria* Borkhausen 1794 in Hessen. – Hess. Florist. Briefe 48 (2): 17-32; Darmstadt.
[Raster-Verbreitungskarte für Südhessen und angrenzende Gebiete in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz]
- HOFBAUER RITA 1999: Die Verbreitung von *Duchesnea indica* (Andrews) Focke im Stuttgarter Stadtgebiet. – Ber. Inst. Landschaft Pflanzenökol. Univ. Hohenheim 8: 57-65; Hohenheim.
- HOFFMANN WALTER 1999: Die Orchideen der St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken. – Faunist. florist. Not. Saarland 30 (3): 690-692; Saarbrücken.
- HÜGIN GEROLD 1999: Was sind Wärmezeiger? Untersuchungen zum Wärmebedürfnis von Ruderal- und Segetalpflanzen in Mitteleuropa. – *Tuexenia* 19: 425-445; Göttingen.
[Südschwarzwald, Kaiserstuhl und Schwäbische Alb sind in die Untersuchungen einbezogen.]
- HÜGIN GEROLD & HÜGIN HEIDE 1999: *Gagea villosa* in Südwestdeutschland. – *Carolinea* 56: 79-89; Karlsruhe „1998“.
- HÜNERFAUTH KLAUS 1999: Auflichtung von Vorwäldern durch Winterbeweidung mit Ziegen? Erste Ergebnisse eines Versuchs auf Weinbergbrachen bei Neustadt. – Pollichia Kurier 15 (4): 11-13; Annweiler am Trifels.
- JAEGER LUTZ 1999: Der Hartheimer Kiefernwald als klimatologische Datenquelle. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 86/87: 1-19; Freiburg i. Br.
- JEROME CLAUDE 1999: Propos au sujet de la détermination des hybrides chez les Ptéridophytes: le cas de *Polystichum illyricum*. – Bull. Ass. philomat. Alsace Lorraine 34: 17-20; Strasbourg „1998“.
[Nachweis von *Polystichum illyricum* (*P. aculeatum* x *P. lonchitis*) in den Vogesen. Alle drei Sippen werden mit Silhouettenabbildungen wiedergegeben.]
- KAHLERT BETTINA, RICHTER MATTHIAS & BÖCKER REINHARD 1999: Sukzessionen auf Kasernenbrachen. – Ber. Inst. Landschaft Pflanzenökol. Univ. Hohenheim 8: 67-76; Hohenheim.
[Floristisch-vegetationskundliche Grundlagenerhebung dreier Kasernengelände in Stuttgart]
- KEGLER HANS-HEINRICH (Bearb.) 1999: Der Bannwald „Hechtsgraben“ im Forstbezirk Kenzingen (Baden-Württemberg), Forstliches Wuchsgebiet Oberrheinisches Tiefland. Ergebnisse der Forstlichen Grundaufnahmen 1981 und 1994. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 15: III+39 S.; Freiburg i. Br.
- KIFFE KARL 1999: Eine Ergänzung zum Vorkommen der Sippen von *Carex* Sect. *Phacocystis* (Cyperaceae) in Hessen. – Hess. Florist. Briefe 48 (1): 1-5; Darmstadt.
[Merkmalstabelle, Hinweis auf Herbarbelege von *Carex x turfosa* und *Carex x peraffinis* aus Baden-Württemberg]
- KLAUCK EBERHARD-JOHANNES 1999: Robinienbestände auf Berghalden aus karbonischem Schiefer im Saarland. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 37: 105-118; Mainz.
- KLEINDIENST WERNER J. 1999: Exkursion der Pollichia-gruppe Landau ins südliche Oberrheingebiet. – Pollichia Kurier 15 (3): 26-27; Annweiler am Trifels.
[Exkursion in den Taubergießen, den Kaiserstuhl und nach Rouffach, Liste der besonderen während der Exkursion beobachteten Tier- und Pflanzenarten]
- KLOTZ ERICH 1999: Die Mehlprimel (*Primula farinosa* Linnaeus 1753) im Kreis Heidenheim. – Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemberg 73: 231-234; Karlsruhe.
- KNIIPPING MARIA 1999: Pollenanalytische Datierungen an Feuchtsedimenten auf Hangrutschungen in Südwestdeutschland. In: Angewandte Studien zu Massenbewegungen (Hrsg.: Bibus E. & Terhorst Birgit). – Tübinger Geowissenschaftl. Arb.,

- einer dynamischen und naturverträglichen Landnutzung. – Natur und Landschaft 74 (10): 411-419; Stuttgart.
- [Verschiedene Formen der Beweidung werden mit Fotografien u.a. aus Baden-Württemberg und den Vogesen belegt.]
- PFADENHAUER JÖRG 1999: Leitlinien für die Renaturierung süddeutscher Moore. – Natur und Landschaft 74 (1): 18-29; Stuttgart.
- PFEIFER GERHARD & RODI DIETER 1999: 40 Jahre Ackerwildkrautforschung im Einzugsgebiet der Lein und Maßnahmen zum Erhalt der Feldflora. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 78-87; Schwäbisch Gmünd.
- PFÜNDEL THOMAS & MÜLLER THEO 1999: Die Pflanzenwelt der Schwäbischen Alb. – 239 S.; Stuttgart, (Verlag des Schwäbischen Albvereins).
- PHILIPPI GEORG 1999: Bemerkenswerte Moosfunde aus dem Schwarzwald und dem angrenzenden Oberrheingebiet. – Caroleinea 56: 63-78; Karlsruhe „1998“.
- POPKEN MONIKA & LICHT WOLFGANG 1999: Bodenökologische Untersuchungen an wechselfeuchten Wiesen des östlichen Hunsrücks. – Mitt. Pollichia 85 (1998): 105-152; Bad Dürkheim.
- POSCHLOD PETER, BÖHRINGER JÖRG, FENNEL SABINE, PRUME CHRISTIAN & TIEKÖTTER ANKE 1999: Aspekte der Biologie und Ökologie von Arten der Zwergbinsenfluren. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. 17 (2) (Im Zwergengarten der Geobotanik. Ökologische und populationsbiologische Forschungen zu Isoëto-Nanojuncetetea- und Isoëto-Littorelletea-Arten und -Gesellschaften): 219-260; Freiburg i. Br.
- [Die Untersuchungsgebiete liegen mit einer Ausnahme in Baden-Württemberg (Nördliches Oberrheingebiet, Donaugebiet, Oberschwaben).]
- PRETZELL DIANA & REIF ALBERT 1999: Erlenbruchwälder im Oberrheingraben und ihre Degradationsstadien. – Tuexenia 19: 179-191; Göttingen.
- RADEMACHER MICHAEL 1999: Wiederfund der deutschen Tamariske (*Myricaria germanica*) an einem Baggersee in der südlichen Oberrheinebene (Baden-Württemberg). – Florist. Rundbriefe 33 (1): 13-15; Göttingen.
- RADKOWITSCH ANNEMARIE 1999: *Apocynum cannabinum* L. - Ein neues nordamerikanisches Florenelement in Deutschland. – Florist. Rundbriefe 32 (2) (1998): 111-116; Göttingen.
- [Die aus Nordamerika stammende *Apocynum cannabinum* wurde erstmals in Südwestdeutschland bei Karlsruhe gefunden. Der Fundort liegt auf TK 6916/434 und nicht, wie im Artikel angegeben, auf 6919/434.]
- REIF ALBERT, JOLITZ THORSTEN, MÜNCH DIETER & BÜCKING WINFRIED 1999: Sukzession vom Eichen-Hainbuchen-Wald zum Ahorn-Wald - Prozesse der Naturverjüngung im Bannwald „Bechtaler Wald bei Kenzingen, Südbaden. – Allg. Forst Jagdzeit. 170(4): 67-74; Frankfurt am Main.
- REIF ALBERT & KATZMAIER REINER 1999: Zur Landnutzungsgeschichte der Allmendweiden von Ibach und Wittenschwand, Südschwarzwald. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 86/87: 55-98; Freiburg i. Br.
- REINEKE DIETER & RIETDORF KLAUS 1999: Bemerkungen zu *Epipogium aphyllum* Sw. in Südbaden. – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 15 (2): 52-62; (ohne Erscheinungsort) „1998“.
- REISCH CHRISTOPH 1999: Die Kalkmagerrasen des oberen Großen Lautertales. – Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemberg 73: 199-229; Karlsruhe.
- REISCH CHRISTOPH & RÖHL MARKUS 1999: *Meconopsis cambrica* (L.) Viguier - eine neue Adventivart für Baden-Württemberg. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 193-197; Stuttgart.
- RIEDINGER RENATE & TERHORST BIRGIT 1999: Vegetationsökologische Befunde in Rutschgebieten der Mittleren Schwäbischen Alb. – In: Angewandte Studien zu Massenbewegungen (Hrsg.: Bibus E. & Terhorst Birgit). – Tübinger Geowissenschaftl. Arb., Reihe D 5: 97-115; Tübingen.
- ROEDER AXEL 1999: Waldforschung und Umweltmonitoring im Biosphärenreservat. – Allg. Forstzeit-schr./Der Wald 54 (10): 510-511; München.
- RÖLLER OLIVER & RÖLLER-BURKARD ANDREAS 1999: Die Purpur-Sommerwurz (*Orobancha purpurea* Jacquin, 1762) in einem intensiv genutzten Weinberg im Naturschutzgebiet Haardtrand-Geraide (Landkreis Südliche Weinstraße). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (1): 329-333; Landau.
- RÖLLER OLIVER 1999: Die Sand-Binse (*Juncus tenageia* J.F. Ehrmann, 1782) in der Pfalz. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (1): 335-339; Landau.
- RÖLLER OLIVER 1999: *Trifolium striatum* (L.) am Haardtrand. – Pollichia Kurier 15 (3): 11; Annweiler am Trifels.
- RUSS JOHANNES 1999: Pflanzenkartierungen an den Stauseen des Einzugsgebietes der Lein. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 11-13; Schwäbisch Gmünd.
- RUTHSATZ BARBARA 1999: Die Quellwässer von Hangmooren im Hunsrück (Rheinland-Pfalz). Chemismus und Einfluß auf Vegetation und Flora. – Archiv Natursch. Landschaftsforsch. 38: 1-41; Amsterdam.
- RUTHSATZ BARBARA & KRASS BETTINA 1999: Die Vegetation von Feuchtgrünlandbrachen im westlichen Hunsrück - Lebensraum für gefährdete

- Reihe D 5: 117-127; Tübingen.
- KNÖRZER DIETRICH 1999: Zur Einbürgerungstendenz der Douglasie (*Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco) im Schwarzwald. – Zeitschr. Ökol. Natursch. 8 (1-2): 31-39; Jena.
- KNÖRZER DIETRICH 1999: Zur Naturverjüngung der Douglasie im Schwarzwald. Inventur und Analyse von Umwelt- und Konkurrenzfaktoren sowie eine naturschutzfachliche Bewertung. – Diss. Bot. 306: XIV+283 S.; Berlin-Stuttgart (J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung).
- KÖBERLE THOMAS & LINK FRITZ-GERHARD 1999: Heiden und Schafe im Nordschwarzwald. – Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemberg 73: 39-62; Karlsruhe.
- KÖNIG ANDREAS 1999: Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 635-645. – Bot. Natursch. Hessen 11: 105-109. Frankfurt am Main.
[*Carex strigosa* an der Bergstraße]
- KÖHLER REINHARD 1999: Bedeutung der Waldbiotopkartierung für den Naturschutz in Baden-Württemberg. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54(24): 1282-1284; München.
- KOLTZENBURG MICHAEL 1999: Bestimmungsschlüssel für in Mitteleuropa heimische und kultivierte Pappelarten und -sorten (*Populus spec.*). – Florist. Rundbriefe, Beih. 6: 54 S.; Göttingen.
[Bestimmungsschlüssel wurden u.a. mit Studien in den Herbarien des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart und im Botanischen Institut der Universität Tübingen erstellt.]
- KOLTZENBURG MICHAEL (Zusammenstellung) 1999: Antrag auf Ausweisung eines flächenhaften Naturdenkmals „Wurminger Gipsbrüche“. – Tübinger Fauna Flora, Beih. 1 (Das Ammertal bei Tübingen: Materialien zu einem geplanten Landschaftsschutzgebiet, Teil I): 55-63; Tübingen.
- KOLTZENBURG MICHAEL & BÖCKER REINHARD (1999): Die heutige potenzielle natürliche Vegetation an Fließgewässern. – Oberirdische Gewässer, Gewässerökologie 57: 1-134, 1 Karte; Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe.
- KOTTKE ULRICH 1999: Neue Gametophytenstandorte von *Trichomanes speciosum* Willd. (Hymenophyllaceae) im Regierungsbezirk Trier und die Bedeutung der vegetativen Vermehrung für die Verbreitung der Art in Mitteleuropa. – Dendrocopos 26 (2): 365-386; Trier.
- KRAUSE STEFAN, BENNERT H. WILFRIED & THIEX CLAUDIA 1999: Verbreitung, Ökologie, Vergesellschaftung und Morphologie von *Cystopteris dickieana* Sim (Woodsiaceae, Pteridophyta) in Deutschland. – Tuexenia 19: 219-239; Göttingen.
[Es wurden auch Populationen aus dem Schwarzwald untersucht.]
- KRETZSCHMAR FRIEDRICH 1999: Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzgebiet Deggenreuschen-Rauschachen. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 42: 51-80; Donaueschingen.
- KROPF MATTHIAS 1999: Ein Vorkommen des Kleinen Vogelfußes (*Ornithopus perpusillus* L.) an der mittleren Nahe. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 37: 119-125; Mainz.
- LABUDDA VOLKER (Bearb.) 1999: Die Bestandesstruktur des Bannwaldes „Birkenkopf“ im Nordschwarzwald Forstbezirk Rotenfels. Ergebnisse der forstlichen Grundaufnahme 1994. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 5: 31 S.; Freiburg i. Br.
- LABUDDA VOLKER (Bearb.) 1999: Die Bestandesstruktur des Bannwaldes „Grubenhau“ im Forstbezirk Langenau bei Ulm (Baden-Württemberg), Forstliches Wuchsgebiet Schwäbisches Alb, Wuchsbezirk 6/02 Lone- und Egau-Alb. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 4: V+55 S.; Freiburg i. Br.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 1999: Der Rohrhardsberg. Neue Wege im Naturschutz für den mittleren Schwarzwald. – Naturschutz-Spectrum. Themen 91: 413 S.; Ubstadt-Weiher, (Regionalkultur).
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 1999: Naturschutzgebiet Jusi - Auf dem Berg. – Naturschutz-Spectrum. Gebiete 23: 96 S.; Karlsruhe.
- LANG WALTER 1999: Populationsstützende Maßnahme beim Königsfarn (*Osmunda regalis* L.). – Pollichia Kurier 15 (1): 15; Annweiler am Trifels.
- LANG WALTER 1999: Nachtrag zur Verbreitung der Krebschere (*Stratiotes aloides* L.) in der Pfalz. – Pollichia Kurier 15 (2): 16; Annweiler am Trifels.
- LUDEWIG ELKE 1999: Direkte und indirekte anthropogene Beeinflussung und Veränderung der Ufervegetation der Saar. – Diss. Bot. 301: VIII+271 S.; Stuttgart, (J. Cramer in der Geb. Bornträger Verlagsbuchhandlung).
- LUDWIG WOLFGANG 1999: *Dipsacus laciniatus* L. - eine kartierungskritische Karte der hessischen Flora. – Hess. Florist. Briefe 48 (1): 10-15; Darmstadt.
[Hinweis auf Ansalbung von *Dipsacus laciniatus* bei Stuttgart]
- LUDWIG WOLFGANG 1999: Über *Doronicum pardalianches* L. in Hessen. – Hess. Florist. Briefe 48 (4): 57-68; Darmstadt.
[Hinweis auf eine Literaturangabe von *Doronicum columnae* am Gualgesheimer Berg bei Bingen]
- LÜPKE BURGHARD VON & HAUSKELLER-BULLERJAHN KAREN 1999: Kahlschlagfreier Waldbau: Wird die Eiche an den Rand gedrängt? – Forst Holz 54(18): 563-568; Alfeld, Hannover.

- LÜTH MICHAEL 1999: Moosgesellschaften und Moosgesellschaftskomplexe auf Blockhalden. – Decheniana-Beihefte 37 (Lebensraum Blockhalde - Zur Ökologie periglazialer Blockhalden im außeralpinen Mitteleuropa. Tagungsband zum Symposium vom 13. und 14. September 1997 an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena): 93-100; Bonn.
[Das Untersuchungsgebiet liegt am Westabfall des Südschwarzwaldes südöstlich Freiburg.]
- MAASS INGE, FRANKE ALBRECHT & HUSSENDÖRFER ERWIN 1999: Zur Wiederentdeckung von Schwarzpappeln (*Populus nigra* L.) am Neckar. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 97-105; Stuttgart.
- MARX BETTINA 1999: Naturschutzgebiet „Wiesentäler bei der Menzlesmühle“. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 38-46; Schwäbisch Gmünd.
- MARX JÜRGEN & HÖLL NORBERT 1999: Zur Landnutzung in den Naturschutzgebieten Baden-Württembergs. – Natursch. Landschaftspflege Baden-Württemberg 73: 5-20; Karlsruhe.
- MATZKE-HAJEK GÜNTER 1999: Zur Kenntnis einiger übersehener Brombeer-Arten (*Rubus* L., Rosaceae) in Rheinland-Pfalz und Nachbarregionen. – Mitt. Pollichia 85 (1998): 63-75; Bad Dürkheim.
[Neubeschreibung von *Rubus pedica* und *Rubus ruborensis*]
- MATZKE-HAJEK GÜNTER 1999: Ergänzende Untersuchungen zur Taxonomie der Haselblattbrombeeren (*Rubus* L., Sektion *Corylifolii*) in Westdeutschland und benachbarten Gebieten. – Feddes Repert. 110 (3-4): 161-172; Berlin.
[Neubeschreibung von drei Haselblattbrombeeren, darunter auch *Rubus imbellis*, die in Rheinland-Pfalz vorkommt. Von *R. inticatus* werden die bisher bekannten Fundorte zusammengestellt. Nachgewiesen wurde die Art bisher im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Frankreich südlich Bitché.]
- MATZKE-HAJEK GÜNTER 1999: Erstnachweis von *Rubus murrayi* Sudre auf dem europäischen Kontinent und Ergänzungen zur Taxonomie und Verbreitung der Serie *Hystrix* (*Rubus* L., Rosaceae) in Mitteleuropa. – Decheniana 152: 37-46; Bonn.
[Neubeschreibung von *Rubus cochlearis*. Die Sippe kommt auch in Rheinland-Pfalz vor.]
- MATZKE-HAJEK GÜNTER & WEBER HEINRICH E. 1999: *Rubus macrodontus* P.J. Müller, eine bislang kaum beachtete Brombeerart. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 37: 127-134; Mainz.
- MAUK JÖRG & RODI DIETER 1999: Die flächenhaften Naturdenkmale auf Feuchtwiesen im Einzugsbereich der oberen Lein. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 57-64; Schwäbisch Gmünd.
- MENZEL FLORIAN 1999: Anatomie der Farnpflanzen: Artbestimmung und Evolution. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 107-133; Stuttgart.
[Anatomischer Bestimmungsschlüssel der einheimischen Farnpflanzen. Zur Untersuchung wurde auch Material aus Baden-Württemberg verwendet.]
- MICHIELS HANS-GERD 1999: Naturnähe der Waldentwicklungstypen in Baden-Württemberg. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54 (16): 866-868; München.
- MICHIELS HANS-GERD 1999: Der Transfer standorts- und vegetationskundlicher Erkenntnisse in waldbauliche Empfehlungen - ein Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 16: 39-50; Freiburg i. Br.
- MÖSELER BODO MARIA & WUNDER JÖRG 1999: Kaltluftströme auf Blockhalden und ihre Auswirkungen auf Flora und Vegetation. – Decheniana-Beihefte 37 (Lebensraum Blockhalde - Zur Ökologie periglazialer Blockhalden im außeralpinen Mitteleuropa. Tagungsband zum Symposium vom 13. und 14. September 1997 an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena): 43-47; Bonn.
[Untersucht wurden u.a. Blockhalden im Hunds-bachtal bei Gerolstein (Rheinisches Schiefergebirge, Rheinland-Pfalz).]
- MÜCKSCHEL CLAUS 1999: Zum Vorkommen und zur Ökologie des Gelben Lerchensporns, *Pseudofumaria lutea*, im mittleren Lahntal (Hessen/Rheinland-Pfalz). – Bot. Natursch. Hessen 11: 85-90. Frankfurt am Main.
- NEHRING BODO 1999: Das Gewässersystem Lein im ökologischen Wandel. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 2-11; Schwäbisch Gmünd.
- OCKERT WILLI & WIELAND ALBRECHT 1999: Aktuelle und historische Verbreitung der Orchideen im Landkreis Schwäbisch-Hall. – Jour. Europ. Orch. 31 (1): 3-258; (ohne Erscheinungsort).
- OESAU ALBERT 1999: Ackerwildkräuter in Rheinland-Pfalz erhalten und fördern. – Pollichia Buch 36: 138 S.; Bad Dürkheim.
- OESAU ALBERT 1999: Zur Verbreitung und Soziologie von Wassermossen im Rhein zwischen Worms und Bingen. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (1): 7-19; Landau.
- OESAU ALBERT 1999: Zur Moosflora des Jakobsberges bei Ockenheim in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) und seiner Umgebung. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 37: 135-154; Mainz.
- OPPERMANN RAINER & LUICK RAINER 1999: Extensive Beweidung und Naturschutz. Charakterisierung

- Pflanzenarten oder das Landschaftsbild störende Unordnung? – Mitt. Pollichia 85 (1998): 77-104; Bad Dürkheim.
- RUTZ TANJA 1999: Strukturwandel in der Landwirtschaft am Beispiel der Sickinger Höhe. – Pfälzer Heimat 50 (2): 60-66; Speyer.
- SALKOWSKI HANS-ERICH 1999: Anmerkungen zu *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 16 (1): 35-43; (ohne Erscheinungs-ort).
[Bericht u.a. über die Bestandesentwicklung von *Spiranthes spiralis* bei Preßburg (Rheinland-Pfalz)]
- SALKOWSKI HANS-ERICH 1999: Beobachtungen an *Platanthera chlorantha* in der Verbandsgemeinde Vallendar am Rhein. – Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 16 (1): 145-147; (ohne Erscheinungs-ort).
- SAUER MICHAEL 1999: *Dicranum bonjeanii* De Not - ein „Sumpfmoo“ an Trockenstandorten in Baden-Württemberg. – Meylania 17: 24-26; Chambéry/Genf.
- SAYER UWE & REIF ALBERT 1999: Bodenwasserversorgung und Einstrahlung in Flaumeichenbeständen im Bereich der mittleren Schwäbischen Alb und des Klettgaus, Südwestdeutschland - was geschieht bei künftiger Erwärmung? – Verhandl. Ges. Ökol. 29: 125-132; Heidelberg - Berlin.
- SCHAUB HANS-PETER 1999: Der Pfälzerwald. Pflanzen - Tiere - Felsen. – 120 S.; Karlsruhe (G. Braun).
- SCHULER DIRK & AMBOS ROBERT 1999: Vergleichende Untersuchungen an Hangwäldchen (Klauern) im nördlichen Rheinhessen. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 37: 63-103; Mainz.
- SCHMIDT U.E. 1999: „Späne in das Feuer, das Holz ist teuer ...“ Waldzustand und ausgetragene Waldnutzungskonflikte des 18. Jahrhunderts. – Allg. Forst Jagdzeit. 170 (8): 149-154; Frankfurt am Main.
[Enthält eine Reisebeschreibung des Waldzustandes im Schönbuch sowie zwischen Wangen und Stuttgart.]
- SCHMITT JOHANNES A. 1999: Neues zum Informationsgehalt von Arten/Areal-Kurven. Die Ermittlung von Arten-Diversität R, Minimum-Areal M und Mittlerer Arten-Densität D aus Teilflächen-Untersuchungen eines Gebietes über Statistische, Hyperbolische, Kumulative Arten/Areal-Kurven am Beispiel Höherer Pilze. – Abhandl. Delattinia 25: 67-210; Saarbrücken.
- SCHNEIDER THOMAS & SCHNEIDER CLAUDIA 1999: Funde bemerkenswerter und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Saarland und seinen Randgebieten, 1. Folge (1993-1999). – Abhandl. Delattinia 25: 211-296; Saarbrücken.
- SCHRÖTER HANSJOCHEN & MITARBEITER 1999: Waldschutzsituation 1998/99 in Baden-Württemberg. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54 (7): 330-331; München.
- SCHUHWERK FRANZ & LIPPERT WOLFGANG 1999: Chromosenzahlen von *Hieracium* L. (Compositae, Lactuceae) Teil 3. – Sendtnera 6: 197-214; München.
[48 Sippen des Subgenus *Hieracium*, überwiegend aus Mitteleuropa, wurden cytologisch untersucht. Mit *Hieracium glaucinum* subsp. *basalticum* (Rheinland-Pfalz), *Hieracium laevigatum* subsp. *perangustum*, *Hieracium lycopifolium* subsp. *lycopifolium* und *Hieracium pseudocorymbosum* subsp. *petryanum* (alle Baden-Württemberg) wurde auch Material aus Südwestdeutschland verwendet].
- SCHWARZWÄLDER STEFAN 1999: Floristische Beobachtungen unter einer Leitungstrasse im Raum Darmstadt. – Bot. Natursch. Hessen 11: 41-49; Frankfurt am Main.
[Wuchsorte von *Jurinea cyanoides* auch aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz]
- SEBALD OSKAR, SEYBOLD SIEGMUND & PHILIPPI GEORG (Hrsg.) 1999: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs, 3, 2. Auflage – 483 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- SEBALD OSKAR, SEYBOLD SIEGMUND & PHILIPPI GEORG (Hrsg.) 1999: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs, 4, 2. Auflage – 362 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- SMETTAN HANS W. 1999: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen am oberen Neckar im Zusammenhang mit der vorgeschichtlichen und frühgeschichtlichen Besiedlung. – Materialh. Archäol. Baden-Württemberg 49: 160 S.; Stuttgart, (Theiss Verlag).
- SMETTAN HANS W. 1999: Florenwandel in Ostfildern (Kreis Esslingen) seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 199-226; Stuttgart.
- SPRENGEL THOMAS 1999: Erhaltung der biologischen Vielfalt in den Wäldern. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54(10): 508-509; München.
- STAHL SIMON 1999: Die Berücksichtigung standortkundlicher Aussagen in der forstlichen Betriebsplanung im Spiegel der Waldentwicklungstypen von Baden-Württemberg. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 16: 51-57; Freiburg i. Br.
- STEIGNER WOLFGANG 1999: Orchideen im Bliesgau. – Pollichia Kurier 15 (3): 25-26; Annweiler am Trifels.
- STEINFELD PETER 1999: Zum Vorkommen der Bocks-Riemenzunge (*Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel) im Südost-Saarland. – Faunist. florist. Not. Saarland 30 (3): 682-689; Saarbrücken.
- STRÖHLE WOLFGANG & HAMMEL STEFFEN 1999: Die Orchideen des Landkreises Ludwigsburg - Ergeb-

- nisse der Weiterführung der Kartierung 1993-1999. – Jour. Europ. Orch. 31 (4): 837-851; (ohne Erscheinungsort).
- SUCK REINER 1999: Die natürlichen Waldgesellschaften des Schneifel-Hauptkammes (Westliche Hocheifel) und ihre Ersatzgesellschaften. – Tuexenia 19: 13-53; Göttingen.
- THÜRINGER NORBERT 1999: Nähr- und Schadstoffgehalte ausgewählter Pflanzenarten der Magerrasen in Naturschutzgebieten von Rheinland-Pfalz. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (1): 289-301; Landau.
- THÜS HOLGER & SCHÖLLER HERIBERT 1999: Zur Bedeutung von Obstbäumen für gefährdete Flechten im nördlichen Rheinhessen. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (1): 303-327; Landau.
- Treiber Reinhold 1999: Untersuchungen zur Aziditätstoleranz der Weissen Brunelle (*Prunella laciniata* L.). – Florist. Rundbriefe 32 (2) (1998): 135-139; Göttingen.
[Meßökologische Untersuchungen im Naturraum Harth (Frankreich, Haut-Rhin).]
- TRÖGER UTA 1999: Pflanzensoziologische Bearbeitung ausgesuchter Quellen des Pfälzerwaldes unter besonderer Berücksichtigung der Acidität. – Mitt. Pollichia 85 (1998): 153-196; Bad Dürkheim.
- ULRICH BERNHARD 1999: Das Pilotprojekt „Pflege- und Entwicklungsplanung Büchelberg“ ein Beispiel für umsetzungsorientierte Naturschutzplanung. – Natur und Landschaft 74(7/8): 306-316; Stuttgart.
- VÖGE MARGRIT 1999: Das See-Brachsenkraut *Isoëtes lacustris* L. in einigen deutschen Seen: Blattanzahl und Sporenproduktion. – Tuexenia 19: 211-217; Göttingen.
[Einbezogen wurden Feldsee und Titisee im Südschwarzwald.]
- VOLK HELMUT 1999: Grundlagen und Erfahrungen bei der Renaturierung von Rheinauwäldern. – Forst Holz 54 (16): 494-500; Alfeld, Hannover.
- VOLK HELMUT 1999: Beiträge zur Naturnähebeurteilung von Baumarten und Wäldern der Rheinaue, der Niederterrasse im Rheintal und der Fichte im Schwarzwald. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 16: 60-79; Freiburg i. Br.
- VOLK HELMUT 1999: Hauptergebnisse der Waldbiotopkartierung in Baden-Württemberg. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54 (24): 1284-1287; München.
- VOLK HELMUT 1999: Elemente eines walddökologischen Netzwerkes in Baden-Württemberg. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 54 (24): 1292-1295; München.
- WAGNER HANS-GEORG 1999: Ein Neufund von *Potamogeton praelongus* von Wulfen 1805 in Baden-Württemberg. – Florist. Rundbriefe 33 (1): 9-12; Göttingen.
- WAHRENBURG WOLFRAM 1999: Die Vegetation im Leintal zwischen Leinecke-see und Leinhäusle sowie im Rottal unterhalb Hüttenbühl als Grundlage für ein Naturschutzgebiet. – Unicornis 10 (Das Leintal 2. Beiträge zur Ökologie, zur Fauna, zur Vegetation, zu Biotopen und zum Naturschutz): 46-57; Schwäbisch Gmünd.
- WEBER HEINRICH E. 1999: Beitrag zur Brombeerflora der Pfalz. – Mitt. Pollichia 85 (1998): 219-229; Bad Dürkheim.
[Erstbeschreibung von *Rubus walteri*.]
- WEBER JOCHEN 1999: Erläuterungen zum Bannwald Sommerberg und den Vergleichsflächen im Wirtschaftswald, Baden-Württemberg, Wuchsgebiet Neckarland, Wuchsbezirk Stromberg, Forstbezirk Eppingen. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 12: 1-44; Freiburg i. Br.
- WEICHERDING FRANZ JOSEF 1999: Die Farnhybride *Polypodium mantoniae* Rothm. im mittleren Saartal. – Abhandl. Delattinia 25: 297-302; Saarbrücken.
- WICHT HEINZ 1999: Fragen der waldbaulichen Praxis an die Standorts- und Vegetationskundliche Wissenschaft - Beispiele aus dem Forstbezirk Rastatt. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 16: 1-6; Freiburg i. Br.
- WILMANN OTTI 1999: Vegetationsfarben. – Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 11 (100 Jahre Reinhold Tüxen. Geobotanik und Vegetationsgeographie): 367-384; Hannover.
- WIRTH VOLKMAR 1999: Neu- und Wiederfunde von Flechten und flechtenbewohnenden Pilzen in Deutschland. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 227-236; Stuttgart.
[Funde aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.]
- WIRTH VOLKMAR 1999: Das Endivien-Habichtskraut (*Hieracium intybaceum*) indigen im Schwarzwald. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 155: 237-240; Stuttgart.
- WIRTH VOLKMAR, CEZANNE RAINER & EICHLER MARION 1999: Beitrag zur Kenntnis der Dynamik epiphytischer Flechtenbestände. – Stuttgarter Beiträge Naturk., Serie A (Hrsg.: Staatliches Museum für Naturkunde in Stuttgart) 595: 17 S.; Stuttgart.
[Die Untersuchungsflächen liegen in Baden-Württemberg.]
- WITTIG RÜDIGER, LENKER KARL-HEINZ & TOKHTAR VALERI 1999: Zur Soziologie von Arten der Gattung *Oenothera* L. im Rheintal von Arnheim (NL) bis Mulhouse (F). – Tuexenia 19: 447-467; Göttingen.
[Vegetationsaufnahmen von *Oenothera*-Arten bei Karlsruhe.]
- WOLFF PETER 1999: Vegetation und Ökologie der nährstoffarmen Fließgewässer der Pfalz. – Polli-

chia Buch 37, 125 S.; Bad Dürkheim.

WOLFF PETER & LANG WALTER 1999: Siebte Nachträge zur „Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete“. – Mitt. Pollichia 85 (1998): 197-218; Bad Dürkheim.

WOTKE STEFAN A. & BÜCKING WINFRIED 1999: Aufnahmen der Vegetation im Bannwald Sommerberg. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 12: 45-56; Freiburg i. Br.

ZEIL LOTHAR & HIMMLER HEIKO 1999: Ein Fund der Spatzenzunge (*Thymelaea passerina*) bei Landau. – Pollichia Kurier 15 (4): 14; Annweiler am Trifels.

Anschrift des Bearbeiters:

Andreas Kleinsteuber
Rhode-Island-Allee 3
76149 Karlsruhe