II.

Berichtigungen und Nachträge zur Flechtenflora der Rheinpfalz

(vgl. Mitt. d. Pollichia Bd. III, 1 (1953) Seite 41 ff.)

S. **43**, 15. Zeile von oben, lies: und ihren umgestürzten, vermorschten Baumriesen.

S. **56**, Karte 2. Die Karte gehört zur Legende S. 81 (= Karte 9).

S. **72**, 6. Zeile von unten, lies: *polyrrhiza*.

S. **73**, 11. Zeile von unten, lies: Von den Felswänden.

S. **79**, Karte 8, lies: *Prunus* u. C. A. MOZER.

S. **81**, Karte 9. Die Karte gehört zur Legende S. 56 (= Karte 2).

S. **85**. *Calicium sphaerocephalum* ACH. = Synonym für die vorstehende Art.

S. **86**, 2. Zeile von oben, lies: LEIGHT.

S. **87**. *Fam. Gyalectaceae*, füge an: *G. ulmi* (SW.) A. ZAHLBR., P. H. (HEPP)
Bei *Lecidea fusco-atra* füge an: Fels bei der Lemberghütte. (GL.)

S. **88**. Füge unten an: *L. cinereoatra* ACH. Pfad zur Wegelnburg, Buntsandstein. (MÜLLER). —

S. **89**. Bei L. *uliginosa* füge an: var. *fuliginea* (ACH.) LINK. P. H. (HEPP)
Lies: *atro-fusca*. —
Lies: *L. lucida* u. füge an: Fruchtend am Schmelzerkopf am Königsberg, (det. HILLMANN). —
4. Zeile von oben füge an: Auf Porphyrit am Lemberg, Naheseite. (MÜLLER). —

S. **90**. Bei *Psora* füge an: *L. (Psora) lurida* (DILL.) ACH. Felsenberg bei Herxheim. (GL.). —
Bei *Bacidia* füge an: *B. rubella* (EHRH.) MASS. P. H. (HEPP). —
Bei *Rhizocarpon geograph.* füge an: *fo. Lecanore* (FLK.)
Hirtenfels u. Königsstuhl am Donnersberg (GL.)

S. **91**. *Rh. disporum* = *Rh. geminatum* (FLOT.) KBR. P. H. (HEPP).

S. **94**. Bei *Cl. furcata* var. *racemosa* füge an: *fo. furcato — subulata* (HOFFM.) WAIN. Sattelberg bei Rockenhausen (GL.). Trifels, Horbachtal (MÜLL.). —
Bei *Cl. furcata* füge noch an: var. *pinnata* (FLK.) WAIN. Gimmeldinger Tal, Wald beim Gr. Hammerweiher bei der Breitenau, Mittl. Krebser bei Kaiserslautern. (MÜLLER). —

Bei *Cl. rangiformis* füge an: var. *pungens* (ACH.) WAIN. Kiefernkopf bei Eßweiler. (GL.) Edenkobener Tal, Westhang des Lembergs, Fels bei Imsbach. (MÜLLER) var. *muricata* (DEL.) ARN. *fo. euganea* MASS. Auf Porphyr am Herztalfels bei Falkenstein. (GL.). —

Bei *Cl. crispata* füge an: var. *gracilescens* (RABENH.) WAIN. (Flößner ohne Standortsangabe).

S. **97**. Bei var. *cervicornis* füge an: Eisenknopf bei Wolfstein (MÜLLER) *fo. prolifera* SCHAER. Fels bei Imsbach a. D. (MÜLLER). —

DES ABAYES u. EVANS, die als die besten Cladonienkenner gelten, trennen in ihren jüngsten Schriften die Variation als selbständige Art ab, weil zwischen ihr und var. *convoluta* ökolog.-soziol. Discrepanzen bestehen, ganz abgesehen von morphologischen Unterschieden (O. KLEMENT briefl.)

S. **100**. Nach *A. rufescens* füge an: *A. fuscata* (ACH.) NYL. Tertiärsandstein bei Neuleiningen. (GL.) Auf Porphyr an Backe Schneider bei Falkenstein. (GL.) Auf Buntsandstein an der Heidenmauer bei Bad Dürkheim. (MÜLLER)

S. **101**. Nach *Leptogium lichen.* füge an: *L. scotinum* (Ach.) Fr. P. H. (Hepp).

S. **103**. Bei *Peltigera rufescens* füge an: Thronfels bei Imsweiler (Gl.). *fo. incusa* Koerb. Kl. Kalmit bei Landau auf Kalk. (Gl.). —
Lies: *P. malacea* und füge an: Über Porphyr auf dem Rheingrafenstein. (Gl.)

S. **104**. Bei *P. lactea* füge an: *fo. cinerascens* Nyl.. Auf Porphyr an der Ruine Wildenstein a. D. (Müller).

S. **106**. Bei *L. rupicola* füge an: Auf Tertiärsandstein bei Tiefenthal. (Gl.) Auf Rotsandstein der Randsteine der Hefersweiler Straße bei Wolfstein. (Müller). —

9. Zeile von unten lies: Hue. —

Füge unten an: *Lecanora frustulosa* (Dicks.) Ach. Zigeunerfels bei Wengelsbach unweit Schönau. Kühungerfels bei Petersbächel. Buntsandstein. Das Vorkommen dieser recht seltenen thermophylen Art überrascht. Eine schöne Bereicherung! (O. Klement briefl.) Ich hatte die Flechten zu *L. subcarnea* gerechnet.

S. **107**. Bei *Pl. radiosa* var. *subcircinata* füge an: Felsen an der Bahn bei Kirchmohr. (Müller). —

Nach *Ochrolechia androg.* füge an: *O. pallescens* (L.) Körb. Kiefernstamm am Pfad zur Hohen Loog bei Neustadt. (Müller).

S. **108**. *Candelariella pulvinata* = *C. coralliza* (Nyl.) H. Magnusson, 1952. Häufig an Lattenzäunen. (Müller). —
Nach *C. aurella* füge an: *C. Xanthostigma* (Pers.) Lett. P. H. (Hepp).

S. **110**. Bei *Parmelia saxatilis fo. furfuracea* füge an: Sehr schöne Rosetten an Buchenstämmen des Kleinen Letzbergs bei Kaiserslautern. (Müller).

S. **111**. Bei *P. laetevierens* füge an: Spärlich an Eichen u. Ahorn in der Wolfsteiner Schlucht des Königsbergs. (Müller)

S. **114**. Nach *U. dasypoga* füge an: *Usnea plicata* (L.) Fr. An Pappeln und Linden bei Eppenbrunn (Müller). Buntsandsteinfels der Ruine Blumenstein bei Schönau (Müller).

S. **115**. *Caloplaca tegularis* wird als eigene Art von *C. murorum* abgetrennt. Sie kommt an der Madenburg vor. (Müller). Dr. Poelt, München, will in einer Monographie die Artberechtigung nachweisen. (O. Klement briefl.)

S. **118**. *Ph. obscura* = *Ph. ciliata* (Hoffm.) Du. Rietz.

S. **120**. 16. Zeile von unten, lies: *Racodium.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der POLLICHIA

Jahr/Year: 1954

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Berichtigungen und Nachträge zur Flechtenflora der Rheinpfalz 198-199