PHILIPPIA III/5: 379–388 1978

GERHARD FOLLMANN

# Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi

## XIII

### Fasciculus

**Abstract**

The lichen exsiccate „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi", a collection of chorologically, ecologically, sociologically, or taxonomically interesting species from all over the world, is continued here with the labels for numbers 241–260. These include isotype material of *Lecanactis subdryophila* FOLLM. et VEZDA (Lecanactidaceae, Chile) and topotype material of *Lecanactis acicularis* DODGE (Lecanactidaceae, Chile). Some additions and corrections to former fascicles are also presented.

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 241. **Bryoria fuscescens** (GYELN.) BRODO et HAWKSW.

(Usneaceae)

I. M. BRODO et D. L. HAWKSWORTH: Op. bot. **42**, 83 (1977). – Alectoria fuscescens GYELN., V. GYELNIK: Nyt. Mag. Naturvid. **70**, 55 (1932). – Bryopogon fuscescens (GYELN.) GYELN., V. GYELNIK: Acta geobot. hung. **2**, 163 (1937). – Bryopogon pacificus GYELN., V. GYELNIK: Acta geobot. hung. **2**, 166 (1937)

Kanarische Inseln, Tenerife: vorhangartig im nebeloffenen, teilschattigen, weitgehend waagrechten Astwerk des Subkronenteils älterer Nadelbäume im *Usneetum atlanticae* KLEM., 1000–1100 m, NO–NW, pH 6,5, lichter Kiefernwald am Lomo del Fraile am Nordwesthang des Vulkans Teide oberhalb La Longuera

leg. G. FOLLMANN et E. BELTRAN-TEJERA (III/1977)
det. D. L. HAWKSWORTH (II/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 242. **Bryoria fuscescens** (GYELN.) BRODO et HAWKSW.

(Usneaceae)

I. M. BRODO et D. L. HAWKSWORTH: Op. bot. **42**, 83 (1977). – Alectoria fuscescens GYELN., V. GYELNIK: Nyt. Mag. Naturvid. **70**, 55 (1932). – Bryopogon fuscescens (GYELN.) GYELN., V. GYELNIK: Acta geobot. hung. **2**, 163 (1937). – Bryopogon pacificus GYELN., V. GYELNIK: Acta geobot. hung. **2**, 166 (1937)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: zopfartig an nebeloffenen, teilschattigen grobborkigen Mittelstämmen und im Subkronenteil älterer Nadelbäume im *Letharietum vulpinae* GAMS, 2100 m, NO–NW, pH 6,1, lichter Hangwald am Nordwestabfall der Ramolkögel zwischen Ramolalm und Venter Ache

leg. G. FOLLMANN et T. FOLLMANN (VII/1974)
det. D. L. HAWKSWORTH (II/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 243. **Byssoloma subdiscordans** (NYL.) JAMES
(Lecideaceae)

P. W. JAMES: Lichenologist **5**, 126 (1971). – Byssoloma rotuliforme (MUELL.-ARG.) SANT., C. A. THOROLD: J. Ecol. **40**, 129 (1952). – Catillaria leucoblepharoides (MERR.) ZAHLBR., A. ZAHLBRUCKNER: Cat. Lich. univ. **8**, 391 (1932). – Chiodecton subdiscordans NYL., W. NYLANDER: Flora **62**, 221 (1879)

Kanarische Inseln, Tenerife: zerstreut auf teilbeschatteten Blattspreiten im Subkronenteil älterer Lorbeerbäume im *Tapellarietum epiphyllae* FOLLM., 900 m, NO–NW, pH 6,5, dichter Nebelwald unter dem Roque de Chinobre im Lomo de los Tabordos auf der Anagahalbinsel

leg. et det. G. FOLLMANN et L. SANCHEZ-PINTO (IV/1977)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 244. **Evernia divaricata** (L.) ACH.
(Usneaceae)

E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 441 (1810). – Letharia divaricata (L.) HUE, A. M. HUE: Nouv. Arch. Mus. (Paris), Sér. **IV**, **1**: 59 (1890). – Usnea flaccida HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 133 (1976). – Usnea mollis (NECK.) BAUMG., J. BAUMGARTNER: Flora Lips. 590 (1790)

Mittelösterreich, Hohe Tauern: vorhangartig im halbschattigen nebeloffenen Zweigwerk des Unterkronenteils älterer Nadelbäume im *Evernietum divaricatae* FREY, 1800 m, NO–NW, pH 6,5, naturnahe Fichtenbestände im Zopatnitzental am Nordhang des Bergerkogels über Prägraten

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1977)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 245. **Haematomma ventosum** (L.) MASS.
(Lecanoraceae)

A. B. MASSALONGO: Ric. Aut. Lich. 33 (1852). – Lecania ventosa (L.) MUELL.-ARG., J. MÜLLER: Mém. Soc. Phys. Hist. nat. Geneve **16**, 387 (1862). – Lecanora ventosa (L.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 399 (1810)

Mittelösterreich, Hohe Tauern: flächendeckend an windoffenen, meist eis- und schneefreien Stirnflächen rauher Granitblöcke im *Agyrophoretum microphyllae* FREY, 2100 m, NW–SW, pH 5,9, Bergsturzblöcke unter dem Zunagl im oberen Umbaltal in der Venedigergruppe

leg. et det. B. FOLLMANN et G. FOLLMANN (VII/1977)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 246. **Lecanactis acicularis** DODGE – **Topotypus**
(Lecanactidaceae)

C. W. DODGE: Nova Hedwigia **16**, 488 (1968)

Mittelchile, Prov. Valparaíso: koloniebildend an halbschattigen luftoffenen Borkenpartien des Mittelstammteils älterer Blaufieberbäume im *Graphidetum immersae* FOLLM., 50 m, SO–SW, pH 6,5, lichter Eukalyptushain auf den Küstenhöhen über dem Balneario El Quisco

leg. M. MAHU (I/1977)
det. G. FOLLMANN (IX/1977)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 247. **Lecanactis subdryophila** FOLLM. et VEZDA – **Isotypus**
(Lecanactidaceae)

G. FOLLMANN et A. VEZDA: Philippia **3**, 271 (1977); G. FOLLMANN et S. HUNECK: Philippia **3**, 179 (1977)

Mittelchile, Prov. Aconcagua: flächenfüllend an seewindbestrichenen halbschattigen Borkenschollen der mittleren Stammpartien älterer Nadelbäume im *Graphidetum immersae* FOLLM., 20 m, pH 6,1, Kiefernpflanzung im Windschatten der Isla Seca in der Bucht von Zapallar

leg. G. FOLLMANN (I/1965)
det. G. FOLLMANN et A. VEZDA (IX/1976)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 248. **Lecidea granulosa** (EHRH.) ACH.
(Lecideaceae)

E. ACHARIUS: Meth. Lich. 65 (1803). – Biatora decolorans (HOFFM.) E. M. FRIES: Kungl. Vetenskapsakad. nya Handl. **1822**, 268 (1822). – Biatora granulosa (EHRH.) FLOT., J. VON FLOTOW: Merkw. selt. Flecht. Hirschberg 14 (1839). – Lecidea quadricolor (DICKS.) TAYL., J. T. MACKAY: Flora hibern. **2**, 128 (1836)

Deutsche Demokratische Republik, Bez. Potsdam: gesellig über Rohhumus und Pflanzenresten in lichtoffenen, trockenliegenden, mehr oder weniger waagrechten Vegetationslücken im *Lecideetum uliginosae* (LANGERF.) KLEM., 100 m, SO–SW, pH 5,9, Umland des Schweinelagerbruchs bei Bredereiche im Kreis Gransee

leg. et det. S. HUNECK (VIII/1977)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 249. **Lecidea lapicida** (ACH.) ACH. f. **oxydata** RABENH.
(Lecideaceae)

G. L. RABENHORST: Deutschl. Kryptogamenfl. **2**, 84 (1845). – Lecidella lapicida (ACH.) KOERB. f. oxydata (RABENH.) KOERB., G. W. KÖRBER: Parerg. lich. 208 (1861)

Mittelösterreich, Hohe Tauern: großflächig an lichtoffenen und windgefegten, nur leicht geneigten, verhältnismäßig glatten Plattenschlüssen im *Aspicilietum cinereae* FREY, 2700 m, SO–SW, pH 6,3, Schuttfelder unter der Sommerschneegrenze unter dem Türmljoch gegen den Aderkamm in der südlichen Venedigergruppe

leg. et det. G. FOLLMANN et T. A. FOLLMANN (VIII/1977)
test. H. HERTEL (I/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 250. **Ramalina crassa** (DEL.) MOT.
(Ramalinaceae)

J. MOTYKA: Fragm. florist. geobot. **6**, 696 (1960). – Ramalina cantabrica FOLLM., G. FOLLMANN: Philippia **2**, 67 (1974). – Ramalina cuspidata (ACH.) NYL. f. cornuta HARM., J. HARMAND: Lich. France **3**, 416 (1907). – Ramalina siliquosa (HUDS.) A. L. SMITH var. crassa (DEL.) HAWKSW., D. L. HAWKSWORTH: Field Stud. **3**, 570 (1972)

Nordspanien, Prov. La Coruña: horstbildend an seeseitigen, windoffenen, aber vor Mittagssonne geschützten Stirn- und Überhangflächen rauher Granitfelsen über der Spritzwasserzone im *Ramalinetum siliquosae* (DU RIETZ) FOLLM., 30–50 m, NW, pH 6,5, Steilküste am Cabo Finisterre gegen die Punta dos Oidos

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1975)
test. W. L. CULBERSON (III/1976)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 251. **Ramalina panizzei** DE NOT.
(Ramalinaceae)

G. DE NOTARIS: Giorn. bot. ital. **II**, **1**, 211 (1846). – Ramalina polymorpha (ACH.) ACH. var. panizzei (DE NOT.) MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lich. 65 (1853)

Südfrankreich, Iles d'Hyères: dichtbuschig im windoffenen, diffus belichteten jungen Zweigwerk des unteren Kronenteils solitärer Ölbäume im *Ramalinetum fastigiatae* DUVIGN., 60 m, S, pH 6,7, lichte Olivenhaine im Vallée La Solitude auf der Ile de Port-Cros

leg. et det. Y. RONDON (V/1971)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 252. **Squamarina gypsacea** (J. E. SMITH) POELT
(Lecanoraceae)

J. POELT: Mitt. bot. Staatssamml. München **19–20**, 539 (1958). – Lecanora fragilis (SCOP.) ZAHLBR., A. ZAHLBRUCKNER: Ann. naturhist. Mus. Wien **38**, 143 (1925). – Lecanora gypsacea (J. E. SMITH) MUELL.-ARG., J. MÜLLER: Bull. Soc. Haller. **4**, 132 (1856). – Lecanora smithii (ACH.) ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 410 (1810)

Südspanien, Prov. Cádiz: zerstreut an weitgehend geschützten, halbschattigen Steilflächen und in Haarspalten rauher Kalkfelsen im *Caloplacion pyraceae* KLEM., 1200 m, NO–SO, pH 7,5, unter der gegenwärtigen Waldgrenze am Südosthang der Sierra del Pinar unweit Grazalema

leg. et det. G. FOLLMANN (X/1976)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 253. **Tapellaria epiphylla** (MUELL.-ARG.) SANT.
(Lecideaceae)

C. A. THOROLD: J. Ecol. **40**, 129 (1952); R. SANTESSON: Symb. bot. Upsal. **XII**, **1**, 505 (1952). – Arthothelium phyllogenum MUELL.-ARG., J. MÜLLER: Flora **64**, 234 (1881). – Lopadium epiphyllum MUELL.-ARG., J. MÜLLER: Flora **64**, 107 (1881)

Kanarische Inseln, Tenerife: vereinzelt auf teilbeschatteten Blattspreiten im Subkronenteil älterer Lorbeerbäume im *Tapellarietum epiphyllae* FOLLM., 900 m, NO–NW, pH 6,5, dichter Nebelwald unter dem Roque de Chinobre im Lomo de los Tabordos auf der Anagahalbinsel

leg. et det. G. FOLLMANN et L. SANCHEZ-PINTO (IV/1977)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 254. **Thamnolia subuliformis** (EHRH.) CULB.
(Thamnoliaceae)

W. L. CULBERSON: Brittonia **15**, 144 (1963). – Thamnolia subvermicularis ASAH., Y. ASAHINA: J. Jap. Bot. **13**, 317 (1937). – Thamnolia vermicularis (SWARTZ) ACH. var. subuliformis (EHRH.) SCHAER., L. E. SCHAERER: Enum. crit. Lich. eur. 243 (1850)

Mittelösterreich, Hohe Tauern: gesellig auf mäßig geneigten, licht- und windoffenen Rohhumusflecken in Krummseggenrasen im *Thamnolietum vermicularis* GAMS, 2100 m, NO–NW, pH 5,9, Neuwandalpe unter dem Großen Schober im mittleren Umbaltal in der Venedigergruppe

leg. et det. G. FOLLMANN et B. A. FOLLMANN (VIII/1977)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 255. **Thamnolia vermicularis** (SWARTZ) ACH.
(Thamnoliaceae)

L. E. SCHAERER: Enum. crit. Lich. eur. 243 (1850); W. L. CULBERSON: Brittonia **15**, 141 (1963). – Cladonia vermicularis (SWARTZ) DE CAND., J. B. A. DE LAMARCK et A. P. DE CANDOLLE: Flore franc. **2**, 335 (1805). – Thamnolia andicola NYL., Ann. Sci. nat., Bot. **IV, 11**, 211 (1859)

Westösterreich, Stubaier Alpen: kurzrasig auf mäßig geneigten, licht- und windoffenen Rohhumusflecken zwischen Silberwurzspalieren im *Thamnolietum vermicularis* GAMS, SO–SW, 2100 m, pH 6,5, Felsgesimse in der oberen Roßgrube unter der Ochsenwand in den Kalkkögeln

leg. et det. G. FOLLMANN (X/1975)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 256. **Usnea australis** E. M. FRIES
(Usneaceae)

E. M. FRIES: Syst. Orb. veget. **1**, 282 (1825); J. MOTYKA: Lich. Gen. Usnea barbata (L.) WIGG. var. angulosa MUELL.-ARG., J. MÜLLER: Jahrb. königl. bot. Gart. Berlin **2**, 308 (1883)

Hawaii-Inseln, Hawaii: horstbildend an locker auf dem Erdboden verstreutem abgestorbenem Astwerk von rauhborkigen Laubbäumen im *Heterodermion leucomelae* FOLLM., 1250 m, ohne ausgesprochene Expositionsabhängigkeit, pH 6,8, licht- und nebeloffener Akazienwald am Kipuka Ki im Hawaii Volcanoes National Park

leg. O. DEGENER et I. DEGENER (I/1977)
det. et comm. K. KALB (I/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 257. **Usnea laricina** VAIN.
(Usneaceae)

V. RÄSÄNEN: Ann. Acad. Sci. Fenn., **A**, **34** (4), 17 (1931); J. MOTYKA: Lich. Gen. Usnea Stud. monogr. **1**, 280 (1936). – Usnea sorediifera (ARN.) MOT. var. laricina (VAIN.) KEISSL., K. VON KEISSLER: Rabenh. Kryptogamenfl. **IX**, **5** (4), 634 (1960)

Südfrankreich, Dép. Haute-Provence: gesellig an halbschattigen, nur zeitweilig nebelfeuchten grobscholligen Borkenpartien des Mittelteils älterer Lärchenstämme im *Pseudevernietum furfuraceae* (HIL.) OCHSN., 1300 m, N, pH 6,1, lichte Nadelwälder um Clot du Dou bei Saint-Vincent les Forts

leg. et det. Y. RONDON (VII/1972)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 258. **Usnea rubiginea** (MICHX.) MASS.
(Usneaceae)

A. B. MASSALONGO: Mem. I. R. Ist. Veneto **10**, 45 (1861). – U s n e a c e r a t i n a ACH. f. r u b i g i n e a (MICHX.) KREMPELH., A. VON KREMPELHUBER: Vid. Medd. naturhist. For. Kjobenhavn **5**, 4 (1874). – U s n e a r u b i c u n d a STIRT., J. STIRTON: Scott. Natur. **6**, 102 (1881); J. MOTYKA: Lich. Gen. U s n e a Stud. monogr. **1**, 339 (1937)

Südfrankreich, Iles d'Hyères: tuffbildend an halbschattigen luftoffenen Stammpartien und im Zweigwerk älterer Baumheide im *Usneetum rubigineae* (BARKM.) FOLLM., 190 m, SO–SW, pH 6,6, lichter Buschwald am Mont-Vinaigre im Nationalpark auf der Ile de Port-Cros

leg. et det. Y. RONDON (IX/1970)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 259. **Usnea sorediifera** (ARN.) MOT.
(Usneaceae)

J. MOTYKA: Wydawn. Muz. Slask. Katowice **III**, **2**, 15 (1930); Lich. Gen. U s n e a Stud. monogr. **1**, 286 (1936). – U s n e a f l o r i d a (L.) WIGG. var. s o r e d i i f e r a (ARN.) HUE, A. M. HUE: Nouv. Arch. Mus. (Paris), Sér. **IV**, **1**, 37 (1899). – U s n e a h i r t a (L.) WIGG. var. s o r e d i i f e r a (ARN.) JATTA, A. JATTA: Flora ital. crypt. **3**, 145 (1909)

Südfrankreich, Dép. Hautes-Alpes: dichtbuschig an leicht beschatteten, langfristig trockenstehenden grobscholligen Borkenpartien des Mittelteils älterer Lärchenstämme im *Pseudevernietum furfuraceae* (HIL.) OCHSN., 1700 m, NO, pH 5,9, lichte Nadelwälder um Chaillol-en-Champsaur

leg. et det. Y. RONDON (VII/1972)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 260. **Xanthoparmelia conspersa** (ACH.) HALE
(Parmeliaceae)

M. E. HALE: Phytologia **28**, 485 (1974). – P a r m e l i a c o n s p e r s a (ACH.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 205 (1803); M. E. HALE: Bryologist **67**, 466 (1964). – P a r m e l i a d i g i t u l a t a NYL., W. NYLANDER: Flora **61**, 247 (1878). – P a r m e l i a i s i d i a t a (ANZI) GYELN., V. GYELNIK: Mag. Bot. Lap. **29**, 31 (1930)

Mitteldeutschland, Bez. Nordhessen: großfleckig an lichtoffenen glatten Kulmflächen schwach geneigter dunkler Schieferplatten im *Xanthoparmelietum conspersae* KLEM., 350 m, S, pH 6,3, Waldsaumlücken am Südhang der Ederhöhen unter dem Dicken Kopf unweit Gellershausen

leg. et det. G. FOLLMANN (V/1972)

**Addenda et Corrigenda**

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 8. **Pseudocyphellaria berberina** (FORST.) GALLOW. et JAMES
(Stictaceae)

D. J. GALLOWAY et P. W. JAMES: Lichenologist **9**, 95 (1977). – Pseudocyphellaria durvillei (DEL.) VAIN., A. E. VAINIO: Hedwigia **38**, 187 (1899). – Pseudocyphellaria orygmaea (ACH.) MALME, G. O. A. MALME: Bih. kongl. svenska Vetensk. Akad. Handl. **25** (6), 28 (1899). – Sticta durvillei DEL., D. F. DELISE: Mém. Soc. Linn. Normandie **2**, 599 (1825). – Sticta orygmaea ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 278 (1803)

Südchile, Prov. Llanquihué: großflächig an feuchten schattigen Borkenpartien des mittleren Stammteils alter Südbuchen im *Stiction subantarcticum* MATT., 800 m, SO–SW, pH 5,8, Regenwald bei Petrohué am Lago Todos los Santos

leg. et det. G. FOLLMANN et H. LEMBCKE (XII/1965)
rev. G. FOLLMANN (I/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 64. **Cladina macaronesica** (AHTI) FOLLM. et HERN.-PADR.
(Cladoniaceae)

G. FOLLMANN: Philippia **3**, 369 (1978). – Cladonia azorica AHTI, T. AHTI: Ann. bot. Soc. zool. bot. fenn. **32**, 36 (1961). – Cladonia macaronesica AHTI, T. AHTI: Ann. bot. Soc. zool. bot. fenn. **32**, 37 (1961)

Kanarische Inseln, Gran Canaria: bodendeckend auf halbschattigem Bimskies in kleinen Waldlichtungen im *Cladinetum macaronesicae* FOLLM. et HERN.-PADR., 600 m, NO–NW, pH 6,8, Lorbeerwaldrelikt von Los Tilos unweit Moya im Nordteil der Insel

leg. G. FOLLMANN (IX/1968)
rev. G. FOLLMANN (II/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 150. **Xanthoparmelia vagans** (NYL.) HALE
(Parmeliaceae)

M. E. HALE: Phytologia **28**, 499 (1974). – Parmelia conspersa (EHRH.) ACH. var. vagans (NYL.) NYL., W. NYLANDER: Lich. Scand. 100 (1861). – Parmelia molliuscula ACH. var. vagans NYL., W. NYLANDER: Synops. Lich. **1**, 393 (1860). – Parmelia vagans (NYL.) NYL., W. NYLANDER: Flora **52**, 293 (1869)

Ostspanien, Prov. Teruel: als freilebende Wanderflechte zusammengetrieben in warmgetönten windoffenen Lehmpfannen zwischen Kalkschrofen im *Xanthoparmelietum vagantis* (KELL.) KLEM., 1000 m, SW, pH 7,7, schüttere Zwergstrauchheide in der Sierra de la Costera unweit Fuentes Calientes

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1973)
rev. G. FOLLMANN (II/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 164. **Cladina stellaris** (OPIZ) BRODO
(Cladoniaceae)

I. M. BRODO: Bryologist **79**, 363 (1976). – Cladina alpestris (L.) HARM., J. HARMAND: Bull. Soc. sci. Nancy, Sér. **II**, **14**, 157 (1894). – Cladonia alpestris (L.) RABENH., L. RABENHORST: Clad. eur. 11 (1860). – Cladonia stellaris (OPIZ) POUZ. et VEZDA, Z. POUZAR et A. VEZDA: Preslia **43**, 193 (1971)

Westösterreich, Stubaier Alpen: horstbildend auf schwach geneigten Rohhumusflächen in Vegetationslücken langfristig schneebedeckter Zwergstrauchheiden im *Cladinetum stellaris* FREY, 2300 m, NO, pH 5,9, Südosthang des mittleren Längentals oberhalb Kühtai

leg. et det. G. FOLLMANN (X/1975)
rev. G. FOLLMANN (II/1978)

## G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 174. **Rhizoplaca bullata** (FOLLM. et CRESPO) LEUCK. et POELT – **Isotypus**
(Lecanoraceae)

J. POELT et A. VEZDA: Bibl. lichenol. **9**, 234 (1977). – Omphalodina bullata FOLLM. et CRESPO, G. FOLLMANN et A. CRESPO: Philippia **3**, 24 (1976)

Zentralspanien, Prov. Toledo: koloniebildend an halbschattigen, luftfeuchten, teils überhängenden, verhältnismäßig glatten Silikatfelsen im *Leprarion chlorinae* SMARDA et HADAC, 800 m, N, pH 6,5, Felstürme in der Sierra de Altamira unweit Puerto de San Vicente

leg. et det. G. FOLLMANN et A. CRESPO (XI/1975)
rev. G. FOLLMANN (I/1978)

**Anmerkung**

Wiederum gilt der Dank des Herausgebers allen in den Scheden genannten Kollegen, Mitarbeitern und Sammlern, ohne deren uneigennützige Hilfe auch der vorliegende Faszikel nicht zustandegekommen wäre.

**Zusammenfassung**

Faszikel XIII der „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi", einer Sammlung chorologisch, ökologisch, soziologisch oder taxonomisch interessanter Flechten aus aller Welt, bringt die Scheden zu den Nummern 241–260. Darunter befindet sich Isotypusmaterial von *Lecanactis subdryophila* FOLLM. et VEZDA (Lecanactidaceae, Chile) und Topotypusmaterial von *Lecanactis acicularis* DODGE (Lecanactidaceae, Chile). Einige Anmerkungen und Berichtigungen zu den vorausgegangenen Faszikeln sind angeschlossen.

**Synopsis**

FOLLMANN, G., 1968 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. I. Fasciculus. Willdenowia **4**: 383–390.
– 1968 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. II. Fasciculus. Willdenowia **4**: 391–397.
– 1968 c: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. III. Fasciculus. Willdenowia **5**: 15–21.
– 1970: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. IV. Fasciculus. Willdenowia **6**: 17–24.
– 1973: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. V. Fasciculus. Philippia **2**: 13–21.
– 1974: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VI. Fasciculus. Philippia **2**: 139–146.
– 1975 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VII. Fasciculus. Philippia **2**: 213–220.
– 1975 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VIII. Fasciculus. Philippia **2**: 286–294.
– 1976 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. IX. Fasciculus. Philippia **3**: 30–37.
– 1976 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. X. Fasciculus. Philippia **3**: 90–97.
– 1977 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. XI. Fasciculus. Philippia **3**: 189–198.
– 1977 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. XII. Fasciculus. Philippia **3**: 288–295.

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 1. März 1978.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. G. FOLLMANN
Naturkundemuseum im Ottoneum
Steinweg 2
3500 Kassel 1
BRD

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel

Jahr/Year: 1976-1978

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): Follmann Gerhard

Artikel/Article: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. XIII. Fasciculus 379-388