PHILIPPIA II/4: 213–220 1975

GERHARD FOLLMANN

Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi

VII

Fasciculus

Abstract

The lichen exsiccate „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi", a collection of chorologically, ecologically, and taxonomically interesting species of all over the world, is continued with the labels for numbers 121–140.

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 121. **Acarospora epithallina** MAGN.
(Acarosporaceae)

A. H. MAGNUSSON: Kongl. svensk. Vetensk. Akad. Handl. **7 (4)**: 72 (1929); G. FOLLMANN et S. HUNECK: Philippia **1**, 174 (1972)

Westspanien, Prov. Badajoz: zerstreut an halbschattigen Stirnflächen glatter Porphyritblöcke im *Acarosporetum hilaris* FOLLM., 600 m, SO, pH 6,3, Felstriften in der Sierra del Castellar nordwestlich Zafra

leg. et det. G. FOLLMANN et T. A. FOLLMANN (VII/1971)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 122. **Buellia zoharyi** GALUN
(Physciaceae)

M. GALUN: Lich. Israel 74 (1970); J. POELT et M. SULZER: Nova Hedwigia **25**, 188 (1974)

Zentralspanien, Prov. Madrid: zerstreut in schwach geneigten, licht- und windoffenen feinerdigen Trockenrasenlücken auf Gipshügeln im *Toninion caeruleonigricantis* REIMERS, 500 m, SO–SW, pH 7,3, Cerros Yesíferos de Ciempozuelos nördlich Aranjuez

leg. E. BARRENO, G. FOLLMANN et A. CRESPO (XI/1974)
det. G. FOLLMANN (I/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 123. **Cetraria ericetorum** OPIZ
(Parmeliaceae)

M. P. OPIZ: Böh. phan. crypt. Gew. 135 (1823). – Cetraria crispa (ACH.) NYL., W. NYLANDER: Bull. Soc. Linn. Normand., Ser. **IV, 1**, 202 (1887). – Cetraria islandica (L.) ACH. var. crispa ACH., E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 513 (1810). – Cetraria islandica (L.) ACH. var. tenuifolia (RETZ.) VAIN., E. A. VAINIO: Ark. Bot. **8 (4)**: 21 (1909). – Cetraria tenuifolia (RETZ.) R. H. HOWE, R. H. HOWE: Torreya **15**, 219 (1915)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: rasenbildend auf Rohhumusböden lichtoffener, trockengetönter windgefegter Hügelkuppen im *Thamnolietum vermicularis* GAMS, 2300 m, N, pH 5,5, Nordostabfall der Talleitspitze gegen das Rofental oberhalb Vent

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 124. **Cladonia nylanderi** COUT.
(Cladoniaceae)

A. X. COUTINHO: Cat. Lich. Lusit. 38 (1916). – Cladonia alcicornis (LIGHTF.) FLOERKE var. firma NYL., W. NYLANDER: Synops. meth. Lich. **1**, 191 (1858). – Cladonia foliacea (HUDS.) SCHAER. var. firma (NYL.) VAIN., E. A. VAINIO: Monogr. Clad. univ. **2**, 400 (1894)

Südspanien, Prov. Huelva: horstbildend in Vegetationslücken lichter Kiefern- und Zistrosenbestände auf trockenen Sandböden im *Cladonietum convolutae* (MUELL.) FOLLM., 50 m, SW, pH 6,6, Küstenformation östlich Mazagón unweit Torre del Oro

leg. et det. G. FOLLMANN (VIII/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 125. **Cornicularia normoerica** (GUNN.) DU RIETZ
(Parmeliaceae)

E. DU RIETZ: Ark. Bot. **20, A (11)**: 32 (1926). – Cornicularia tristis (G. H. WEB.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Descript. Adumbr. Plant. lich. **2**, 36 (1974). – Cetraria normoerica (GUNN.) LYNGE, B. A. LYNGE: Stud. Lich. Flora Norw. 179 (1921). – Cetraria tristis (G. H. WEB.) E. M. FRIES, E. M. FRIES: Lichenogr. eur. ref. 34 (1831)

Zentralspanien, Prov. Madrid: horstbildend an ausgesetzten Stirnflächen rauher Granitfelsen im *Umbilicarion cylindricae* FREY, 1700 m, SW, pH 5,9, Südostabfall der Maliciosa in der Sierra de Guadarrama unweit Navacerrada

leg. et det. G. FOLLMANN et A. CRESPO (XI/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 126. **Gloeolecta bryophaga** (KOERB.) VEZDA
(Gyalectaceae)

A. VEZDA: Preslia 37: 237 (1965). – Gyalecta bryophaga (KOERB.) HELLB., P. J. HELLBOM: Nerik. Lafflora 47 (1871). – Gyalecta gloeocapsa (NITSCHKE) ZAHLBR., A. ZAHLBRUCKNER: Natürl. Pflanzenfam. **I, 1**, 126 (1905). – Secoliga bryophaga KOERB., F. C. G. ARNOLD: Flora **47**, 595 (1864)

Mitteldeutschland, Bez. Nordbayern: flächendeckend über Moospolstern und auf Rohhumus zwischen Felsblöcken im *Cladonion silvaticae* KLEM., 900 m, N, pH 5,9, Basaltblockmeer in Gipfelnähe des Kreuzbergs bei Bischofsheim in der Bayerischen Rhön

leg. et det. V. WIRTH (IX/73)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 127. **Hypogymnia tubulosa** (SCHAER.) HAV.
(Parmeliaceae)

J. J. HAVAAS: Bergens Mus. Aarb., naturvid. R. **2**, 31 (1918). – Parmelia physodes (L.) ACH. var. tubulosa (SCHAER.) MUELL.-ARG., J. MÜLLER-ARGAU: Mém. Soc. Phys. Hist. nat. Genève **16**, 373 (1862). – Parmelia tubulosa (SCHAER.) BITT., G. BITTER: Hedwigia **40**, 179 (1901)

Zentralspanien, Prov. Madrid: gesellig an halbschattiger grobscholliger Kiefernborke in lockeren Hangwäldern im *Pseudevernietum furfuraceae* (HIL.) OCHSN., 1500 m, SW, pH 6,3, Südabfall der Maliciosa in der Sierra de Guadarrama oberhalb Mataelpino

leg. et det. G. FOLLMANN, A. CRESPO et E. BARRENO (XI/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 128. **Lepraria crassissima** (HUE) LETT. var. **isidiata** LLIM.
(Leprariaceae)

X. LLIMONA: Sched. Lich. exs. sel. ed. Inst. bot. Acad. Sci. cechoslov. **47**, 1175 (1973); Opusc. spars. Dep. Bot. Fac. Sci. Univ. Barcin. **6**, 11 (1973)

Südspanien, Prov. Almería: massenhaft an geschützten, halbschattigen, steilen angewitterten Gipsabbrüchen im *Aspicilio-Lecideetum gypsicolae* LLIM., 450 m, NO–NW, pH 7,2, Gipssteppe bei Rio Aguas südöstlich Sorbas

leg. et det. G. FOLLMANN (XII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 129. **Leprocaulon tenellum** (TUCK.) NYL.
(Stereocaulaceae)

W. NYLANDER: Lich. Jap. 19 (1890). – Stereocaulon tenellum TUCK., E. TUCKERMAN: Crypt. Wilkes Exped. 123 (1861)

Nordchile, Prov. Coquimbo: rasenbildend auf Dioritgrus im Schlagschatten von Felsblöcken am Nebelwaldsaum im *Stereocaulion ramulosi* MATT., 500 m, NO, pH 6,6, Naturschutzgebiet Fray Jorge unweit Ovalle

leg. G. FOLLMANN (IX/1964)
det. I. MACKENZIE-LAMB (I/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 130. **Ochrolechia szatalaensis** VERS.
(Pertusariaceae)

K. VERSEGHI: Ann. hist.-nat. Mus. nat. Hung. **9**, 80 (1958); Beih. Nova Hedwigia **1**, 76 (1962)

Kanarische Inseln, Gran Canaria: zerstreut an dürrem Zweigwerk der unteren Kronenteile in nebeloffenen Kiefernwäldern im *Usneetum atlanticae* KLEM., 1400 m, NW, pH 6,5, Pinar de Tamadaba nordwestlich von Artenara

leg. G. FOLLMANN et G. KUNKEL (IX/1968)
det. G. FOLLMANN (V/1972)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 131. **Peltigera aphthosa** (L.) WILLD.
(Peltigeraceae)

C. L. WILLDENOW: Flora Berol. 347 (1787). – Peltidea aphthosa (L.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 287 (1803)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: flächendeckend über halbschattigen Moospolstern in Schluchtwaldsäumen im *Cladonietum alpestris* FREY, 2000 m, NW, pH 5,8, unter dem Stockkogel im Venter Tal nahe Heiligkreuz

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 132. **Psora decipiens** (HEDW.) HOFFM.
(Lecideaceae)

G. F. HOFFMANN: Descript. Adumbr. Plant. lich. **2**, 68 (1974). – Lecidea decipiens (HEDW.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 80 (1803). – Placodium decipiens (HEDW.) LINK, J. H. F. LINK: Grundr. Kräuterk. **3**, 189 (1833). – Psora gypsophila (SCHRAD.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 162 (1796)

Zentralspanien, Prov. Madrid: gesellig in schwach geneigten, licht- und windoffenen Trockenrasenlücken auf Gipshügeln im *Toninion caeruleonigricantis* REIMERS, 500 m, SO–SW, pH 7,2, Cerros Yesíferos de Ciempozuelos nördlich von Aranjuez

leg. et det. A. CRESPO, G. FOLLMANN et E. BARRENO (XI/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 133. **Solorina crocea** (L.) ACH.
(Peltigeraceae)

E. ACHARIUS: Lichenogr. univ. 149 (1810). – Peltigera crocea (L.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Descript. Adumbr. Plant. lich. **2**, 60 (1974)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: flächendeckend über Fließerde und Feinschutt auf Moränengeschiebe im *Stereocauletum alpini* FREY, 2700 m, NW, pH 5,7, Nordwestabfall des Marzellkammes im obersten Niedertal

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 134. **Stereocaulon alpinum** LAUR.
(Stereocaulaceae)

A. F. FUNCK: Crypt. Gewächs. **33**, 6 (1827). – Stereocaulon paschale (L.) HOFFM. var. alpinum (LAUR.) MUDD, W. A. MUDD: Man. Brit. Lich. 66 (1861). – Stereocaulon tomentosum E. M. FRIES var. alpinum (LAUR.) T. M. FRIES, T. M. FRIES: Stereoc. Piloph. Comment. 30 (1857)

Westösterreich, Ötztaler Alpen: bestandsbildend als Erstbesiedler auf jungen offenen Moränenböden im *Stereocauletum alpini* FREY, 2450 m, SO, pH 5,9, oberstes Rofental unter den Guslarspitzen im Weißkamm

leg. et det. G. FOLLMANN (VII/1974)
test. I. MACKENZIE-LAMB (I/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 135. **Stereocaulon dactylophyllum** FLOERKE
(Stereocaulaceae)

H. G. FLÖRKE: Deutschl. Lich. **4**, 13 (1819). – Stereocaulon coralloides E. M. FRIES, E. M. FRIES: Lich. exs. 118 (1817); T. M. FRIES: Stereoc. Piloph. Comment. 16 (1857)

Mitteldeutschland, Bez. Osthessen: polsterbildend in geschützten Gesteinsspalten zwischen glatten Felsblöcken im *Lecideetum lithophilae* WIRTH, 800 m, SO, pH 6,1, Basaltblockstrom im Naturschutzgebiet Schafstein unweit Wüstensachsen im Naturpark Hochrhön

leg. et det. G. FOLLMANN (X/1973)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 136. **Stereocaulon ramulosum** (SWANS.) RAEUSCH. f. **elegans** T. M. FRIES
(Stereocaulaceae)

T. M. FRIES: Stereoc. Piloph. Comment. 11 (1857). – I. MACKENZIE-LAMB: Ann. Parqu. nac. **7**, 94 (1958)

Südchile, Prov. Osorno: rasenbildend als Erstbesiedler auf grobkörnigem jungem Lavageschiebe im *Stereocauletum ramulosi* FOLLM., 1500 m, W, pH 6,5, oberhalb des Lago Rupanco in der südchilenischen Vulkankette

leg. et det. G. FOLLMANN et H. LEMBCKE (XII/1965)
test. I. MACKENZIE-LAMB (I/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 137. **Stereocaulon ramulosum** (SWANS.) RAEUSCH. var. **macrocarpum** (A. RICH.) BAB.
(Stereocaulaceae)

J. D. HOOKER: Flora Nov. Zel. **2**, 294 (1855). – Stereocaulon macrocarpum A. RICH., A. RICHARD: Voy. Découv. Astrolabe, Bot. **1**, 34 (1832)

Südchile, Prov. Llanquihué: horstbildend in geschützten Gesteinsspalten junger Lavaströme im *Stereocauletum ramulosi* FOLLM., 1200 m, NW–SW, pH 6,8, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales in der südchilenischen Vulkankette unweit Petrohué

leg. et det. G. FOLLMANN et H. LEMBCKE (XII/1965)
test. I. MACKENZIE-LAMB (I/1975)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 138. **Stereocaulon vesuvianum** PERS.
(Stereocaulaceae)

C. H. PERSOON: Ann. wetterau. Ges. **2**, 19 (1811). – Stereocaulon botryosum ACH. var. vesuvianum (PERS.) ACH., E. ACHARIUS: Synops. Lich. 285 (1814). – Stereocaulon denudatum FLOERKE var. vesuvianum (PERS.) LAUR., J. A. P. HEPP: Flecht. Eur. 2 (1853); W. NYLANDER: Ann. Sci. nat., Sér. **IV, 3**, 149 (1855)

Kapverdische Inseln, Fogo: flächendeckend an licht- und windoffenen Stirn- und Scheitelflächen poröser Lavablöcke sowie über Lavagrus im *Stereocauletum vesuviani* KLEM., 1000 m, NW–SW, pH 6,8, Lavafelder am Westhang des Vulkans Fogo oberhalb Mira Mira

leg. et det. G. FOLLMANN et J.-R. KESTLER-MERLIN (IV/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 139. **Teloschistes scorigenus** (MONT.) VAIN.
(Teloschistaceae)

E. A. VAINIO: Cat. Afr. Plants Welwitsch **II, 2**, 407 (1901). – Anaptychia scorigena (MONT.) HUE, A.-M. HUE: Ann. Mycol. **12**, 516 (1914). – Physcia scorigena (MONT.) DE NOT., G. DE NOTARIS: Giorn. bot. ital. **II, 2**, 197 (1847). – Tornabenia scorigena (MONT.) MASS., A. B. MASSALONGO: Mem. lichenogr. 42 (1853)

Kanarische Inseln, Tenerife: gesellig an offenen Stirnflächen rauher Lavafelsen des oberen Ärohalins im *Caloplacion marinae* KLEM., 100 m, NW, pH 6,9, Punta Tamadite nahe Playa Fajana nordöstlich Bajamar

leg. et det. L. GALLO (XII/1973)
test. G. FOLLMANN (IV/1974)

G. FOLLMANN: LICHENES EXSICCATI SELECTI A MUSEO HISTORIAE NATURALIS CASSELENSI EDITI

No. 140. **Toninia caeruleonigricans** (LIGHTF.) T. M. FRIES
(Lecideaceae)

T. M. FRIES: Lichenogr. scand. **1**, 336 (1874). – Lecidea caeruleonigricans (LIGHTF.) SCHAER., L. E. SCHAERER: Lich. helv. spic. **3**, 121 (1828). – Lecidea vesicularis (HOFFM.) ACH., E. ACHARIUS: Meth. Lich. 78 (1803). – Psora vesicularis (HOFFM.) HOFFM., G. F. HOFFMANN: Deutschl. Flora 163 (1796)

Mitteldeutschland, Bez. Nordhessen: koloniebildend in windoffenen Trockenrasennischen schwach geneigter Kalkhänge im *Fulgensietum fulgentis* GAMS, 350 m, SW–SO, pH 7,8, Hochflächen des Naturschutzgebiets Hielöcher unweit Eschwege

leg. et det. G. FOLLMANN (III/1973)

Anmerkung

Auch diesmal möchte der Herausgeber wieder allen in den Scheden genannten Sammlern danken, ohne deren uneigennützige Mithilfe der vorliegende Faszikel nicht zustandegekommen wäre.

Zusammenfassung

Faszikel VII der „Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi", einer Sammlung chorologisch, ökologisch oder taxonomisch interessanter Flechten aus aller Welt, bringt die Scheden zu den Nummern 121—140.

Schrifttum

FOLLMANN, G., 1968 a: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. I. Fasciculus. Willdenowia **4**: 383—390.
— 1968 b: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. II. Fasciculus. Willdenowia **4**: 391—397.
— 1968 c: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. III. Fasciculus. Willdenowia **5**: 15—21.
— 1970: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Botanico Berolinensi Editi. IV. Fasciculus. Willdenowia **6**: 17—24.
— 1973: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. V. Fasciculus. Philippia **2**: 13—21.
— 1974: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VI. Fasciculus. Philippia **2**: 139—146.

Manuskript bei der Schriftleitung eingegangen am 1. Februar 1975.

Anschrift des Verfassers:

G. FOLLMANN
Naturkundemuseum im Ottoneum
Steinweg 2
35 Kassel 1
BRD

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Philippia. Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel

Jahr/Year: 1973-1975

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): Follmann Gerhard

Artikel/Article: Schedae ad Lichenes Exsiccati Selecti a Museo Historiae Naturalis Casselensi Editi. VII Fasciculus 213-220