

Ber. Naturf. Ges. Freiburg i. Br.	79	S. 219–296	14 Abb.	6 Tab. 1 Karte	Freiburg 1991
-----------------------------------	----	------------	---------	-------------------	---------------

Das Vegetationsmosaik eines Waldgebietes der Emmendinger Tafelbergzone bei Freiburg¹⁾

– Beziehungen zwischen Geologie, Böden und Vegetation.

von

Axel Ssymank, Bonn/Bad-Godesberg

Zusammenfassung

Die Emmendinger Tafelbergzone, ca. 25 km nördlich von Freiburg, ist eine von triadischen Deckgebirgsgesteinen gebildete Tafelberglandschaft. Das Klima hat eine subatlantische Tönung mit einer deutlichen thermischen Begünstigung. In eine leicht geneigte, in mehrere Bruchschollen gegliederte Hochfläche mit Muschelkalkverwitterungs- und Lößlehmen hat sich der Brettenbach mit seinen Nebenbächen tief bis in den Bausandstein eingeschnitten. Die geologische und geomorphologische Vielfalt des Gebietes hat ein reiches, kleinflächig gegliedertes Vegetationsmosaik zur Folge.

Auf Muschelkalklehmen stocken je nach Exposition, Neigung und Feuchtigkeit *Asperulo-Fageten* (Waldmeister-Buchenwälder) verschiedener Ausbildungen und an quelligen Standorten *Carici remotae-Fraxineten* (Bach-Eschenwälder) mit ihren homologen Schlaggesellschaften (*Carex sylvatica*-Schlag) des *Atropion*-Verbandes.

Auf Buntsandstein wachsen, je nach Nährstoffgehalt des Ausgangsgesteins und der Exposition, artemarme Buchenwälder des *Asperulo-Fagetum* und die *Ilex-Fagus*-Gesellschaft (*Ilex*-Buchenwald). Ihre homologen Schlaggesellschaften (*Carex pilulifera*-Schlag) gehören zum *Epilobion*. Im Buntsandsteingebiet sind jedoch die meisten naturnahen Buchenwälder verschiedenen Nadelholzforsten gewichen. Die Forstgesellschaften wer-

¹⁾ Dieser Aufsatz ist der vegetationskundliche Teil einer Dissertation, die 1989 in Freiburg unter Betreuung von Frau Prof. O. WILMANNS abgeschlossen wurde (SSYMANK 1989). Für finanzielle Unterstützung danke ich dem Ministerium für Ernährung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, Baden-Württemberg.

Anschrift des Verfassers:

Dr. AXEL SSYMANK, Arbeitsgebiet Biotopschutz, Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Konstantinstraße 110, D-5300 Bonn 2
(Vulkanstraße 11, D-5300 Bonn 2).

den analog den Laubwaldgesellschaften typisiert. Sie entsprechen in ihrer standörtlichen Gliederung den primären Laubwaldgesellschaften.

Die Wälder, ihre Schlagfluren und die Gesellschaften der Binnensäume werden durch pflanzensoziologische Tabellen und eine Vegetationskarte M 1 : 12.500 (690 ha) dokumentiert. Sie fügen sich zu 6 abgrenzbaren Vegetationskomplexen zusammen, mit jeweils einem eigenen typischen Gesellschaftsmosaik.

Inhalt

Zusammenfassung	219
1. Einführung	221
2. Methoden	222
2.1 Vorbemerkung	222
2.2 Pflanzensoziologische Tabellen und Aufnahmen	222
Liste der Abkürzungen in den pflanzensoziologischen Tabellen.	223
2.3 Vegetationskarte	225
3. Die Emmendinger Vorbergzone.	225
3.1 Tektonik	226
Karte der Verwerfungen	227
3.2 Stratigraphie	226
3.2.1 Buntsandstein	227
Ausschnitt aus der Geologischen Karte	229
3.2.2 Muschelkalk	230
3.2.3 Pleistozäne Ablagerungen – der Löß	230
3.3 Die Böden	231
3.4 Das Klima	232
4. Waldgeschichte	233
5. Die Laubwälder	235
Kartierungsschema der Laubwälder	237
5.1 Stellario-Alnetum glutinosae	236
5.2 Carici remotae-Fraxinetum	238
5.3 Asperulo-Fagetum	240
5.4 Ilex-Fagus-Gesellschaft, der Ilex-Buchenwald	242
5.4.1 Überlegungen zur syntaxonomischen Stellung	242
5.4.2 Die Ilex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung	245
5.4.3 Die Ilex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausbildung	246
6. Die Forstgesellschaften	247
6.1 Die Tannen/Fichten-Forsten	247
6.1.1 Der Carex brizoides-Fichten-Forst	247
Kartierungsschema der Forstgesellschaften	248
6.1.2 Der Lamium-Athyrium-T/F-Forst	249
6.1.3 Der Reine Athyrium-T/F-Forst	249
6.1.4. Der Reine T/F-Forst	250

6.2 Die Kiefern-Forsten	252
6.2.1 Der Reine Kiefern-Forst	252
6.2.2 Der Pteridium-Kiefern-Forst	252
7. Die Schlaggesellschaften	253
7.1 Die <i>Carex sylvatica</i> -Schlaggesellschaft	256
7.2 Die <i>Carex pilulifera</i> -Schlaggesellschaft	257
8. Binnensäume und Gesellschaften der Waldwegränder	257
8.1 Überblick	257
8.2 Die <i>Nardo-Callunetea</i> -Böschungsgesellschaft	258
8.3 Das <i>Hedero-Rosetum</i>	261
8.4 Das <i>Epilobio-Geranietum robertiani</i>	261
8.5 Die <i>Chrysosplenium alternifolium-Ficaria verna</i> -Gesellschaft	263
8.6 Die <i>Alliaria petiolata</i> -Gesellschaft	264
8.7. Das <i>Juncetum tenuis</i>	264
8.8 Das <i>Poo-Tussilaginetum farfarae</i>	265
8.9 Das <i>Urtico-Aegopodietum</i>	265
8.10 Weitere Gesellschaften an Waldwegen	266
9. Die Vegetationskomplexe	267
10. Aspekte des Naturschutzes	270
Angeführte Schriften	272

1. Einführung

Sowohl vegetationskundliche als auch faunistische Untersuchungen haben sich bisher meist auf Gebiete mit seltenen Arten oder extremen Standortbedingungen beschränkt. So sind in der Pflanzensoziologie die Trockenwälder, Feuchtwälder und Hangschuttwälder recht gut bekannt, während die ökologische und floristische Gliederung der zonalen, auf „mittleren“ Standorten natürlichen Schlußgesellschaften — der Buchenwälder — lange Zeit kaum beachtet wurde. Erst in jüngster Zeit ist das Interesse an den Buchenwäldern gestiegen und mehrere Pflanzensoziologen haben sich ihrer angenommen. So ist derzeit eine bundesweite Übersicht über die bodensauren Buchen- und Eichenwälder vom Arbeitskreis Pflanzensoziologie der florist.-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Bearbeitung. Das Buchenwald-Symposium (POTT 1989) anlässlich der Rh. Tüxen-Preisverleihung an Prof. Dr. E. Oberdorfer gibt einen ersten Einblick in den derzeitigen Forschungsstand über Buchenwaldgesellschaften.

In unserer Kulturlandschaft sind naturnahe und natürliche Biotope selten geworden und der Naturschutz darf sich nicht nur auf Flächen mit seltenen oder gefährdeten Arten beschränken. Auch die „normalen“ bewirtschafteten Wälder können regionalspezifische Gesellschaften und Mosaik von hoher kulturhistorischer, chorologischer und bioökologischer Bedeutung bilden, wie hier am Beispiel eines Waldgebietes der Vorbergzone des Schwarzwalds gezeigt werden

soll. Dabei pausen sich die geologischen und bodenkundlichen Verhältnisse z.T. recht fein auf die Vegetation durch. Gleichzeitig möchte diese Arbeit einen Beitrag zum Verständnis von Buchenwaldkomplexen, d.h. den Wäldern, ihren homologen Schlaggesellschaften und den sie begleitenden Binnensäumen der Waldwege leisten.

Die Emmendinger Tafelbergzone hat ihren besonderen Reiz zunächst nur in der Vielfalt der geologischen Substrate und den damit verbundenen geomorphologischen Formen, während floristische Seltenheiten unter den höheren Pflanzen nicht vorkommen.

Auf der Grundlage der hier vorgestellten vegetationskundlichen Untersuchungen sind auch phänologische und biozönologische Untersuchungen der Blütenbesuchergemeinschaften durchgeführt worden, welche die hohe faunistische Bedeutung dieses Gebietes belegen (SSYMANK 1989, 1991).

2. Methoden

2.1. Vorbemerkung

Die vegetationskundliche Beschreibung der Emmendinger Tafelbergzone stützt sich auf die Diplomarbeiten von SSYMANK (1985) und LECHNER (1986). Darüber hinaus wurden weitere pflanzensoziologische Aufnahmen gemacht, die vorliegenden Vegetationskarten überprüft und erweitert, um einen repräsentativen Überblick über die Waldvegetation des untersuchten Gebietes zu ermöglichen.

2.2. Pflanzensoziologische Tabellen und Aufnahmen

Die pflanzensoziologischen Aufnahmen erfolgten nach der üblichen Methode von Braun-Blanquet mit der untergliederten Artmächtigkeit 2 (2m, 2a und 2b) in Anlehnung an BARKMAN, DOING & SEGAL (1964). Bei der Erfassung der Moose wurde nach einer im unteren Deckungsbereich modifizierten Skala wie folgt geschätzt:

- + Moosschichtdeckung < 1 %
- 1 Moosschichtdeckung 1– 5 %
- 2a Moosschichtdeckung 6–15 %

Berücksichtigt wurden nur Erdmoose; Epiphyten und epilithische Moose wurden nicht in die Aufnahmen einbezogen. Pilze wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Wälder im Buntsandsteingebiet der Emmendinger Tafelbergzone sind jedoch ausgesprochen pilzreich (vgl. HOCKENJOS, SPAHL & VERES, 1973).

Beide genannten vegetationskundlichen Diplomarbeiten basieren zum Großteil auf pflanzensoziologischen Aufnahmen, die im Frösommer und Sommer gemacht wurden. Dadurch fehlten besonders in den Wäldern des Muschelkalkgebietes diejenigen Fröhlingsgeophyten, die ihre Blätter früh einziehen. Dies machte eine erneute Aufnahme im Fröhjahr 1988 erforderlich, bei der die ehemaligen Aufnahmeflächen in den meisten Fällen anhand der Geländebücher und einem punktgenauen Eintrag in Forstkarten (M 1 : 10 000) wiedergefunden werden konnten.

Bei der Überarbeitung der Originaltabellen von LECHNER (1985) sind außerdem wenige Aufnahmen mit deutlich erkennbarer Randwirkung und stark erhöhten Artenzahlen gestrichen worden.

Die folgende Tabelle führt alle Abkürzungen der pflanzensoziologischen Tabellen auf.

Abkürzungen in den pflanzensoziologischen Tabellen:

– Geologischer Untergrund:

smc1	Eck'scher Horizont
smb	Bausandstein
smc2	Hauptkonglomerat
smk	Kristallsandstein
so1	Plattensandstein
so2	Röt
mu	Unterer Muschelkalk
mm	Mittl. Muschelkalk
lö	Löß, Lößlehme
S	Sande, Alluvionen

– Ausgangsmaterial der Bodenbildung:

l	Lößlehme und Decklehme
(l)	vermutete Lößlehmeteiligung
K	Kolluvium
B	Block- und Hangschutt

– Bodentyp:

(o)B	(oligotrophe) Braunerde
L	Parabraunerde (Lessivé)
P	Podsol
G	Pseudogley
S	Semigleye und Gleye
St	Stagnogley

Zwischentypen wie zum Beispiel:

pB	podsol. Braunerde
PB	Podsol-Braunerde
BP	Braunerde-Podsol

– Bodenart:

S	Sand
T	Ton
L	Lehm
U	Schluff

– Humusform:

Mu	Mull
Mo	Moder
Ro	Rohhumus
mMo	mullartiger Moder
rMo	rohhumusart. Moder

– Skelettgehalt:

	kein Skelett
(+)	Skelettgehalt < 5 %
+	Skelettgehalt > 5 %
++	reichlich Skelett, meist Hangschutt

Stetigkeitsskala für die Stetigkeitstabellen (nach TÜXEN 1974):

r	0– 5 %
+	6– 10 %
I	11– 20 %
II	21– 40 %
III	41– 60 %
IV	61– 80 %
V	81–100 %

Die Nomenklatur der höheren Pflanzen richtet sich nach OBERDORFER (1983), für die Moose nach FRAHM & FREY (1983). Angaben zur syntaxonomischen Stellung sind OBERDORFER (1978 ff.) und OBERDORFER (1983) entnommen, soweit nicht anders angegeben.

2.3 Die Vegetationskarte

Die Vegetationskarte stellt einen repräsentativen Ausschnitt der aktuellen Waldvegetation der Emmendinger Tafelbergzone dar, auf der ca. 690 ha Waldfläche im Maßstab 1 : 12.500 (Originalkarte 1 : 10.000) dargestellt sind. Sie dokumentiert ferner alle Dauerflächen dieses Waldgebiets, auf denen die Blühphänologie und blütenbesuchenden Insekten beobachtet worden sind (vgl. SSYMANK 1991).

Da die Wälder der Emmendinger Tafelbergzone durch die Waldgeschichte und die Forstwirtschaft in hohem Maße geprägt sind, wurde bei der Vegetationskarte die dominante Baumart, soweit nicht Eiche oder Buche, gesondert angegeben. Das Alter des Bestandes und die dominante Baumart haben einen großen Einfluß auf das Artengefüge der Kraut- und Strauchschicht eines Waldes. Diese Altersstadien, die bei der Kahlschlagbewirtschaftung in jedem Umtriebszyklus in gesetzmäßiger Folge durchlaufen werden, spielen bei der Kartierung der aktuellen Vegetation eine wichtige Rolle. Die jüngeren Bestände sind deshalb in der forstlich üblichen Weise in „Waldentwicklungsstufen“ eingeteilt worden:

Brusthöhendurchmesser:

1 Jungwuchs oder Dichtung	< 10 cm
2 Stangenholz	10–20 cm
3 Baumholz geringer Stärke	20–35 cm

Diese Waldentwicklungsstufen sind in der Kartierung als Aufsignaturen angegeben.

3. Die Emmendinger Vorbergzone

Zwischen den quartären Schotterfüllungen des Oberrheingrabens und dem Grundgebirgsschwarzwald erstreckt sich in einer Höhenlage von ca. 200–600 m NN die Vorbergzone als eine Hügelkette meist triadischer und jurassischer Deckgebirgsgesteine. Durch die variskische Orogenese und die Hebung des Schwarzwaldes in späteren tertiären Hebungsphasen entstand die heutige tektonische Zerlegung in Rand- und Grundgebirgsschollen. Das sedimentogene Deckgebirge wurde nach der Hebung des Schwarzwaldes rasch abgetragen, und die Erosion erreichte im Pliozän in der Emmendinger Vorbergzone stellenweise bereits den Buntsandstein (KESSLER & LEIBER 1980).

Die äolische Sedimentation von Löß nach Ausblasung aus den periglazialen Schotterflächen der Rheinebene in den Eiszeiten führte zu einer maximal 16 m mächtigen Überdeckung der tieferliegenden Schollen (Köndringer Scholle) und zur Entstehung einer Lößhügelzone im Westen. Diese erstreckt sich heute als schmaler, intensiv landwirtschaftlich genutzter Streifen zwischen der westlichen

Oberrhinggraben-Randverwerfung und der als Steilstufe erkennbaren Landecker Verwerfung.

3.1 Tektonik

Die starke tektonische Gliederung²⁾ in Bruchschollen wird bei einem Blick auf die Karte der Verwerfungen (Abb. 1) deutlich und prägt das heutige Landschaftsbild. Die Landecker Verwerfung – mit einer Sprunghöhe von ca. 100 m bei Landeck – spaltet sich Richtung Südosten in mehrere, kleinere Verwerfungen geringerer Sprunghöhe auf: Binzenwald-, Malecker und Fronbächle-Verwerfung.

Zwischen der Schwarzwaldrand-Verwerfung und der Landecker Verwerfung liegt eine bewaldete, flach geneigte Buntsandstein- und Muschelkalkhochfläche, die Emmendinger Tafelbergzone. Die Schichten dieser Platte fallen nur mit ca. 2–3 Grad West ein, so daß heute, nach Lösungsverwitterung des Muschelkalks, die leicht geneigten, verwitterungsbeständigen Tonschichten des Oberen Buntsandsteins (Röt) anstehen (Mußbach-Scholle).

Im Süden der Tafelbergzone, auf der Malecker Scholle, sind geringe Lößbeimengungen (meist Kolluvien) für die Bodenbildung von Bedeutung. Hier ist der Obere Buntsandstein auch noch von einer dünnen Schicht von Muschelkalkverwitterungslehmen des Unteren, stellenweise auch des Mittleren Muschelkalks, bedeckt. Diese Verwitterungslehme sind jedoch bereits weitgehend entkalkt und haben pH-Werte zwischen 4 und 5. Die Hochflächen werden teilweise landwirtschaftlich genutzt (Streuobstwiesen, Ackerbau), die steilen Talhänge sind bewaldet geblieben und werden forstwirtschaftlich genutzt.

Die starke rhenanische Erosion hat mit dem zur Elz fließenden Brettenbach zu einer tiefen Einschneidung junger Täler in die Hochfläche der Emmendinger Tafelbergzone geführt. Diese Täler zerschneiden alle Schichten des Oberen und Mittleren Buntsandsteins bis in den Bausandstein.

3.2 Stratigraphie

Es folgt eine kurze Darstellung der Geologie des Deckgebirges, (vgl. Abb. 2 u. 3) soweit dies für die Ausprägung des Landschaftsbildes, der Böden und der Vegetation von Bedeutung ist. Einzelheiten zur Geologie sind in KESSLER & LEIBER (1980) nachzulesen, auf den sich die folgenden Angaben im wesentlichen stützen.


²⁾ Die geologischen und tektonischen Verhältnisse der Emmendinger Vorbergzone sind durch die geologischen Kartierungen von BUDWILL (1957) und SACK (1962) und durch die geologische Karte MTB 7813 Emmendingen (M 1 : 25.000, 1980) gut dokumentiert.

3.2.1 Buntsandstein

Unterer Buntsandstein (su, Tigersandstein), ein mürber, wadlfleckiger³⁾ Sandstein direkt über dem Grundgebirge, und der Eck'sche Horizont (smc1) des Mittleren Buntsandsteins mit reichlich Geröllführung, stehen beide in der Emmendinger Vorbergzone nur kleinflächig an (Kirnhalden).

Verwerfungen der Emmendinger Vorbergzone

Abb. 1:



nach KEßLER & LEIBER 1980, geändert.

3) Wad ist ein Eisen/Manganoxid-Rückstand der Karbonatverwitterung.

Die mächtige Stufe des Bausandsteins (smb, Mittlerer Buntsandstein) mit ca. 70 m ist in den Tälern der Emmendinger Tafelbergzone bis heute erst in den oberen 20–25 m aufgeschlossen. Es sind gebankte, rote Sandsteine von großer Festigkeit mit Kieselsäure und Kaoliniten als Bindemittel. Die Bänke sind durch Ton- und Tonbreccienlagen getrennt und waren ein beliebter Baustein. Mehrere Steinbrüche der Emmendinger Tafelbergzone, z.B. die Heimbacher Brüche, lieferten die Steine für den Bau des Freiburger Münsters.

Abb. 2: Schematischer Querschnitt durch ein Tal der Emmendinger Tafelbergzone

Stratigraphie:

Unterer Muschelkalk Röttone	mu so2	35 m 5 m
Plattensandstein	so1	40 m
Kristallsandstein	smk	15 m
Hauptkonglomerat	smc2	15 m
Bausandstein	smb	70 m

Böden:

pseudovergleyte Parabraunerde
Pseudogleye

oligotrophe Braunerde

podsolierte Braunerde –
Braunerde-Podsol

oligotr. Braunerde

Hanggleye

Eck'scher Horizont

oligo- mesotrophe Semigleye/ Gleye

Zu Wad verwitterte dolomitische Sandkonkretionen (Kugelsandstein, Pseudomorphosesandstein) treten zum Hangenden vermehrt auf. Der Bausandstein ist nährstoffarm und durch Klüfte und tiefe Verwitterung relativ gut wasser-durchlässig. Er bildet in der Tafelbergzone die Unterhänge der Täler.

Die Mächtigkeit des Hauptkonglomerats (smc2) beträgt nur ca. 15 m. Da es sich um stark verkieselte, gebankte und verfestigte Sandsteine mit höherer Geröllführung handelt, ist er sehr verwitterungsbeständig. Daher bildet er an den Taloberhängen eine markante Steilstufe (Abb. 2). Die Verwitterung erfolgt nur sehr flachgründig und ergibt die nährstoffärmsten Böden der Emmendinger Vorbergzone.


Über dem Hauptkonglomerat folgen mittel- bis feinkörnige Sandsteine mit Kieselsäure als Bindemittel. Dieser Kristallsandstein (smk, Glitzern der Bruchflächen durch Kieselsäureummantelung der Sandkörner) ist nicht so verwitterungsbeständig wie das Hauptkonglomerat. Im Talquerschnitt wird dies als Hangverflachung erkennbar.

Der Obere Buntsandstein ist vom Mittleren durch einen Violetten Horizont getrennt. Es ist ein markanter Karneol-Dolomit-Horizont mit grauen,

Geologie der Emmendinger Vorbergzone

Abb. 3:

Ausschnitt aus der geologischen Karte MTB 7813: Emmendingen.



meist lebhaft violett gebänderten Karneolen. Die Hochfläche von Freiamt-Ottoschwanden wird vom Oberen Buntsandstein gebildet.

Im Plattensandstein (so1) dominieren feinkörnige, rote Sandsteine mit tonigem Bindemittel. Dünnplattige Struktur und zahlreiche, zum Hangenden sich häufende Ton- und Tonschlufflagen machen den Plattensandstein weniger verwitterungsbeständig und nährstoffreicher als die Schichten des Mittleren Buntsandsteins. Die Schichtmächtigkeit des Plattensandsteins beträgt ca 40 m.

Darüber folgen die Röttone (so2), tiefrote und graugrüne Ton- und Tonmergelbänke. Der Sandgehalt nimmt zum Hangenden stark ab. Es ist die einzige Schicht des Buntsandsteins, die Fossilien enthält: *Lingula tenuissima*, *Rhizocorallium* ... (Liste der Fossilien in KESSLER & LEIBER, 1980: 68). Nach längeren Regenperioden besteht eine Neigung zu Hangrutschungen.

3.2.2 *Muschelkalk*

Der Untere Muschelkalk (mu) bedeckt als Verwitterungslehm weite Teile der Hochfläche der Ottoschwandener Platte und der Malecker Scholle. Mittlerer Muschelkalk (mm) steht etwas kleinflächiger z.B. bei Landeck oder auf dem südwestlichen Teil der Malecker Scholle an. Der Obere Muschelkalk (mo) ist nur an wenigen Stellen entlang der Landecker Verwerfung überhaupt aufgeschlossen. Auf eine genauere Beschreibung und fazielle Untergliederung kann im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden.

Der Untere Muschelkalk (vgl. BUDWILL, 1957, 1962 u. KESSLER & LEIBER, 1980) mit einer Mächtigkeit von 35 m untergliedert sich in 3 Schichten: 1. Wellendolomit (mu1, 9 m) mit Trochiten, den Stielgliedern von *Encrinus*-Arten, als Leitfossil, 2. Wellenkalk (mu2, 14 m) mit verschiedenen fossilführenden Schichten (*Terebratula vulgaris*, *Spiriferina*-Bank, u.a.) und 3. die *Orbicularis*-Schichten (mu3, 3 m).

Sandige, zellige Dolomite im Liegenden wechseln mit fossilführenden Mergeln und Dolomiten. Tiefgründige Verwitterung und fast vollständige Entkalkung führten zu gelbbraunen Verwitterungslehmdecken, die weite Bereiche der Hochflächen bedecken. Die pH-Werte liegen meist zwischen 4 und 5. In der Korngrößenverteilung ähneln sie umgelagerten Lößlehm.

Der Mittlere Muschelkalk ist durch Subrosion tiefgründig verwittert und durch Gips- und Anhydritauswaschung von ehemals ca. 80–100 m Mächtigkeit auf 20–35 m zusammengesunken. Er steht nur südlich der Malecker Verwerfung und an der Steilstufe der Landecker Verwerfung kleinflächig an.

3.2.3 *Pleistozäne Ablagerungen – der Löß*

Während tertiäre Bildungen in der Emmendinger Vorbergzone kaum eine Rolle spielen (Malecker Tuffschlot), prägen die pleistozänen äolischen Sedi-

mente, der Löß, noch heute die Böden und die Vegetation des Gebietes. Durch Ausblasung aus den periglazialen Schotterflächen der Rheinebene gebildet, enthält der Löß bis zu 25 % Karbonat, ca. 45 % SiO_2 , 15–20 % Alkalifeldspat, ferner Glimmer und Tonminerale. Sein Korngrößenmaximum liegt zwischen 10 und 60 μm (60–70 % Schluffraktion). Der Löß bildet eine bis zu 16 m mächtige Lockergesteinsauflage über den tiefer gelegenen Schollen des Unteren Muschelkalks in der Lößhügelzone, kommt aber in geringer Mächtigkeit als „Lößschleier“ bis in ca. 400 m NN Höhe vor (BUDWILL, 1957; SACK, 1962; Aufsichtsur in den geol. Kartierungen).

3.3 Böden der Emmendinger Vorbergzone

Die Böden der Emmendinger Vorbergzone sind in ihrer Genese, Verbreitung und Vergesellschaftung von HÄDRICH (1962) beschrieben und kartiert worden (MTB 7813, M 1 : 25.000).

Da die Entstehung bestimmter Bodentypen mit ihrer typischen Horizontabfolge wesentlich vom Ausgangsmaterial der Bodenbildung und der klimatischen Situation abhängt, paust sich die geologisch-tektonische Gliederung der Emmendinger Vorbergzone in Lößhügelzone und Tafelbergzone auf das Mosaik der Böden durch (vgl. Abb. 2). Hädrich unterscheidet zusätzlich eine Übergangszone, die der flacheren Malecker Scholle mit Muschelkalkverwitterungslehmen entspricht.

Die Lößhügelzone der Köndringer Platte im Südwesten wird von Böden der Mergelserie mit Ausgangsmaterial Löß geprägt. Je nach Dauer der ungestörten Bodenentwicklung liegen Löß-Syroseme und Löß-Pararendzinen vor. Während die Pararendzinen durch einen karbonathaltigen, humusreichen A_h mit allmählichem Übergang in den reinen Löß (C-Horizont) gekennzeichnet sind, ist unter Wald mit zunehmender Entkalkung meist schon eine Lessivierung (Tonverlagerung) mit beginnender Pseudovergleyung (Staufeuchtigkeit im Unterboden) eingetreten.

Der größte Teil der Lößhügelzone, ca. 70 %, wird von Löß-Syrosemern und -Pararendzinen bedeckt und intensiv landwirtschaftlich genutzt (Rebbau, Obstkulturen). In trockenen Senken liegen kolluviale Löß-Pararendzinen, mit zunehmendem Grundwassereinfluß karbonathaltige Semigleye und Gleye vor.

Auf der Malecker Scholle bilden Muschelkalkverwitterungslehme und Lößlehme das Ausgangsmaterial für die Pedogenese. Parabraunerden (A_h - A_c - B_t - B_{tr} -C) wechseln bei welligem Relief kleinflächig mit Hangkolluvien. Durch die darunterliegenden Röttonen und den insgesamt höheren Tonanteil des Ausgangsmaterials sind Lessivierung (Tonverlagerung) und Pseudovergleyung (primär über Röttonen, sog. „Zweischichtprofile“ und sekundär nach Lessivierung) in unterschiedlicher Ausprägung sehr verbreitet. Die Tonverlagerung ist nach der Kalkauswaschung durch Peptisation (Dispersion der Tonfraktion) im pH-

Bereich um 5–6,5 begünstigt. Steigende Ca^{2+} -Konzentration oder Sickerwasserstau in tieferen Bodenschichten führen zur Ausfällung der Tonfraktion und Tonanreicherung im Unterboden (B₁). Dieser Staukörper führt bei ausreichenden Jahresniederschlägen (800–1000 mm/a) zu Wechselfeuchte mit Rostfleckigkeit der tieferen Bodenschichten. Auf stärker sandigen Partien des Plattensandsteins herrschen lokal oligotrophe Braunerden vor.

Nördlich der Binzenwaldverwerfung in der Tafelbergzone dominieren die nährstoffärmeren Ausgangsmaterialien des Buntsandsteins. Die am meisten verbreiteten Böden sind oligotrophe Braunerden, unter Nadelwald mit beginnender Podsolierung (A_{h,e} mit Bleichkörnern). Auf den nährstoffärmsten Schichten des Mittleren Buntsandsteins (smc2, smb) kommt es besonders bei Kiefernbestockung zu Podsol-Braunerden bis hin zu echten Podsolen mit mächtiger Rohhumusdecke. An steileren Hängen sind Podsol-Ranker ausgebildet. Ehemalige Streunutzung hat die Podsolierung sicher begünstigt (HOCKENJOS, SPAHL & VERES, 1973), aber es sollen nach HÄDRICH (1962) auch primäre Podsole vorhanden gewesen sein.

An den Unterhängen kommen mit zunehmendem Hangwassereinfluß Pseudo- und Hangleye vor. Für die Talsohlen sind auf den sandigen Kolluvien des Buntsandsteins, meist unter Wiesennutzung, oligo- bis mesotrophe Semigleye und Gleye kennzeichnend.

3.4 Das Klima der Emmendinger Vorbergzone

In der Emmendinger Vorbergzone liegen nur für die Niederschläge langjährige Meßreihen der Station Keppenbach (275 m NN) und Ottoschwanden (430 m NN) vor. Über eine 10-Jahresperiode sind vollständige Klimawerte von den Stationen Emmendingen-Mundingen (201 m NN) am Rande der Tafelbergzone, noch im Bereich der Lößhügelzone, und von der Station Ottoschwanden vorhanden. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Darstellung des Klimas von TRENKLE & v. RUDLOFF (1980) und auf die Daten des Deutschen Wetterdienstes Freiburg⁴⁾ der genannten Klimastationen.

Die mittleren Jahrestemperaturen der Emmendinger Vorbergzone liegen mit 9–9,6 °C nur wenig unter denen der Oberrheinebene mit ca. 10 °C (Freiburg 10,3 °C; 259 m NN) und spiegeln, unter Einbeziehung einer Temperaturabnahme von 0,6 °C je 100 m Höhe, eine Wärmebegünstigung von ca. + 0,4 °C wieder. In der folgenden Tabelle (Abb. 4) sind die wichtigsten Klimawerte von Ottoschwanden für den Zeitraum 1971–1980 zusammengestellt.

⁴⁾ Dem Zentralamt des DWD, Freiburg, sei für die Überlassung von Klimadaten herzlich gedankt.

Klimaübersicht: Mittelwerte 1971–1980 von Freiamt-Ottoschwanden

Abb. 4:

Höhe: 430 m NN

Monat	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr:
Mittlere Lufttemperatur (°C)	0,7	2,2	5,1	7,7	12,5	15,4	17,5	17,4	14,1	9,0	4,3	1,6	8,9
Niederschlagssumme (mm)	52	55	51	59	100	120	107	100	56	74	82	52	899
Anzahl Nebeltage	7,7	8,5	4,3	2,2	2,2	1,9	0,8	2,9	3,1	8,2	8,4	6,6	56,4
Anzahl Frosttage	17,1	13,5	7,2	2,8	0,2	0	0	0	0	0,4	7,5	15,4	64

Absolutes Temperaturminimum: -14,3 °C (1973)

Absolutes Temperaturmaximum: +32,6 °C (1976)

Schneedecke durchschnittlich 40 Tage.

Milde Winter und hohe Sommertemperaturen sind kennzeichnend für das subatlantisch geprägte Klima der Emmendinger Vorbergzone. In der Tafelbergzone sind ca. 70 Frosttage (Minima unter 0 °C) und 20 Eistage (Maxima unter 0 °C) zu erwarten.

Die Jahresniederschläge steigen von der rheinnahen Colmarer Trockeninsel im Lee der Vogesen mit ca. 700 mm/a am Rande der Vorbergzone bereits auf ca. 800 mm/a (Emmendingen 880 mm/a) an. Die Station Keppenbach, am Ostrand der Vorbergzone, im Grundgebirge, verzeichnet bereits 1062 mm/a (1951–1980). Auf der Malecker Scholle im flachen südwestlichen Teil der Emmendinger Tafelbergzone kann man also mit 900–950 mm Jahresniederschlag rechnen, der auf den Hochebenen von Freiamt-Ottoschwanden auf ca. 1000 mm/a ansteigt. Die Niederschlagsverteilung zeigt die höchsten monatlichen Niederschläge in der Hauptvegetationsperiode, insbesondere von Mai–August. Steigungsregen und sommerliche Gewitter am Rande der Tafelbergzone durch starke Erwärmung der Luftmassen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Lößhügelzone begünstigen dies.

Während auf den Hochflächen und in den Buntsandsteintälern mit ca. 60 Nebeltagen zu rechnen ist, treten am Westrand der Tafelbergzone und in der Lößhügelzone durch Kaltluftabfluß auch geringere Nebelhäufigkeiten mit ca. 30 Nebeltagen und weniger Frosttagen auf. Besonders bei Inversionswetterlagen im Herbst und Winter ist die Emmendinger Vorbergzone von Strahlungsnebeln bedeckt, die sich in den engen Buntsandsteintälern am längsten halten.

4. Die Waldgeschichte der Emmendinger Vorbergzone

Die jüngere Waldgeschichte ist bis heute für das Waldbild bestimmter Wald- und Forstgesellschaften der Emmendinger Tafelbergzone prägend. Die Besiedlung des Schwarzwaldes führte erst nach ca. 1000 n. Chr. zu einer beginnenden Entwaldung. Standen zunächst Rodungen zur Weide- und Bauholzgewinnung im Vordergrund, so stieg der Holzverbrauch durch Holländerflößerei (lang-

schäftige Stämme), Köhlerei und Glashütten (Pottasche) sehr schnell an. Bergbau und metallverarbeitende Industrie hatten einen besonders hohen Holzverbrauch, und den Bergarbeitern wurde zusätzlich meist uneingeschränktes Recht zur Waldweide gewährt.

In der Emmendinger Vorbergzone gelangte der Abbau von silberhaltigem Bleiglanz und Brauneisen im 13. Jahrhundert zu einer ersten Blüte (KESSLER & LEIBER, 1980). In Sexau, unterhalb der Hochburg, lag eine Silberschmelze, deren Bergarbeiter als „Freibauern“ abgesicherte Rechte zur Rodung und Waldweide besaßen (VOLLMER, 1981). Im 17. Jahrhundert wurde in Kollnau ein Eisenwerk gegründet, dessen Einflußbereich bis in die Emmendinger Vorbergzone reichte. Es hatte um 1700 einen Holzverbrauch von 7.000 Festmeter pro Jahr und nur 30 Jahre später bereits 19.000 Festmeter pro Jahr (VOLLMER, 1981).

Der Abbau des Bau- und Plattensandsteins (Werksandstein) in zahlreichen kleinen Steinbrüchen der Emmendinger Tafelbergzone (Heimbacher Brüche, Landeck, Tennenbacher Brüche, Allmendsberg..) hat ebenfalls zur Waldverwüstung beigetragen.

Im 15. und 16. Jahrhundert war die Waldweide mit Ziegen und Kleinvieh allgemein verbreitet und machte eine Naturverjüngung der devastierten Wälder unmöglich.

Ab ca. 1790 stieg der Nadelholzanteil im Schwarzwald infolge der ersten planmäßigen Aufforstungen stark an (VOLK, 1969). Während die Waldweide mit Einführung des Badischen Forstgesetzes 1833 verboten wurde, hat die Umstellung auf Stallfütterung zur Streunutzung in den Wäldern geführt, die bis ins beginnende 20. Jahrhundert fortgesetzt wurde. Auf den nährstoffarmen Gesteinen der Emmendinger Tafelbergzone war die Folge eine starke Verarmung und Versauerung der Waldböden mit beginnender sekundärer Podsolierung.

Genauere Angaben der Waldgeschichte der Emmendinger Vorbergzone sind vor allem durch das „Tennenbacher Güterbuch“ überliefert. Große Teile des heutigen Emmendinger Bergwaldes (Distr.III) gehörten zu den Besitztümern des 1160 gegründeten Zisterzienserklosters (HOCKENJOS, SPAHL & VERES, 1973).

Die Hochfläche des Laberberges war im 18. Jahrhundert ein Lehensgut (Laberhof), dessen Grundmauern und ein alter Brunnenschacht heute noch im Wald zu finden sind. Ackerrandstufen rund um den Laberberg zeugen ebenso wie im Binzgenwald (Lehengut „Corben“) von der Ausdehnung landwirtschaftlicher Nutzung. Die heutigen Althölzer mit den alten Eichenüberhältern sind vermutlich die zweite Baumgeneration. Am Eichberg wurden 1984/85 die Reste eines ehemaligen Gehöfts ausgegraben, das um 1800 aufgegeben wurde. Es war ebenfalls ein Tennenbacher Lehensgut (1341 sind im Tennenbacher Güterbuch 3 Höfe am Eichberg mit Wohngebäuden vermerkt; ZEIS, 1976).

Von der Tennenbacher Klosteranlage ist nach dem Abriß durch die badische Reichsregierung im Zuge der Säkularisierung im Jahre 1806 nur noch die kleine Krankenkapelle geblieben. Die Klosterkirche wurde als Ludwigskirche in Frei-

burg wieder errichtet und ist dort im 2. Weltkrieg zerstört worden. Ein gutes Beispiel für die Devastierung und Nutzung der Gemeindewaldungen ist der Viërdörferwald von Mundingen, Heimbach, Köndringen und Malterdingen. Seine Geschichte ist durch Streitigkeiten über die Nutzungsrechte genau überliefert (HOF, 1912; WELLMER, 1938).

Die Einführung der Hochwaldwirtschaft erfolgte in den Gemeindewaldungen erst 1891, während dies im Staatswald schon um 1840 der Fall war. In den Privatwäldern am Allmendsberg sind heute noch durchgewachsene Mittelwälder zu finden. Der Privatwaldanteil in der Emmendinger Vorbergzone ist durch den früheren Bergbau und das Freibauerntum recht hoch.

Ab 1849 ist die Waldentwicklung des Emmendinger Bergwaldes durch die Forstlichen Einrichtungswerke dokumentiert. Der Buchenanteil sank von ca. 70 % auf 65 % um 1900 und weiter auf 51 % im Jahr 1927. Die heutige Baumartenverteilung ist ca. 35 % Buche, 7 % Traubeneiche, 16 % Tanne, 15 % Fichte und je 6–7 % Douglasie, Kiefer und Lärche. Inwieweit die Tanne auf den nährstoffarmen Böden des Buntsandsteins autochthon ist, ist ungeklärt. Das älteste Vogtei-Siegel von Freiamt von 1587 führte die Tanne im Wappen.

Insgesamt kann man davon ausgehen, daß das Buntsandsteingebiet der Emmendinger Tafelbergzone früher überwiegend artenärmere Buchenwälder getragen hat, und der „bunte“ Anblick der aktuellen Vegetationskarte auf Waldgeschichte und Forstwirtschaft zurückgeht.

5. Die Laubwälder der Emmendinger Tafelbergzone

Die Wälder und Schlagfluren der Emmendinger Tafelbergzone zeichnen sich durch das weitgehende Fehlen von typischen Basenzeigern, selbst im Muschelkalkgebiet, aus. *Euphorbia amygdaloides*, *Mercurialis perennis*, *Campanula trachelium* und auf den Schlagfluren *Atropa belladonna* fehlen auf den entkalkten Verwitterungslehmen. Der subatlantische Klimacharakter findet seinen Ausdruck im subatlantischen Florenelement, vertreten durch *Ilex aquifolium*, *Lonicera periclymenum*, *Teucrium scorodonia*, *Digitalis purpurea* und *Hypericum pulchrum*. Die Stechpalme bevorzugt in der Emmendinger Tafelbergzone Hochflächen und süd- bis südwestexponierte Hanglagen und erreicht auf den Decklehmen der Hochflächen baumförmigen Wuchs bis zu 8 m Höhe. Sie fruchtet und blüht reichlich in lichterem Wäldern und auf Schlägen in Südexposition.

Die pflanzensoziologischen Tabellen I.a und I.b (nach LECHNER, 1986, verändert) umfassen die Wälder auf Muschelkalk, die Tabellen II.a und II.b (SSYMAN, 1985) die Wälder auf Buntsandstein. Die Vegetationsaufnahmen von Ssymank und Lechner wurden größtenteils im Sommer gemacht und erforderten eine Überprüfung auf ev. fehlende Frühlingsgeophyten. Im April 1988 wurden daher die Frühlingsgeophyten in allen feuchten Laubwäldern (Cariciremotae-Fraxinetum, Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung) nachträglich

geschätzt und die trockeneren Laubwälder stichprobenartig überprüft (vgl. Tab. Ib, ab Aufnahme 26 und Tab. IIb, Einheit II). Dabei ergab sich eine völlig neue Differentialartengruppe für die Wälder mit „Eschendominanz“, die bei LECHNER (1985) nur nach der herrschenden Baumart abgegrenzt worden waren. Für die Emmendinger Tafelbergzone sind lokale Trennarten vom Carici remotae-Fraxinetum: *Ficaria verna*, *Cardamine pratensis*, *Arum maculatum* und *Chrysosplenium alternifolium*. Auch die Moose *Eurhynchium striatum* und *Plagiomnium undulatum* gehören zu dieser Artengruppe. *Anemone nemorosa* wurde ebenfalls stark unterschätzt und ist im Frühjahr flächendeckend in der ganzen feuchten Ausbildung vom Asperulo-Fagetum vorhanden (vgl. Tab Ib, Aufn. 26–35).

Überraschend war das Vorkommen von *Colchicum autumnale* und reichlich *Ornithogalum umbellatum* in zwei benachbarten Wäldern bei Emmendingen. Dies sind vermutlich jüngere Aufforstungen von Reb- bzw. Wiesengelände (Tab. Ib, Aufn. 44 u. 45).

In den artenarmen Wäldern des Buntsandsteins fehlten im Carici remotae-Fraxinetum u.a. *Arum maculatum* und *Ficaria verna* (Tab. IIb, Einheit II).

Das Kartierungsschema (Abb. 5) gibt einen Überblick über alle Laubwälder der Emmendinger Tafelbergzone mit Ausnahme des leicht kartierbaren Schwarzerlen-Galeriewaldes. Es ist aus der Stetigkeitstabelle III entwickelt worden und war Grundlage für die Vegetationskarte.

5.1. Stellario nemorum-Alnetum glutinosae Lohm. 57, der Schwarzerlen-Galeriewald (Tab. II.b, Einheit I)

Der Schwarzerlen-Galeriewald säumt die Bäche der Buntsandsteintäler auf den vergleyten holozänen, sandig-kiesigen Anschwemmungen der Aue. Schwarzerle, Bergahorn und Esche bilden das lichte Kronendach dieses Auwaldes, unter dem sich eine üppige Krautschicht eutraphenter Arten ausbreitet: *Stellaria nemorum* als Assoziationskennart, *Urtica dioica*, *Angelica sylvestris*, *Stachys sylvatica*, *Phalaris arundinacea* und *Impatiens glandulifera*. Das „Seegras“, *Carex brizoides*, bildet oft dichte Teppiche, und in der Mooschicht sind feuchtigkeitsbedürftige Arten, wie *Plagiomnium undulatum*, bezeichnend. Leider ist dieser Wald in der Emmendinger Tafelbergzone häufig durch Fichtenforste (*Carex brizoides*-Fichtenforst) ersetzt worden.

Abb. 5: Kartierungsschema

Laubwälder der Emmendinger Vorbergzone:

Gesellschaften:	Carici remotae- Fraxinetum		Asperulo-Fagetum				Ilex-Fagus-Gesellschaft			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Fagus sylvatica</i>	—	—								
<i>Quercus petraea</i>	—	—								
<i>Fraxinus excelsior</i>										
<i>Acer pseudoplatanus</i>										
lok. d 1-2:										
<i>Plagiomnium undulatum</i>										
<i>Ficaria verna</i>										
<i>Arum maculatum</i>										
<i>Eurhynchium striatum</i>										
<i>Primula elatior</i>										
<i>Cardamine pratensis</i>										
<i>Glechoma hederacea</i>										
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>										
d AF:										
<i>Galium odoratum</i>										
<i>Brachypodium sylvaticum</i>										
<i>Polygonatum multiflorum</i>										
<i>Milium effusum</i>										
<i>Pulmonaria obscura</i>										
<i>Viola reichenbachiana</i>										
Feuchte/Nitrifizierer, d 1-4:										
<i>Impatiens noli-tangere</i>										
<i>Deschampsia cespitosa</i>										
<i>Stachys sylvatica</i>										
<i>Carex remota</i>										
<i>Carex brizoides</i>										
<i>Senecio fuchsii</i>										
d 5, 1-5:										
<i>Circaea lutetiana</i>										
<i>Carex sylvatica</i>										
d IF:										
<i>Polytrichum formosum</i>										
<i>Pteridium aquilinum</i>										
<i>Hypnum cupressiforme</i>										
<i>Deschampsia flexuosa</i>										
d IF:										
<i>Luzula luzuloides</i>										
<i>Carex pilulifera</i>										
d 7,8:										
<i>Athyrium filix-femina</i>										
<i>Dryopteris dilatata</i>										
<i>Blechnum spicant</i>										
d 7:										
<i>Lamium galeobdolon</i>										
<i>Oxalis acetosella</i>										
<i>Dryopteris filix-mas</i>										
d 10:										
<i>Vaccinium myrtillus</i>										
<i>Leucobryum glaucum</i>										

Gesellschaften:

Tabelle Nr

Einheit Nr

- | | | | |
|----|---|------|------|
| 1 | Carici remotae-Fraxinetum ohne Säurezeiger
(einschließl. <i>Impatiens noli-tangere</i> - und <i>Carex brizoides</i> -Fazies) | I.b | II |
| 2 | Carici remotae-Fraxinetum mit Säurezeigern | II.b | II |
| 3 | Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung mit Säurezeigern | II.b | III |
| 4 | Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung | I.b | I |
| 5 | Asperulo-Fagetum, Typische Ausbildung, <i>Circaea</i> -Variante | I.a | III |
| 6 | Asperulo-Fagetum, Typische Ausbildung | I.a | II |
| 7 | Ilex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung, <i>Lamium</i> -Variante | II.a | I.a |
| 8 | Ilex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung, Typische Variante | II.a | I.b |
| 9 | Ilex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausbildung, inops | II.a | II.a |
| 10 | Ilex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausbildung, <i>Vaccinium</i> -Variante | II.a | II.b |

5.2 *Carici remotae-Fraxinetum* W.Koch 26, der Bacheschenwald (Tab. II.b, Einheit II u. Tab. I.b, Einheit II⁵⁾)

Der Bacheschenwald hat seinen Schwerpunkt in flachen Hangmulden und kleinen Tälchen im Muschelkalkgebiet der Emmendinger Tafelbergzone. In der Baumschicht herrschen Esche und Bergahorn vor. Entlang der Tallinie sind meist einzelne Schwarzerlen eingestreut, randlich kommen Hainbuche, Vogelkirsche, später in Übergängen zum *Asperulo-Fagetum* auch Traubeneiche und Buche hinzu. Die Böden sind durchsickerte kolluviale Parabraunerden, schwach hangvergleyt, mit der Humusform Mull. Die pH-Werte des Oberbodens liegen auf Schwemmlöß und kolluvialen Muschelkalkverwitterungslehmen um 6–7, d.h. deutlich höher als in den anderen Waldgesellschaften der Emmendinger Tafelbergzone. Durch den Sickerwassereinfluß sind es nährstoffreiche und produktionskräftige Wälder.

In der Krautschicht findet man zahlreiche *Alno-Ulmion*-Kenn- oder Trennarten, wie *Impatiens noli-tangere*, *Stachys sylvatica* und *Veronica montana*. Als Kennarten der Assoziation werden *Carex pendula*, *Carex remota*, *Carex strigosa* und *Veronica montana* angegeben. Leider zeigen diese Arten mit Ausnahme von *Carex strigosa*, die sehr selten ist, auf den stauwasserbeeinflußten lehmigen Böden im Muschelkalkgebiet der Emmendinger Tafelbergzone eine viel weitere soziologische Amplitude. Sie reagieren stark auf lokale Verdichtung und bevorzugen stärkere Auflichtung im Kronendach, sind also im frischen *Asperulo-Fagetum* überall eingesprengt und haben ein Optimum auf Rückewegen⁶⁾. Wegen der allgemeinen Kalkarmut der Böden gibt es aber lokal eine Differentialartengruppe von anspruchsvollen Feuchtigkeitszeigern. Dazu gehören v.a. *Ficaria verna*, *Cardamine pratensis*, ferner *Arum maculatum*, *Primula elatior* und *Glechoma hederacea*. Dies sind alles Arten, die normalerweise eher in frischen bis feuchten Buchenwäldern ihr Optimum haben. In der Moosschicht sind *Plagiomnium undulatum* und *Eurhynchium striatum* kennzeichnend. Die Krautschicht fällt durch üppigen Wuchs von Nitrophyten wie *Urtica dioica* und den Farnreichtum auf: *Dryopteris filix-mas*, *Dryopteris x tavelii*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris dilatata* und *D. carthusiana*.

⁵⁾ Die Reihenfolge der Hauptbaumarten ist in allen Tabellen gleich, um einen direkten Vergleich der aneinander anschließenden Tabellen I.a und I.b bzw. II.a und II.b zu ermöglichen.

⁶⁾ OBERNDORFER (1957) erwähnt ein „feuchtes, dem Bacheschenwald benachbartes *Melico-Fagetum impatiens-tetosum*“. Diese Subassoziation hat jedoch in der Baumschicht noch vorherrschend Buche, während das völlige Fehlen der Buche und die Beimischung von Erle in der Emmendinger Tafelbergzone eine Einordnung in das *Carici remotae-Fraxinetum* ermöglichen.

LECHNER (1986) unterscheidet eine Typische Variante, eine *Impatiens noli-tangere*-Fazies und eine *Carex brizoides*-Fazies. Die Entwicklung einer *Impatiens*-Fazies ist sehr vom Witterungsverlauf des jeweiligen Jahres abhängig, da in feuchten Jahren Mehltau-Befall eintritt (*Sphaerotheca humilis* var. *fuliginosa*).

Im Buntsandsteingebiet kommt der Bacheschenwald (*Acer-Fraxinus*-Gesellschaft SSYMAN, 1985) kleinflächiger, nur in Nordexposition, in luftfeuchten Dobeln und Taleinschnitten vor. Er ist an Schichtquellwasseraustritte mu/so2 oder im Oberen Buntsandstein gebunden.

Im Buntsandsteingebiet liegt eine Ausbildung mit Säurezeigern (Tab.II.b, Einheit II) vor, die durch die Moose *Polytrichum formosum*, *Hypnum cupressiforme* und durch *Pteridium aquilinum* unterschieden ist. Sickerwassereinfluß und die Humusform Mull, selbst auf armen Buntsandsteinböden, deuten auf hohe Nitrifikationsraten hin. Unter diesen Bedingungen wachsen sogar *Pulmonaria obscura* und *Paris quadrifolia* auf bodensaurem Substrat. Ein gutes Gedeihen von Feuchtigkeitszeigern, Mullbodenarten und Farnen ist für die Krautschicht bezeichnend.

Bei der Kartierung wurde 1988 am Waldsee bei Emmendingen ein junger Eschenbestand mit nitrophytischen Arten gefunden, die, wie *Alliaria petiolata*, *Galium aparine*, und *Aegopogium podagraria*, in der Emmendinger Tafelbergzone sonst fehlen. Hier am Rande der Lößhügelzone wird der Einfluß einer deutlichen Lößbeimengung wirksam und führt zu einer Veränderung des Artengefüges (ob auch durch immissionsbedingte Eutrophierung?).

Pflanzensoziol. Aufnahme: 21. 04. 1988, Eschenjungbestand am Waldsee, 16° SSO.

Baumschicht: 95 %, 10–14 m

<i>Fraxinus excelsior</i>	4.5
<i>Acer pseudoplatanus</i>	2b.2
<i>Prunus avium</i>	+1

Strauchschicht: 10–15 %, < 4 m

<i>Sambucus nigra</i>	2a.2
<i>Acer campestre</i>	+1
<i>Corylus avellana</i>	+2
<i>Evonymus europaeus</i>	+1
<i>Rubus fruticosus</i>	+1
<i>Rosa arvensis</i>	+1

Krautschicht: 98 %, < 0,6 m

Alno-Ulmion V, DV:

<i>Ficaria verna</i>	3.4
----------------------	-----

<i>Impatiens noli-tangere</i>	2m.1
<i>Circaea lutetiana</i>	2m.1
<i>Stachys sylvatica</i>	1.2
<i>Veronica montana</i>	1.2
<i>Carex pendula</i>	+2
<i>Milium effusum</i>	+2

Faget. O/K:

<i>Anemone nemorosa</i>	3.4
<i>Pulmonaria obscura</i>	2a.3
<i>Paris quadrifolia</i>	2m.1
<i>Hedera helix</i>	2m.1
<i>Arum maculatum</i>	1.2
<i>Dryopteris filix-mas</i>	+1

Stickstoffzeiger:

<i>Alliaria petiolata</i>	2a.2
<i>Urtica dioica</i>	2m.2
<i>Galium aparine</i>	2m.1
<i>Aegopodium podagraria</i>	1.2
<i>Geranium robertianum</i>	+2
<i>Moehringia trinervia</i>	+1

Begleiter:

<i>Cardamine flexuosa</i>	2m.2
<i>Glechoma hederacea</i>	+2
<i>Carex sylvatica</i>	+2
<i>Rubus fruticosus</i>	+1
<i>Rumex sanguineus</i>	+1
<i>Cardamine pratensis</i>	+1
<i>Melandrium rubrum</i>	+2

Moose: 35 %

<i>Eurhynchium striatum</i>	2b
<i>Plagiomnium undulatum</i>	2a
<i>Eurhynchium swartzii</i>	1
<i>Brachythecium rutabulum</i>	1
<i>Attrichum undulatum</i>	+

5.3 Asperulo-Fagetum H. May. 64 em., der Waldmeister-Buchenwald

Der Waldmeister-Buchenwald ist das typische Beispiel einer Zentral- oder Kernassoziation mittlerer Standorte ohne eigene Kennarten. Für die Kraut-

schicht vom *Asperulo-Fagetum* sind zahlreiche Mullbodenzeiger bezeichnend, die gleichzeitig als Trennarten gegenüber den bodensauren Buchenwäldern (*Ilex-Fagus-Gesellschaft* bzw. *Luzulo-Fagetum*) dienen: *Galium odoratum*, *Polygonatum multiflorum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Milium effusum*, *Pulmonaria obscura* und *Viola reichenbachiana*.

Lamium galeobdolon, von OBERDORFER (1983) als *Fagetalia*-Ordnungskennart und allgemein ebenfalls als Trennart zu den bodensauren Buchenwäldern gewertet, greift in der Emmendinger Tafelbergzone auch in eine Ausbildung des *Ilex*-Buchenwaldes über.

Es lassen sich im Gebiet drei Ausbildungen des *Asperulo-Fagetum* unterscheiden: Eine Typische Ausbildung und eine Feuchte Ausbildung, die zusammen den größten Teil des Muschelkalkgebietes der Emmendinger Tafelbergzone einnehmen, und eine Feuchte Ausbildung mit Säurezeigern auf Buntsandstein. In allen *Asperulo-Fagetum* der Emmendinger Tafelbergzone kommt aus walddgesellschaftlichen Gründen eine reine Traubeneichenfazies vor, die auf den stärker pseudovergleyten Röttonen durch den Wasserstau begünstigt wird.

In der Tabelle I.a sind diese eichenreichen Bestände jeweils am Ende einer Einheit zusammengestellt worden (Tab. I.a, Aufn. 22–24, 43–49). In der Feuchten Ausbildung (Tab. I.b) ist der Eichenanteil allgemein etwas höher. *Carpinus betulus* und *Prunus avium* als Carpinion-Differentialarten haben in den eichenreichen Beständen einen etwas höheren Anteil an der Baumschicht, aber die charakteristische Artenzusammensetzung der Carpinion-Wälder in der Krautschicht fehlt.

Das *Asperulo-Fagetum*, Typische Ausbildung (Tab. Ia, Einheit II, III) ist der bezeichnende frühlingsgeophytenreiche Buchenwald der Emmendinger Tafelbergzone auf den pseudovergleyten Parabraunerden der Muschelkalkhochflächen. Die Humusform in diesen Wäldern ist mullartiger Moder. LECHNER (1986) unterscheidet innerhalb der Typischen Ausbildung noch eine *Circaea*-Variante (besser: *Carex sylvatica*-Variante, da diese Art eine höhere Stetigkeit aufweist) mit *Circaea lutetiana* und *Carex sylvatica* als Differentialarten. Es handelt sich aber nicht um ein „*Asperulo-Fagetum circaetosum*“ im Sinne von OBERDORFER (1957), denn weitere Feuchtigkeitszeiger fehlen. Die ökologische und soziologische Eigenständigkeit dieser Variante ist unklar, und bei der Kartierung wurde das *Asperulo-Fagetum*, Typische Ausbildung nicht weiter untergliedert. Die Typische Ausbildung entspricht dem „*Asperulo-Fagetum typicum*, Schwarzwald-Vogesen-Rasse“ in OBERDORFER (1957).

Die Feuchte Ausbildung des *Asperulo-Fagetum* (Tab. I.b, Einheit I) kommt auf frischen, kaum noch pseudovergleyten Parabraunerden und Kolluvien meist in der Nachbarschaft des Bacheschenwaldes vor. Die vorherrschende Humusform ist Mull. In der Krautschicht treten eine Reihe von Feuchtigkeitszeigern auf: *Impatiens noli-tangere*, *Stachys sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Scrophularia nodosa* und *Glechoma hederacea*. Auch die Alno-Ulmion Arten wie *Carex remota*, *Carex pendula* und *Veronica montana* treten mit geringer bis mittlerer Stetigkeit auf. Obwohl in der Krautschicht gute Verjüngung von Bergahorn und

Esche zu beobachten ist, bleibt die Rotbuche zusammen mit der Traubeneiche uneingeschränkter Herrscher in der Baumschicht.

Als Sonderfall der Feuchten Ausbildung des Asperulo-Fagetum kann das Auftreten von *Allium ursinum* gelten. Auf einer Schwemmlößzunge am Eichberg oberhalb von Maleck gibt es in der Tafelbergzone einen einzigen von Bärlauch dominierten feuchten Buchenwald.

Die Feuchte Ausbildung mit Säurezeigern (Tab. II.b, Einheit II, „feuchter Traubeneichen-Buchenwald“ nach SSYMANK, 1986) säumt die Bacheschenwälder der Nordhänge im Buntsandsteingebiet oder kommt in Plateaulage über tonigen Schichten des oberen Buntsandsteins vor. Während die Feuchte Ausbildung vom Asperulo-Fagetum im Muschelkalk im Mittel 25 Arten aufweist, hat die Ausbildung mit Säurezeigern eine etwas geringere mittlere Artenzahl mit 22 Arten. Einige anspruchsvollere Arten werden seltener, dafür kommen Säurezeiger wie z.B. *Blechnum spicant*, *Polytrichum formosum* und *Dicranella heteromalla* als differenzierende Arten hinzu. Dabei ist gerade bei den Aufnahmen im Buntsandstein ein allmählicher Gradient zwischen artenreicheren feuchten und trockeneren Aufnahmen mit Säurezeigern zu erkennen.

5.4 Die Ilex-Fagus-Gesellschaft

5.4.1 Überlegungen zur syntaxonomischen Stellung

Die bodensauren Buchenwälder sind wegen ihrer Artenarmut (Mittlere Artenzahl nur 10–14) floristisch-soziologisch schwer zu gliedern und nur wenige Autoren haben sich dieser Wälder angenommen. Die Buche zeigt auf sauren, selbst extrem nährstoffarmen Gesteinen guten Zuwachs, wenn die Jahresniederschläge ausreichend hoch sind und das Substrat nicht bewegt ist.

In der Emmendinger Tafelbergzone kommt eine deutliche, thermische Begünstigung des Klimas hinzu, die einen subatlantischen Charakterzug dieser nährstoffarmen Buchenwälder zur Folge hat. OBERDORFER (1984) stellt die bodensauren Buchenwälder in zwei verschiedene Ordnungen der Laubwälder. Das Ilici-Fagenion (Br.-Bl. 67) Tx.79 mit dem Ilici-Fagetum und das Quercenion robori-petraeae (Br.-Bl.) Riv.-Mart. 82 mit dem Violo-Quercetum Oberd. 57 (früher Fago-Quercetum Tx.55) stehen in der Ordnung der Eichenwälder und das Luzulo-Fagetum Pawl. 28 in einem eigenen Unterverband in der Ordnung der Buchenwälder (Fagetalia).

Dieser Vorschlag berücksichtigt das völlige Fehlen der Fagion-Kenn- und Trennarten im Ilici-Fagetum, wird aber der engen Verwandtschaft dieser Gesellschaft mit dem Luzulo-Fagetum einerseits und dem Violo-Quercetum andererseits nicht gerecht.

In Frankreich wird von RAMEAU (1981, 1985) das *Ilici-Fagetum* Br.-Bl. 67 sogar als eine atlantische bzw. subatlantische Rasse des *Violo-Quercetum* aufgefaßt.

Der südwesteuropäische Verband *Ilici-Fagion* ist von BRAUN-BLANQUET in seinen „Vegetationsskizzen aus dem Baskenland“ 1967 erstmals beschrieben worden. Er schreibt „Das *Ilici-Fagion*, der stechpalmenreiche Buchenwald, kann als das Gegenstück zum mitteleuropäischen Parallelverband *Luzulo-Fagion* angesehen werden“. Als Trennarten zum *Luzulo-Fagion* nennt Braun-Blanquet mediterran-atlantische Gebirgspflanzen: *Asphodelus albus*, *Arenaria montana*, *Avena sulcata*, *Luzula forsteri* und *Erica arborea*. Mit Ausnahme von *Erica arborea* sind aber alle genannten Arten im *Ilici-Fagetum* unter den „zufällig nur einmal notierten Arten“, d.h. ihre Stetigkeit ist für Trennarten viel zu gering. Das *Ilici-Fagetum* ass.nov. ist nach der Tabelle von BRAUN-BLANQUET (1967) durch *Ilex aquifolium*, *Dicranum scoparium*, *Vaccinium myrtillus*, *Thuidium abietinum* und *Saxifraga granulata* gekennzeichnet. Die Moose und *Vaccinium myrtillus* haben eine soziologisch sehr weite Amplitude und können sicher nicht als Kennarten der Assoziation, sondern höchstens als Trennarten gegenüber basenreicheren Wäldern verwendet werden. *Saxifraga granulata* hat eine geringe Stetigkeit. Von den Wäldern in der Emmendinger Tafelbergzone unterscheiden sich die Aufnahmen aus dem Baskenland v.a. durch die hohe Stetigkeit von *Deschampsia flexuosa* (eigene Subassoziation) und durch die mittlere Stetigkeit von *Erica arborea* und *Erica vagans* bei den Begleitern. Die *Erica*-Arten können als Differentialarten einer atlantischen Rasse aufgefaßt werden. Die Dominanz der Buche, bei gleichzeitigem Fehlen der *Fagion*- und *Fagetalia*-Arten, hatten Braun-Blanquet veranlaßt, diese Gesellschaft in einem eigenen Verband den *Quercetalia robori-petraeae* zuzuordnen. Die Böden seines *Ilici-Fagetum* entsprechen den oligotrophen Braunerden der Emmendinger Tafelbergzone.

Vergleicht man die Wälder der Schwarzwaldvorbergzone mit dem Tabellenmaterial von DURIN, GÉHU, NOIRFALISE & SOUGNEZ (1967) aus Westfrankreich, so wird der subatlantische Charakter und die Übereinstimmung mit dem *Ilici-Fagetum* deutlich (Abb. 6, Stetigkeitsübersicht⁷⁾). Bezeichnende subatlantische Arten, die dem *Luzulo-Fagetum* fehlen, sind *Ilex aquifolium*, *Pteridium aquilinum* und *Blechnum spicant*. Eine weitere wichtige Trennart zum *Luzulo-Fagetum* ist der Efeu (*Hedera helix*). Er hat eine weite ökologische Amplitude, fehlt aber in den mitteleuropäischen bodensauren Buchenwäldern, d.h. im *Luzulo-Fagetum* vollständig. Seine relativ hohe Stetigkeit (II-III) ist ebenfalls bezeichnend für den subatlantischen Charakter dieser Gesellschaft. Die *Quercetalia*-Arten sind gut vertreten. Die einzige Verbindung zum *Luzulo-*

⁷⁾ Eine gekürzte Stetigkeitstabelle findet man in SSYMANK 1989.

Fagetum⁸⁾ ist das allerdings geringste Vorkommen von *Luzula luzuloides*, die meist nur als Einzelpflanze mit geringer Vitalität auftritt. Diese Art fehlt im subatlantischen Ilici-Fagetum Frankreichs, dennoch können die Wälder der Emmendinger Vorbergzone als eine Ausbildung in geographischer Grenzlage aufgefaßt werden. Nach J.-M. Géhu (mündl.) lassen sich diese Wälder aufgrund ihrer subatlantischen Trennartenkombinationen dem Ilici-Fagetum angliedern. Weitere subatlantische Arten mit geringer Stetigkeit in der Emmendinger Tafelbergzone sind *Hypericum pulchrum* und *Lonicera periclymenum*.

Abb. 6:

Stetigkeitsübersicht Buchenwälder:

	Ilici-Fagetum W-Frankreich	Ilici-Fagetum Emm.Vorberge	Luzulo- Fagetum	Aperulo- u. Hordelymo- Fagetum
<i>Ilex aquifolium</i>	IV-V	II		
<i>Pteridium aquilinum</i>	I-V	II		
<i>Blechnum spicant</i>	+ - V	+ - III		
<i>Polypodium vulgare</i>	+ - II			
<i>Luzula luzuloides</i>		I-II	IV-V	r-III
<i>Melica uniflora</i>				
<i>Lamium galeobdolon</i>				II-V
<i>Primula elatior</i>				
usw.				
<i>Deschampsia flexuosa</i>				
<i>Carex pilulifera</i>	III-V	I-V	II-V	
<i>Vaccinium myrtillus</i>				
usw.				
<i>Hedera helix</i>	III-V	II		II-V

Der Arbeitskreis Pflanzensoziologie, Arbeitsgruppe Buchenwald, hat auf seiner Tagung in Erlangen (Febr. 1989) folgende Neugliederung für die bundesdeutschen Buchenwälder vorgeschlagen:

⁸⁾ OBERNDORFER (1984) unterscheidet im Luzulo-Fagetum eine submontane/kolline *Quercus petraea*-Form (Melampyrum-Form) mit den Trennarten *Quercus petraea*, *Melampyrum pratense*, *Castanea sativa* und *Lonicera periclymenum*. Dieser wurden die Wälder der Emmendinger Tafelbergzone von SSYMANK (1985) noch zugeordnet.

O. Quercetalia robori-petraeae

- V. Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 32
Violo-Quercetum
- V. Ilici-Fagion Br.-Bl. 67
Deschampsia-Fagus-Gesellschaft (nördl. Oberrheinebene)
Ilex-Fagus-Gesellschaft (westl. Schwarzwaldvorberge)
- V. Luzulo-Fagion Lohm. et Tx. in Tx.54
Luzulo-Fagetum Meus.37

O. Fagetalia sylvaticae

Diese Gliederung vereint alle bodensauren Buchenwälder in der Ordnung Quercetalia robori-petraeae. Eine endgültige Entscheidung über die soziologische Stellung der bodensauren Ilex-Buchenwälder der Emmendinger Tafelbergzone ist erst nach Vorliegen einer mitteleuropäischen Übersicht über die bodensauren Eichen- und Buchenwälder möglich. Daher verwende ich vorläufig die neutrale Bezeichnung „Ilex-Fagus-Gesellschaft“

Nach Th. Müller (mündl.) existieren ähnliche Ilex-Fagus-Bestände auch auf Buntsandstein im Nordschwarzwald. Auf Urgestein mit deutlich höherem Nährstoffreichtum tritt in derselben Höhenlage *Luzula luzuloides* im Schwarzwald bereits hochstet auf, und die subatlantischen Arten treten zurück. Somit ist das Auftreten der Ilex-Fagus-Gesellschaft in der Schwarzwaldvorbergzone Ausdruck einer pflanzengeographisch-klimatischen Grenzsituation und gleichzeitig geologisch-pedogenetisch bedingt.

5.4.2 Ilex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung (Tab.II.a, I.a, je Einheit I; Stetigkeitstab. III, Spalten 21-23)

Die Feuchte Ausbildung des Ilex-Buchenwaldes ist durch *Athyrium filix-femina* und *Dryopteris dilatata* gekennzeichnet. Dabei reicht *Dryopteris dilatata* auf Sonderstandorten, auf vermoderten Baumstümpfen, vereinzelt auch bis in die Typische Ausbildung. Es sind fast reine Buchenhallenwälder mit geringer Beimischung von Fichte, Tanne, Kiefer, Traubeneiche, Birke und Lärche. Eine Strauchschicht fehlt weitgehend, und auch die Krautschichtdeckung bleibt meist unter 5 %. In der Krautschicht sind mit mittlerer Stetigkeit *Hedera helix* (Diff. zum Luzulo-Fagion), *Galeopsis tetrabit*, *Carex pilulifera* und vereinzelt *Luzula luzuloides* anzutreffen.

Das Buschwindröschen (*Anemone nemorosa*) ist, da es früh einzieht, bei den pflanzensoziologischen Aufnahmen sicher unterschätzt worden. Es ist aber der einzige Geophyt dieser nährstoffarmen Wälder. Die Moosschicht ist von Azidophyten wie *Polytrichum formosum*, *Dicranella heteromalla* und *Leucobryum*

glaucum geprägt. Nur gelegentlich findet man an laubfreien Stellen auch *Atrichum undulatum*. Der Standort der Feuchten Ausbildung von der Ilex-Fagus-Gesellschaft sind die frischen Nord- und Osthänge im Platten- und Bausandstein und die kleinen Talrinnen. Auch auf der Hochfläche mit schwach pseudovergleyten Parabraunerden über oberem Buntsandstein ist der feuchte Ilex-Buchenwald verbreitet⁹⁾. Die Typische Variante mit durchschnittlich 15 Arten zeigt im Bodenprofil eine geringe Podsolierungstendenz (Bleichkörner), und die vorherrschende Humusform ist Moder bis rohhumusartiger Moder. Die *Lamium*-Variante unterscheidet sich durch *Lamium galeobdolon* und *Oxalis acetosella* und mit geringer Stetigkeit *Dryopteris filix-mas* als Trennarten in der Krautschicht. Ihre mittlere Artenzahl beträgt 16 Arten und die Bindung an die luftfeuchten kleinen Seitentäler ist wesentlich enger als bei der Typischen Variante.

5.4.3 *Ilex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausbildung* (Tab.II.a, Einheit II, Stetigkeitstab. III, Spalten 24,25)

Die Typische Ausbildung des Ilex-Buchenwaldes ist die nährstoffärmste und zugleich artenärmste Laubwaldgesellschaft der Emmendinger Tafelbergzone. Sie ist kennzeichnend für die trockenen Süd- und Westhänge der Buntsandsteintäler. In der Baumschicht ist meist Kiefer, Lärche und Traubeneiche eingestreut. Interessant ist die vermutlich durch die Waldgeschichte bedingte starke Substitution der Buche durch die Traubeneiche auf trockenen flachgründigen Böden. Dabei kommt es nicht zu einer Veränderung im Artengefüge der Kraut- und Mooschicht.

In der Typischen Variante beträgt die mittlere Artenzahl nur noch 8, in der kleinflächig auftretenden *Vaccinium*-Variante (Allmendsberg, Meisenbuck) ist sie mit 12 Arten etwas höher. Die *Vaccinium*-Variante, mit *Vaccinium myrtillus* und *Leucobryum glaucum* als Trennarten, ist nur in durchgewachsenen Mittelwäldern im Privatwald anzutreffen und geht vermutlich auf besonders intensive und langanhaltende Streunutzung zurück¹⁰⁾. Dies bestätigt sich mit der im Vergleich zur Typischen Ausbildung stärkeren Podsolierungstendenz der Böden mit Bildung einer dünnen Rohhumusauflage.

⁹⁾ Sehr selten greift der Ilex-Buchenwald auf geringmächtige Muschelkalkverwitterungslehmdecken über vgl. Tab. I.a, Spalten 6, 7.

¹⁰⁾ Da als Kontaktgesellschaft der *Vaccinium*-Variante der *Pteridium*-Kiefernforst auftritt, ist eine geringe Wechsell Trockenheit als Standortfaktor anzunehmen.

6. Forstgesellschaften der Emmendinger Tafelbergzone

Die Forstgesellschaften nehmen im Buntsandsteingebiet der Emmendinger Tafelbergzone etwa die Hälfte der Fläche ein (Emmendinger Bergwald: 51 % Nadelholzanteil). Sie lassen sich ebenso wie die naturnahen Laubwälder nach floristisch-soziologischen Prinzipien gliedern. Sie sind durch die anthropogene Artenverbindung, durch die wirtschaftsbedingte Dominanz einer oder mehrerer standortfremder Baumarten, ein Sonderfall einer Ersatzgesellschaft. Da die dominante Baumart das Artegefüge der Krautschicht stark beeinflusst, können unter gleichen edaphischen und klimatischen Bedingungen, je nach der geförderten Baumart, verschiedene homologe Ersatzgesellschaften einer natürlichen Waldgesellschaft auftreten. Die stickstoffarme Nadelstreu führt mit der Dauer der Bestockung auf nährstoffarmen Ausgangsgesteinen auch zu einer sekundär veränderten Bodenbildung. Die Benennung der Forstgesellschaften erfolgte in Anlehnung an MEISEL-JAHN (1955) nach einer steten soziologisch-ökologischen Trennart in Verbindung mit der dominanten Baumart.

Ein Vergleich mit den homologen Laubwaldgesellschaften ist durch die Stetigkeitstabelle III gegeben. Eine Übersicht über die Forstgesellschaften der Emmendinger Tafelbergzone gibt das Kartierungsschema (Abb. 7).

6.1 Tannen/Fichtenforsten

Die Dominanten in der Baumschicht sind Tanne und Fichte, gelegentlich ist auch Douglasie vorhanden. Die Monokulturen aller drei Baumarten unterscheiden sich bei gleichem Nährstoff- und Wasserhaushalt floristisch-soziologisch nicht voneinander.

6.1.1 Der *Carex brizoides*-Fichten-Forst (Stetigkeitstab. III, Spalte 1)

Der *Carex brizoides*-Fichtenforst ist die feuchteste und nährstoffreichste Forstgesellschaft der Emmendinger Tafelbergzone. Er kommt fast ausschließlich in der Aue der Buntsandsteintäler als Ersatzgesellschaft des *Stellario-Alnetum glutinosae* vor¹¹⁾. Die Baumschicht wird von der Fichte beherrscht (Fichtenaufforstungen) mit einzelnen eingestreuten Schwarzerlen als Zeugen des ehema-

¹¹⁾ Im Kartierungsgebiet kommt außerhalb der Aue nur an zwei Stellen ein Tannen-Fichtenforst mit reichlich *Carex brizoides* Unterwuchs auf Röttonen vor (Wachtel, Kohlwald). Er steht im Kontakt zum *Carici remotae-Fraxinetum* und ist dort vermutlich dessen Ersatzgesellschaft. Er kann ebenfalls zum *Carex brizoides*-Fichtenforst gerechnet werden, wurde aber in der Vegetationskarte mit einer eigenen Signatur eingetragen.

Abb. 7: Kartierungsschema

Forstgesellschaften der Emmendinger Vorbergzone:

		Tannen-/Fichtenforsten				Kiefernforsten		
Gesellschaften:		1	2	3	4	5	6	7
	Picea abies							
	Abies alba							
	Pinus sylvestris							
d 1	Carex brizoides							
	Plagiochila asplenioides (M)							
	Chrysosplenium alternifolium							
d 1,2	Lamium galeobdolon							
	Carex sylvatica							
	Circaea lutetiana							
	Plagiomnium undulatum (M)							
	Deschampsia cespitosa							
	Brachypodium sylvaticum							
d 1-3	Athyrium filix-femina							
	Galeopsis tetrahit							
	Atrichum undulatum (M)							
d 1-4	Dryopteris dilatata							
	Oxalis acetosella							
d 6	Pteridium aquilinum							
	Molinia arundinacea							

Gesellschaften:

- 1 *Carex brizoides*-Fichten-Forst
- 2 *Lamium*-*Athyrium*-Tannen/Fichten-Forst
- 3 Reiner *Athyrium* T/F-Forst
- 4 Reiner T/F-Forst mit *Dryopteris dilatata*
- 5 Reiner T/F-Forst ohne *Dryopteris dilatata*
- 6 *Pteridium*-Kiefern-Forst
- 7 Reiner Kiefern-Forst

Tabelle III

- Einheit Nr.: A I.1a
A I.1b
A I.2
A II.1
A II.2
B I
B II

(M) Moos

ligen Erlengaleriewaldes. Eine Strauchschicht ist kaum ausgebildet. Dafür ist die Krautschichtdeckung mit 80–100 % für einen Fichtenforst sehr hoch. Gegenüber den anderen Tannen/Fichtenforsten differenzieren die Feuchtigkeitszeiger *Stellaria nemorum*, *Impatiens noli-tangere*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Galium palustre* und das Lebermoos *Plagioclima asplenoides*. Häufig treten auch Faziesbildungen von *Impatiens noli-tangere* und *Carex brizoides* auf. Die *Carex brizoides*-Fazies weist wegen des dichten Wuchses des Seegrases und ungünstigerer Humusform nur ca. die halbe mittlere Artenzahl der anderen *Carex brizoides*-Fichtenforsten auf. Die azidophytischen Nadelholzbegleiter *Blechnum spicant*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus* und *Polytrichum formosum* sind überall eingestreut. Ihre Zunahme und in der Folge eine Artenverarmung ist mit längerer Nadelholzbestockung zu erwarten, da die dokumentierten Bestände die erste Baumgeneration Fichte tragen (SSYMANK, 1985).

6.1.2 Der *Lamium-Athyrium-T/F-Forst*¹²⁾ (Tab. III, Spalte 2)

Der *Lamium-Athyrium-T/F-Forst* ist im Buntsandsteingebiet Ersatzgesellschaft des *Carici remotae-Fraxinetum* mit Säurezeigern und z.T. des *Asperulo-Fagetum*, Feuchte Ausbildung mit Säurezeigern. Er ist auf die kleinen Nebentäler des Au- und Tennenbächleins beschränkt und wächst auf pseudo- bis hangvergleyten kolluvialen Parabraunerden und oligotrophen Braunerden. Ein wesentlicher Standortsfaktor ist der Nährstoffeintrag durch Sickerwasser- und Hangwasserzufuhr. Der relative Nährstoffreichtum findet seinen Ausdruck in der hohen mittleren Artenzahl von 30.

Die enge Bindung des *Lamium-Athyrium-T/F-Forsts* an kleine feuchte Talrinnen im Buntsandsteingebiet geht im Muschelkalkgebiet verloren. Dort kommt er auf der Hochfläche vor und ist die Ersatzgesellschaft vom *Asperulo-Fagetum*. Die wenigen Fichtenbestockungen auf Muschelkalkverwitterungslehmen unterscheiden sich durch eine üppige Strauchschicht von *Sambucus nigra* und *Sambucus racemosa* in den Althölzern, können aber soziologisch noch dem *Lamium-Athyrium-T/F-Forst* zugeordnet werden.

Im Buntsandsteingebiet sind einerseits die Feuchtigkeitszeiger *Deschampsia cespitosa*, *Circaea lutetiana*, *Carex sylvatica* und das Moos *Plagiomnium undulatum*, andererseits Mullbodenzeiger wie *Lamium galeobdolon* und *Brachypodium sylvaticum* Trennarten gegen die trockeneren Forstgesellschaften. Die Krautschichtdeckung im *Lamium-Athyrium-T/F-Forst* ist hoch, meist über 70 %. Üppiger Farnwuchs, v.a. von *Athyrium filix-femina*, zeigt die Bindung an luftfeuchte Standorte. Unter den steten Begleitern findet man weitere Feuchtigkeitszeiger des Alno-Ulmion wie *Carex remota*, *Carex pendula* und *Impatiens noli-*

6.1.3. Der Reine *Athyrium-T/F-Forst* (Tab. I, Einheit A.I.2, Tab. III, Spalte 3)

Im frischen Flügel der Forstgesellschaften ist der Reine *Athyrium-T/F-Forst* die am weitesten verbreitete Forstgesellschaft. Sie umgibt den *Lamium-Athyrium-T/F-Forst* in den Buntsandsteintälern und kommt v.a. in Nord- und Ostexposition an den Schatthängen der Täler vor. Wir treffen sie auch auf der Hochfläche auf lehmig-tonigen Schichten des Plattensandsteins, auf Röt und im Muschelkalkgebiet auf Verwitterungslehmen an. Während die meso- bis eutraphen und hygrophilen Arten der *Lamium*-Gruppe fehlen, sind *Athyrium filix-femina* und *Atrichum undulatum* als feuchtigkeitsliebende Arten noch vor-

¹²⁾ T/F-Forst wird als Abkürzung für „Tannen/Fichten-Forst“ verwendet.

handen und differenzieren gegen den trockenen Flügel der Reinen T/F-Forsten.

Galeopsis tetrahit, in Laubwäldern ein Störzeiger, bleibt in den Forstgesellschaften auf den feuchten Flügel beschränkt und kann ebenfalls als Trennart gewertet werden. Die mittlere Artenzahl vom Reinen Athyrium-T/F-Forst beträgt 23.

Als Kontaktgesellschaften treten im Buntsandsteingebiet v.a. der Reine T/F-Forst mit *Dryopteris dilatata* und die Ilex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung auf. Die homologe Laubwaldgesellschaft ist unter den nährstoffarmen Verhältnissen im Buntsandstein die Feuchte Ausbildung vom Ilex-Buchenwald, vermutlich in der Lamium-Ausbildung. Auf Muschelkalkverwitterungslehmen hingegen ist der Reine Athyrium-T/F-Forst Ersatzgesellschaft vom Asperulo-Fagetum¹³⁾.

6.1.4 Der Reine T/F-Forst (Tab. III, Spalten 4,5)


Zum Reinen T/F-Forst gehören die artenarmen trockenen Tannen- und Fichtenbestände¹⁴⁾ (mittlere Artenzahlen 12 bzw. 15) an den Hängen der Buntsandsteintäler. Auf den nährstoffarmen Buntsandsteinen sind unter Fichtenbestockung oligotrophe bis podsolige Braunerden mit der Humusform Rohhumus entstanden. Die Reinen T/F-Forsten nehmen die größte Fläche aller kartierten Forstgesellschaften ein und bleiben als Ersatzgesellschaft des Ilex-Buchenwaldes auf den Buntsandstein beschränkt. Eine Strauchschicht fehlt häufig und die Krautschicht weist meist geringe Deckung auf. Nur unter Tanne bildet *Vaccinium myrtillus* manchmal einen dichteren Zwergstrauchunterwuchs. Zu den seltensten Arten in der Krautschicht gehören die Säurezeiger *Vaccinium myrtillus*, *Deschampsia flexuosa*, *Pteridium aquilinum* und *Blechnum spicant*. Kennzeichnend ist auch der Reichtum azidophytischer Moose: *Hypnum cupressiforme*, *Dicranum scoparium*, *Dicranella heteromalla*, *Leucobryum glaucum* u.a..

In manchen Beständen treten Moosfazies auf, die den ganzen Waldboden in einen dichten grünen Teppich verwandeln. Ursache dieser Faziesbildungen ist

¹³⁾ Mehrfach tritt der Athyrium-T/F-Forst auf der Vegetationskarte im Muschelkalkgebiet und auf Röttonen in Kontakt zum Carici remotae-Fraxinetum auf. Da die Trennartengruppe mit *Lamium galeobdolon* in dichten jüngeren Waldentwicklungsstufen z.T. noch fehlt, ist anzunehmen, daß diese Forsten eigentlich zum Lamium-Athyrium-T/F-Forst gehören (Beispiel: Kohlwald, Teufelsbrücke).

¹⁴⁾ Die wenigen Lärchenbestände am Stockberg (*Larix decidua* x *kaempferi*) weisen eine ähnliche Krautschichtzusammensetzung auf und sind als Reiner T/F-Forst mit Aufsichtsur Lx für *Larix* kartiert worden.

Abb. 8: Lichter Pteridium-Kiefern-Forst mit *Pteridium aquifolium* und *Molina arundinacea* am Amsenbuck südhang, Aug. 1984.



eine ehemalige Streunutzung mit anschließender Nadelholzbestockung (SSYMANK, 1985). Dabei tritt in Südexposition eine reine *Leucobryum glaucum*-Fazies auf (Amsenbuck), in luftfeuchten Tälern in Nordexposition eine *Bazzania trilobata*-Fazies. Unabhängig von der Exposition, kann auch *Polytrichum formosum* Moosteppiche bilden. Es stellt aber höhere Lichtansprüche als *Bazzania trilobata*. Die Moosfazies sind in der Vegetationskarte durch Aufsignatur angegeben.

Die Ausbildungen „ohne“ und „mit *Dryopteris dilatata*“ unterscheiden sich nur wenig voneinander. Der Reine T/F-Forst mit *Dryopteris dilatata* ist durch *Oxalis acetosella* und *Dryopteris dilatata* gekennzeichnet und hat eine etwas höhere mittlere Artenzahl (15). Er wächst bevorzugt an nordexponierten, luftfeuchten Hängen im Buntsandstein. *Dryopteris dilatata* kommt in anderen Gesellschaften auf vermoderten Baumstümpfen mit verminderter Vitalität vor und ist daher als Trennart kritisch zu werten.

6.2 Die Kiefernforsten

6.2.1 Der Reine Kiefern-Forst (Stetigkeitstab.III, Spalte 6)

Die Reinen Kiefern-Forsten sind krautschichtarme Kiefernbestände mit geringer Traubeneichen-, Birken- und Buchenbeimischung. Sie sind Ersatzgesellschaft von der Typischen Ausbildung der Ilex-Fagus-Gesellschaft. In der Strauchschicht wächst etwas *Ilex aquifolium*, *Frangula alnus*, *Rubus fruticosus* und Buchenjungwuchs. Die Krautschichtdeckung (mittlere Artenzahl 13) übersteigt selten 5 % mit *Vaccinium myrtillus*, *Calluna vulgaris*, *Deschampsia flexuosa* und *Carex pilulifera*. In der Moosschicht treten ausschließlich Azidophyten wie *Polytrichum formosum*, *Hypnum cupressiforme*, *Dicranum scoparium* und *Leucobryum glaucum*, z.T. in größerer Deckung, auf. Durch das Fallaub geht mit steigendem Buchenanteil die Moosschichtdeckung zurück.

6.2.2 Der Pteridium-Kiefern-Forst (Tab. III, Spalte 5)

Dieser wechselfeuchte Pteridium-Kiefern-Forst fällt sofort durch seinen ungewöhnlich hohen und dichten Unterwuchs von Adlerfarn (*Pteridium aquilinum*) und Pfeifengras (*Molinia arundinacea*) auf. In der lichten Baumschicht ist neben der Kiefer fast nur noch Birke beigemischt, Buche und Traubeneiche treten stark zurück. Die Krautschicht erreicht oft über 80–90 % Deckung und ist zweischichtig aufgebaut. Unter dem fast mannshohen Adlerfarn und Pfeifengras wächst eine dichte Zwergstrauchschicht mit *Vaccinium myrtillus* und *Calluna vulgaris*.

Zwischen der dichten Streu von *Molinia arundinacea* finden einige säureliebende Moose, v.a. *Hypnum cupressiforme* und *Polytrichum formosum*, ihr Auskommen.

Der Pteridium-Kiefern-Forst wächst auf flachgründigen Böden im Hauptkonglomerat, Kristall- und Bausandstein auf stark podsolierten Böden. Nach HÄDRICH (1962) sind es sogar teilweise primäre Podsole. Die Streubildung von *Molinia arundinacea* und von Kiefernadeln hat zu einer mächtigen Rohhumusdecke und sekundärer Podsolierung geführt.

Ein wesentlicher Standortsfaktor für den Pteridium-Kiefern-Forst ist die Wechselfeuchtigkeit an trocken-warmen Süd- und Südwesthängen infolge kombinierter Schicht/Kluftwasserquellen mit stark wechselnder Schüttung, v.a. an der Grenze smc2/smb (SSYMANK, 1985). Ein direktes Pendant unter den Laubwäldern existiert nicht, als homologe natürliche Gesellschaft muß eine wechselfeuchte Ilex-Fagus-Gesellschaft (*Vaccinium*-Variante?) mit Birken und Kiefern Beteiligung in der Baumschicht angenommen werden. Die üppige Entfaltung von *Molinia arundinacea* ist nur unter den lockeren Kronenschlußverhältnissen der Kiefer möglich gewesen.

7. Die Schlaggesellschaften

(Tabelle IV, Abb. 9)

In der Emmendinger Tafelbergzone lassen sich zwei Schlaggesellschaften in jeweils mehreren Ausbildungen unterscheiden (Abb. 9). Auf nährstoffarmen Böden im Buntsandsteingebiet wächst die *Carex pilulifera*-Schlaggesellschaft (Epilobion-Verband) während auf den basenreicheren Böden im Muschelkalkgebiet und auf lehmigen Schichten des oberen Buntsandsteins nach Kahlschlag die *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft (Atropion) entsteht. Beide Schlaggesellschaften lassen sich nicht direkt einer beschriebenen Assoziation zuordnen und wurden deshalb nach einer steten Trennart bezeichnet¹⁵⁾.

Wegen des hohen Anteils von Deck- und Verwitterungslehmen ist auf allen Schlägen eine stete Gruppe von Staunässezeigern mit *Juncus effusus*, *J. conglomeratus*, *Deschampsia cespitosa* und *Carex pendula* vorhanden. Allen Schlaggesellschaften gemeinsam ist das Auftreten schlagbegünstigter Gehölze: die Brombeeren, *Betula pendula*, *Salix caprea* und die *Sambucus*-Arten. Die typischen Schlagflurarten (Atropetalia OC/KC) wie zum Beispiel *Epilobium angustifolium* und *Senecio fuchsii* treten, mit Ausnahme von *Senecio sylvaticus*, in der Emmendinger Tafelbergzone nur spärlich auf. Bezeichnend für die Schläge ist das Vorkommen der Lianen *Lonicera periclymenum* und *Solanum dulcamara*.

¹⁵⁾ Korrekterweise müßte es heißen: *Carex pilulifera*-Epilobion-Schlaggesellschaft und *Carex sylvatica*-Atropion-Schlaggesellschaft. Dies ist im Text und auf der Vegetationskarte abgekürzt worden.

Abb. 9: Kartierungsschema

Schlaggesellschaften der Emmendinger TafelbergzoneI. *Carex sylvatica*-SchlagII. *Carex pilulifera*-Schlag

Gesellschaften:	1	2	3	1	2
d I:					
<i>Carex sylvatica</i>					
<i>Circaea lutetiana</i>					
<i>Ajuga reptans</i>					
<i>Brachypodium sylvaticum</i>					
<i>Potentilla sterilis</i>					
<i>Solanum dulcamara</i>					
<i>Impatiens noli-tangere</i>					
d I.1:					
<i>Glechoma hederacea</i>					
<i>Galium odoratum</i>					
<i>Pulmonaria obscura</i>					
<i>Geum urbanum</i>					
<i>Sanicula europaea</i>					
<i>Viola reichenbachiana</i>					
<i>Lamium galeobdolon</i>					
d I.2:					
<i>Myosotis laxiflora</i>					
<i>Mentha arvensis</i>					
<i>Galium palustre</i>					
<i>Carex brizoides</i>					
d II:					
<i>Carex pilulifera</i>					
<i>Vaccinium myrtillus</i>					
<i>Calluna vulgaris</i>					
<i>Deschampsia flexuosa</i>					
d II.1:					
<i>Calamagrostis epigejos</i>					
<i>Eupatorium cannabinum</i>					
d II.1:					
A <i>Digitalis purpurea</i>					
<i>Luzula sylvatica</i>					
d II.2:					
<i>Pteridium aquilinum</i>					
<i>Molinia arundinacea</i>					

Gesellschaften:I. *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft (Atropion):

1. *Glechoma hederacea*-Ausbildung
2. *Myosotis laxiflora*-Ausbildung
3. Typische Ausbildung

II. *Carex pilulifera*-Schlaggesellschaft (Epilobion):

1. mit *Calamagrostis epigejos* (verarmtes Epilobio-Digitalietum)
2. mit *Pteridium aquilinum*

Abb. 10: *Carex sylvatica*-Schlag im Spätsommer zur Hauptblüte von *Eupatorium cannabinum* am Waldsee, Aug. 1984.



7.1 Die *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft (Tabelle IV, Einheit I)

Die anspruchsvollere *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft der nährstoffreicheren Böden ist die homologe Schlaggesellschaft vom *Asperulo-Fagetum*. Die Differentialartengruppe gegenüber bodensauren Schlägen umfaßt Feuchtigkeitszeiger (*Imaptiens noli-tangere*, *Circaea lutetiana*, *Carex sylvatica*) und Verdichtungszeiger wie *Ranunculus repens* und *Ajuga reptans*. Arten der Binnensäume, des *Epilobio-Geraniumetum robertiani* bzw. der *Glechometalia*, wie *Stachys sylvatica*, *Lapsana communis*, *Geum urbanum* und *Geranium robertianum*, breiten sich nach Kahlschlag schnell flächenhaft aus. Säurezeiger fehlen dieser Schlaggesellschaft ganz.

Soziologisch kann die Gesellschaft dem *Atropion*-Verband zugeordnet werden. Ein typisches *Atropetum belladonnae* ist aber nur auf kalkreichen Böden ausgebildet, wie sie zum Beispiel am Schönberg südlich Freiburg vorliegen. Ohne *Atropa belladonna* beschreibt OBERDORFER (1978) eine „*Cirsium vulgare*-Gesellschaft als «Vorstufe» des *Atropetum*“, die als Verbandsgesellschaft ohne eigene Kennarten der *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft in der floristischen Zusammensetzung ähnlich ist.

Es lassen sich in der Emmendinger Tafelbergzone drei Ausbildungen mit unterschiedlichen Nährstoff- und Feuchtigkeitsansprüchen feststellen.

1. Die *Glechoma*-Ausbildung kommt fast ausschließlich auf Verwitterungslehmen des Unteren Muschelkalks und auf Röt vor und ist die homologe Schlaggesellschaft der Feuchten Ausbildung vom *Asperulo-Fagetum*. Die Mittlere Artenzahl liegt mit 40–50 Arten sehr hoch. Bei natürlichen Rutschungen an der Schichtgrenze Unterer Muschelkalk/Röt kann ein reichhaltiges Kleinstrukturmosaik entstehen mit Artenzahlen bis zu 80. Trennarten sind neben *Glechoma hederacea* die Mullbodenzeiger des *Asperulo-Fagetum*: *Galium odoratum*, *Pulmonaria obscura*, *Lamium galeobdolon* und *Viola reichenbachiana*.

2. Der Typischen Ausbildung der *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft fehlen die soeben genannten Mullbodenzeiger. Dafür treten *Eupatorium cannabinum* und *Calamagrostis epigejos* stärker auf. *Calamagrostis epigejos* kann durch dichten Wuchs die Baumverjüngung hemmen.

3. Eine besonders feuchte Ausbildung mit *Myosotis laxiflora* (*palustris* agg.), *Mentha arvensis* und *Galium palustre* läßt sich extra abtrennen. Sie neigt an Nordhängen zur „Vergrasung“ mit *Carex brizoides* (begünstigt durch die Mahd der Kahlschläge). Auch *Juncus effusus* kann faziesbildend auf Pseudogleyen über Röttonen auftreten, so zum Beispiel auf der Hochfläche des Laberberges.

7.2 Die *Carex pilulifera*-Schlaggesellschaft (Tabelle IV, Einheit II)

Die *Carex pilulifera*-Schlaggesellschaft, auf den nährstoffarmen Schichten des Buntsandsteins, ist durch das Fehlen aller anspruchsvollen Arten und das gleichzeitige Auftreten von Säurezeigern floristisch und auch im Aspekt sehr scharf abgegrenzt. Auf den jüngeren Schlägen dominieren *Galeopsis tetrahit* und *Senecio sylvaticus*. Später werden sie von Gräsern abgelöst, die dann die Krautschicht beherrschen und eine Sukzession zu gehölzreichen Vorwaldgesellschaften des *Sambuco-Salicion* verlangsamen.

Bezeichnende, durch Schlag geförderte Arten sind *Carex brizoides* und *Deschampsia flexuosa*. In einer Ausbildung mit *Digitalis purpurea* und *Luzula sylvatica* treten oft Herden von *Calamagrostis epigejos* auf. *Digitalis purpurea* selbst erreicht in der Emmendinger Tafelbergzone keine hohen Deckungen. Der Fingerhut ist die Assoziationscharakterart des Epilobio-Digitalietum *purpureae* Schwick. (33) 44, einer subatlantischen, montanen Ersatzgesellschaft des Luzulo-Fagetum oder des Abieti-Fagetum. Der Fingerhutschlag erreicht im Schwarzwald die Ostgrenze seiner Verbreitung. Die Bestände der Emmendinger Tafelbergzone können als verarmte Ausbildung des Epilobio-Digitalietum in der Subassoziation *juncetosum effusi* aufgefaßt werden und sind hier Ersatzgesellschaft der Ilex-Fagus-Gesellschaft.

Den etwas frischeren Flügel der *Carex pilulifera*-Schlaggesellschaft differenzieren *Molinia arundinacea* und *Pteridium aquilinum*, die auf wechselfeuchten Standorten, besonders im Kontakt zum Pteridium-Kiefern-Forst, faziesbildend die Gesellschaft beherrschen.

8. Binnensäume und Gesellschaften der Waldwegränder

8.1 Überblick

Die Wegrandvegetation in der Emmendinger Tafelbergzone ist sehr verschieden ausgebildet. Eine Übersicht über die wichtigsten Gesellschaften gibt die Stetigkeitstabelle V, die die pflanzensoziologischen Aufnahmen von SSYMANK (1985) und LECHNER (1986) zusammenfaßt.

Auf den nährstoffarmen Böschungen der Waldwege an den Hängen der Buntsandsteintäler wachsen verschiedene Nardo-Callunetea-Gesellschaften. Die häufigste Gesellschaft auf Muschelkalkverwitterungslehmen und nährstoffreichen Schichten des Oberen Buntsandsteins ist das Epilobio-Geranietum (*Glechometalia*) in mehreren Subassoziationen und Ausbildungen. Daneben tritt als Heilgesellschaft im Muschelkalkgebiet das Hedero-Rosetum und an nährstoffreichen Stellen das Urtico-Aegopodietum auf.

Wichtige Trittgemeinschaften am Wegrand sind auf Buntsandstein das Junce-

Abb. 11: *Carex pilulifera*-Schlag auf Buntsandstein im Binzgenwald mit Dominanz von Gräsern. Kennzeichnend sind *Digitalis purpurea* u. *Sambucus racemosa*.



tum tenuis und *Agrostis capillaris*-Bestände, auf den Muschelkalkresiduallehmen *Agrostietea stoloniferae*-Fragmentgesellschaften und das *Poo-Tussilaginietum farfarae*. In der Aue begleitet der Neophyt *Impatiens glandulifera* die Bäche und Wegränder in Bachnähe.

8.2 Die *Nardo-Callunetea*-Böschungsgesellschaft (Tabelle V, Spalten 1–5)

Die *Nardo-Callunetea*-Böschungsgesellschaft begleitet die meisten Waldwege auf den sandigen, nährstoffarmen Schichten des Mittleren Buntsandsteins. Die

Krautschicht ist artenarm und wird von den Zwergsträuchern *Vaccinium myrtillus*, *Calluna vulgaris* und weiteren Säurezeigern geprägt. Stete charakteristische Arten sind die Farne *Blechnum spicant* und *Thelypteris limbosperma*, ferner *Deschampsia flexuosa*, *Hypericum pulchrum*, *Teucrium scorodonia* und *Carex pilulifera*. Auch in der kärglichen Strauchschicht sind nur anspruchslose Pioniergehölze wie Birke und Faulbaum, manchmal etwas Fichten-, Tannen- und Buchenanflug vorhanden.

Im Gegensatz zu der artenarmen Kraut- und Strauchschicht steht die meist hohe Moosschichtdeckung mit zahlreichen, steten, charakteristischen Azidophyten und Rohbodenbesiedlern: *Polytrichum formosum*, *Bazzania trilobata*, *Dicranella heteromalla*, *Pellia epiphylla*, *Diplophyllum albicans*, *Leucobryum glaucum* u.a. . . . Dabei beinhalten die Aufnahmen verschiedene Moosgesellschaften bzw. -synnusen, die ganz unterschiedliche Mikrostandorte besiedeln (SSYMANK, 1985). Die Pioniergesellschaft sandig-lehmiger Böschungen ist das *Dicranelletum rufentis* Philippi 56, das nur kurze Zeit an frischen Böschungsanrissen zu beobachten ist und sich rasch zum *Calypogeietum fissae* Schuhm. 44 weiterentwickelt. In den trockeneren Ausbildungen der Nardo-Callunetea-Böschungen herrscht die Subassoziation mit *Diplophyllum albicans* vor (standörtl. Gliederung nach PHILIPPI, 1956), während auf den feuchten Böschungen die Subassoziation mit *Pellia epiphylla* wächst. Gelegentlich tritt auch das *Pogonatum aloidis* v. Krusenstjerna 45 auf.

In den Buntsandsteintälern der Emmendinger Tafelbergzone können 5 Ausbildungen der Nardo-Callunetea-Gesellschaft unterschieden werden (SSYMANK, 1985):

1. Im Kontakt zur Typischen Ausbildung der Ilex-Fagus-Gesellschaft und seinen Ersatzgesellschaften wächst auf trockenen, sandig-lehmigen Böden die Typische Ausbildung der Nardo-Callunetea-Gesellschaft. (Abb. 11). *Calluna vulgaris* tritt häufig faziesbildend auf, durchsetzt von einigen Horsten von *Deschampsia flexuosa*, *Agrostis capillaris* und *Blechnum spicant*. In der Moosschicht fallen größere Polster von *Polytrichum formosum* auf, das hier sein Optimum hat.

2. Die Molinia-Ausbildung der Nardo-Callunetea-Gesellschaft wächst auf den wechselfeuchten Böschungen im Kontakt zum Pteridium-Kiefernforst und zur Ilex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausbildung mit Wechselfeuchtigkeitszeigern. In ihr gelangen *Pteridium aquilinum* und *Molinia arundinacea* zur Dominanz. *Pteridium aquilinum* meidet die warmen südexponierten Böschungen, so daß dort meist eine reine Molinia-Fazies ausgebildet ist. Das Vorhandensein der Säurezeiger im Unterwuchs — v.a. *Vaccinium myrtillus*, *Calluna vulgaris* und *Deschampsia flexuosa* erreichen hohe Stetigkeit — zeigt die Zugehörigkeit dieser physiognomisch stark abweichenden Ausbildung zur Nardo-Callunetea-Böschungsgesellschaft.

3. Die Sphagnum-Ausbildung mit *Sphagnum nemoreum* und *Bazzania trilobata* besiedelt feucht-nasse Böschungen, die nur an wenigen hangwasserbeeinflussten Stellen an den Hangfüßen im Bausandstein auftritt.

4. An luftfeuchteren Standorten, vor allem in Nordexposition, sind die Farne gegenüber den Zwergsträuchern und den Säurezeigern, wie *Deschampsia flexuosa* und *Carex pilulifera*, im Vorteil: In der Athyrium-Ausbildung mit den Trennarten *Athyrium filix-femina* und *Oxalis acetosella* erreichen *Athyrium filix-femina* selbst, *Blechnum spicant* und *Thelypteris limbosperma* höhere Deckungen.

5. Eine nährstoffreiche Ausbildung an den Hangfüßen im Bausandstein oder auf Buntsandsteinmischlehmen vermittelt zu den Glechometalia. Die mittlere Artenzahl steigt von ca. 20 bei den übrigen Ausbildungen auf 27 Arten an. Zahlreiche, anspruchsvollere Feuchtigkeitszeiger und Staunässezeiger, wie *Carex sylvatica*, *Carex pendula*, *Carex remota* und weitere Arten, wie *Brachypodium sylvaticum* und *Fragaria vesca*, differenzieren diese Ausbildung. Sie wächst im Kontakt zur Feuchten Ausbildung der Ilex-Fagus-Gesellschaft und zum Asperulo-Fagetum mit Säurezeigern.

Abb. 12: Nardo-Callunetea-Böschungsgesellschaft, typische Ausbildung mit den Farnen *Athyrium filix-femina*, *Blechnum spicant* und *Deschampsia flexuosa*, Langauweg, Aug. 1984.



8.3 Das Hedero-Rosetum Wilm. 80

Die strauchreichen Wegränder und Böschungen im Muschelkalkgebiet gehören zum Hedero-Rosetum und seinen Überlagerungen mit den Glechometalia-Gesellschaften. Es ist eine subatlantische Heilgesellschaft gestörter Waldränder, mit Schwerpunkt in der submontanen Stufe (WILMANNS, 1980). Die Assoziationscharakterart, *Rosa arvensis*, ist ein schattenresistenter Strauch, der im Wald lange überdauern kann und sich bei Verlichtung mit bogigen, sich bewurzelnden Langtrieben und unterirdischen Sproßausläufern rasch ausbreitet. Kennzeichnend sind eine Reihe von wärmeliebenden Sträuchern der Prunetalia, wie *Acer campestre*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea* und *Ligustrum vulgare* und, als subatlantische Trennart zum Rosetum subkontinentale, *Hedera helix*.

In der Emmendinger Tafelbergzone sind *Phyteuma spicatum* und *Campanula trachelium* für das Hedero-Rosetum lokale Trennarten, da diese Gesellschaft nur auf basenreichen Böden, die noch nicht völlig entkalkt sind (pH = 5–8), wächst. Ein Vergleich mit Aufnahmen von WILMANNS (1980; Spalten 6, 7) zeigt, daß das Hedero-Rosetum der Wegränder zur verarmten Ausbildung gehört. Die Arten der Glechometalia bzw. des Epilobio-Geranietum robertiani erreichen in der Emmendinger Tafelbergzone höhere Stetigkeit und Deckung. Übergänge zu den schattigen Binnensäumen sind nicht selten.

8.4 Das Epilobio-Geranietum robertiani Lohm. ex Görs et Müll. 69¹⁶⁾ (Tabelle V, Spalten 9–15)

Die Bergweidenröschen-Ruprechtskrautgesellschaft ist in der Emmendinger Tafelbergzone die am weitesten verbreitete Saumgesellschaft der Binnensäume. Sie gehört zum schattentoleranten Verband des Alliarion, der durch zahlreiche Waldpflanzen von den besonnten nitrophytischen Säumen des Aegopodion-Verbandes getrennt ist. Verbandscharakterarten sind *Lapsana communis*, *Stellaria media* ssp. *neglecta* und *Impatiens parviflora*. Als Assoziationskennarten haben *Geranium robertianum*, *Epilobium montanum*, *Mycelis muralis* und *Moehringia trinervia* hier ihren Schwerpunkt. Besonders *Geranium robertianum* kann ein dichtes, rotblühendes Band entlang der Waldwege bilden.

Normalerweise hält sich das Epilobio-Geranietum als konkurrenzschwache, halbnatürliche Ersatzgesellschaft der frischen und feuchten Fagetalia-Wälder nur wenige Jahre. Zu starke Aufflichtung führt zur Ausbildung anderer Glechome-

¹⁶⁾ In Anlehnung an OBERDORFER (1983) sind hier die *Impatiens noli-tangere*-Verlichtungsgesellschaften, die TÜXEN & BRUN-HOOL (1975) als eigene Assoziationen beschrieben haben, eingeschlossen.

talia-Gesellschaften, und selbst an schattigen Stellen wird diese Gesellschaft von Heilgesellschaften, wie z.B. dem Hedero-Rosetum und anderen Strauchgesellschaften langsam überwachsen. Auf den Banketten schmaler Waldwege kann das Epilobio-Geranietum, begünstigt durch die Mahd, zur anthropogenen Dauergesellschaft werden.

In der Emmendinger Tafelbergzone ist die Gesellschaft je nach Feuchtigkeit und Basenreichtum der Böden in folgende Ausbildungen gegliedert:

1. Epilobio-Geranietum stachyetosum
 - Typische Variante
 - Lysimachia nemorum-Variante
2. Epilobio-Geranietum impatientetosum
 - Lysimachia nemorum-Variante

Für die Subassoziation stachyetosum gibt Oberdorfer als Trennarten die Alno-Ulmion-Begleiter *Stachys sylvatica* und *Festuca gigantea* an, neben zwei weiteren Arten basenreicherer Böden (*Campanula trachelium* und *Ranunculus lanuginosus*), die in der Emmendinger Tafelbergzone fehlen. Es sind die Binnensäume im Kontakt zum Asperulo-Fagetum, Typische und Feuchte Ausbildung.

Die Typische Variante (Spalte 9) bleibt in der Emmendinger Tafelbergzone auf Muschelkalkverwitterungslehme, Deck- und Lösslehme beschränkt. Sie entspricht der Circaeae-Variante nach der Untergliederung von OBERDORFER (1983) (Tab. V, Spalte 10), die durch die Feuchtigkeitszeiger *Circaea lutetiana*, *Carex sylvatica*, *Ajuga reptans* und *Rumex sanguineus* gekennzeichnet ist. Diese Artengruppe ist in allen mesophilen und schwach sauren Binnensäumen der Emmendinger Tafelbergzone vorhanden. Die Lysimachia nemorum-Variante („Athyrium-Variante“ SSYMANK, 1985), am höchsten Auftreten von *Athyrium filix-femina* und *Oxalis acetosella* zu erkennen, greift auch auf den Platten-sandstein über und hat ihren Schwerpunkt auf oberflächlich versauerten Böden. Sie kann zum Epilobio-Geranietum stachyetosum, Lysimachia nemorum-Variante nach OBERDORFER (1983) gestellt werden, wobei *Lysimachia nemorum* und *Carex remota* eine geringe Stetigkeit haben.

Das Epilobio-Geranietum impatientetosum (Tab. V, Spalten 13–15) ist eine Subassoziation, die durch die Feuchtigkeitszeiger *Impatiens noli-tangere*, *Deschampsia cespitosa* und *Carex brizoides* von der Subassoziation stachyetosum deutlich getrennt ist. Auch im Aspekt dominiert jetzt meist *Impatiens noli-tangere*. Im Frühjahr, noch kaum vom Epilobio-Geranietum stachyetosum zu unterscheiden, entwickeln sich die Keimlinge von *Impatiens* sehr rasch und überwachsen die anderen Kräuter schnell (Phänologie in SSYMANK 1989).

Es ist die feuchteste Ausbildung des Epilobio-Geranietum, und ihre Kontakte sind das Carici remotae-Fraxinetum und die Feuchte Ausbildung des Asperulo-Fagetum. Auf tonigen Schichten des Oberen Buntsandsteins und auf den ent-

Abb. 13: *Epilobio-Geranium impatiensetosum* zur Hauptblüte von *Geranium robertianum*, Ende Mai; dazwischen der Neophyt *Impatiens parviflora*.



kalkten Muschelkalkverwitterungslehmen handelt es sich in der Emmendinger Tafelbergzone überall um die *Lysimachia nemorum*-Variante.

8.5 Die *Chrysosplenium alternifolium*-*Ficaria verna*-Gesellschaft (Tabelle VI)

An den schattigen Waldwegen im Kontakt zum *Carici remotae*-*Fraxinetum* fallen stellenweise, Ende April, kleinflächig durchsickerte Bestände von gelbgrün blühendem Milzkraut (*Chrysosplenium alternifolium*) ins Auge. Diese *Chrysosplenium alternifolium*-*Ficaria verna*-Gesellschaft (vorläuf. Bezeichnung) steht der *Cardamine amara*-*Chrysosplenium alternifolium*-Gesellschaft (*Cardamino-Chrysosplenietum* Maas 59) nahe. Letztere hat an kalkhaltigen, durchsickerten Stellen im Kontakt zu *Alno-Ulmion*-Wäldern ihren Schwerpunkt (vgl. OBERDORFER, 1977). In der Emmendinger Tafelbergzone fehlen *Cardamine amara* und auch alle übrigen Kennarten der Klasse *Montio-Cardaminetea*. Damit ist die *Chrysosplenium alternifolium*-*Ficaria verna*-Gesellschaft soziologisch nicht mehr zu den Quellfluren zu rechnen.

Typische Artenkombination ist *Chrysosplenium alternifolium* mit *Ficaria verna*, daneben, je nach Beschattung unterschiedlich hohe Anteile von Waldarten: Fagetalia- und Querc-Fagetea-Arten einerseits und die Alno-Ulmion-Arten der feuchten Laubwälder andererseits. Bezeichnender Begleiter ist *Urtica dioica*. Die gesamte Artenkombination entspricht weitgehend einer verarmten Krautschicht des Carici remotae-Fraxinetum, aber das Vorkommen von *Chrysosplenium alternifolium* und besonders dessen Dominanz zusammen mit *Ficaria verna* weisen diese Gesellschaft als eine für die Emmendinger Tafelbergzone eigenständige, sehr schattentolerante, durchsickerte Gesellschaft der Binnensäume aus.

Man kann diese Gesellschaft auch als eine sickerfeuchte Ausbildung des Epilobio-Geranietum impatientetosum auffassen. Dafür sprechen die manchmal in großer Anzahl auftretenden Keimlinge von *Impatiens noli-tangere* im Frühjahr.

Es gibt auf Rückewegen im fast geschlossenen Carici remotae-Fraxinetum auch reine *Ficaria verna*-Bestände, die als auffallendes, dunkelgrünes, bzw. zur Blütezeit gelbes Band den Wald durchziehen (Aufnahme 4, Tab. VI). Die Wurzelknöllchen des Scharbockskrautes werden in diesen, nach der Holzabfuhr eingetieften und vegetationsfreien Wegerinnen durch Regen rasch eingeschwemmt und verteilt. Sie haben dann, wie in den Auewäldern nach Überflutung, optimale Startbedingungen.

8.6 Die *Alliaria petiolata*-Gesellschaft, der Lauch-Hederich-Saum (Tabelle V, Spalte 16)

Der Lauch-Hederich (*Alliaria petiolata*) bevorzugt kalkreiche Böden und die *Alliaria petiolata*-Gesellschaft ist deshalb in der Emmendinger Tafelbergzone nur an wenigen, feucht-schattigen Waldwegen zu finden, wenn Lößbeteiligung oder noch nicht vollständig entkalkte Böden vorliegen. Die Gesellschaft zeichnet sich soziologisch eigentlich nur negativ durch das Fehlen aller Kennarten der anderen Assoziationen des Alliario-Verbandes und die Dominanz von *Alliaria petiolata* aus. Für das Auftreten von *Chaerophyllum temulum* (Alliario-Chaerophylletum temuli) sind die Waldbinnensäume in der Emmendinger Tafelbergzone zu schattig.

8.7 Das *Juncetum tenuis* Schwick. 44 (Tabelle V, Spalte 18)

Juncus tenuis ist ein 1824 aus Nordamerika eingeschleppter Neophyt, der bei uns inzwischen eine soziologisch fest umrissene Trittgemeinschaft sandig-lehmiger Wegränder charakterisiert. Kenn- und Trennarten der Assoziation sind *Jun-*

cus tenuis und *Prunella vulgaris*. Stete Begleiter sind *Agrostis capillaris* und Staufeuchtigkeitszeiger, wie *Mentha arvensis*, *Juncus effusus* und *Lycopus europaeus*, die den Glechometalia-Gesellschaften fehlen. Mit *Ranunculus repens* und *Glyceria declinata* stehen die Bestände den Agrostietalia nahe und gehören zu der artenreichen Subassoziation agrostietetosum stoloniferae. *Juncus tenuis* verträgt gelegentliches Befahren und Betreten. Die Gesellschaft wächst vor allem auf größeren, z.T. geschotterten Waldwegen an sonnigen Wegrändern im Buntsandsteingebiet.

8.8 Das Poo-Tussilaginetum farfarae Tx. 31 (Tabelle V, Spalte 20)

Auf verdichteten, staufeuchten Lehmböden siedelt sich der Wurzelkriechpionier *Tussilago farfara* an. Diese Pionierassoziation, das Poo-Tussilaginetum farfarae, findet besonders auf ehemaligen Holzlagerplätzen geeignete Standortbedingungen. Die floristische Zusammensetzung der Gesellschaft schwankt stark. Bezeichnende Begleiter sind die Staufeuchtezeiger *Ranunculus repens* und *Equisetum arvense*, daneben ein mehr oder minder großer Anteil der Arten der Glechometalia. Die Gesellschaft wird vom Epilobio-Geranium mit reichlich *Eupatorium cannabinum* oder von *Cirsium arvense*-Beständen abgelöst, kann sich aber jahrelang fast unverändert halten. Sie hat eine herausragende Bedeutung für Blütenbesucher wegen des reichen Nahrungsangebots im zeitigen Frühjahr (SSYMANK 1991).

8.9 Das Urtico-Aegopodietum (Tx. 63) Oberd. 64

Die Brennessel-Giersch-Gesellschaft, das Urtico-Aegopodietum podagrariae, wächst an nährstoffreichen Stellen sonniger, breiter Waldwege, z.B. an Weggabelungen oder in der Umgebung von Waldparkplätzen. Sie bevorzugt lehmige Böden im Muschelkalkgebiet, kommt aber auch auf Buntsandsteinlehm vor. Meist gelangt entweder *Urtica dioica* oder *Aegopodium podagraria* zur Dominanz. Zur typischen Artenkombination dieser Zentralassoziation des Aegopodion-Verbandes gehören *Lamium maculatum* (VC), *Heracleum sphondylium* und *Galium aparine*. Die Arten der angrenzenden Wälder und Binnensäume (Kontaktgesellschaften) greifen in die, im Vergleich zu anderen Standorten des Urtico-Aegopodietum, schattigen Bestände der Waldwege über. So sind Fagetalia- und Alno-Ulmion-Arten mit relativ großer Stetigkeit vorhanden. Manche schattige *Urtica*-Fazies in der Emmendinger Tafelbergzone muß mit dem Ausfallen der Aegopodion-Arten schon dem Alliarion-Verband zugerechnet werden. *Urtica dioica* ist wesentlich schattentoleranter als *Aegopodium podagraria*.

8.10 Weitere Gesellschaften an Waldwegen

Hier sei noch eine Reihe weiterer Gesellschaften aufgeführt, die anteilmäßig in der Emmendinger Tafelbergzone unbedeutend sind und meist pflanzensoziologisch nur als Fragmentgesellschaften angesprochen werden können. Sie sind syntaxonomisch i.d.R. nur einer höheren Einheit – Verband, Ordnung oder Klasse – zuzuordnen. Diese Gesellschaften sind jedoch blütenreich und daher für blütenbesuchende Insekten an den Waldwegen oft besondere Anziehungspunkte.

– In der Aue der Buntsandsteintäler, in Kontakt zum Stellario-Alnetum glutinosae oder zum Carex brizoides-Fichtenforst, begleitet der Neophyt *Impatiens glandulifera* die Wegränder. Diese Neophytengesellschaften sind soziologisch meist Glechometalia- oder *Impatiens glandulifera*-Alliarion-Gesellschaften (LECHNER, 1985).

– An luftfeuchten Standorten, meist an den Unterhängen in Nordexposition, kann stellenweise *Knautia dipsacifolia* wenige m² große, blaublühende Bestände bilden, zusammen mit *Hypericum perforatum*. Diese Bestände sind eine verarmte Ausbildung des Knautietum dipsacifoliae Oberd. 71, aus der Gruppe der azidoklinen Saumgesellschaften des Trifolion medii-Verbandes.

– In feucht-nassen Gräben auf stauenden Schichten des Oberen Buntsandsteins kommen Magnocaricion-Fragmentgesellschaften vor. *Carex acutiformis* dominiert, zusammen mit *Lythrum salicaria*, *Lysimachia vulgaris* und *Angelica sylvestris*.

– An feuchten, befahrenen Wegrändern treten verschiedene Fragmentgesellschaften der Agrostietea stoloniferae auf. Dazu gehören Dominanzbestände von *Carex hirta*, *Potentilla anserina* und *Agrostis stolonifera* (Tab.V, Spalte 19).

– Entlang der Kreisstraßen kommen auf den Banketten, besonders bei geringer Beschattung, Arrhenatherion-Fragmentgesellschaften vor. Es sind die Wiesengräser unserer Wirtschaftswiesen, die hier, je nach Beschattungsgrad, zusammen mit Arten der Binnensäume (Glechometalia) und Waldarten wachsen. Für blütenbesuchende Insekten ist der Reichtum an Doldenblütlern besonders wichtig: *Anthriscus sylvestris*, *Pimpinella major*, *Heracleum sphondylium* und an feuchten Stellen *Angelica sylvestris*.

– An Holzlagerplätzen am Rande mancher Schlagfluren treten Ruderalbestände auf, die von *Cirsium arvense* beherrscht werden, und zu der Klasse der Artemisietea gerechnet werden müssen.

9. Die Vegetationskomplexe

Nach der Beschreibung aller Gesellschaften der Wälder, Schlagfluren und Binnensäume, soll hier im Zusammenhang noch einmal kurz das typische Vegetationsmosaik der Emmendinger Tafelbergzone unter einem neuen Gesichtspunkt dargestellt werden.

Auf der Vegetationskarte erkennt man zunächst zwei große Einheiten: das Buntsandsteingebiet nördlich der Binzgenwaldverwerfung und die von Muschelkalkverwitterungslehmen bedeckte Malecker Scholle im Süden. Bei genauerer Betrachtung lassen sich diese Einheiten in folgende Vegetationskomplexe, mit jeweils einer typischen Kombination von Pflanzengesellschaften, gliedern:

Buntsandsteingebiet

1. Süd- und Südwesthänge (Amsenbuck, Allmendsberg, Weiherbühl)
2. Nord- und Osthänge (Binzgenwald und Laberberg)
3. Buntsandsteintalsolehnen (Lange Au)
4. Hochlagen und Verebnungen im Oberen Buntsandstein (Kuppe des Laberberges)

Muschelkalkgebiet

5. Muschelkalkhochfläche (Verwitterungs- und Lößlehme)
6. Flache Talmulden und Täler im Muschelkalk

Dieser Einteilung in Vegetationskomplexe liegen keine sigmasoziologischen Aufnahmen zugrunde. Die Komplexe fassen mehrere geomorphologische Kleinformen mit unterschiedlicher, potentieller natürlicher Vegetation zu größeren Landschaftseinheiten mit einheitlichem Vegetationsmosaik zusammen.

Für diese Vegetationskomplexe wird jeweils eine Liste aller Pflanzengesellschaften (Abb. 14) mit ihrer relativen Häufigkeit in dieser Einheit aufgestellt, wobei die prozentuale Flächendeckung der Wald- und Schlaggesellschaften durch Planimetrieren repräsentativer Ausschnitte aus der Vegetationskarte gewonnen wurde. Die prozentuale Weglänge der Wegränder der einzelnen Gesellschaften am Gesamtwegenetz ist anhand der genauen Kenntnis ausgewählter Waldwege abgeschätzt worden.

Anhand der Abb. 14 wird deutlich, daß jeder der betrachteten Vegetationskomplexe bestimmte Pflanzengesellschaften und ein eigenes Mosaik derselben umfaßt.

Das Buntsandsteingebiet zeichnet sich durch die Ilex-Fagus-Gesellschaft und die entsprechenden Ersatzgesellschaften bei den Forst- und Schlaggesellschaften aus. Das Vorkommen der Ilex-Buchenwälder und der verarmten Ausbildung

Vegetationskomplexe der Emmendinger Tafelbergzone

Prozentuale Flächenbedeckung der Gesellschaften in den Vegetationskomplexen

Vegetationskomplex-Nr.: Planimetrierte Fläche in ha:	Burtsandstein-						Muschelkalkgebiet					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	485	604	97	224	324	307						

Wälder und Schlaggesellschaften

Abb. 14, 1. Teil:

d1-4	Reiner T/F-Forst ohne Dryopteris dilatata	12,3	19,8	5,1	13,1							
	Reiner T/F-Forst mit Dryopteris dilatata	8,6	21,0	20,5	1,7							
	Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung mit Säurezeigern	0,2	2,3	4,6	17,6							
	lex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausb., Typische Variante	40,4	13,2		15,4							
	lex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausb., Typische Variante	1,0	14,0		12,0							
	lex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausb., Lamium-Variante	10,7	3,0		10,9							
	Carex pilulifera-Schlag	0,4	0,9	6,2								
	Carex remotae-Fraxinetum mit Säurezeigern	3,6	0,4	1,5	3,2							
	lex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausb., Vaccinium Variante											
d1	Pteridium-Kiefernforst	30,5	1,7									
	Reiner T/F-Forst mit Dryopteris dilatata, Leucobryum glaucum-Fazies	3,5										
	Carex pilulifera-Schlag, mit Molinia (wechselfeucht)	1,3										
	Reiner Kiefernforst	1,0										
d2	Reiner T/F-Forst mit Dryopteris dilatata, Polytrichum formosum-Fazies	1,0	5,4									
	Reiner T/F-Forst mit Dryopteris dilatata, Bazzania trilobata-Fazies		4,1									
d3	Carex brizoides-Fichtenforst			31,3								3,6
	Stellario-Alnetum glutinosae, Carex brizoides-Fazies			22,6								
	Stellario-Alnetum glutinosae			5,1								
d5,6	Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung										30,0	56,4
d5	Asperulo-Fagetum, Typische Ausbildung										50,0	3,6
d6	Carici remotae-Fraxinetum (ohne Säurezeiger)										3,0	23,0
	Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung, Deschampsia cespitosa-Fazies											5,5
	Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung, Allium ursinum-Fazies											4,9
	Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung, Impatiens noli-tangere-Fazies											3,7
	Alnus glutinosa-Bestände (linear)											0,4
d4-6	Carex sylvatica-Schlag, Glechoma-Ausbildung				12,0						2,0	2,7
B	Reiner Athyrium-T/F-Forst		15,7		13,1						5,0	1,7
	Lamium-Athyrium-T/F-Forst		0,4		1,0						8,0	3,6

Vegetationskomplexe der Emmendinger Tafelbergzone, Teil 2

Binnensäume und Waldwege

Prozentualer Anteil an der Waldwegstrecke

Vegetationskomplex-Nr.:

Abb. 14, 2. Teil:

	Buntsandstein-						Muschelkalkgebiet					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
d1-4	25	45	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nardo-Callunetea-Böschungsgesellschaft, Typische Ausbildung	2	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nardo-Callunetea-Böschungsgesellschaft, Athyrium-Ausbildung	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Nardo-Callunetea-Böschungsgesellschaft, Nährstoffreiche Ausbildung	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nardo-Callunetea-Böschungsgesellschaft, Sphagnum-Ausbildung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
d1	40	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nardo-Callunetea-Böschungsgesellschaft, Molinia-Ausbildung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
d3	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Impatiens glandulifera-Glechometalia-Gesellschaft	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Scirpus sylvaticus-Bestand	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phalaridetum arundinaceae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
d4-6	.	5	.	50	30	80	.	.	.	.	.	.
Epilobio-Geranietum impatiens-., Lysimachia-Var., Impatiens-Fazies	1	.	.	20	40	5	.	.	.	.	.	.
Epilobio-Geranietum impatiensetosum, Lysimachia-Variante	.	.	.	1	5	.	.	.	.	.	.	.
Urtico-Aegopodietum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
d5,6	.	.	.	.	5	1	.	.	.	.	.	.
Hedero-Rosetum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B	1	2	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.
Epilobio-Geranietum stachyretosum, Lysimachia nemorum-Variante	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Poo-Tussilaginetum farfarae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juncetum tenuis	.	5	1	3	1	.	.	.	.	.	.	.
Cirsium arvense-Ruderalbestand	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.
Chrysosplenium alternifolium-Ficaria verna-Gesellschaft	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Agrostis capillaris-Tritrasen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Knautietum dipsacifoliae	5	.	.	1	1	5	.	.	.	.	.	.
Urtica-Alliarion-Gesellschaft	.	1	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Magnocaricion-Fragmente	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Agrostietea-Fragmente	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
Epilobio-Geranietum stachyretosum, Typische Variante	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Caltha palustris-Bänder bachbegleitend	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.

Vegetationskomplex-Nr. vgl. Text.

d differenzierende Vegetationseinheiten, B Begleiter.

des *Epilobio-Digitalietum purpureae* spiegeln den subatlantischen Klimacharakter der Emmendinger Vorbergzone mit seiner besonderen thermischen Begünstigung wieder. An den Waldwegen dominieren verschiedene Ausbildungen der *Nardo-Callunetea*-Böschungen und das *Juncetum tenuis*.

Im Muschelkalkgebiet wachsen *Asperulo-Fagetum* und *Carici remotae-Fraxinetum* mit ihrer Ersatzgesellschaft, der *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft. An den Waldwegen herrscht das *Epilobio-Geranietum impatientetosum* vor. Übergänge zeigen die Buntsandstein-Hochflächen, auf deren lehmig-tonigen Schichten ebenfalls bereits die *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft und das *Epilobio-Geranietum impatientetosum* auftreten, andererseits aber noch die Waldgesellschaften bodensaurer Substrate vorkommen.

Die Südhänge der Buntsandsteintäler (Nr. 1) zeichnen sich durch die *Ilex-Fagus*-Gesellschaft, Typische Ausbildung und an wechsellrockenen Stellen durch den *Pteridium*-Kiefernforst mit der entsprechenden Wegrandvegetation, der *Molinia*-Ausbildung der *Nardo-Callunetea*-Böschung aus.

An den Nordhängen (Nr. 2) kommen die luftfeuchten, farnreicheren Ausbildungen der Waldgesellschaften und der Binnensäume stärker zur Geltung. Dies sind die *Ilex-Fagus*-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung, der Tannen-Fichtenforst mit *Dryopteris dilatata*, der *Athyrium*-T/F-Forst und, bei der *Nardo-Callunetea*-Böschung, die *Athyrium*-Ausbildung.

Die Buntsandsteintäler (Nr. 3) sind, soweit keine Wiesennutzung vorliegt, durch das *Stellario-Alnetum glutinosae* mit seiner Ersatzgesellschaft, dem *Carex brizoides*-Fichtenforst, und durch die *Impatiens glandulifera*-Neophytenfluren gekennzeichnet.

Auf den Verebnungen im Oberen Buntsandstein, z.B. am Laberberg (Nr. 4), ist das *Asperulo-Fagetum*, Feuchte Ausbildung mit Säurezeigern, mit den Säumen des *Epilobio-Geranietum impatientetosum* besonders häufig.

Im Muschelkalkgebiet sind die Übergänge zwischen den beiden unterschiedenen Vegetationskomplexen (Nr. 5 und 6) auf der Vegetationskarte und im Gelände unschärfer. Dennoch lassen sich die Muschelkalktäler (Nr. 6) durch sickerfeuchte Waldgesellschaften, wie das *Carici remotae-Fraxinetum* mit der *Chrysosplenium alternifolium*-*Ficaria verna*-Gesellschaft auf Waldwegen, und durch das häufige Auftreten des *Asperulo-Fagetum*, Feuchte Ausbildung, abtrennen.

Die Muschelkalkhochflächen (Nr. 5) sind die Domäne des *Asperulo-Fagetum*, Typische Ausbildung, dessen Binnensäume vom *Epilobio-Geranietum* und vom *Hedero-Rosetum* gebildet werden.

10. Aspekte des Naturschutzes

Aus der Sicht eines prospektiven und praxisorientierten Naturschutzes besteht die Notwendigkeit komplexe Landschaften als Teile unserer Kulturland-

schaft zu erfassen und zu bewerten. Wenn „Rote-Liste-Arten“ fehlen und damit das am häufigsten verwendete Wertkriterium der Seltenheit der Arten ausfällt, bedeutet dies keinesfalls eine „geringe Wertigkeit“ dieses Gebietes für den Arten- und Biotopschutz.

Im Gegenteil müssen zahlreiche weitere Kriterien für die Schutzwürdigkeit geprüft werden:

- Regionalspezifische Typische Ausbildung von Vegetationskomplexen (Zonationen und Mosaik). Hier ist besonders die kleinräumige Verzahnung von bodensauren artenarmen Wäldern mit mesophilen Buchenwäldern und ihren jeweiligen homologen Schlaggesellschaften und den sie begleitenden Binnensäumen als Folge der starken tektonischen und geomorphologischen Gliederung des Gebietes zu nennen. Solche Mosaik ermöglichen eine artenreiche Entomofauna, insbesondere von bodennistenden Hymopteren, deren bevorzugte Bruthabitate sandige Böden (Schläge im Buntsandstein) sind, die aber Blüten in den artenreicheren Gesellschaften auf Muschelkalk besuchen können.
- Vielfalt der Gesellschaften und Ausbildungen, die wie in der Emmendinger Tafelbergzone auch die Waldgeschichte (Streunutzung u.a.) widerspiegeln und der Landschaft ein besonderes Gepräge verleihen.
- Arealgeographische Besonderheiten der Pflanzen-, Tierarten und der Lebensgemeinschaften. Hier ist z.B. die Ilex-Fagus-Gesellschaft als arealgeographische Besonderheit der Emmendinger Tafelbergzone zu nennen.
- Strukturelle Vielfalt, d.h. vertikale und horizontale Gliederung der Gesellschaften im Hinblick auf typische Strukturqualitäten für eine artenreiche lebensraumtypische Fauna. Die Wälder im Muschelkalkgebiet der Emmendinger Tafelbergzone haben einen hohen Anteil alter Eichen, Totholz und blütenreiche Binnensäume.
- Großer Arten- und Individuenreichtum lebensraumtypischer Tierarten. Auf zahlreichen Dauerflächen wurde die Gilde der Blütenbesucher in den Wäldern, Schlagfluren und Binnensäumen erfaßt (SSYMAN, 1991). Die Schwebfliegenfauna umfaßt 156 Arten, das sind rund ein Drittel aller in Baden-Württemberg nachgewiesenen Arten. Darunter sind zahlreiche Arten, deren Larven hohe spezifische Ansprüche an Totholz in verschiedenen Zersetzungsgraden stellen oder auf andere Weise eine Bindung an Wälder aufweisen. Auch bei den Schmetterlingen sind einige Besonderheiten wie Trauermantel und Großer Fuchs an den Binnensäumen zu finden. Auf den Doldenblütlern trifft man an den Waldrändern und auf der *Carex sylvatica*-Schlaggesellschaft im Hochsommer eine arten- und individuenreiche Gemeinschaft blütenbesuchender Bockkäfer.

Angeführte Schriften

- BARKMAN, J. J., DOING, H. & SEGAL, S. (1964): Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. — *Acta bot. Neerl.* **13**: 394–419. Amsterdam.
- BOHN, U. (1981): Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200.000 Blatt CC 5518 Fulda, Potentielle Natürliche Vegetation. — *Schriftenr. Veget.kde.* **15**: 1–330. Bonn — Bad-Godesberg.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1967): Vegetationsskizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken auf das weitere Ibero-Atlantikum. II. Teil. — *Vegetatio* **14**: 1–26. Den Haag.
- BUDWILL, H. (1957): Geologie der Emmendinger Vorberge (Südteil). Kartierung 1 : 25.000, Dipl.arb. Freiburg, 84 S.
- DURIN, L., GÉHU, J.-M., NOIRFALISE, A. & SOUGNEZ, N. (1967): Les hêtraies atlantiques et leur essaim climatique dans le nord-ouest et l'ouest de la France. — *Bull. soc. bot. Nord-France* **20**: 59–89. Lille.
- FRAHM, J.-P. & FREY, W. (1983): Moosflora. — 522 S. (Ulmer) Stuttgart.
- GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTT. (1981): Erläuterungen zur geologischen Karte Freiburg und Umgebung 1 : 50.000. — 354 S. Stuttgart.
- HÄDRICH, F. (1962): Beziehungen zwischen Böden und Landschaft in der Emmendinger Vorbergzone. — Diss. Freiburg, 204 S.
- HOCKENJOS, W., SPAHL, H. & VERES (1973): Erläuterungen zur Standortskarte Emmendingen Bergwald (Forstbezirke Emmendingen und Kenzingen). Forstamt Emmendingen.
- HOF (1912): Der Vierdörferwald. — *Monatsbl. Bad. Schwarzwaldverein* **4** (15): 68–70.
- KESSLER, G. & LEIBER, J. (1980): Geologische Karte 1 : 25.000 MTB 7813 Emmendingen mit Erläuterungen. — Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, 151 S., Stuttgart.
- LECHNER, B. (1986): Das Mosaik der Waldgesellschaften auf Muschelkalk mit Lössdecke in der Emmendinger Vorbergzone. — Dipl.arb. Univ. Freiburg, 83 S.
- MEISEL-JAHN, S. (1955): Die Kiefern-Forstgesellschaften des nordwestdeutschen Flachlandes. — *Angew. Pfl.soziologie* **11**: 126 S., Stolzenau/Weser.
- OBERDORFER, E. (1957): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. — *Pflanzensoziol.* **10**: 564 S. Jena.
- (1977 ff.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I, Teil II (2.A., 1978, 355 S.), Teil III (1983, 455 S.), G. Fischer, Stuttgart.
- (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 1051 S., Ulmer, Stuttgart.
- (1984): Zur Synsystematik bodensaurer, artenarmer Buchenwälder. — *Tuexenia* **4**: 257–266. Göttingen.
- PHILIPPI, G. (1956): Einige Moosgesellschaften des Südschwarzwaldes und der angrenzenden Rheinebene. — *Beitr. natkd. Forsch. SW-Dtl.* **15** (2): 91–124. Karlsruhe.

- POTT, R. (Hrsg.) (1989): Rintelner Symposium I, Buchenwaldsymposium. 165 S., R. Tüxen-Gesellschaft. Hannover.
- RAMEAU, J. C. (1981): Réflexions sur la synsystème des forêts françaises de hêtre, chênes et charme. Application au système bourgignon. — Bull. soc. bot. France; Actual. Bot. **128**: 33–63.
- (1985): L'intérêt chorologique de quelques groupements forestiers du Morvan, France. — Vegetatio **59**: 47–65. Den Haag.
- SACK, H. (1962): Geologie der Emmendinger Vorberge zwischen Freiamt und Heimbach. Dipl.arb. Freiburg., 100 S.
- SSYMANK, A. (1985): Gibt es eine Koinzidenz von Waldgesellschaften und geologischem Substrat in der Emmendinger Vorbergzone? — Dipl.arb., 92 S. Freiburg.
- (1989): Das Vegetationsmosaik eines Waldgebietes der Schwarzwaldvorbergzone und seine funktionale Bedeutung für blütenbesuchende Insekten — unter besonderer Berücksichtigung der Syrphidae (Diptera). Diss. Freiburg, 330 S., 1 Karte, 41 Tab.
- (1991): Die funktionale Bedeutung des Vegetationsmosaiks eines Waldgebiets der Schwarzwaldvorbergzone für blütenbesuchende Insekten — untersucht am Beispiel der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae). — Phytocoenologia **19** (3): 307–390.
- TRENNLE, H. & v. RUDLOFF, H. (1980): Das Klima im Schwarzwald. In: Liel, Sick — Der Schwarzwald.: 59–100. (Konkordia) Bühl/Baden.
- TÜXEN, R. & BRUN-HOOL, J. (1975): Impatiens noli-tangere-Verlichtungsgesellschaften. — Mitt. flor.-soz. Arbgem. N.F. **18**: 133–155. Göttingen.
- VOLLMER, F. X. (1981): Wissenswertes aus Städten und Gemeinden. — In: Der Kreis Emmendingen. S. 245–282. Stuttgart.
- VOLK, H. (1969): Untersuchungen zur Ausbreitung und künstlichen Einbringung der Fichte im Schwarzwald. — Schriftenr. Landesforstverw. Bad.-Württ **28**: 1–160. Stuttgart.
- WELLMER, M. (1938): Zur Entstehungsgeschichte der Markgenossenschaften: Der Vierröfderwald bei Emmendingen. — Veröff. Oberrhein. Inst. f. gesch. Landkde. **4**: 1–182. Diss. Freiburg.
- WILMANN, O. (1980): Rosa arvensis-Gesellschaften. — Mitt. flor.-soz. Arbgem. N.F. **22**: 125–134. Göttingen.
- (1984): Ökologische Pflanzensoziologie. — 3.A. (Quelle & Meyer) Heidelberg.
- ZEIS, K. (1976): Der Eichberg in vergangenen Zeiten. — Emmendinger Heimatkalender: 54–56. Emmendingen.

Anhang Vegetationstabellen

Hinweis: Die Tabellen Ib, IIa und die Vegetationskarte sind lose Beilagen.

275

7 17 25

Gehölze:

Overco-Pagete, KC:

DIF Ilex aquifolium

Quercus robur

Corylus avellana

Lonicera xylosteum

Carpinion V

Carpinus betulus

INVENTORY NUMBER 400

[illegible]

Fortsetzung Tabelle Ia:

[illegible]

Gerner folgende Arten:

Gesellschaften:

- I Ilici-Fagetum, Feuchte Ausbildung (Typ-Variante)
- II Asperulo-Fagetum, Typische Ausbildung, reine Variante
- III Asperulo-Fagetum, Typische Ausbildung, Carer sylvatica-Variante (Circaeä-Variante n. Lechner 1986)

Asperuio-Fagetum, Feuchte Ausbildung siehe Tabelle 1.b

VEGETATIONSMOSAİK EINES WALDGEBIETES DER EMMENDINGER TAFELBERGZONE

O Pratinus excelsior	B1	2a1 + 3.3	4.4 2b1 3.3 2b3 2a1 4.4	2a1 2a1	+	2a1	+	+	3 8
	B2	+	2a1	+	+	+	+	+	1 6 14
K Ilex aquifolium	Kr	+	2a1	1.2 1.1 2a1 1.1	+	2a1 1.1 2a1 1.1 1.1 1.1 2a1	+	+	0 1 5
	Str	+	+	+	+	+	+	+	2 1 0
K Corylus avellana	Str 2b	+	+	+	+	+	+	+	4 2 0
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	3 1 0
Alnus glutinosa	B1	5.5 3.3 2b3 2a1	2a1	+	+	+	+	+	0 2 8
	B2	+	+	+	+	+	+	+	0 3 7
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	0 2 0
	Str	+	+	+	+	+	+	+	0 2 3
Prunus avium	B1	+	+	+	+	+	+	+	4 6 12
	B2	+	+	+	+	+	+	+	0 3 5
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	0 1 10
	Str	+	+	+	+	+	+	+	0 0 8
Abies alba	B1	+	+	+	+	+	+	+	0 1 12
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 2 2
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	0 0 5
	Str	+	+	+	+	+	+	+	0 2 1
Rubus idaeus	B1	+	+	+	+	+	+	+	0 0 3
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Sambucus nigra	B1	+	+	+	+	+	+	+	0 0 5
Lonitza periclymenum	B2	+	+	+	+	+	+	+	0 2 1
Frangula alnus	Kr	+	+	+	+	+	+	+	0 0 3
Pinus sylvestris	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Viburnum opulus	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Betula pendula	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Quercus robur	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Castanea sativa	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Larix decidua	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Stellaria nemorum	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Lapathum glandulifera	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Phalaris arundinacea	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Urtica dioica	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Scirpus sylvaticus	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Carex acutiformis	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Chrysanthemum alternifolium	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
Koeleria diacapsifolia	B1	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	B2	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Kr	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1
	Str	+	+	+	+	+	+	+	1 0 1

Fortsetzung Tabelle II.b:

Laufende Nummer:

diff. Carici rem.-Frag.

	2b	+	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	
--	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

Begleiter:

<i>Athyrium filix-femina</i>	+	+	2a1	2b1	4.4	2a2	1.2	1.1	2a1	1.1	2a1	2b1	+	+	+	3.4	+	1.1	+	2a2	2b1	2a1	1.2	+	1.1	2a1	2a2	+	1.2	+	+	4	9	20		
<i>Oralis acetosella</i>	-	-	-	-	2a2	1.2	2a2	2a1	1.1	2m	2b3	3.3	2b2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	19	
<i>Lamiae glaberrima</i>	1.1	-	-	-	2a1	2a2	2a1	1.1	1.2	2a1	+	2a1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	9	19
<i>Galopsis tetralix</i>	1.1	-	-	-	+	+	1.2	1.1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	5	9
<i>Dryopteris dilatata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9
<i>Luzula sylvatica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	9
<i>Luzula pilosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	9
<i>Stachnum spicatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	4
<i>Juncus effusus</i>	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	5
<i>Pteridium aquilinum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	5
<i>Dryopteris carthusiana</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	5
<i>Solidago virgaurea</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	5
<i>Helios linatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	5
<i>Stellaria uliginosa</i>	-	-	-	-	+	2a2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1
<i>Vicia sepium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1
<i>Thelypteris limbostrata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	1
<i>Juncus conglomeratus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1
<i>Fragaria vesca</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1
<i>Myrica australis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
<i>Carex uabrosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
<i>Hypericum pulchrum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
<i>Moos, Begleiter:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
<i>Polypodium formosum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
<i>Dicranella heteromalla</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2
<i>Fissidens tataricus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5
<i>Thuidium tamariscinum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	4
<i>Isophragma elegans</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4
<i>Erynum cupressiforme</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3
<i>Eurhynchium swartzii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2
<i>Pellia epiphylla</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0
<i>Eurhynchium praelongum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1

Anmerkungen: a) Aufnahmefläche; nach dem Schrägstrich erweiterte Aufnahmefläche

für die Schätzung der Baum/Strauchschicht

Unterstrichenen Artsschichtigkeit bedeutet cf. (conferatur)

x2: Arten im April 1998 ergänzt, neue Artsschichtigkeit unterstrichen. ~

Abkürzungen in der Randspalte: K Querco-Fagetea Kennart

O Fagelalia Kennart

V Fagion Kennart

V, C Carpino-Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

Anmerkungen: a) Aufnahmefläche; nach dem Schrägstrich erweiterte Aufnahmefläche

für die Schätzung der Baum/Strauchschicht

Unterstrichenen Artsschichtigkeit bedeutet cf. (conferatur)

x2: Arten im April 1998 ergänzt, neue Artsschichtigkeit unterstrichen. ~

Abkürzungen in der Randspalte: K Querco-Fagetea Kennart

O Fagelalia Kennart

V Fagion Kennart

V, C Carpino-Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

Anmerkungen: a) Aufnahmefläche; nach dem Schrägstrich erweiterte Aufnahmefläche

für die Schätzung der Baum/Strauchschicht

Unterstrichenen Artsschichtigkeit bedeutet cf. (conferatur)

x2: Arten im April 1998 ergänzt, neue Artsschichtigkeit unterstrichen. ~

Abkürzungen in der Randspalte: K Querco-Fagetea Kennart

O Fagelalia Kennart

V Fagion Kennart

V, C Carpino-Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

Anmerkungen: a) Aufnahmefläche; nach dem Schrägstrich erweiterte Aufnahmefläche

für die Schätzung der Baum/Strauchschicht

Unterstrichenen Artsschichtigkeit bedeutet cf. (conferatur)

x2: Arten im April 1998 ergänzt, neue Artsschichtigkeit unterstrichen. ~

Abkürzungen in der Randspalte: K Querco-Fagetea Kennart

O Fagelalia Kennart

V Fagion Kennart

V, C Carpino-Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

Anmerkungen: a) Aufnahmefläche; nach dem Schrägstrich erweiterte Aufnahmefläche

für die Schätzung der Baum/Strauchschicht

Unterstrichenen Artsschichtigkeit bedeutet cf. (conferatur)

x2: Arten im April 1998 ergänzt, neue Artsschichtigkeit unterstrichen. ~

Abkürzungen in der Randspalte: K Querco-Fagetea Kennart

O Fagelalia Kennart

V Fagion Kennart

V, C Carpino-Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

Anmerkungen: a) Aufnahmefläche; nach dem Schrägstrich erweiterte Aufnahmefläche

für die Schätzung der Baum/Strauchschicht

Unterstrichenen Artsschichtigkeit bedeutet cf. (conferatur)

x2: Arten im April 1998 ergänzt, neue Artsschichtigkeit unterstrichen. ~

Abkürzungen in der Randspalte: K Querco-Fagetea Kennart

O Fagelalia Kennart

V Fagion Kennart

V, C Carpino-Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

V, A Alno-Betula Kennart

[illegible]

	a										b																	
	1					2					1					2												
Laufende Nummer:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Datum/Monat. 1984:	7	7	7	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	8
Baumart (34...):	15	15	15	15	16	17	16	15	15	16	17	17	15	17	15	17	15	17	17	17	17	15	15	14	13	13	13	13
Baumart (53...):	825	925	620	890	875	150	480	405	530	575	425	650	460	630	420	425	600	650	70	120	430	870	975	890	790	700	405	460
Höhe über NN (Dekanten):	32	32	32	32	32	35	35	33	33	33	33	33	33	33	34	33	33	33	34	34	36	34	36	34	36	34	34	34
Exposition:	725	625	625	625	625	70	70	275	100	840	970	950	825	800	905	905	910	820	220	240	275	460	475	500	530	310	500	660
Wegung:	32	33	31	32	32	34	37	30	30	32	34	36	33	35	35	33	26	34	33	34	39	32	31	32	32	38	30	32
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	30	5	12	20
Wegung:	20	8	5	30	35	2	-	5	15	10	5	5	13	3	12	5	5	3	5	5	6	20	5	15	3			

[illegible][illegible]

Fortsetzung Tabelle IV: Schlagfluren

[illegible]

VEGETATIONSMOSAİK EINES WALDGEBIETES DER EMMENDINGER TAFELBERGZONE

[illegible]

Fortsetzung Tabelle IV: Schlafliuren

Fortsetzung Tabelle IV. Schlaefliuren

I

II

Laufende Nummer:	a							b																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
<i>Myosotis arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Luzula luzuloides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Hyperchoeris radicata</i>	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Galium aparine</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Primula elatior</i>	1.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Torilis japonica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Paris quadrifolia</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Vicia sepium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Erigeron annuus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Plantago major</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Chenopodium album</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carex flacca</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Stellaria uliginosa</i>	.	.	.	.	.	.	2a1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Lotus uliginosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Phalaris arundinacea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Oxalis stricta</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Blechnum spicant</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Laufende Nummer:

Myosotis arvensis

Luzula luzuloides

Hyperchoeris radicata

Galium aparine

Primula elatior

Torilis japonica

Paris quadrifolia

Vicia sepium

Erigeron annuus

Plantago major

Chenopodium album

Carex flacca

Stellaria uliginosa

Lotus uliginosus

Phalaris arundinacea

Oxalis stricta

Blechnum spicant

Moose Polytichum formosum

Atrichum undulatum

Dicranella heteronalla

Bryum cupressiforme

Brachythecium rutabulum

Fossaria hygrometrica

Pissidium tarifolius

Thuidium tamariscinum

Bryum lacunosum

Plagiomnium rostratum

Bryum spec.

Plagiomnium undulatum

Eurhyrachium swartzii

Bryum argenteum

Leucobryum glaucum

Laufende Nummer:

Myosotis arvensis

Luzula luzuloides

Hyperchoeris radicata

Galium aparine

Primula elatior

Torilis japonica

Paris quadrifolia

Vicia sepium

Erigeron annuus

Plantago major

Chenopodium album

Carex flacca

Stellaria uliginosa

Lotus uliginosus

Phalaris arundinacea

Oxalis stricta

Blechnum spicant

Moose Polytichum formosum

Atrichum undulatum

Dicranella heteronalla

Bryum cupressiforme

Brachythecium rutabulum

Fossaria hygrometrica

Pissidium tarifolius

Thuidium tamariscinum

Bryum lacunosum

Plagiomnium rostratum

Bryum spec.

Plagiomnium undulatum

Eurhyrachium swartzii

Bryum argenteum

Leucobryum glaucum

Anmerkungen:

- *1 Eine strenge Trennung in Gehölzrandflur und in Pflanzung war nicht immer möglich.
 *2 In den Aufnahmen 27, 35 und 36 wurde *Rubus canaliculatus* P.J. Hüller bestimmt.
 *3 unterstrichen ist *Hypericum x desatansii*; sonst bedeutet Unterstrichung cf. (conferatur).

Außerdem je einmal in Aufnahme Nr. 1: *Lathyrus pratensis* +; *Veronica persica* r; *Pottia truncata* (N) +; *Dicranella spec.* (N) +; 2: *Sonchus oleraceus* +; *Alliaria petiolata* +; *Dicranella spec.* (N) +; 3: *Acer campestre* (Str.) +; *Ribes rubrum* (Str.) +; 4: *Lonicera xylosteum* (Str.) +; *Viburnum opulus* (Str.) +; *Acer platanoides* r; *Crataegus monogyna* (Str.) +; *Cornus sanguinea* (Str.) +; *Campanula trachelium* 1.2; *Euphorbia spec.* r; 5: *Hypericum tetrapterum* 1.2; *Welandrium rubrum* 1.4; *Epilobium hirsutum* r; *Chenopodium polysperum* +; *Euphorbia verrucosa* +; *Schoenus setaceus* +; *Eurhynchium praelongum* (N) 2a; 6: *Ulmus glabra* (Str.) +; *Aspergillum podagrata* +; 7: *Glyceria declinata* 1.2; *Veronica beccabunga* +; 8: *Scirpus sylvaticus* 1.2; 9: *Impatiens glandulifera* 2a.2; *akrok. Kleinmoos* 1; 10: *Valeriana officinalis* +; *Calligonella cuspidata* (N) 1; 11: *Equisetum arvense* +; 12: *Tilia cf. tomentosa* (Str.) +; *Polygonum aviculare* 1.2; *Cerastodon purpureus* (N) 1; 14: *Lichnus flos-cuculi* +; 17: *Polygonum aviculare* +; *Juglans regia* (Str.) +; *Rumex acetosa* r; *Poa nemoralis* 1.2; *Calystegia sepium* +; *Cynodonium spec.* (N) 2a; 18: *Tilia cf. tomentosa* (Str.) r; 21: *Genista pilosa* +; *Campanula rotundifolia* r; *Conocarpium ciliatum* (N) +; *Akrokerpes Kleinmoos* (cf. *Weisia microstoma*) +; 23: *Picea fag.* +; 25: *Prenanthes purpurea* r; 27: *Linaria vulgaris* 1.2; *Hieracium sylvaticum* +; *Festuca arundinacea* +; *Salanthemum bifolium* 1.2; 28: *Hieracium spec.* +; 31: *Polygonum aloides* (N) 1; 36: *Cannabis sativa* r.

Gesellschaften:

- I Carex sylvatica-Atropion-Gesellschaft
- 1.a Glechoma hederacea-Ausbildung
- 1.b1 Myosotis latiflora-Ausbildung
- 1.b2 Typische Ausbildung
- II Carex pilulifera-Epilobion-Gesellschaft
- II.a Typische Ausbildung
- II.b Pteridium aquilinum-Ausbildung

Tabelle V
Böschungen, Binnensäume und Waldwege

Seite Nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Einzel- in der Einzel-	1, 1	2, 2	3, 3a	4, 4a	5, 5a	6, 6a	7, 7a	8, 8a	9, 9a	10, 10a	11, 11a	12, 12a	13, 13a	14, 14a	15, 15a	16, 16a	17, 17a	18, 18a	19, 19a	20, 20a
Samml. der Pflanzen:	7	11	5	10	17	7	8	9	69	6	21	20	21	20	12	11	1	5	3	4
Mittlere Artenzahl:	19	18	23	18	27	19	18	28	26	-	25	-	29	28	24	29	-	-	-	-
Beob. bei Beil. I	III +	II +	II +	I +	II +	I +	I +	I +	-	-	III +	-	-	-	-	-	-	-	-	I +
Abies alba	III +	II +	II +	I +	II +	I +	I +	I +	-	-	III +	-	-	-	-	-	-	-	-	I +
Picea abies	III +	II +	II +	I +	II +	I +	I +	I +	-	-	III +	-	-	-	-	-	-	-	-	I +
Betula pendula	III +	II +	II +	I +	II +	I +	I +	I +	-	-	III +	-	-	-	-	-	-	-	-	I +
Cassiope hecla	III +	II +	II +	I +	II +	I +	I +	I +	-	-	III +	-	-	-	-	-	-	-	-	I +
Prunella vulgaris	III +	II +	II +	I +	II +	I +	I +	I +	-	-	III +	-	-	-	-	-	-	-	-	I +
Pinus sylvestris	III +	II +	II +	I +	II +	I +	I +	I +	-	-	III +	-	-	-	-	-	-	-	-	I +
des Beil. II:	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fagus excelsior	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quercus robur	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quercus petraea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fraxinus excelsior	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix caprea	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salix alba	I +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

[illegible]

Fortsetzung Tabelle V:

[illegible]

Tabelle Nr.: VI

Chrysosplenium alternifolium-Ficaria verna-Gesellschaft

Aufnahme Nr.:	1	2	3	4
Datum:	18.4	17.4	17.4	28.4
19..	87	88	88	87
R-Wert: 34..	16	15	15	14
	500	420	770	620
H-Wert: 53..	33	33	33	35
	430	600	550	440
Neigung:	4	2	3	2
Exposition:	SO	WNW	OSO	N
Krautschicht, Deckung:	100	70	65	100
Höhe (dm):	4	2	1,5	4
Aufnahmefläche (m):	1	3	5	2
Artenzahl:	19	10	14	8

Ficaria verna	3.4	1.2	2b2	5.5
Chrysosplenium alternifolium	3.3	4.4	3.4	.

Alno-Ulmion V, DV:

Carex remota	1.2	+2	+2	+1
Impatiens noli-tangere Klg.	2m1	2m1	2m1	.
lok.Cardamine pratensis	+2	.	.	+1
Carex pendula	+1	.	.	.
Veronica montana	1.1	.	.	.
Stachys sylvatica	+1	.	.	.

Glechometalia O, Alliarion V:

Rumex sanguineus	1.1	.	1.1	.
Glechoma hederacea	1.2	.	.	.
Geranium robertianum	.	.	+1	.

Fagetalia O, Qu.-Fagetea K:

Carex sylvatica	2a1	+2	+2	.
Anemone nemorosa	2m2	1.2	.	+1
Milium effusum	+2	+2	+2	.
Primula elatior	.	+1	.	+1
Pulmonaria obscura	+1	.	.	.
Lamium galeobdolon	+1	.	.	.
Arum maculatum	.	+1	.	.
Hedera helix	.	.	+1	.

Begleiter:

Urtica dioica	+2	1.1	+1	.
Acer pseudoplatanus	1.1	.	.	1.1
Deschampsia cespitosa	+2	.	+2	.
Fraxinus excelsior	+1	.	.	.
Potentilla sterilis	.	.	+1	.
Ajuga reptans	.	.	+2	.
Poa pratensis	.	.	+2	.
Oxalis acetosella	.	.	.	1.2
Cardamine flexuosa	.	.	.	+2

Vegetationskarte der Emmendinger Tafelbergzone

Aktuelle Waldvegetation M 1:12 500

Ssymank 1990

Wälder auf Buntsandstein (nördlich der Binzgenwaldverwerfung)
kartiert von Ssymank (1985, veränd.).
Wälder auf Muschelkalk (südlich der Binzgenwaldverwerfung)
kartiert von Lechner 1986, ergänzt 1988.
Wälder bei Landeck
kartiert von Ssymank 1988.

Kartengrundlage:

MTB 7813, Emmendingen.
Forstkarten Staatswald und Stadtwald Emmendingen.
Karte Wälder im Buntsandsteingebiet der Emmendinger
Vorberzone (Ssymank, 1985).

geändert und ergänzt, Stand 1984/85.

A. Laubwälder

- Ilex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausbildung, Vaccinium-Variante
- Ilex-Fagus-Gesellschaft, Typische Ausbildung, inops
- Ilex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung, Typische Variante
- Ilex-Fagus-Gesellschaft, Feuchte Ausbildung, Lamium-Variante
- mit *Pteridium aquilinum*
- Asperulo-Fagetum, Typische Ausbildung (einschließl. *Circaea*-Variante)
- Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung
- Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung, *Allium ursinum*-Fazies
- Asperulo-Fagetum, Feuchte Ausbildung, mit Säurezeigern (auf Buntsandstein)
- Carici remotae*-*Fraxinetum*
- Carici remotae*-*Fraxinetum*, mit Säurezeigern (auf Buntsandstein)
- Stellario-Alnetum glutinosae*, z.T. fragmentarisch

B. Nadelwälder und -forsten

- Reiner Kiefern-Forst
- Pteridium*-Kiefern-Forst
- Reiner Tannen/Fichten-Forst ohne *Dryopteris dilatata*
- Reiner Tannen/Fichten-Forst mit *Dryopteris dilatata*
- Reiner *Athyrium*-Tannen/Fichten-Forst
- Lamium*-*Athyrium*-Tannen/Fichten-Forst
- Feuchter Tannen/Fichten-Forst auf Muschelkalk, *Carex brizoides*-Fazies
- Carex brizoides*-Tannen/Fichten-Forst

C. Schlaggesellschaften

- Schlagflur, z. Zeit nicht differenzierbar
- Carex sylvatica*-Schlag (Atropion), Reine Ausbildung
- Carex sylvatica*-Schlag (Atropion), *Glechoma*-Ausbildung
- Carex pilulifera*-Schlag (Epilobion), ohne *Calamagrostis epigejos*
- Carex pilulifera*-Schlag (Epilobion), mit *Calamagrostis epigejos*
- Pteridium*/*Molinia*-Fazies (Schlagflur)

D. Faziesbildungen (Wälder)

- Carex brizoides*
- Deschampsia cespitosa*
- Impatiens noli-tangere*
- Calamagrostis epigejos*
- Leucobryum glaucum*
- Polytrichum formosum*
- Bazzania trilobata*

E. Dominanten in der Baumschicht

Soweit nicht anders angegeben bei Laubwäldern B/E, bei Nadelwäldern F/T.

- T Tanne (*Abies alba*)
- F Fichte (*Picea abies*)
- Lx Lärche (*Larix decidua* und Hybr.)
- K Kiefer (*Pinus sylvestris*)
- D Douglasie (*Pseudotsuga menziesii*)
- Q Eiche (*Quercus petraea*)
- E Esche (*Fraxinus excelsior*)
- B Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*)
- B Buche (*Fagus sylvatica*)

F. Sonstiges

Waldentwicklungsstufen:

- 1 Jungwuchs, Dichtung
- 2 Stangenholz
- 3 Baumholz geringer Stärke
- 4 Baumschicht überwiegend Stockausschlag
- lokales Auftreten von Erle (*Ainus glutinosa*)
- lokale Verdichtungen, Störstellen
- 5 Dauerbeobachtungsflächen 1986 - 1987




Tabelle 1b
FrISChe und Feuchte Laubwälder im Muschelkalkgebiet
der Emmendinger Tafelbergzone

[illegible]

Gesellschaften:

Tabelle nach Lechner 1986, überarbeitet:
Frühlingsgeophyten ab Aufnahme Nr. 26 im April 1988 ergänzt (vgl. Text S.)
Ergänzungen: nur Deckungsangabe und %
Aufnahmen mit Feldauswertung ab Aufnahme Nr. 50 sind Originalaufnahmen von B. Lechner.

I. *Asperulo-Fagetum*, feuchte Ausbildung
II. *Carici remotae-Fraxinetum*
II.1. *Inops*
II.2. *Impatiens noli-tangere* Fazies
II.3. *Carex brizoides* Fazies

Tabelle II.a

Ilex-Fagus-Gesellschaft im Buntsandsteingebiet der Emmendinger Tafelbergzone

		I.a.		I.b.		II.a.		II.b.		Absolute Statistiken	
		1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	24	25
Laufende Nummer:		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Detum(Nemat. 1941):		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Rechtst. (24. 11. 1941):		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Hochwert (53. 11. 1941):		850	730	980	510	100	880	140	435	645	500
Höhe über NN (Dekameter):		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Exposition:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Majusker:		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Ausgewertete d. Nadelabdeckung:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Schaleit/Gründigkeit:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
pH-Wert (in ca. 10 cm Tiefe):		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Buntesandstein (in ca. 80 cm Tiefe):		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Nadel:		SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW
Bäume:		SW	SW	SW	SW						

absolute Stetigkeit: