©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Register

zu Neue Folge, Heft 31 (1914) bis 35 (1921) der Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins[1]).

Acaulon muticum Schreb. **32**, 155; triquetrum Spr. **32**, 155. — **Achillea** Millefolium L. **31**, 21; nobilis L. **33**, 64; Ptarmica L. **35**, 31; setacea W. K. **35**, 23. — **Achyrophorus** maculatus (L.) **31**, 53. — **Acisphagnum** C. M. **31**, 4. — **Acorus** Calamus L. **35**, 25. — **Acrocladium** cuspidatum L. **32**, 278. — **Acrostichum** **33**, 78. — **Actaea** spicata L. **35**, 22. — **Actinonema** Fr. **31**, 74. — **Acutifolia** (Schl.) **31**, 4. — **Adonis** aestivalis L. **33**, 47; 54; var. citrina Hffm. **33**, 54; flammeus Jcq. **31**, 54; vernalis L. **33**, 29; **35**, 14; 31. — **Aegopodium** Podagraria L. **35**, 23. — **Aethusa** Cynapium L. **31**, 77; var. agrestis Wallr. **31**, 77; var. cynapioides M. B. **31**, 77. — **Agrimonia** Trn. **34**, 21. — **Ajuga** genevensis L. **33**, 62; 77; var. elatior Fr. **33**, 77; var. macrophylla Schbl. et Mart. **35**, 24; pyramidalis L. **33**, 77; reptans L. **33**, 77; **Alchimilla** arvensis Scop. **35**, 31; glaucescens Wallr. **31**, 77. — **Alectorolophus** anceps Behrendsen **31**, 59; arvensis × Aschersonianus **31**, 61; × serotinus **31**, 60; var. leucodon **31**, 61; Aschersonianus **31**, 59; × minor **31**, 58; eumajor **31**, 59; glandulosus **33**, 6; hungaricus Borb. **31**, 60; minor W. et. G. **31**, 59; var. vittulatus Gremli **31**, 60; montanus (Saut.) Fritsch **31**, 59; rumelicus **31**, 59; serotinus Schönh.**31**, 59; f. glanduliger Bornm. **31**, 59. — **Allium** acutangulum Schrad. **35**, 30; rotundum L. **35**, 23; vineale f. compactum (Thuill.) Aschers. **35**, 22. — **Alnus** glutinosa × incana **35**, 9; incana var. arcuata Skaerm. **35**, 9; borealis Norrlin f. cordifolia Call. **35**, 9; ulmifolia Bornm. **35**, 9. — **Aloina** aloides Koch **32**, 161; brevirostris Hook. et Grev. **32**, 161; ericaefolia (Neck.) **32**, 161; stellata (Schreb.) **32**, 161. — **Alopecurus** agrestis L. **35**, 24; anthoxanthoides Boiss. **33**, 31; Bornmülleri Domin **33**, 31; neglectus Aznav **33**, 31; setarioides Gren. **33**, 31; var.? juvenalis Hack. et Thell. **33**, 31; ventricosus Pers. **33**, 30. — **Althaea** officinalis L. **31**, 14. — **Amanita** caesarea (Scop.) **35**, 25; muscaria (L.) **35**, 25; strobiliformis (Vitt.) **35**, 11. — **Amarantus** albus L. **35**, 23. — **Amblystegium** compactum (C. M.) Aust. **32**, 258; confervoides Brid. **32**, 257; hygrophilum Sch. **32**, 260; Juratzkanum Sch. **32**, 260; Kochii Br. Eur. **32**, 259; rigescens Lpr. **32**, 259; riparium L. **32**, 261; serpens L. **32**, 257; Sprucei Bruch **32**, 256; subtile Hedw. **32**, 256; varium (Hedw.) Ldbg. **32**, 258. — **Amelanchier** vulgaris Mnch. **31**, 68. — **Ammi** majus L. **33**, 60. — **Amphidium** lapponicum Sch. **32**, 178; Mougeotii Br. Eur. **32**, 178. — **Amphiprora** **33**, 68. — **Amphora** **33**, 69. — **Anacamptis** Rich. **31**, 77. — **Anacamptosphagnum** C. M. **31**, 4. — **Andraea** petrophila Ehrh. **32**, 103: rupestris L. **32**, 103. — **Andropogon** Ischaemon L. **31**, 38; **33**, 29. — **Anemone** **33**, 47; nemorosa × ranunculoides **35**, 5; nigricans St. **33**, 29; patens L. **33**, 29; Pulsatilla L. **35**, 24; 31; silvestris L.

[1]) Die Seitenzahlen von Heft 32 beziehen sich auf den zweiten Teil dieses Heftes

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

33, 29; transsilvanica Heuffel 33, 77. — **Angelica** silvestris L. 33, 39. — **Ankylotus 31**, 56. — **Anomodon** apiculatus Br. et Sch. 32, 234; 35, 5; attenuatus Schreb. 32, 234; longifolius Schl. 32, 234; viticulosus L. 32, 234. — **Anthemis** tinctoria L. 33, 64. — **Anthericum** Liliago L. 31, 53; 35, 4; 30; ramosum L. 35, 14; 22. — **Anthoxanthum** aristatum Boiss. 35, 24. — **Anthyllis** Vulneraria L. f. alba L. 34, 20. — **Antirrhinum** majus L. 35, 5. — **Antitrichia** curtipendula L. 32, 222. — **Apium** graveolens L. 31, 14; 33, 60. — **Aquilegia** vulgaris L. 34, 21. — **Arabis** alpina L. 34, 13; arenosa Scop. 35, 21; pauciflora (Grimm) 34, 10. — **Arbutus** Uva ursi L. 35, 21. — **Archangelica** officinalis Hoffm. 35 22; 24; 31. — **Archidium** phascoides Brid. 32, 103. — **Aremonia** 34, 21. — **Arenaria** serpyllifolia 35, 14. — **Aristolochia** Clematidis L. 35, 4; 31. — **Arnica** montana L. 33, 70. — **Arnoseris** pusilla Gaertn. 35, 25. — **Arrhenatherum** elatius M. et K. 31, 21. — **Artemisia** Absynthium L. 31, 30; austriaca Jcq. 35, 4; campestris L. 35, 7; 31; Cina Berg 31, 31; laciniata Willd. 31, 14 u. f.; maritima L. 31, 14; 29; 76; 33, 65; Mertensiana Wallr. 31, 15; pontica L. 31, 31; rupestris L. 31, 14 u. f.; 33, 65; Seriphium Wallr. 31, 22. — **Asarum** europaeum L. 31, 67. — **Ascomyceten 31**, 74. — **Asparagus** officinalis L. 33, 50. — **Asperugo** procumbens L. 35, 23. — **Asperula** arvensis L. 33, 77; odorata L. 34, 10; setosa Jaub. et Spach 33, 77. — **Aspidium** cristatum × spinulosum 35, 4; Filix mas Sw. f. affine Rth. 35, 4; montanum (Vogler) Aschers. 33, 78; spinulosum Sw. ssp. eu-spinulosum Asch. f. elevatum A. Br. 35, 4; exaltatum Lasch 35, 4. — **Asplenium** bulbiferum Forst. 33, 10; monanthemum L. 33, 78; Ruta muraria L. 33, 39; Trichomanes L. 33, 49; 78. — **Aster** Amellus L. 33, 64; 35, 14; 31; lanceolatus Willd. 35, 24; Linosyris (L.) Bernh. 35, 4; 31; Tripolium L. 31, 14 u. f.; 33, 64. — **Astomum** crispum Hedw. 32, 135. — **Astragalus** ancyleus Boiss. 31, 57; arenarius L. 33, 23; berytheus Boiss. 31, 57; Cicer L. 35, 23; commixtus Bge. 31, 57; crassinervius Boiss. 31, 58; danicus Retz 33, 21; 35, 31; f. polyspermus Abrom. 33, 23; drymophilus Bornm. 31, 57; glaucopsoides Bornm. 31, 58; gracilipes Benth. 31, 57; Hypoglottis ?? polyspermus Torr. et Gray 33, 23, silvaticus Thal 33, 56; spirorhynchus Bornm. 31, 56; strictifolius Boiss. 31, 58. — **Astrantia** major L. 35, 31. — **Asyneuma** amplexicaule (Willd.) Handel 35, 5; cordifolium Bornm. 35, 5. — **Athyrium** Filix femina Rth. 35, 4. — **Atriplex** 33, 53; litorale L. 31, 14; oblongifolium W. K. 35, 22; tataricum L. 35, 4. — **Atropa** Belladonna L. 33, 39; 33, 63. — **Atropis** distans (L.) 31, 14 u. f. — **Aulacomnium** androgynum L. 32, 208; palustre L. 32, 208. — **Avena** abessynica Hochst. 31, 6; barbata Pott 31, 9; brevis Roth 31, 6; 33, 20; byzantina C. Koch 31, 6; 33, 20; diffusa Neilreich 31, 6; fatua L. 31, 8; 33, 16; nigra C. B. P. 33, 21; nuda L. 31, 6; 33, 19; f. chinensis 33, 20; f. inermis 33, 20; orientalis Schreb. 31, 6; 33, 16; sativa L. 31, 6; 33, 16; sterilis L. 31, 9; 33, 20; strigosa Schreb. 31, 6; 33, 20; Wiestii Steudel 31, 9.

Bacillaria 33, 68. — **Bacillariaceen** 33, 68 u. f. — **Barbula** acuta Brid. 32, 151; convoluta Hedw. 32, 153; cylindrica Tayl. 32, 152; Enderesii Garov 32, 154; fallax Hedw. 32, 151; Hornschuchii Schultz 32, 151; reflexa Brid. 32, 152; revoluta (Schrad.) Brid. 32, 153; rigidula var. gigantea Schl. 31, 5; unguiculata (Huds.) Hedw. 32, 153; vinealis Brid. 32, 152. — **Bartramia** Halleri Hedw. 32, 210; ithyphylla Brid. 32, 210; pomiformis L. 32, 210. — **Bellis** perennis L. 34, 21. — **Blechnum** Spicant (L.) 33, 49. — **Blindia** acuta Dicks. 32, 118. — **Boletus** appendiculatus (Schaeff.) 35, 11; olivaceus (Schaeff.) 35, 11. — **Bonjeania** hirsuta Rchb. 35, 23. — **Botrychium** Lunaria (L.) Sw. 33, 70; 35, 8; 23; 25; 30; f. subincisa Röper 33, 70. — **Brachydontium** trichodes W. et M.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

32, 117. — **Brachypodium 31**, 68; pinnatum (L.) **31**, 53; **35**, 14. — **Brachythecium** albicans Neck. **32**, 241; campestre (Bruch) **32**, 244; curtum Ldbg. **32**, 243; glareosum (Bruch) Br. Eur. **32**, 241; Mildei Sch. **32**, 240; reflexum W. et M. **32**, 242; rivulare Br. Eur. **32**, 244; rutabulum L. **32**, 244; salebrosum Hoffm. **32**, 240; salicinum Br. Eur. **32**, 241; Starkei Brid. **32**, 243; vagans Milde **32**, 242; velutinum Hedw. **32**, 241. — **Brassica** Napus esculenta DC. **33**, 55; Rapa L. **33**, 55. — **Bromus** arvensis L. **35**, 22; 30; crinitus Boiss. 33, 77; inermis Leyss. **35**, 25; 30; patulus M. et K. **35**, 24; sterilis L. **33**, 21. — **Bruchia** palustris Br. et Sch. **32**, 110. — **Brunella** grandiflora Jcq. **35**, 14. — **Bryonia** alba L. **33**, 41; dioica Jcq. **33**, 41. — **Bryum** alpinum L. **32**, 199; argenteum L. **32**, 200; atropurpureum Web. et Mohr. **32**, 199; badium Bruch **32**, 200; bimum Schreb. **32**, 197; caespiticium L. **32**, 200; capillare L. **32**, 200; cirrhatum Hoppe et H. **32**, 197; cuspidatum (Sch.) **32**, 197; cyclophyllum Schwgr. **32**, 201; Duvalii Voit. **32**, 201; elegans Nees **32**, 201; erythrocarpum Schwgr. **32**, 198; Funckii Schwgr. **32**, 200; Graefianum Schl. **31**, 5; inclinatum Sw. **32**, 196; intermedium Brid. **32**, 197; Mildei Jur. **32**, 199; murale Wils. **32**, 199; pallens Sw. **32**, 201; pallescens Schleich. **32**, 198; pendulum Hornsch. **32**, 196; pseudotriquetrum Hedw. **32**, 202; Schleicheri Schwgr. **32**, 203; subglobosum Schl. **31**, 5; turbinatum Hedw. **32**, 202; uliginosum Bruch **32**, 197. — **Bunias** orientalis L. **35**, 22. — **Bupleurum** falcatum L. **35**, 14; rotundifolium L. **33**, 60; tenuissimum L. **31**, 14. — **Buxbaumia** aphylla L. **32**, 104; indusiata Brid. **32**, 104.

Calamagrostis 34, 6; Haussknechtiana Torg. **34**, 6; purpurea Trin. **34**, 7; Torgesiana Hsskn. **34**, 6. — **Calendula** arvensis L. **35**, 32. — **Calliergon** cordifolium Hedw. **32**, 277; giganteum (Schw.) Ldbg. **32**, 277; stramineum Dicks. **32**, 278. — **Calluna** vulgaris (L.) **33**, 39; **35**, 5. — **Camelina** microcarpa Andrz. **35**, 24. — **Campanula** bononiensis L. **35**, 31; glomerata L. **35**, 14; rapunculoides L. **35**, 10. — **Camptothecium** Geheebii (Milde) Ldbg. **32**, 239; lutescens Hedw. **32**, 239; nitens Schreb. **32**, 238. — **Campylopus** brevipilus Br. Eur. **32**, 133; flexuosus Brid. **32**, 132; fragilis Dicks. **32**, 133; subulatus Milde **32**, 132; turfaceus Br. Eur. **32**, 133. — **Campylostelium** saxicola W. et M. **32**, 116. — **Cannabis** sativa L. **35**, 31. — **Capsella** procumbens (L.) **31**, 14; **33**, 75. — **Cardamine** baldensis Fritsch **33**, 70; digenea (Gremli) O. E. Schulz **33**, 70; digitata (Lam.) O. E. Schulz **33**, 70; Impatiens L. **35**, 24; intermedia Hook. **33**, 70; pentaphyllos (L.) R. Br. **33**, 70; pinnata (Lam.) O. E. Schulz **33**, 70; pratensis dentata Schultes **35**, 24. — **Carduus 34**, 21; hamulosus **33**, 29. — **Carex** acuta L. strictifolia Opiz **35**, 24; amphilepis Peterm. **35**, 24; aquatilis Wahlenb. **31**, 78; Davalliana Sm. **35**, 30; digitata × ornithopoda **35**, 10; flava L. **35**, 30; globularis L. **31**, 78; hordeistichos Vill. **31**, 14; 17 u. f.; **35**, 10; humilis Leyss. **33**, 29; **35**, 14; laevirostris Blytt **31**, 78; ornithopoda Willd. **31**, 69; **34**, 10; pilosa Scop. **35**, 10; 29; praecox Schreb. **35**, 30; rhynchophysa C. A. Mey **31**, 78; riparia Curt. **35**, 22; tenella Schkuhr **31**, 78; vitilis Fr. **31**, 78. — **Carlina** acaulis L. **31**, 76; **34**, 13; vulgaris L. **35**, 14. — **Carthamus** tinctorius L. **33**, 65; **35**, 24. — **Coscinodon** cribrosus (Hedw.) **32**, 166. — **Castanea** vesca Gaertn. **35**, 26. — **Catharinea** angustata Brid. **32**, 106; tenella Roehl **32**, 106; undulata L. **32**, 106. — **Centaurea** algeriensis Coss. et Dur. **31**, 77; diluta Dryander **31**, 77; Jacea L. **35**, 14; kilaea Boiss. **35**, 5; leucomalla Bornm. **35**, 5; rhenana Bor. **35**, 14; rumelica Boiss. **35**, 7; Scabiosa L. **35**, 14; solstitialis L. **35**, 21; 25. — **Cephalanthera** alba (Cr.) Simk. **35**, 22. — **Cephalaria** pilosa Gren. **35**, 4. — **Cerastium** brachypetalum Desp. **35**, 24; glutinosum Fr. **35**, 31; pallens **35**. 14. — **Cerasus** acida Dumort. **33**, 27. — **Ceratodon** purpureus (L.) **32**, 115. —

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Cercidiphyllaceae 35, 6. — **Cercidiphyllum** japonicum L. et Z. 35, 6. — **Cerinthe** minor L. 35, 24. — **Ceterach** officinarum × Scolopendrium vulgare 33, 7. — **Chaetoceros** 33, 68; Wighamii Brightwell 33, 68; var. Irmischii Cohn 33, 68. — **Chamaecistus** angustifolius C. B. P. 35, 15. — **Chenopodium** 33, 53; opulifolium Schrad. 35, 22; 23. — **Chondrilla** juncea L. 33, 66. — **Chrysanthemum** Parthenium (L.) 33, 64. — **Chrysohypnum** chrysophyllum Brid. 32, 265; elodes Spruce 32, 265; Halleri L. fil. 32, 265; polygamum (Br. Eur.) Wils. 32, 266; protensum (Brid.) 32, 266; Sommerfeltii Myr. 32, 265; stellatum Schreb. 32, 265. **Chrysosplenium** oppositifolium L. 35, 24. — **Cichoreen**-Art = Ixopus Val. Cord. 33, 66. — **Cinclidotus** aquaticus Hedw. 32, 154; fontinaloides Hedw. 32, 154. — **Circaea** alpina L. 35, 23; intermedia Ehrh. 35, 24; lutetiana L. 35, 24. — **Cirriphyllum** crassinervium Tayl. 32, 246; germanicum Grebe 32, 246; piliferum Schreb. 32, 247; plumosum Sw. 32, 248; populeum Hedw. 32, 247; Tommasinii (Sendtn.) 32, 246; velutinoides (Bruch) 32, 246. — **Cirsium** arvense Scop. 35, 14; canum Mnch. 35, 24; Eriophorum Scop. 34, 22; 35, 22; heterophyllum (L.) 33, 66; 35, 21; pannonicum Gaud. 33, 29; silvaticum Tsch. 35, 22; tuberosum (L.) All. 35, 31. — **Cistus** vinealis Willd. 35, 17. **Claviceps** purpurea Tul. 31, 78. — **Clematis** recta L. 35, 22; Vitalba L. 33, 54. — **Climacium** dendroides Hedw. 32, 286. — **Colchicum** 35, 10. — **Collomia** grandiflora Dougl. 35, 21. — **Colutea** arborescens × orientalis 35, 7. — **Comatosphagnum** C. M. 31, 4. — **Contarinia** Loti De Geer 35, 9; Onobrychidis Kieff. 35, 9. — **Conyza** sylvestris hirsuta 33, 64. — **Coralliorrhiza** trifida Chatel 35, 31. — **Cornus** mas L. 33, 61; 35, 14; sanguinea L. 31, 48; 33, 60; 35, 9. — **Coronilla** vaginalis Lmk. 34, 10; 35, 20. — **Cotoneaster** integerrima Med. 35, 14. — **Cousinia** 34, 16. — **Crataegus** 34, 21; monogyna Jcq. 35, 10. — **Cratoneuron** commutatum Hedw. 32, 268; falcatum Brid. 32, 268; irrigatum Zetterst. 32, 268. — **Crocus** officinalis L. 33, 51. — **Ctenidium** molluscum (Sch.) Mitt. 32, 282. — **Cuscuta** Epithymum (L.) 35, 22; 24. — **Cuspidata** Schl. 31, 4. — **Cylindrosporium** 31, 74. — **Cymbifolia** Schl. 31, 4. — **Cynareen**-Art 33, 66. — **Cynodontium** polycarpum Ehrh. 32, 123; strumiferum (Haller) Ehrh. 32, 123. — **Cyprinotus** salina Brady 31, 28. — **Cypripedium** Calceolus L. 35, 30. — **Cystopteris** atrivirescens Presl. 35, 7; Baenitzii Doerfler 35, 6; fragilis (L.) Bernh. 35, 7; var. dentata 35, 7. — **Cytheridea** torosa Jones var. littoralis Brady 31, 28. — **Cytisus** nigricans L. 33, 29; ratisbonensis Schff. 33, 29.

Dactylis Aschersoniana Graebn. 35, 24; glomerata L. 31, 21; 35, 14. — **Daucus** Carota L. 31, 21. — **Delphinium** Consolida L. 34, 21; 35, 4. — **Dentaria** bulbifera L. 33, 55; 35, 20; 24; digitata Lam. 33, 69; × pennata (D. digenea Gremli) 33, 69; enneaphyllos L. 33, 55; intermedia Sond. 33, 69; pinnata Lmk. 33, 69. — **Dianthus** Armeria L. 34, 14; 35, 8; × superbus 34, 15; barbatus L. 34, 14; caesius Sm. 34, 21; capitatus DC. 33, 29; Carthusianorum L. 35, 14; pseudobarbatus Bess. 33, 29; superbus L. 34, 14; × barbatus (D. Courtoisii Rchb., D. Leitgebii Reichardt) 34, 14. — **Diatoma** elongatum 33, 69. — **Dichodontium** pellucidum L. 32, 124. — **Dicksonia** 33, 78. — **Dicranella** cerviculata Hedw. 32, 120; crispa Hedw. 32, 119; curvata Hedw. 32, 121; heteromalla Hedw. 32, 121; rufescens Turn. 32, 120; Schreberi Hedw. 32, 119; squarrosa Schrad. 32, 119; subulata Hedw. 32, 120; varia Hedw. 32, 120. — **Dicranodontium** longirostre W. et M. 32, 133. — **Dicranoweisia** cirrhata Hedw. 32, 125; crispula Hedw. 32, 125. — **Dicranum** Bergeri Bland. 32, 130; Bonjeani Not. 32, 130; congestum Brid. 32, 129; flagellare Hedw. 32, 128; fulvum Hook. 32, 128; fuscescens Turn. 32, 129; longifolium Hedw. 32, 128; majus Turn. 32, 130; montanum Hedw. 32, 127;

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Sauteri Br. Eur. **32**, 129; scoparium L. **32**, 129; spurium Hedw. **32**, 131; Starkei W. et M. **32**, 126; undulatum Turn. **32**, 131; viride Sull. **32**, 127. — **Dictamnus** albus L. **35**, 14; 22. — **Didymodon** cordatus Jur. **32**, 144; cylindricus Bruch **32**, 147; luridus Hsch. **32**, 144; rigidulus Dicks. **32**, 146; rubellus Hoffm. **32**, 143; sinuosus Wils. **32**, 148; spadiceus (Mitt.) Spr. **32**, 148; tophaceus (Brid.) Jur. **32**, 148; validus Limpr. **31**, 5. — **Digitalis** purpurea L. **35**, 25. — **Diphyscium** sessile (Schm.) Ldbg. **32**, 104. — **Dipsacus** pilosus L. **35**, 31. — **Distichium** capillaceum L. **32**, 115. — **Ditrichum** flexicaule Schwgr. **32**, 113; homomallum Hedw. **32**, 113; Knappii Jur. **32**, 115; pallidum Schreb. **32**, 115; tortile Schrad. **32**, 112; vaginans Sull. **32**, 113. — **Draba** verna L. **35**, 14. — **Drepanocladus** aduncus Hedw. **32**, 273; aquaticus Sanio **32**, 274; exannulatus Guemb. **32**, 274; fluitans Hedw. **32**, 275; hamifolius Sch. **32**, 272; H. Schulzei Spr. **32**, 275; intermedius Ldbg. **32**, 271; Kneiffii Br. Eur. **32**, 273; lycopodioides Schwgr. **32**, 272; polycarpus Bland. **32**, 273; pseudofluitans Sanio **32**, 274; pseudo-stramineus C. M. **32**, 276; purpurascens (Sch.) Spr. **32**, 275; revolvens Sw **32**, 271; Rotae Not. **32**, 275; Sendtneri Sch. **32**, 272; serratus Ldbg. **32**, 276; tenuis Kling. **32**, 273; uncinatus Hedw. **32**, 270; vernicosus Ldbg. **32**, 271; Wilsoni Sch. **32**, 272. — **Drosera** longifolia L. **35**, 21. — **Dryptodon** patens Dicks. **32**, 173.

Echinops sphaerocephalus L. **35**, 22. — **Elssholzia** eriostachya Benth. **35**, 32; Patrini (Lepech.) Grke. **35**, 32. — **Empusa** muscae Cohn **31**, 75. — **Encalypta** ciliata Hedw. **32**, 165; contorta (Wulf.) Ldb. **32**, 166; spathulata C. M. **32**, 166; vulgaris Hedw. **32**, 165. — **Entodon** orthocarpus (Lapyl) Ldb. **32**, 223. — **Entosthodon** fascicularis Dicks. **32**, 188. — **Ephemerella** recurvifolia Dicks. **32**, 186. — **Ephemerum** cohaerens Hedw. **32**, 187; serratum (Schreb.) **32**, 186. — **Epilobium** **33**, 59; collinum Gmel. **35**, 22; confusum Hsskn. **35**, 5; Graebneri Rubner **35**, 5; minutiflorum Hsskn. **35**, 5; modestum Hsskn. **35**, 6; nervosum Boiss. et Buhse **35**, 6; obscurum (Schreb.) Roth **35**, 6; palustre L. **35**, 5. — **Epipactis** latifolia L. **33**, 53; rubiginosa Crntz. **33**, 22; 24; 53; sessilifolia Peterm. **35**, 24. — **Erica** Tetralix L. **35**, 21. — **Eruca** sativa Lam. **31**, 79. — **Ervum** silvaticum Peterm. **35**, 24. — **Eryngium** amethystinum L. **31**, 77; var. majus Bornm. **31**, 77; campestre **35**, 14; Creticum L. **31**, 77. — **Erysimum** hieraciifolium L. **35**, 24; repandum L. **35**, 31; virgatum Roth **31**, 53. — **Erythraea** litoralis **31**, 23; pulchella (Sw.) Fr. **35**, 31. — **Eucladium** verticillatum Turn. **32**, 139. — **Euphorbia** Cyparissias L. **35**, 14; dulcis Jcq. **34**, 10; palustris L. **35**, 20; 31. — **Euphrasia** minima Jcq. **33**, 6; Rostkoviana × stricta (= E. intermedia Wettst.) **35**, 8; stricta Host. **35**, 25. — **Eurhynchium** Stokesii Turn. **32**, 251; striatum Schreb. **32**, 251; strigosum Hffm. **32**, 250. — **Evonymus** europaea L. **31**, 48. — **Excipulaceen** Sacc. **31**, 73.

Fagopyrum esculentum Mnch. **35**, 31; tataricum (L.) Gaertn. **35**, 31. — **Falcaria** vulgaris Bernh. **33**, 60. — **Farsetia** incana R. Br. **35**, 24. — **Festuca** arundinacea Schreb. **35**, 24; Haussknechtii Torg. (= gigantea × rubra) **34**, 6; ovina L. **31**, 14; 54; pseudomyuros Soy. **35**, 10; silvatica Vill. **35**, 25. — **Filipendula** hexapetala **35**, 14; Ulmaria (L.) Maxim. **35**, 31. — **Fissidens** adiantoides (L.) Hedw. **32**, 217; bryoides Hedw. **32**, 215; crassipes Wils. **32**, 216; cristatus Wils. **32**, 217; exiguus Sull. **32**, 215; exilis Hedw. **32**, 215; incurvus W. et M. **32**, 215; osmundoides Hedw. **32**, 216; pusillus Wils. **32**, 216; taxifolius L. **32**, 217. — **Fistularia** Crista galli minor **31**, 60; Hungarica **31**, 60. — **Fontinalis** antipyretica L. **32**, 218; Kindbergii Ren. et Card. **32**, 218; squamosa L. **32**, 219. — **Forsythia** europaea Baldacci **33**, 77; suspensa × viri-

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

dissima **33**, 77. — **Fragaria** collina Ehrh. **35**, 14; × vesca **35**, 23. — **Fumana** vulgaris Spach **35**, 7. — **Fumaria** Vaillantii Lois. **35**, 20. — **Funaria** hygrometrica L. **32**, 188; mediterranea Ldb. **32**, 188. — **Fungi** imperfecti **31**, 71. — **Fusicoccum 31**, 74.

Gaillardia picta Sw. **34**, 21. — **Galeopsis** bifida Bugh. **35**, 25; pubescens Bess. **34**, 18; speciosa Mill. **35**, 21; 25. — **Galinsoga** parviflora Cav. **35**, 24. — **Galium** anglicum Hds. (gracile Wallr.) **35**, 23; boreale L. **35**, 10; Mollugo L. f. pubescens Schrad. **34**, 20. — **Genista** sagittalis L. **33**, 57; tinctoria L. **35**, 31. — **Gentiana** germanica Willd. **33**, 61; lutea L. **34**, 13; **35**, 21; Pneumonanthe L. **33**, 61. — **Georgia** pellucida L. **32**, 105. — **Geranium** nodosum L. **35**, 5; Robertianum L. **35**, 23; sanguineum L. **35**, 14. — **Gingko** biloba L. **35**, 9; 25. — **Gladiolus** communis L. **33**, 52; imbricatus L. **33**, 52; paluster Gaud. **33**, 52. — **Glaucium** corniculatum (L.) **33**, 56; flavum Crntz. **31**, 34; **33**, 56; luteum Smith **31**, 34; 78. — **Glaux** maritima L. **31**, 14; 17; **33**, 61. — **Globularia** Linnaei Rouy **35**, 13; vulgaris L. **35**, 13; Willkommii Nym. **34**, 11; 13; **35**, 13. — **Gloeosporium** nervisequum Sacc. **31**, 73; Robergei Desm. **31**, 74. — **Glumaceae 34**, 6. — **Glyceria** fluitans L. **33**, 50; plicata Fr. **33**, 50; **35**, 22; 25. — **Glycine** chinensis Sims. **35**, 25. — **Glyphomitrium** polyphyllum (Dicks.) Mitt. **32**, 178. — **Gnaphalium** luteo-album L. **35**, 21. — **Goodyera** repens R. Br. **35**, 25; 31. — **Gratiola** officinalis L. **33**, 63. — **Grimmia** anodon Br. Eur. **32**, 170; commutata Huebn. **32**, 173; crinita Brid. **32**, 170; decipiens Schltz. **32**, 171; Donii Smith **32**, 172; Hartmanni Sch. **32**, 171; incurva Schwgr. **32**, 171; leucophaea Grev. **32**, 172; montana Br. Eur. **32**, 173; Muehlenbeckii Sch. **32**, 171; orbicularis Br. Eur. **32**, 170; ovata W. et M. **32**, 172; plagiopoda Hedw. **32**, 170; pulvinata Sm. **32**, 170; trichophylla Grev. **32**, 171. — **Gymnadenia** conopea R. Br. **35**, 24. **Gymnostomum** calcareum Nees et H. **32**, 138; rupestre Schleich. **32**, 138. — **Gypsophila** fastigiata L. **31**, 50. — **Gyroweisia** tenuis Schrad. **32**, 139.

Halimus pedunculatus Wallr. **33**, 75. — **Hamamelidaceae 35**, 6. — **Hapalosphaeria** deformans Syd. **35**, 9. — **Hedwigia** albicans Web. **32**, 213; Fumana Mill. **31**, 50; italicum Tenore **35**, 19; montanum Visiani **35**, 17; oelandicum Wahlenb. **35**, 20; procumbens **31**, 38; **35**, 15; serpyllifolium Rehfeldt **35**, 18; vineale Willd. **34**, 13; **35**, 16; candidissimum Tenore **35**, 19; virescens Tenore **35**, 14; 19. — **Helianthemum** Chamaecistus Mill. 31, 38; **35**, 14. — **Helichrysum** arenarium DC. **35**, 21. — **Helleborus** viridis L. **33**, 55. — **Helminthia** echioides Gaertn. **35**, 25. — **Helodea** canadensis Rich. **35**, 30. — **Helodium** lanatum Ström. **32**, 238. — **Hepatica** triloba Gil. **33**, 47. **Herpotrichia** Henkeliana Syd. **35**, 10. — **Heterocladium** heteropterum Bruch **32**, 233; squarrosulum (Voit.) Ldb. **32**, 232. — **Hieracium** aurantiacum L. **35**, 21; bifurcum M. B. subsp. franconum Bornm. et Zahn **35**, 7, gypsigenum Bornm. et Zahn **35**, 7; Pilosella L. **35**, 7; 14; praealtum Vill. **35**, 25; Schmidtii Tsch. **35**, 25; setigerum Tsch. **35**, 7; vulgatum Fr. ramosum W. et K. **35**, 24. — **Hippuris** vulgaris L. **33**, 59. — **Homalia** trichomanoides Schreb. **32**, 220. — **Homalothecium** sericeum L. **32**, 238. — **Homogyne** alpina (L.) **33**, 65. — **Hookeria** lucens L. **32**, 225. — **Hordeum** secalinum Schreb. **31**, 11. — **Hosta** plantaginea (Lam.) Aschers. **35**, 5. — **Hutchinsia** petraea R. Br. **35**, 14. — **Hydrocotyle** vulgaris L. **35**, 21. — **Hygro-Amblystegium** filicinum L. **32**, 263; fluviatile Sw. **32**, 263; irriguum Wils. **32**, 262. — **Hygro-Hypnum** dilatatum Wils. **32**, 267; ochraceum Wils. **32**, 267; palustre L. **32**, 266. — **Hylocomium** brevirostre (Ehrh.) Br. Eur. **32**, 285; loreum L. **32**, 286; proliferum L. **32**, 284; Schreberi Willd. **32**, 284; squarrosum L.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

32, 285; triquetrum L. 32, 286; umbratum Ehrh. 32, 285. — **Hymenostomum** microstomum R. Br. 32, 136; rostellatum Brid. 32, 136; squarrosum Nees et Hedw. 32, 136; tortile Schwgr. 32, 136. — **Hypericum** elegans Steph. 31, 53; 33, 29; perforatum L. 35, 14. — **Hyphomycetes** 31, 73. — **Hypnum** arcuatum Ldbg. 32, 281; cupressiforme L. 32, 280; Halleri L. fil. 35, 11; incurvatum Schrad. 32, 279; pallescens Br. Eur. 32, 280; pratense Koch 32, 282; reptile Mich. 32, 280; Vaucheri Lesqu. 32, 280. — **Hyssopus** officinalis L. 32, 69; 33, 63.

Impatiens parviflora DC. 35, 22. — **Inocybe** frumentacea (Bull.) 35, 11. — **Inula** britannica L. 35, 32; ensifolia L. 33, 29; germanica L. 31, 53; 35, 32; hirta L. 35, 14; salicina L. 35, 14; 22; 32. **Iris** aphylla L. 33, 51; 34, 11; 35, 14; bohemica Schmidt 33, 52; germanica L. 33, 52; sibirica L. 35, 30; **Isatis** praecox W. K. 35, 23; tinctoria L. 33, 55. — **Isopterygium** elegans (Hook.) Ldb. 32, 225; Muelleri Sch. 32, 226; silesiacum Br. et Sch. 32, 226. — **Isothecium** myosuroides L. 32, 222; viviparum (Neck.) Ldb. 32, 222.

Jasione montana major Koch 35, 24. — **Juncus** filiformis L. 35, 20; Gerardi Loisl. 31, 14; 17; sphaerocephalus Nees 33, 70; subnodulosus Schrk. 35, 30. — **Juniperus** nana W. 35, 25. — **Jurinea** mollis Rchb. 33, 29.

Kentrophyllum lanatum L. 35, 23. — **Knautia** arvensis Coult. 35, 22; campestris Bess. 35, 22; silvatica Duby 35, 21. — **Koeleria** cristata ciliata Kern. 35, 24; gracilis Pers. 35, 14.

Lactuca muralis L. 33, 65; perennis L. 33, 65; quercina L. 33, 65; saligna L. 35, 32; sativa (L.) 33, 65. — **Laestadia** Rosae Auersw. 35, 10. — **Lamium** 31, 75. — **Lappa** nemorosa Koern. 35, 25. — **Lappula** echinata Gil. 35, 22. — **Lathyrus** montanus Bernh. 33, 56; pratensis sepium Scop. 35, 23; sativus L. 35, 23. — **Lavatera** thuringiaca L. 35, 4. — **Ledum** palustre L. 33, 62. — **Lentinus** hispidosus (Fr.) 35, 11. — **Leonurus** Cardiaca L. var. chaituroides Vollm. 35, 8; dissectus 35, 8; Marrubiastrum N. A. Busch 35, 9; villosus Desf. 35, 4. **Lepidium** campestre (L.) 33, 55. — **Lepiota** amianthina (Scop.) 35, 11; pudica (Bull.) 35, 11. — **Leptobryum** pyriforme L. 32, 189. — **Leptosphaeria** ophioboloides Sacc. 35, 10. — **Leptostromataceen** 31, 73. — **Leptothyrella** 31, 74. — **Lescuraea** striata Schwg. 32, 236. — **Leskea** nervosa Schwg. 32, 235; polycarpa Ehrh. 32, 235. — **Leucobryum** glaucum L. 32, 134. — **Leucodon** sciuroides L. 32, 221. — **Leucojum** vernum L. 33, 51. — **Ligustrum** vulgare L. 33, 61. — **Limacium** Russula (Schaeff.) 35, 11. — **Limnanthus** Douglasii R. Br. 35, 22. — **Linaria** Elatine Mill. 35, 24; vulgaris Mill. 34, 13; 21. — **Linosyris** vulgaris Cass. 35, 7. — **Linum** austriacum L. 35, 4; tenuifolium L. 34, 13; 20. — **Lithospermum** purpureo-coeruleum L. 35, 14. — **Lolium** perenne L. 31, 78. — **Lunularia** cruciata (L.) Dum. 35, 5. — **Lupinus** polyphyllus Lindl. 35, 25. — **Lycopodium** Selago L. 34, 21. — **Lysimachia** punctata L. 35, 4; vulgaris L. f. maculata (= Klinggraeffii Abrom.) 34, 20. — **Lythrum** Hyssopifolia L. 33, 59; Salicaria L. var. glabricaule Koehne 35, 8.

Macrobiophthora vimariensis Reukauf 31, 76. — **Magnoliaceae** 35, 6. — **Malacosphagnum** C. M. 31, 4. **Malva** Alcea L. 35, 22; fastigiata Cav. 35, 24; moschata L. 33, 59. — **Marrubium** creticum Mill. 31, 29; 33, 63; × vulgare 31, 29; 33, 63; leonuroides Desr. 35, 9; vulgare L. 31, 29. —

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Marssonina Potentillae (Desm.) **31**, 73. — **Matricaria** discoidea DC. **35**, 4; 21; 22; suaveolens (Pursh) Buch **35**, 31. — **Meesia** trichodes (L.) Spruce **32**, 209; triquetra (L.) Ang. **32**, 209. **Melanconieen 31**, 71. — **Melica** Aschersoni M. Sch. **33**, 6; ciliata L. **35**, 20; 22; picta C. Koch **31**, 77; transsilvanica Schur **35**, 7; uniflora L. **35**, 22. — **Melilotus** albus Desr. **35**, 22; dentatus (W. K.) **31**, 14; 17. — **Melittis** Melissophyllum L. **33**, 63. — **Melosira** subflexilis **33**, 69. — **Mespilus** germanica L. **31**, 67. — **Mildeella** bryoides Dicks. **32**, 156. — **Mimulus** luteus L. **35**, 25; 31. — **Mniobryum** albicans Wahlb. **32**, 194; carneum L. **32**, 194. — **Mnium** affine Bland. **32**, 205; cinclidioides Blytt **32**, 206: cuspidatum Hdw. **32**, 205; hornum L. **32**, 206; marginatum Dicks. **32**, 207; orthorhynchum Br. Eur. **32**, 207; punctatum Hedw. **32**, 206; riparium Mitt. **32**, 207; rostratum Schrad. **32**, 206; rugicum Laur. **32**, 205; Seligeri Jur. **32**, 205; spinosum Voit. **32**, 207; spinulosum Br. et Sch. **32**, 207; stellare Hedw. **32**, 208; subglobosum Br. Eur. **32**, 206; undulatum Hedw. **32**, 206. — **Moehringia** trinervia Clrv. **35**, 10. — **Mollusca** Schl. **31**, 4. — **Monanthes** agriostaphys (Webb) Christ **35**, 5. — **Montia** minor Gmel. **35**, 20. — **Mulgedium** alpinum Cass. **35**, 21. — **Muscari** botryoides (L.) fl. alb. **33**, 51; comosum (L.) **33**, 50; **35**, 20; tenuiflorum Tsch. **33**, 50; **35**, 10. — **Mycena** acicula (Schaeff.) **35**, 11; rubrimarginata (Fr.) **35**, 11. — **Mycosphaerella** syringicola Otth **35**, 10. — **Myosotis** hispida Schlecht. **34**, 20; × intermedia **34**, 20. — **Myrica** Gale L. **33**, 53. — **Myxofusicoccum 31**, 73. — **Myxosporium 31**, 74.

Nardus stricta L. **33**, 70. — **Nasturtium** officinale (L.) **33**, 55. — **Neckera** complanata L. **32**, 220; crispa L. **32**, 220; pennata Dill. **32**, 219; pumila Hedw. **32**, 220; turgida Jur. **32**, 220. — **Nepeta** Cataria L. **35**, 25. — **Nigella** arvensis L. **33**, 40; 55. — **Nitzschiella** Costerium **33**, 69. — **Nivieria** Seringe **33**, 16. — **Nonnea** pulla DC. **35**, 21; rosea Fisch. et Mey. **35**, 22. — **Nyctalis** asterophora (Fr.) **35**, 11. — **Nymphaea** alba L. **35**, 20.

Obione pedunculata (L.) **31**, 14; 17; 19; **33**, 61. — **Octodiceras** Julianum Savi **32**, 218. — **Odontites** lutea Rchb. **31**, 38; rubra Pers. **31**, 21. — **Oenanthe** fistulosa L. **35**, 31. — **Oligotrichum** hercynicum Ehrh. **32**, 106. — **Oligotrophus** Corni Giraud **35**, 9. — **Onobrychis** arenaria (Kit.) **31**, 35; 76; montana (Schwabe Fl. Anh.) **31**, 38; sativa Lmk. **35**, 4; 9; 24; viciaefolia Scop. **31**, 38. — **Ononis** repens L. **35**, 14. — **Onopordon** tauricum W. **35**, 4. — **Ophioglossum** vulgatum L. **35**, 10; 30. — **Ophrys** apifera Huds. **35**, 10; f. aurita Moggr. **35**, 10; 24; Muteliae Mut. **35**, 24; aranifera Hds. **31**, 69; × muscifera **31**, 69; **33**, 4; fuciflora (Crntz.) **31**, 69; muscifera Hds. f. apiculata **35**, 24. — **Orchis** fusca Jcq. B. rotundata Wirtg. **35**, 24; Haussknechtii M. Sch. **33**, 5; incarnata L. **35**, 31; maculata L. f. albiflora **35**, 23; f. comosa Schur **35**, 24; Ruthei **33**, 6; tridentata Scop. **35**, 20. — **Oreoweisia** Bruntoni Not. **32**, 123. — **Origanum** vulgare L. **35**, 14; 22. — **Ornithogalum** tenuifolium Guss. **34**, 13. — **Ornithopus** perpusillus L. **35**, 20; sativus Brot. **35**, 4. — **Orobanche** lutea Baumg. **35**, 31; rubens Wallr. **35**, 25; vulgare Poir. **35**, 31. — **Orobus** niger L. **35**, 24. — **Orthothecium** intricatum Hartm. **32**, 223. — **Orthotrichum** affine Schrad. **32**, 182; anomalum Hedw. **32**, 181; cupulatum Hffm. **32**, 181; diaphanum Schrad. **32**, 184; fastigiatum Bruch **32**, 183; leiocarpum Br. et Sch. **32**, 185; leucomitrium Br. Eur. **32**, 183; Lyellii Hook. et Tayl. **32**, 184; nudum Dicks. **32**, 181; obtusifolium Schrad. **32**, 182; pallens Bruch **32**, 184; patens Bruch **32**, 183; pumilum Swartz **32**, 184; rupestre Schleich. **32**, 182; Schimperi Hammar **32**, 183; speciosum Nees **32**, 183; stramineum Hsch. **32**, 183; Sturmii Hppe. et H. **32**, 181; tenellum Bruch **32**, 184. — **Otthia**

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Crataegi Fuck. **35**, 10. — **Oxalis** Acetosella L. **35**, 23. — **Oxytropis** pilosa DC. **31**, 53. — **Oxyrrhynchium** pumilum (Wils.) Sch. **32**, 249; rusciforme Weis **32**, 250; Schleicheri Brid. **32**, 249; speciosum Brid. **32**, 249; Swartzii Turn. **32**, 249.

Paludella squarrosa L. **32**, 209. — **Papaver** **33**, 56. — **Parietaria** officinalis L. **33**, 39; **35**, 21; 22. — **Pastinaca** sativa L. **31**, 21. — **Pedicularis** silvatica L. **33**, 70. — **Penicillium** **31**, 75. — **Peplis** Portula L. **35**, 21. — **Pestalozzia** Palmarum **31**, 73. — **Petasites** albus (L.) **33**, 65. — **Peucedanum** Cervaria (L.) **33**, 60; **35**, 22; 31; officinale L. **35**, 14; Oreoselinum (L.) **33**, 60. — **Phascum** curvicollum Hedw. **32**, 156; cuspidatum Schreb. **32**, 156; Floerkei Web. et M. **32**, 156; piliferum Schreb. **32**, 156. — **Phegopteris** Dryopteris (L.) **33**, 50. — **Philadelphus** Falconeri Sarg. **35**, 7; Falconeri × laxus **35**, 7. — **Philonotis** Arnelli Husn. **32**, 213; caespitosa Wils. **32**, 212; calcarea Br. Eur. **32**, 211; fontana L. **32**, 212; marchica Brid. **32**, 213; Osterwaldii Warnst. **32**, 213; Schliephackei Rl. **31**, 5; seriata Mitt. **32**, 212; Tomentella Mol. **32**, 212. — **Phragmites** **35**, 10. — **Phyllitis** Hemionitis (Lag.) O. Ktze. **33**, 7; hybrida (Milde) Christensen **33**, 7; 78; Scolopendrium (L.) Newman **33**, 10. — **Physalis** Alkekengi L. **33**, 63. — **Physcomitrella** patens (Hedw.) **32**, 187. — **Physcomitrium** eurystoma Sendtn. **32**, 188; pyriforme L. **32**, 188; sphaericum Schwgr. **32**, 187. — **Phyteuma** orbiculare L. **35**, 31. — **Picris** echioides L. **35**, 22. — **Pimpinella** Saxifraga L. **33**, 59: **35**, 14. — **Pirus** Aria (L.) Ehrh. **35**, 22; communis L. **33**, 57; Malus L. **33**, 58. — **Plagiobryum** Zierii (Dicks) Ldb. **32**, 195. — **Plagiopus** Oederi Gunn. **32**, 210. — **Plagiothecium** curvifolium Schl. **31**, 5; **32**, 228; denticulatum L. **32**, 227; var. recurvum W. **31**, 5; latebricola Wils. **32**, 227; Roesei Hpe. **32**, 228; Ruthei Spr. **32**, 230; silvaticum L. **32**, 229; succulentum Spr. **32**, 229; undulatum L. **32**, 230. — **Plantago** arenaria W. et K. **33**, 63; Coronopus L. **33**, 64; maritima L. **31**, 17; **35**, 4; var. dentata Roth **33**, 64. — **Platyglottis** **31**, 57. — **Platygyrium** serpens Brid. **32**, 224. — **Platysphagnum** C. M. **31**, 4. — **Pleuridium** alternifolium Hp. **32**, 111; nitidum Hedw. **32**, 111; subulatum L. **32**, 111. — **Pleurochaete** squarrosa Brid. **32**, 142. — **Pleurosigma** aestuarii **33**, 69. — **Pleuroweisia** Schliephackei Spr. **31**, 5. — **Poa** badensis Haenke **31**, 53; Chaixi Vill. **35**, 25; persica Trin. **33**, 78; pratensis L. **31**, 20; songarica Schrenk **33**, 78. — **Pogonatum** aloides Hedw. **32**, 107; alpinum L. **32**, 108; decipiens Spr. **32**, 108; nanum Dill. **32**, 107; urnigerum L. **32**, 107. — **Pohlia** annotina Leers **32**, 192; commutata Sch. **32**, 193; cruda Schreb. **32**, 191; elongata Dicks. **32**, 190; gracilis Not. **32**, 193; lutescens Spr. **32**, 193; nutans Schreb. **32**, 191; proligera Ldbg. **32**, 193. — **Polygala** major Jcq. **33**, 29. — **Polygonatum** officinale All. **35**, 14; verticillatum L. **33**, 50. — **Polygonum** amphibium L. **33**, 53; aviculare L. **33**, 59; dumetorum L. **35**, 22; lapathifolium L. **35**, 10; molliaeforme Boiss. **33**, 78; rottboellioides Jaub. et Spach **33**, 78. — **Polytrichum** commune L. **32**, 110; formosum Hedw. **32**, 109; gracile Menz. **32**, 109; juniperinum Hedw. **32**, 109; piliferum Schreb. **32**, 109; strictum Menz. **32**, 109. — **Potamogeton** marinus L. **31**, 14. — **Potentilla** **34**, 21; alba L. **33**, 29; arenaria Borkh. **33**, 29; canescens Bess. **33**, 29; 57; norvegica L. **35**, 11; patula W. K. **33**, 29; pilosa W. **35**, 23; procumbens Sibth. **33**, 70; × Tormentilla **33**, 70; recta L. **33**, 57; supina L. **35**, 31; verna L. **35**, 14. — **Pottia** crinita Wils. **32**, 158; intermedia (Turn.) Fuernr. **32**, 158; Heimii Hedw. **32**, 159; lanceolata Dicks. **32**, 158; minutula (Schleich.) **32**, 157; mutica (Vent.) **32**, 159; Starkei Hedw. **32**, 159; truncata L. **32**, 158. — **Prenanthes** purpurea L. **33**, 65; **35**, 10; 24. — **Prunus** acida K. Koch **31**, 49; Cerasus L. **31**, 49; **33**, 27; × fruticosa **31**, 47; **33**, 28; Chamaecerasus Jcq.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

31, 42; eminens Beck 33, 28; fruticosa Pallas 31, 40; 33, 25; 29; 57; var. dispar Beck. 33, 26; friburgensis A. Sch. 34, 11; sativa Rchb. 31, 49; 33, 27; var. typica Schneider 33, 26; serotina Ehrh. 35, 25; spinosa L. 31, 44; 35, 14; coaetanea Wimm. et Grab. 35, 23. — **Psalliota** echinata (Roth) 35, 11. — **Pseudoleskea** atrovirens Dicks. 32, 235; catenulata Brid. 32, 236; tectorum Al. Br. 32, 236. — **Pseudopycnidiales** 31, 73. — **Pteridium** aquilinum (L.) Kuhn. 35, 22. — **Pterigynandrum** filiforme (Timm.) 32, 224. — **Pterogonium** ornithopodioides (Hedw.) Ldb. 32, 222. — **Pterygoneuron** cavifolium Ehrh. 32, 160; lamellatum (Ldb.) Jur. 32, 160; subsessile Brid. 32, 159. — **Ptilium** Crista castrensis L. 32, 283. — **Pulmonaria** angustifolia L. var. australis Murr 33, 76; mollissima Kern. 33, 77; obscura Dum. 33, 77; officinalis L. 33, 77; rubra Schott et Ky. 33, 77; saccharata Mill. 33, 77; tuberosa Schrk. 33, 77. — **Pulsatilla** 33, 47; vulgaris Mill. 35, 14. — **Pycnosphagnum** C. M. 31, 4. — **Pycnothyrieen** 31, 73. — **Pylaisia** polyantha Schreb. 32, 224. — **Pyramidula** tetragona Brid. 32, 188.

Quercus lanuginosa Lam. var. Kitaibelii Simk. 35, 9; prionota G. Beck. 35, 9; subvelutina Pospich 35, 9; pedunculata Ehrh. 33, 53; Robur L. 35, 9; × sessilis 35, 5; sessilis Ehrh. 33, 53; 35, 9.

Racomitrium aciculare L. 32, 174; affine Schleich. 32, 175; canescens Hedw. 32, 177; fasciculare Schrad. 32, 175; heterostichum Hedw. 32, 175; lanuginosum (Hedw.) Brid. 32, 176; microcarpon Hedw. 32, 176; protensum Al. Br. 32, 174; sudeticum Funck 32, 174. — **Ramularia** Moehringiae Lindr. 35, 10. — **Ranunculus** 33, 47; acris L. 35, 8; platanifolius L. 33, 54; Stevenii Andrz. 35, 8. — **Raphanus** sativus L. 33, 56. — **Rapistrum** perenne (L.) All. 35, 22; 31; rugosum All. 35, 24. — **Reseda** alba L. 35, 22. — **Rhabdoweisia** denticulata Brid. 32, 122; fugax Hedw. 32, 122. — **Rhacophorus** 31, 58. — **Rhinanthus** angustifolius Gmel. 35, 10. — **Rhodobryum** roseum Schreb. 32, 203. — **Rhynchostegium** algirianum Brid. 32, 252; confertum Dicks. 32, 253; curvisetum (Brid.) Ldb. 32, 252; depressum (Bruch) 32, 254; litoreum Not. 32, 252; megapolitanum Bland. 32, 253; murale Hedw. 32, 253; rotundifolium Scop. 32, 254. — **Rhytidium** rugosum Ehrh. 32, 283. — **Ribes** alpinum L. 35, 22. — **Rigida** Schl. 31, 4. — **Rosa** Dufftii 33, 5; elliptica Tsch. 35, 22; Haeckelii Dufft et M. Sch. 33, 5; jenensis M. Sch. 33, 5; provincialis Ait. 34, 21; rubiginosa L. 33, 6; 35, 10. — **Rubus** Aschersonii Sprib. 35, 28; acuminatus Lindeb. 35, 28; Bellardii W. et N. 35, 23; 26; caesius × bifrons Gremli 35, 28; Sudre 35, 28; × epipsilus Zinsm. 35, 27; × hirtus Sudre 35, 27; candicans Whe. 35, 27; × caesius Sudre 35, 28; chlorophyllus Gremli 35, 27; dollnensis Sprib. 35, 27; dumetorum W. N 35, 9; fa. platypetalus G. Braun 35, 27; erraticus × caesius Sudre 35, 28; fabrimontanus Sprib. 35, 28; fasciculatus P. J. Müll. 35, 28; gothicus Frid. et Gel. 35, 28; C. Aschersonii Focke 35, 28; gratus × caesius Sudre 35, 28; hirtus × caesius Sudre 35, 27; Koehleri × caesius Sudre 35, 27; Mikani Baenitz 35, 28; Mougeotii Bill. 35, 28; nemoralis Aresch. 35, 28; Arrh. 35, 28; nemorosus b. montanus Wimm. 35, 27; nitidus W. et N. 35, 26; × caesius Sudre 35, 27; oreogeton Focke 35, 27; f. ruber Baenitz 35, 28; plicatus W. et N. 35, 26; Radula W. 35, 26; rhombifolius × caesius Sudre 35, 27; rivularis P. J. Müll. ssp. setiger Lef. et Müll. var. cordiger Müll. et Wirtg. 35, 27; ssp. spinulosus Sudre 35, 27; Schleicheri Whe. 35, 27; senticosus Koehler 35, 26; f. umbrosa 35, 26; serpens × caesius Sudre 35, 27; serrulatus Lindeb. 35, 27; silesiacus × caesius Sudre 35, 28; spinosissimus P. J. Müll. var. 35, 27; Sprengelii W. 35, 26; subaculeatus Borb. 35, 27; suberectus Anderson 35, 23; 26;

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

subtilissimus Sudre **35**, 27; thyrsanthus Focke **35**, 22; 26; thyrsoideus × caesius Sudre **35**, 28; Villarsianus Focke **35**, 27; virgultorum Müll. **35**, 28; var. Aschersonii (Sprib.) Sudre **35**, 28; Warnstorffii Focke **35**, 28; Zinsmeisteri Erdner **35**, 27. — **Rumex** aquaticus × crispus × obtusifolius **34**, 20; densiflorus Metsch **34**, 20; Dufftii Hsskn. **34**, 20; **35**, 22; Patientia L. **35**, 7; subulatus Rechinger **34**, 20. – **Ruppia** rostellata Kch. **31**, 14; 24. — **Russula** albonigra (Krombh.) **35**, 11. — **Ruta** graveolens L. **31**, 67; **33**, 59; **34**, 11.

Sagittaria montevidensis Cham. et Schlechtd. **34**, 13. — **Salicornia** herbacea L. **31**, 14; 17; **33**, 53. — **Salix** **33**, 53; babylonica × fragilis **35**, 9; repens L. **33**, 70; **35**, 31. — **Salsola** fruticosa L. **33**, 54. — **Salvia** **31**, 75; pratensis L. **35**, 4; 14; verticillata L. **35**, 24. — **Sambucus** racemosa L. **35**, 22. — **Samolus** Valerandi L. **31**, 11; 14; 17. — **Sanguisorba** minor Scop. **35**, 14; officinalis L. **33**, 57. — **Sanicula** europaea L. **33**, 39; **35**, 22. — **Sarothamnus** scoparius (L.) **33**, 39; 56. — **Satureja** Clinopodium Briqu. **35**, 4. — **Saxifraga** decipiens Ehrh. **35**, 21. — **Scabiosa** canescens W. K. **31**, 38; 53; **35**, 14; Columbaria L. **34**, 21; f. albiflora **35**, 23; ochroleuca L. **31**, 38; **35**, 14. — **Schistidium** alpicola Sw. **32**, 168; apocarpum (L.) Hedw. **32**, 167; confertum Funck **32**, 168; gracile Schleich. **32**, 168; pulvinatum Brid. **32**, 168; rivulare Brid. **32**, 167. — **Schistostega** osmundacea Dicks. **32**, 189. — **Schliephackea** prostrata C. M. **31**, 5. — **Scilla** autumnalis L. **35**, 5. — **Scirpus** maritimus L. **31**, 11; Tabernaemontani Gmel. **31**, 11. — **Scleropodium** illecebrum (Schwg.) **32**, 245; purum L. **32**, 245. — **Scolopendrium** hybridum Milde **33**, 7; vulgare Sm. **33**, 10. — **Scorpidium** scorpioides L. **32**, 276. — **Scorzonera** **33**, 66; hispanica L. **31**, 54; f. asphodeloides Wallr. **35**, 22; f. glastifolia Willd. **35**, 22; humilis L. **35**, 32. — **Scrophularia** alata Gil. **35**, 22. — **Sedum** acre L. **33**, 39; album L. **33**, 39; altissimum Poir. **33**, 34; nicaeense Alb. **33**, 34. — **Seligeria** calcarea (Dicks.) **32**, 118; Doniana (Sm.) C. Müll. **32**, 117; pusilla Hedw. **32**, 117; recurvata Hedw. **32**, 118; tristicha Brid. **32**, 118. — **Sempervivum** barbatum Webb **33**, 33; Bentejui (Webb) Chr. **33**, 33; caespitosum Chr. Sm. **33**, 33; cruentum (Webb) Chr. **33**, 33; cuneatum (Webb) Chr. **33**, 35; Haworthii (Webb) Chr. **33**, 35; × urbicum **33**, 35; sediforme Jacq. **33**, 34; Smithii (Webb) Chr. **33**, 32; 69; soboliferum Sims. **35**, 21; strepsicladum (Webb) Chr. **33**, 33; urbicum Chr. Sm. **33**, 35. — **Senecio** erucifolius L. **35**, 25; 32; fluviatilis Wallr. **35**, 25; Jacobaea L. f. discoideus W. et Grab. **35**, 21; 22; spathulifolius DC. **35**, 32; vernalis W. et K. **35**, 24. — **Septoria** Trachelii Allesch. **35**, 10. — **Seseli** annuum L. **31**, 38; **33**, 60; Hippomarathrum L. **31**, 38; **35**, 14; Libanotis (L.) **33**, 60. — **Sesleria** **31**, 68. — **Sibbaldia** **34**, 21. — **Sideritis** montana L. **35**, 23. — **Silene** chlorantha Ehrh. **33**, 29; dichotoma Ehrh. **35**, 22; **35**, 31; Otites (L.) **31**, 50; 76; 79; **34**, 11; vulgaris (Mnch.) Gcke. **35**, 4. — **Sisymbrium** austriacum Jcq. **35**, 11; Columnae Jcq. **35**, 24; Loeselii L. **35**, 4; orientale L. **35**, 4; Sinapistrum Crntz. **35**, 20. — **Solidago** Virga aurea L. **35**, 14. — **Sorbus** **34**, 21; Aria × aucuparia **35**, 25; × torminalis **31**, 67; domestica L. **35**, 25; torminalis L. **33**, 57; **35**, 14. — **Sparganium** simplex Hds. **35**, 22. — **Spenceria** ramalana Trim. **34**, 20. — **Spergularia** marginata (DC.) **31**, 14; 17; 19; 54; salina Presl **31**, 14; 17; 19; **33**, 54; **35**, 20. — **Sphaeropsideen** **31**, 71. — **Sphagnum** **32**, 50; acutifolium Ehrh. **31**, 4; **32**, 55; acutiforme Schl. et W **31**, 4; auriculatum Sch. **32**, 91; balticum Russ. **32**, 80; brevifolium Rl. **31**, 3; **32**, 78; compactum DC. **31**, 4; **32**, 83; contortum Schltz. **32**, 90; cupressiforme Rl. **32**, 87; cuspidatum Ehrh. **31**, 3; **32**, 72; Dusenii Jens. **32**, 71; fallax Kling. **31**, 4; **32**, 75; fimbriatum Wils. **31**, 2; **32**, 66; fuscum Kling. **32**, 59; Girgensohnii Russ. **31**, 3;

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

32, 62; imbricatum Hornsch. **31**, 3; **32**, 100; inundatum Russ. **32**, 88; Klinggraeffii Rl. **31**, 3; **32**, 99; laricinum Spruce **31**, 4; **32**, 93; ligulatum Rl. **32**, 80; magellanicum Brid. **31**, 4; **32**, 95; molle Sulliv. **32**, 52; obtusum W. **32**, 73; palustre L. **31**, 4; **32**, 97; papillosum Ldbg. **31**, 3; **32**, 100; platyphyllum Sull. **32**, 94; plumulosum Rl. **32**, 53; pseudocontortum Rl. **32**, 87; pseudomolluscum Rl. **32**, 70; pseudopatulum (Schl.) Rl. **32**, 60; pseudorecurvum Rl. **32**, 75; pseudoserratum Rl. **31**, 3; **32**, 73; pseudoturgidum Rl. **32**, 88; pulchrum (Ldbg.) W. **32**, 76; pungens Roth **32**, 88; quinquefarium (Ldbg.) W. **32**, 54; recurvum Pal. **31**, 3; **32**, 76; riparium Ang. **32**, 73; robustum (Russ.) Rl. **32**, 60; Roellii (Schl.) Roth **32**, 74; Rothii Rl. **32**, 74; Schimperi Rl. **31**, 3; **32**, 52; Schliephackei Rl. **31**, 3; 5; **32**, 71; squarrosum Pers. **32**, 82; Stollei Rl. **32**, 74; subbicolor Hpe. **32**, 96; subsecundum Nees **31**, 3; 32, 86; tenellum Ehrh. **32**, 69; teres Ang. **31**, 3; **32**, 81; turgidum Rl. **32**, 92; Warnstorffii Russ. **32**, 59; Wilsoni Rl. **32**, 57. — **Splachnum** ampullaceum L. **32**, 186; sphaericum L. fil. **32**, 185. — **Squarrosa** Schl. **31**, 4. — **Stachys** ambigua Sm. **35**, 25; germanica L. **33**, 63; palustris × silvatica **35**, 5; recta L. **33**, 29; **35**, 14; 22; sideritoides C. Koch **35**, 4. — **Statice** Limonium L. **35**, 21. — **Stellaria** Frieseana Ser. **33**, 76. — **Stenorhynchium** **31**, 57. — **Stipa** capillata L. **31**, 38; 53; 54; **35**, 14; Joannis Cel. 35, 14. — **Stromaticae** **31**, 73. — **Struthiopteris** germanica Willd. **33**, 49. — **Suaeda** maritima (L.) **31**, 14; 17; 19; **33**, 54. — **Subsecunda** Schl. **31**, 4. — **Surirella** Gemma Cohn **33**, 69; striatula Turpin **33**, 69. — **Symphytum** officinale L **33**, 61. — **Synedra** affinis **33**, 69; laevis **33**, 69. — **Syringa** **35**, 10.

Taxus **35**, 9. — **Tayloria** tenuis Dicks. **32**, 185. — **Tetragonolobus** **31**, 25. — **Tetrodontium** Brownianum Dicks. **32**, 105. — **Teucrium** Botrys L. **35**, 22; Chamaedrys L. **31**, 69; **33**, 29; 62; **35**, 14; 22; montanum L. **31**, 38; 79; **33**, 62; **35**, 21; Scordium L. **33**, 62; **35**, 21; Scorodonia L. **35**, 21. — **Thalictrum** aquilegifolium L. **35**, 20; flexuosum Bernh. **35**, 14; minus L. **35**, 31. — **Thamnium** alopecurum L. **32**, 286; **34**, 22. — **Thesium** intermedium Schr. **35**, 14. — **Thlaspi** montanum L. **31**, 68; **34**, 10. — **Thuidium** abietinum L. **32**, 237; delicatulum (L.) Ldb. **32**, 237; Philiberti Spr. **32**, 237; pseudotamarisci Spr. **32**, 237; recognitum Ldbg. **32**, 237; tamariscinum Hedw. **32**, 237. — **Thymus** Celakovskyanus M. Sch. **33**, 6; Serpyllum L. **35**, 14. — **Timmia** megapolitana Hedw. **32**, 213. — **Tofieldia** calyculata Whlbg. **31**, 75. — **Torgesia** Bornm. **34**, 8. — **Torilis** infesta K. **35**, 23. — **Tortella** inclinata Schwgr. **32**, 141; tortuosa L. **32**. 142. — **Tortula** aestiva Brid. **32**, 162; calcicola Grebe **32**, 164; Fiorii Vent. **32**, 164; laevipila Brid. **32**, 163; latipila Bruch **32**, 163; montana Nees. **32**, 164; muralis L. **32**, 162; obtusifolia Schleich. **32**, 162; papillosa Wils. **32**, 163; pulvinata Jur. **32**, 163; ruralis L. **32**, 163; subulata L. **32**, 162. — **Tragopogon** **33**, 66; major Jcq. **35**, 10; orientalis L. **31**, 78; **35**, 22; pratensis L. **31**, 78. — **Trapa** natans L. **33**, 57. — **Trematodon** ambiguus Hedw. **32**, 110. — **Tribulus** terrestris L. **35**, 23. — **Trichodon** tenuifolius (Schrad.) Ldb. **32**, 112. — **Tricholoma** nudum (Bull.) **35**, 11; personatum (Fr.) **35**, 11. — **Trichostomum** caespitosum Bruch **32**, 140; crispulum Bruch **32**, 140; mutabile Bruch **32**, 141; pallidisetum H. Müll. **32**, 140; viridulum Bruch **32**, 141. — **Trientalis** europaea L. **33**, 61. — **Trifolium** alpestre L. var. glabratum Klinggr. **35**, 23; fragiferum L. **31**, 11; **35**, 24; montanum L. **35**, 31; pratense L. **31**, 31; rubens L. **35**, 31; striatum L. **35**, 31. — **Triglochin** maritima L. **31**, 14; 17; palustris L. **35**, 30. — **Trinia** Kitaibelii M. B. **33**, 29. — **Triticum** aegilopoides (Link) **33**, 11; boeoticum Boiss. **33**, 12; 71; Thaoudar Reuter **33**, 12; caninum L. **35**, 25; compactum **33**, 11; dicoccoides Koern. **31**, 63; f. Kotschyana A. Sch. **31**, 63; f. Straussiana

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

A. Sch. **31**, 62; **33**, 15; dicoccum Schrank **31**, 62; **33**, 11; **34**, 13; dicoccoides Koern. **33**, 11; Haussknechtianum A. Sch. **34**, 14; durum Desf. **33**, 11; monococcum L. **33**, 11; **34**, 20; Hornemanni Clem. **33**, 13; nigrescens Pančić **33**, 13; polonicum L. **33**, 11; repens L. **31**, 21; Spelta L. **33**, 11; **34**, 20; turgidum L. **33**, 11; vulgare Vill. **33**, 11; trojanum Wittm. **33**, 14. — **Trochodendraceae** **35**, 6. — **Trollius** europaeus L. **35**, 31. — **Tulipa** silvestris L. **35**, 30. — **Tussilago** Farfara L. **33**, 65. — **Typha** angustifolia L. **35**, 30.

Ulota americana (Pal.) Mitt. **32**, 180; Bruchii Hornsch. **32**, 179; crispa Hedw. **32**, 179; crispula Br. **32**, 180; intermedia Sch. **32**, 179; Ludwigii Brid. **32**, 179. — **Urocystis** Colchici (Schlechtd.) Rbh. **33**, 70; **35**, 10. — **Urtica** pilulifera L. **31**, 34. — **Ustilago** utriculosa (Nees) Tul. **35**, 10; Vaillantii Tul. **35**, 10.

Vaccaria pyramidata Med. **33**, 54; **35**, 31. — **Vaccinium** Oxycoccos L. **33**, 61. — **Valeriana** sambucifolia Mik. **35**, 24. — **Valerianella** Auricula DC. **35**, 24; carinata Loisl. **35**, 4; 24. — **Verbascum** **34**, 21; nigrum L. **35**, 22. — **Veronica** acinifolia L. **33**, 77; biloba L. **33**, 77; glaberrima Boiss. et Bal. **33**, 77; nudicaulis Kur. et Kir. **33**, 77; scutellata L. **35**, 23; Tournefortii Gmel. **31**, 63. — **Viburnum** Lantana L. **35**, 14. — **Vicia** Cracca L. **35**, 23; sativa L. f. albiflora **35**, 23; segetalis Thuill. **35**, 23; sepium L. **35**, 24; tenuifolia Roth **35**, 23; villosa Roth B. glabrescens Koch **35**, 24. — **Vinca** minor L. **35**, 14. — **Vincetoxicum** fuscatum Rchb. **35**, 8; × officinale **35**, 8; Haussknechtii M. Sch. **35**, 8; officinale Mnch. **35**, 8; var. Haussknechtii Bornm. **35**, 8. — **Viola** ambigua W. K. **33**, 29; arenaria DC. **31**, 38; hirta L. **33**, 29; **35**, 14; pumila Chaix **33**, 29; 67; **35**, 31; silvestris Lam. **34**, 21; stagnina Kit. **33**, 29; tricolor L. **34**, 21. — **Viscum** album L. **35**, 4. — **Volvaria** plumulosa (Lasch) **35**, 11.

Waldsteinia geoides Willd. **33**, 77. — **Weisia** crispata (Br. Germ.) Jur. **32**, 138; rutilans (Hedw.) Ldb. **32**, 137; viridula (L.) Brid. **32**, 137. — **Wojnowicia** graminis (Mc. Alp.) Sacc. **35**, 10.

Zannichellia palustris L. **35**, 20; pedicellata Whlbg. **31**, 14; 25. — **Zygodon** rupestris Sch. **32**, 179; viridissimus Dicks. **32**, 179.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis

der in den „Mitteilungen" des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, Heft 31 (1914) bis Heft 35 (1921) enthaltenen Abhandlungen.

Becker, W., *Viola pumila Chaix,* eine xerophile Pflanze des pontischen Elements ..... Heft **33**, S. 28

Bliedner, A., Weitere Beiträge zur Flora von Eisenach .... „ **35**, „ 23

Bornmüller, J., Zwei neue *Astragalus*-Arten der Flora Persiens. Mit 2 Tafeln ..... „ **31**, „ 56

Ueber Brutknospen- und Gabelbildung an Wedeln von *Phyllitis hybrida (Milde) Christensen.* Mit 1 Tafel ..... „ **33**, „ 7

Einige Bemerkungen über die Verbreitung von *Alopecurus setarioides Gren.* ..... „ **33**, „ 30

Teratologisches an *Sempervivum (Aeonium) Smithii (Webb) Christ* und einigen anderen canarischen Semperviven.. „ **33**, „ 32

Bemerkungen zu *Carex pilosa Scop.* in Thüringen ..... „ **35**, „ 29

Ueber eine adventive *Elssholzia* bei Merseburg ..... „ **35**, „ 32

Diedicke, H., Professor B. Hergt †..... „ **35**, „ 1

Eckardt, W. R., Der Kaiserling *(Amanita caesarea)* an der bayrisch-meiningischen Grenze ..... „ **35**, „ 25

Henkel, A., Beiträge zur Flora von Weimar ..... „ **35**, „ 30

Hergt, B., Oberstabsarzt Dr. Emil Torges †..... „ **34**, „ 1

Holzfuß, E., Beitrag zur Brombeerflora von Thüringen .... „ **35**, „ 26

Reinecke, Karl L., Weitere Beiträge zur Thüringer Flora .. „ **35**, „ 21

Rettig, E., Max Schulze †..... „ **33**, „ 1

Röll, J., Meine Erinnerungen an Dr. Karl Schliephacke.. „ **31**, „ 1

Die Thüringer Torfmoose und Laubmoose und ihre geographische Verbreitung ..... „ **32**, „ 1

Schulz, A., Abstammung und Heimat des Saathafers ..... „ **31**, „ 6

Ueber die Ansiedlung und Verbreitung halophiler Phanerogamenarten in den Niederungen zwischen Bendeleben und Nebra ..... „ **31**, „ 11

Ueber das Vorkommen von *Artemisia maritima L.* auf der Ruine der Burg Arnstein bei Harkerode im Mansfelder Gebirgskreise ..... „ **31**, „ 29

Ueber das Vorkommen von *Onobrychis arenaria (Kitaibel)* in der Umgebung von Halle ..... „ **31**, „ 35

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Die im Saalebezirke wildwachsenden strauchigen Sauerkirschen. 2. Mitteilung ..... Heft **31**, S. 40
Ueber die Verbreitung von *Silene Otites (L.)* und *Gypsophila fastigiata L.* im Südsaalebezirke ..... „ **31**, „ 50
Ueber die Abstammung des Weizens ..... „ **33**, „ 11
Abstammung und Heimat des Saathafers. 2. Mitteilung .. „ **33**, „ 16
Die Anzahl der Samen in der Hülse von *Astragalus danicus Retzius* ..... „ **33**, „ 21
Die im Saalebezirke wildwachsenden strauchigen Sauerkirschen. 3. Mitteilung ..... „ **33**, „ 24
Valerius Cordus als mitteldeutscher Florist..... „ **33**, „ 37
Bericht über die Exkursionen am 2. und 3. Juni 1914 .... „ **34**, „ 10
Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung interessanterer Phanerogamenformen im Saalebezirke. I ..... „ **35**, „ 13
Schulze, Max, Weitere kleine Mitteilungen über *Alectorolophus*-Formen der Jenaer Flora ..... „ **31**, „ 58
Zahn, G., Mitteilung aus dem Herzogtum Gotha ..... „ **35**, „ 20

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: NF_35

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: Register und Verzeichnis I-XVI