©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen.

Von **K. L. Reinecke.**

(Eingegangen am 6. Oktober 1912.)

Thalictrum minus L. Einzeln am Marolsberge bei Elxleben a. G. und am Weinberge b. Haarhausen.

Adonis vernalis L. Steinberg und Marolsberg b. Elxleben a. G. und Längel zwischen Haarhausen und Freudenthal b. Wandersleben.

A. flammeus Jcq. Diebskammer b. Schallenburg; Roter Berg b. Witterda.

Ranunculus aquatilis L. Im ehemal. Vordersee b. Obernissa.

R. trichophyllus Chaix. Vordersee b. Obernissa; zwischen Großrudestedt und Kranichborn; im Linderbache b. Töttleben; auf Schlammboden an der Unstrut bei Henschleben in der Form *terrestris Godr.*

R. Lingua L. Einzeln in Torflöchern des Vordersees b. Obernissa.

Nymphaea alba L. In einem Teiche zwischen Holzhausen und Röhrensee, aber vielleicht nicht ursprünglich.

Arabis Gerardi Bess. Nördlich von Mittelhausen am Rande des Feldgehölzes.

Erysimum virgatum Rth. Einzeln an der Schleusenbrücke bei Kühnhausen und am Ringelberge b. Witterda.

Lunaria rediviva L. Häufig am Graben beim Dörrberger Hammer im Thüringerwalde.

Tunica prolifera Scop. Zahlreich am rechten Ufer der Gera bei der Schleusenbrücke zwischen Gispersleben und Kühnhausen und am Wegrande neben der Nordhäuserbahn bei Erfurt-Nord.

Silene dichotoma Ehrh. Zwischen Möbisburg und Eischleben; bei Werningsleben; zwischen Erfurt und Bindersleben; bei Frienstedt; an der Flutgrabenböschung in Erfurt; zwischen Erfurt und Gispersleben; zwischen Kühnhausen und der Schleuse.

Cerastium glutinosum Fr. Zahlreich auf den Gipshügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda; Orphaler und Schaderoder Grund bei Tieftal. In den Formen *obscurum Chaub.* und *pallens F. Schultz* am Steinberge b. Elxleben a. G.

C. triviale Lk. var. glandulosum Koch. Am Bahndamme bei Stedten unweit Erfurt und in der Nähe der Saline Luisenhall bei Stotternheim.

Hypericum montanum L. f. (nov.) abbreviatum Reinecke. Foliis

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

caulinis superioribus lateovatis breviter acuminatis. Am Möbisburger Holze südlich von Rhoda.

Geranium molle L. Auf Grasplätzen am Dome in Erfurt und in Chausseegräben beim städt. Krankenhause.

Impatiens Noli tangere L. Am Ufer der Gera zwischen Teichmanns Fabrik und Gispersleben Kil. angeschwemmt.

Oxalis stricta L. Auf Acker- und Gartenland bei Gispersleben Kil. u. Viti und bei Kühnhausen.

Ononis mitis Gm. Gipshügel zwischen Elxleben a. G. und Witterda; Diebskammer bei Schallenburg.

Medicago minima Grufberg (1759). Häufig auf fast allen Gipshügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda.

Melilotus altissimus Thuill. Im Gleichentale zwischen der Wachsenburg und Freudenthal b. Wandersleben.

Astragalus danicus Retz. Zwischen Alperstedt und der Gramme-Mühle an einer Stelle ziemlich häufig.

Oxytropis pilosa DC. Auf einem Hügel zwischen Röhrensee und der Mühlberger Leite.

Vicia tenuifolia Rth. Am Wechselholze b. Rohda.

Prunus insititia × spinosa (Pr. fruticans Whe.) zwischen Melchendorf und dem Willroder Forste an steinigen Rainen und am Petersberg-Glacis in Erfurt.

Potentilla rubens (Crantz) Zimm. Zwischen Witterda und der Grundmühle; Abhänge des Drosselberges b. Melchendorf.

P. arenaria Borkh. Einzeln am Hünerbiel und Marolsberge, zahlreicher am Steinberge bei Elxleben a. G.

P. arenaria × opaca. Einzeln zwischen den Stammarten am Marolsberge und Steinberge b. Elxleben a. G. Einmal in wenigen Exemplaren auch am Rande der Chaussee zwischen Stotternheim und Alperstedt.

P. pilosa W. Steiler Abhang bei Tiefthal.

Archangelica officinalis Hffm. Einzeln am Ufer der Unstrut bei Vehra und Henschleben; zahlreicher an der Wipfra bei Eischleben und an der Gera bei Kühnhausen.

Tordylium maximum L. An mit Schlehengebüsch bewachsenen Abhängen unweit der Kirche von Tiefthal zahlreich.

Anthriscus vulgaris Pers. Sehr zahlreich an der Dorfstraße und an Zäunen in Schallenburg.

Scabiosa ochroleuca L. An der Schallenburg bei Schallenburg.

S. canescens W. K. An der Diebskammer b. Schallenburg;

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Gipshügel zwischen Kühnhausen, Elxleben a. G. und Witterda, besonders zahlreich auf dem Steinberge.

Aster Amellus L. Einzeln an einer Stelle auf dem Weinberge b. Haarhausen.

Inula germanica L. Truppweise auf Gipshügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda, besonders am Steinberge.

Artemisia campestris L. Auf fast allen Gipshügeln zwischen Elxleben a. G. und Witterda: Schallenburg und Diebskammer b. Schallenburg; auf einem Hügel zwischen Röhrensee und der Mühlberger Leite.

Hieracium pratense Tsch. Am Feldwege von Dietendorf nach Frienstedt und auf Wiesen im Vordersee b. Obernissa.

Helminthia echioides Grtn. (Picris echioides L.). Eingeschleppt neben der Sangerhäuser Bahn östlich von Erfurt-Nord.

Menyanthes trifoliata L. Einzeln im Vordersee b. Obernissa.

Collomia grandiflora Dougl. Am rechten Ufer der Gera zwischen Gispersleben und Kühnhausen.

Myosotis hispida Schld. Am Westrande des Nonnenholzes zwischen Witterda und der Grundmühle.

M. versicolor Sm. mit *M. hispida Schld.* und *M. micrantha Pall. (M. arenaria Schrad.)* auf Sand zwischen Singen und dem Forste.

Physalis Alkekengi L. Am Steinberge zwischen Elxleben a. G. und Witterda von Prof. Dr. A. Schulz-Halle a. S. aufgefunden.

Veronica prostrata L. Am Marolsberge b. Elxleben a. G.

V. Tournefortii Gm. Auf Acker- und Gartenland bei Bienstädt, Gispersleben Viti, Eischleben, Kirchheim und zwischen Egstedt und dem Willroder Forste.

Origanum vulgare L. Im Steigerforste b. Erfurt auch am sog. alten Rhodaischen Wege südlich der „Schönen Aussicht."

Stachys annua L. Hünerbiel bei Elxleben a. G. und am Abhange des Riechheimer Berges.

Chenopodium rubrum L. Gleichental bei Wandersleben: auf Gemüseland bei Kühnhausen.

Ch. glaucum L. An der Dorfstraße in Gispersleben Kil.: auf Gemüseland und in Kiesgruben bei Kühnhausen.

Atriplex oblongifolium W. K. Am Bahndamme nördlich von Kühnhausen; am Fahrwege von Tiefthal nach Kühnhausen neben dem Weißbache.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Polygonum dumetorum L. An den Steinbrüchen der Mühlberger Leite.

Gymnadenia conopea R. Br. f. albiflora (G. ornithis Spr.). Am Strohberge bei Rohda 1 Exemplar.

Platanthera Wankelii Rchb. fil. Strohberg b. Rohda: im Distr. 13 des Willroder Forstes; 1 Exemplar am Erlensumpfe im Steigerforste b. Erfurt.

Goodyera repens R. Br. Zahlreich am Waldwege vom Bahnhofe Plaue nach der Halskappe.

Allium montanum Schm. (A. fallax Schultes). Auf Gips am Steinberge bei Elxleben a. G. (hier von Prof. Dr. A. Schulz-Halle zuerst aufgefunden); zahlreicher auf dem Marolsberge b. Elxleben a. G.

A. rotundum L. Einzeln zwischen Gebesee und Dachwig.

A. vineale L. var. capsuliferum Lge. An einem Feldwege östlich von Dachwig.

Juncus obtusiflorus Ehrh. Spindelgraben zwischen Elxleben und Witterda.

Scirpus Tabernaemontani Gm. Feldsumpf zwischen Marienthal und Schmira; Moorwiese im Gleichentale b. Wandersleben.

Carex Davalliana Sm. Krautseewiesen bei Ingersleben; zwischen Haßleben und Werningshausen; in den Waltersweiden bei Tiefthal.

C. Hornschuchiana Hppe. Einzeln auf der Wiese an der Saline Luisenhall b. Stotternheim.

C. Pseudo-Cyperus L. Am Teiche zwischen Holzhausen und Röhrensee.

C. lasiocarpa Ehrh. (C. filiformis Good.). Wächst nicht in einem Fichtenwalde bei Kranichfeld (cfr. Schönheit, Taschenbuch der Flora Thüringens und Hse, Flora von Mittelthüringen). Das im Herbar Buddensiegs befindliche Originalexemplar gehört zu *C. vesicaria L.*

Stipa capillata L. Zwischen Elxleben a. G., Külmhausen und Witterda sehr verbreitet; auf einem Hügel zwischen Röhrensee und der Mühlberger Leite.

Sclerochloa dura P. B. Planweg beim Wasserwerke Elxleben zwischen Elxleben a. G. und Witterda.

Glyceria aquatica Whlnb. Am Unstrutufer bei Vehra; zwischen Großrudestedt und Kranichborn; am rechten Ufer der Gera zwischen Gispersleben Viti und Külmhausen.

Festuca arundinacea Schreb. Am Spindelgraben bei Elxleben a. G.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: NF_30

Autor(en)/Author(s): Reinecke Karl [Carl] Lorenz

Artikel/Article: Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen. 18-22