©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze.

Von **Johanna Schultze-Wege.**

(Fortsetzung von Heft XVII, S. 33 ff.)[1])

B. Polyporei.[2])

1. Boletus.

B. *luteus L., elegans Schum., flavus Wither., flavidus Fr., collinitus Fr., granulatus L., bovinus L., piperatus Bull., variegatus Swartz, chrysenteron Fr., sulphureus Fr., subtomentosus L., purpurascens Rostk., lilaceus Rostk., parasiticus Bull., umbrinus Pers., pachypus Fr., torosus Fr., cruentus Ventur.* (bei Rödichen b. Friedrichroda), *regius Krombh., edulis Bull., vaccinus Fr.* (Ettersberg), *sericeus Krombh., Satanas Lenz, lupinus Fr., luridus Schaeff., erythropus Pers., purpureus Fr., Meyeri Rostk., strobilaceus Scop., floccopus Vahl, laricinus Berkl.* (Belvedere), *viscidus L., asprellus Fr., versipellis Fr., scaber Fr., felleus Bull., alutarius Fr.* (Spießbergkopf b. Friedrichroda), *cyanescens Bull., castaneus Bull., rubescens Trog., cavipes Klotzsch, hieroglyphicus Rostk., roseus Winter, eriophorus Rostk., pumilus Sauter, tridentinus Bres.*

2. Fistulina.

F. *hepatica (L.).*

3. Polyporus.

I. Mesopus.

A. Carnosi.

P. *subsquamosus (L.), ovinus (Schaeff.), xoilopus Rostk., rutrosus Rostk.;*

B. Lenti.

P. lepideus Fr., lentus Berkl. (Weimar), *brumalis (Pers.), arcularius (Batsch), vernalis Fr.;*

C. Spongiosi.

P. Schweinitzii Fr., biennis (Bull.), laciniatus Pers. (Reinhardsbrunn).

---

[1]) Die durch gesperrten Druck hervorgehobenen Arten sind in Rabenhorsts Kryptogamen-Flora nicht aufgeführt. Fundorte, deren Zugehörigkeit zu einem engeren Floren-Bezirke nicht ohne weiteres ersichtlich oder nicht angegeben ist, liegen in der Umgegend von Weimar. D. Verf.

[2]) Wenn auch, besonders bei den Polyporeen, die neue Einteilung und Nomenklatur viele Vorzüge hat, bleibe ich doch, der Einheitlichkeit wegen, hier bei der von Fries. D. Verf.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

D. Subcoriacei.

Polyporus tomentosus Fr., Montagnei Fr., perennis (L.), pictus (Schultz Starg.), substriatus Rostk.

II. Pleuropus.

A. Lenti.

Polyporus squamosus Fr., pallidus Schulz (Ettersberg), melanopus (Swartz), picipes Fr., varius Fr., elegans (Bull.), petaloides Fr.;

B. Suberoso-lignosi.

P. lucidus (Leys.).

III. Merisma.

A. Carnosi.

P. umbellatus Fr., frondosus (Fl. Dan.), intybaceus (Auctt. pr. p.), cristatus (Pers.), confluens (Alb. et Schw.);

B. Lenti.

P. giganteus (Pers.);

C. Caseosi.

P. sulphureus (Bull.), imbricatus (Bull.), Spongia Fr., alligatus Fr.

IV. Apus.

A. Anodermei.

1. Carnosi: *P. epileucus Fr., alutaceus Fr., stypticus (Pers.), lacteus Fr., fragilis Fr., mollis (Pers.), caesius (Schrad.), destructor (Schrad.);*

2. *Lenti: P. nidulans Fr., fumosus (Pers.), adustus (Willd.), crispus (Pers.), kymathodes Rostk., amorphus Fr.;*

3. Spongiosi: *P. hispidus (Bull.), cuticularis (Bull.), spumeus (Sowerb.), borealis (Wahlb.).*

B. Placodermei.

4. Suberosi: *P. resinosus (Schrad.), crubescens Fr., betulinus (Bull.), officinalis (Vill.);*

5. Fomentarii: *P. vegetus Fr.,* (Buchfahrt b. Weimar), *applanatus Wallr., fomentarius (L.), nigricans Fr., igniarius (L.), fulvus Fr., conchatus (Pers.), Ribis (Schum.), marginatus Fr., rufopallidus Trog., connatus Fr.;*

6. Lignosi: *P. annosus Fr., populinus Fr.*

C. Inodermei (Polystictus).

7. Stupposi: *P. leporinus Fr.* (Weimar), *triqueter (Sowerb.), radiatus (Sowerb.), cryptarum (Bull.), ravidus Fr.* (Wilhelmsthal b. Eisenach), *gossypinus Lev., albidus Trog., Fibula Fr.;*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

8. Coriacei: *Polyporus lutescens Pers., hirsutus (Wulf.), velutinus Fr., zonatus Fr., versicolor (L.), stereoides Fr., abietinus (Dicks.), Wynnei Berkl.*

V. Resupinati (Poria).

1. Polyporus.

P. obliquus (Pers.), unitus Pers., fuscolutescens Fuckel, ferruginosus Fr., floccosus Fr., incarnatus (Alb. et Schw.), rufus (Schrad.), rhodellus Fr., nitidus Fr., bombycinus Fr., cinctus Berkl. (Weimar), *sinuosus Fr., Medulla panis (Pers.), obducens Pers., vulgaris Fr., molluscus Fr., vaporarius Fr., Vaillantii Fr., farinellus Fr., corticola Fr.*

2. Trametes.

T. *odorata (Wulf.), Trogii Berkl., gibbosa (Pers.), rubescens (Alb. et Schw.), Bulliardii Fr., suaveolens (L.), hexagonoides Fr., serpens Fr.*

3. Daedalea.

D. *quercina (L.), cinnabarina Secr., confragosa (Bolt), cinerea Fr., unicolor (Bull.), zonata Schwein., latissima Fr.*

4. Marulius.

M. *aurantiacus Klotzsch, Corium (Pers.), lacrymans (Wulf.), papyraceus Fr.*

C. Hydnei.

1. Hydnum.

H. *imbricatum L., scabrosum Schäff., versipelle Fr., candidum Schmidt, repandum L., rufescens Pers., fuligineo-violaceum Kalchbr., compactum Pers., aurantiacum Alb. et Schw. ferrugineum Fr., cinereum Bull., velutinum Fr., scrobiculatum Fr., zonatum Batsch, Quéletii Fr., graveolens Delast., melaleucum Fr., cyathiforme Schäff., auriscalpium L., coralloides Scop., Schiedermayeri Heufler, cirrhatum Pers., diversidens Fr., leoninum Fr. (Ettersberg), fulgens Fr.* (Belvedere).

2. Tremellodon.

T. *gelatinosum Pers., auriculatum Fr.,*

3. Irpex.

I. *fusco-violaceus Fr., lacteus Fr., canescens Fr., paleaceus Thore.*

4. Radulum.

R. *orbiculare Fr., tomentosum Fr.*

5. Grandinia.

G. *granulosa (Pers.).*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

D. Thelephorei.

1. Craterellus.

C. *lutescens (Pers.), cornucopioides (L.).*

2. Thelephora.

Th. *multizonata Berkl. et Br., radiata (Holmsk.), caryophyllea Pers., anthocephala Fr., coralloides Fr., palmata (Scop.), contorta (Karst.), terrestris (Ehrh.), laciniata Pers., biennis Fr., cristata (Pers.), fastidiosa Fr., sebacea (Pers.).*

3. Stereum.

S. *ochroleucum Fr., purpureum Pers., lilacinum Batsch, hirsutum (Willd.), spadiceum Fr., sanguinolentum (Alb. et Schw.), conchatum Fr., ferrugineum (Bull.), tabacinum (Sowb.), disciforme (Dec.), repandum Fr., frustulosum Fr., rugosum Fr., Pini Fr., rufum Fr.*

4. Corticium.

C. *Boltonii Fr., salicinum Fr., sarcoides Fr., lacteum Fr., roseum (Pers.), coeruleum (Schrad.), calceum (Pers.), livido-coeruleum Karst., ochraceum Fr., seriale Fr., quercinum (Pers.), incarnatum Fr., nudum Fr., confluens Fr.*

5. Cyphella.

C. *muscigena Fr.*

E. Clavariei.

1. Sparassis.

S. *crispa (Wulf.).*

2. Clavaria.

C. *flava Schäff., Botrytes Pers., amethystina Bull., muscoides L., coralloides L., cinerea Bull., cristata Pers., rugosa Bull., Kunzei Fr., aurea Schäff., rufescens Schäff., formosa Pers., spinulosa Pers., abietina Pers., corrugata Krst., flaccida Fr., grisea Pers., rufoviolacea Barl.* (bei Naumburg), *suecica Fr., palmata Pers., apiculata Fr., crispula Fr., byssiseda Pers., inaequalis Fl. Dan., fragilis Holmsk., tenacella Pers., pistillaris L., Ligula Schäff., paludicola Libert* (Ettersberg), *acuta Sowb.* (Weimar, in einem Blumentopf).

3. Calocera.

C. *viscosa (Pers.), palmata (Schum.), furcata Fr., cornea Fr.*

4. Typhula.

T. *sclerotioides Fr., erythropus (Bolt.), variabilis Riess, gyrans (Batsch), peronata (Pers.).*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

5. Pistillaria.

P. *micans Fr.*

F. Tremellinei.

1. Tremella.

T. *fimbriata Pers., frondosa Fr., foliacea Pers., mesenterica (Schäff.), intumescens Engl. Bot., albida Huds., elegans Fr., viscosa Berkl., violacea Relh.*

2. Exidia.

E. *saccharina Fr.*

4. Dacryomyces.

D. *stillatus Nees.*

3. Guepinia.

G. *helvelloides (DC.).*

Gasteromycetes.

A. Nidularici.

1. Cyathus.

C. *vernicosus Bull., striatus (Huds.).*

2. Crucibulum.

C. *vulgare Tul.*

B. Lycoperdinei.

1. Geaster.

G. *hygrometricus Pers., rufescens Pers., limbatus Fr., fimbriatus Fr., fornicatus (Huds.), Bryantii Berkl., Schmiedeli Vitt., striatus (DC.), saccatus Ellis et Ev.* (Berka a. Ilm), *velutinus Lloyd* (Ettersberg), *Morganii Lloyd* (Belvedere).

2. Bovista.

B. *nuciformis Wallr., tunicata Fr., nigrescens Pers., plumbea Pers.*

3. Lycoperdon.

L. *cruciatum Rostk., areolatum Rostk., constellatum Fr., hirtum Pers., granulatum Wallr., serotinum Bon., pyriforme Schäff., gemmatum Batsch, var. perlatum Batsch, var. echinatum Pers., var. furfuraceum Fr., var. papillatum Schaeff., aestivale Bon., foetidum Bon., ericaeum Bon., fuscum Bon., var. flavofuscum Bon., var. glaucofuscum Bon., cepaeforme (Wallr.), cupricum var. ochraceum Bon., cinereum Bon., laxum Bon., saccatum Fl. Dan., aculeatum Rostk., flavescens Rostk., punctatum Rostk., rusticum Bon., pistilliforme Bon., Bovista L., pusillum Batsch, favosum Rostk., caelatum Bull.*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

C. Tulostomei.

1. Tulostoma.

T. *mammosum Micheli.*

D. Sclerodermei.

1. Polysaccum.

P. *crassipes DC.*

2. Scleroderma.

S. *verrucosum Bull., Bovista Fr., vulgare Fl. Dan., areolatum Ehrh.*

E. Hymenogastrei.

1. Rhizopogon.

Rh. *rubescens Tul., luteolum Fr.*

F. Phalloidei.

1. Phallus.

Ph. *impudicus L., caninus Schäff.*

Beiträge zur Flora von Wippra.

I. Geranium phaeum L. im Unterharze bei Wippra.

Von **K. Wein.**

(Eingegangen den 20. Mai 1905.)

Obwohl seit Wallroth und Hampe noch manche wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Flora des Harzgebirges veröffentlicht worden sind, so bedürfen doch einzelne kleinere Bezirke in dieser Hinsicht weiterer Durchforschung; ja, es gibt deren, die noch fast unerschlossen sind.

Eine solche terra incognita ist z. B. das obere Wippertal mit seinem schön gelegenen Wippra geblieben, während über die Gegend etwas weiter flußabwärts, von Mansfeld bis Hettstedt[1]) schon wenn auch spärliche Angaben vorliegen.

Ersteres Gebiet umfaßt die Südostecke des hercynischen devonischen Schiefergebirges mit dem wenig bedeutenden Karbon und wird im Süden und Osten von den Ablagerungen der Dyaszeit begrenzt. Im Norden erstreckt es sich bis zur Leine, im Westen bis in das obere Tal der Alten Wipper. Über seine Pflanzendecke

[1]) Ein wenig bekanntes Verzeichnis der Blütenpflanzen in der Gegend von Hettstedt von K. Mehliß im Wochenbl. f. d. Mansfelder Gebirgskreis XIV, 1844, 146 ff. ist fast wertlos. D. Verf.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1904-1905

Band/Volume: NF_20

Autor(en)/Author(s): Schultze-Wege Johanna

Artikel/Article: Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze. 63-68