©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Register

zu Neue Folge, Heft XVI (1901) bis XX (1904/1905) der Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

Abies alba Mill. XX, 12.
— Apollinis Link XX, 12.
— excelsa Poir. v. viminalis Host XVI, 10.
— Nordmanniana Stev. XX, 12.
— pectinata DC. s. A. alba.
Acanthus mollis L. XX, 88.
Acer campestre L. XVI, 128.
— — v. athoum Bornm. XVIII, 45.
— — commutatum (Psl.) XVIII, 45.
— — cruciatum Pax XVIII, 45.
— — diversifolium Wirtg. XVIII, 45.
— — ibericum MB. XVIII, 45.
— — illyricum (Jcq.) XVIII, 45.
— — microcarpum Bornm. XVIII, 45.
— — microphyllum Boiss. XVIII, 45.
— — pseudomonspessulanum Bornm. & Pax XVIII, 45.
Aceras anthropophora R. Br. XVII, 66.
— — × Orchis militaris XVII, 66; XIX, 117.
— — × — purpurea XVII, 66.
— — × — Simia XVII, 67.
Achillea anthemiformis Freyn & Sint. XX, 16.
— anthemoides Freyn & Sint. XX, 15.16.
— atrata L. XVII, 122.
— — × moschata XVII, 122.
— Kraettliana Brügg. s. A. atrata × moschata.
— Millefolium L. XVII, 24.
— moschata Wulf. XVII, 122.
— Neilreichii Kerner XVII, 122.
— ochroleuca Ehrh. XVI, 18.
— Ptarmica L. XVI, 45, 132; XVII, 31, 122; XIX, 70.
Achnanthes exilis Kg. XIX, 136.
Achyrophorus maculatus Scop. XVIII, 65; XIX, 75.
Aconitum Lycoctonum L. XVIII, 58, 79; XIX, 98; XX, 71.
— variegatum L. XVIII, 79; XX, 71.
Acorus Calamus L. XVI, 110, 136.
Actaea spicata L. XVI, 125; XVII, 30; XVIII, 59, 79; XIX, 135; XX, 71.
Adiantum Capillus Veneris L. XVI, 33, 115; XIX, 58.
Adonis flammea Jcq. XVIII, 78.
Adoxa Moschatellina L. XVIII 55.
Aecidium Salviae silv. XVIII. 37.
Aegilops triuncialis L. XVI, 34.
Aesculus Hippocastanum L., f. laciniata XIX, 10.
— — Schlitzblättrigkeit von XIX, 10 ff., 126.
Aethionema saxatile R. Br. XVI, 49.
Agrimonia Eupatorium L. XVII, 24.
— odorata Mill XX, 70.
Agrostemma coronaria L. XVII, 24.
Agrostis alba L. XVI, 137.
— — v. gigantea Mey. XVIII, 73.
— canina L. XVI, 137.
— vulgaris With. XVI, 137.
Aira caespitosa L. v. aurea Wimm. & Gr. XVII, 124.
— flexuosa L. v. Legei Bor. XVI, 18; XVIII, 73.
— media Gouan XVI, 35.
Ajuga Chamaepitys Schreb. XVIII. 67; XIX, 130.
— genevensis L. rot blühend XVI, 28.
— pyramidalis L. XVIII, 56.
— reptans L. rot blühend XVIII, 67.
— — weiß blühend XVIII, 67.
Alchemilla Sect. Pubescentes XIX, 133, 134.
— arvensis Scop. XVIII, 62.
— flabellata Buser XIX, 134.
— glaucescens Wallr. XIX, 134.
— pubescens autt. XIX, 134.
— — MB. XIX, 134.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Alchemilla vulgaris L. XVI, 128; XVII, 24, 29.
— — v. pubescens Lam. XVI, 128.
Alisma Plantago L. v. lanceolata (With.) XVI, 37; XVIII, 41.
Allium carinatum L. XVI, 37.
— fallax Don XIX, 95, 130.
— flavum L. XVI, 37.
— margaritaceum Sibth. & Sm. XVI, 37.
— oleraceum L. XIX, 95.
— paniculatum L. XVI, 37.
— rotundum L. XVIII, 69; XIX, 95.
— Scorodoprasum L. monströs XVII, 124.
— sphaerocephalum L. XVI, 37.
— tenuiflorum Ten. XVI, 37.
— ursinum L. XIX, 95.
— vineale L. XVIII, 69.
Alnus glutinosa Gaertn. XVI, 136.
— — humilis XX, 91.
— — × incana XX, 91.
— incana DC. XX, 91.
Aloina XIX, 17.
Alopecurus agrestis L. XVI, 17.
— fulvus Sm. XVI, 17.
Alsine austriaca M. & K. XX, 9.
— juniperina Fenzl v. glandulosa Boiss. XX, 10.
— — v. lineata (C. A. M.) XX, 10.
— lineata C. A. M. XX, 10.
— pontica Bornm. XX, 9.
— — v. alpina Bornm. XX, 9.
— rimarum Boiss. & Bal. XX, 9.
— tenuifolia Wlnb. XVIII, 54.
— verna L. XX, 9, 10.
— Villarsii M. et K. XX, 10.
Alyssum aizoidis Boiss. XX, 2.
— Bornmuelleri Hskn. XX, 2.
— bulbotrichum Hskn. et Bornm. XX, 3.
— calycocarpum Hskn. XX, 5.
— — Rupr. XX, 5.
— condensatum Boiss. et Hskn. XX, 3.
— Doerfleri Degen XX, 2.
— Haussknechtii Boiss. XX, 3.
— hirsutum MB. XX, 4.
— macrostylum Boiss. & Huet XX, 4, 5.
— — v. calycocarpum Hskn. XX, 4, 5.
— microcarpum Hskn. & Bornm. XX, 3.
— montanum L. v. arenarium Gmel. XVII, 126.
— oxycarpum Boiss. & Bal. XX, 3.
— pannulosum Hskn. & Bornm. XX, 2.
— paphlagonicum Bornm. XX, 7.
— petraeum Ard. XVI, 130.
— praecox Boiss. XX, 4.
— pseudomontanum Hskn. & Bornm. XX, 4.
Alyssum repens Baumg. XX, 4.
— rostratum Bornm. exs. XX, 4.
— tortuosum W. & K. XX, 3.
— — v. microcarpum Bornm. XX, 3.
Alyssum trichostachyum Rupr. XX, 4.
Amanita nitida Fries XVI, 20.
Amarantus Blitum L. XVIII, 41; XX, 90.
Amaryllis Carnarvonia DC. XVI, 23.
— Reginae × vittata XVI, 23.
Amblystegium confervoides Brid. XIX. 136.
— filicinum Lindb. XVII, 12.
— fluviatile Schpr. XVII, 12.
— irriguum Schpr. XVII, 12.
— Juratzkanum Schpr. XVII, 12.
— rigescens Limpr. XX, 87.
— riparium B. S. XVII, 12.
— serpens B.S. XVII, 12; XX, 88.
— subtile XVII, 12.
— varium Lindb. XX, 88.
Amelanchier vulgaris Mnch. XIX, 130, 135.
Amphoridium XVII, 17.
— Mougeoti Schpr. XVII, 8.
Anacamptis Durandii de Bréb. XVII, 48.
— pyramidalis Spr. weiß blühend XVII, 67.
— — v. tanayensis Chenev. XVII, 67.
Anagallis arvensis L. XIX, 88.
— — × coerulea XVIII, 30.
— coerulea Schreb. XVIII, 88.
Anchusa italica Retz XVI, 41.
Andromeda polifolia L. XVI, 133.
Andropogon Ischaemum L. XVI, 29; XVII, 125.
Anemone alpina L. XIX. 49.
— apennina L., Sclerotinia auf XVI, 6.
— coronaria L., Pilz auf XVI, 6.
— Hepatica L. XVII, 23, 29; XVIII, 77.
— hortensis L., Pilz auf XVI, 6.
— nemorosa L. XVIII, 78.
— — fl. pleno XVI, 5.
— — monströs XVI, 19: XVII, 123.
— — Pilz auf XIX, 57.
— — Sclerotinia auf XVI, 5, 6.
— — × ranunculoides XIX, 132.
— Pulsatilla L. XVIII, 58.
— ranunculoides L. XVIII, 78.
— — Sclerotinia auf XVI, 6.
— silvestris L. XVII, 29; XVIII, 58, 77; XIX, 135.
Anemonen, Gartenfeind der XVI, 5.
Angelica silvestris L. XVI, 131.
Anodus Donii B. S. s. Seligeria D.
Anomodon attenuatus Hartm. XVII, 11.
— longifolius Hartm. XVII, 18.
— — Schleich. XIX, 136.
— viticulosus Br. & Sch. XVII, 11, 16; XIX, 128.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Anthemis arvensis × tinctoria XVIII. 44.
— carpatica W. XX, 20.
— iberica MB. XX, 20.
— Kotschyana Boiss. XX, 19.
— leucopilodes Bornm. XX, 19.
Anthemis maritima L. XVI, 85.
— nobilis L. XVI, 85.
Anthericum Liliago L. XIX, 130, 136.
— ramosum L. XVII, 30; XIX, 95; XX, 90.
Anthyllis Vulneraria L. XVIII, 84; XIX, 99.
Antirrhinum Orontium L. XVIII, 67; XIX, 85.
Antitrichia curtipendula Br. XVII, 12.
Apera Spica venti P. B. XVI, 137; XX, 78.
Apfelfrucht, monströse XVIII, 36.
Aquilegia vulgaris L. XVII, 23; XVIII, 78; XIX, 98, 135; XX, 72.
— — Vergrünung von XIX, 126.
Arabis brassicaeformis Wallr. XIX, 130.
— hirsuta Scop. XVI, 125; XVIII, 59.
— sagittata DC. XIX, 132.
Archangelica officinalis Hoffm. XIX, 62.
Aristolochia Clematitis L. XVII, 32; XIX, 89.
— pallida W. XVI, 37, 108.
Armeria vulgaris W. XVIII, 56.
Armillaria robusta Alb. & Schw. XVIII, 69.
Arnica montana L. XVI, 132; XIX, 71.
Arnoseris pusilla Gaertn. XVIII, 55.
Arrhenatherum elatius M. & K. brachycladum XVI, 18.
— — glaucum XVIII, 73.
— — luxurians XVIII, 73.
Artemisia campestris L. XVIII, 64; XIX, 70.
— maritima L. XVI, 86.
— melanolepis Boiss. & Ky. XVIII, 46.
— vulgaris L. XVII, 24.
Arum maculatum L. XVII, 29; XVIII, 68; XIX, 91.
— — mit purpurner Scheide XVII, 123.
Aruncus silvester Kostel. s. Spiraea Aruncus.
Arundo intermedia Gmel. s. Calamagrostis epigeios variegata
— varia Schrad. s. Calamagrostis v.
Asarum europaeum L. XIX, 89.
Asparagus officinalis L. monströs XVII, 125.
Asperugo procumbens L. XIX, 84.
Asperula capitellata Hskn. & Bornm. XX, 13. 14.
— cynanchica L. XIX, 65.
Asperula glauca Bess. XIX, 130.
— lycia Stapf XX, 14.
— — v. scabriflora Bornm. XX, 14.
— nitida Sibth. XX, 13.
— — v. hirtella Boiss. XX, 13, 14.
— odorata L. XVI, 132; XVII, 24; XIX, 66.
— tinctoria L. XVII, 26; XVIII, 55.
Aspidium Braunii Spenn. XVII, 122.
— cristatum Sw. s. Polystichum cr.
— Filix mas Sw. s. Polystichum F. m.
— lobatum Sw. XVII, 122; XVIII, 57.
— Lonchitis Sw. XVI, 138.
— montanum Sw. s. Polystichum Oreopteris.
— spinulosum Sw. s. Polystichum sp.
Asplenium Adiantum nigrum L. v. Onopteris Heufl. XVI, 33.
— Filix femina Bernh. XVI, 139; XVIII, 74.
— — — monströs XVIII, 37.
— — — fissidens XVI, 139.
— — — multidentatum sublatipes XVI, 139.
— germanicum Weis XVI, 139; XVII, 121.
— Ruta muraria L. XIX, 139; XIX, 58.
— — — Brunfelsii XVI, 33.
— — — heterophyllum XVI, 33.
— — — Matthioli XVI, 33.
— — — pseudogermanicum XVI, 139.
— — — pseudo-Serpentini XVI, 139; XVIII, 57.
— septentrionale Hffm. XVI, 139; XIX, 58.
— Trichomanes L. XVI, 33, 139; XVII, 32.
— — auriculatum XVI, 33.
— — Harovii XVI, 33.
— — microphyllum XVI, 29.
— viride Huds. XVI, 33.
Aster alpinus L. XX, 87.
— Amellus L. XVIII, 64; XIX, 68, 130.
— Linosyris Bernh. XIX, 67.
— macrophyllus L. XVI, 132.
— salignus W. XVIII, 64.
Asterocephalus Wulfenii R. & Sch. XVI, 45.
Astragalus Cicer L. XVIII, 61, 72, 85; XIX, 130.
— danicus L. XX, 90.
— exscapus L. XVI, 7.
— glycyphyllos L. XVI, 128; XVIII, 85; XIX, 100.
— heterochrous Bornm. XVIII, 46.
Astrantia major L. XIX. 60.
— — v. elatior Friv. XVI, 46.
Athanasia maritima L. XVI, 84.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Athyrium Filix femina Rth. s. Asplenium F. f.
Atrichum XIX, 20, 21.
— angustatum Br. & Sch. XVII, 10.
— tenellum Br. & Sch. XVII, 10.
— undulatum P. B. XVII, 10.
Atriplex hortensis L. XVII, 127.
— tatarica L. XVIII, 30; XX, 88.
Atropa Belladonna L. XIX, 85.
Aulacomnium androgynum Schwgr. XVII, 85.
— palustre Schwgr. XVII, 10.
Aulax Scabiosae (Gir.) XVI, 15.
Avena Blavii Aschs. & Janka XVI, 35.
— — alpina XVI, 35.
— fatua L. XVI, 124, 137.
— flavescens L. v. variegata Gaud. XVIII, 73.
— praecox P. B. XVIII, 57.
— sativa L. XVI, 137.

Barbaraea arcuata Rchb. XVIII, 54.
Barbula XIX, 17.
— aloides B. S. XVII, 18.
— convoluta Hdw. XVII, 6.
— fallax Hdw. XVII, 6; XIX, 128.
— Fiorii Ventur. XIX, 129.
— Hornschuchiana Schultz XVII, 6.
— inclinata Schwgr. XVII, 7.
— laevipila Brid. XVII, 15.
— latifolia B. S. XVII, 7.
— muralis Hdw. XVII, 6.
— papillosa Wils. XVII, 7.
— pulvinata Jur., XVII, 7.
— revoluta Brid., XIX, 128, 129.
— rigida Schultz XVII, 6.
— rigidula (Dicks.) XVII, 6.
— ruralis Hdw. XVII, 7.
— spec. nova XIX, 129.
— subulata Brid. XVII, 7.
— tortuosa W. & M. XVII, 7.
— unguiculata Hdw. XVII, 6.
Bartramia Halleri Hdw. XVII, 10.
— ithyphylla Brid. XVII, 10.
— Oederi Sw. XVII, 10.
— pomiformis Hdw. XVII, 10.
Batrachium s. Ranunculus
Batrachospermum moniliforme Rth. XVI, 17.
Berberis vulgaris L. XVIII, 54, 59.
Berula angustifolia K. XIX, 61.
Beta vulgaris L. XVI, 38.
Betonica officinalis L. XVI, 40; XVII, 25; XIX, 87.
— — v. serotina XVI, 40.
Billbergia monströs XVIII, 36.
Biltz, E., Nekrolog XVIII, 21.
Biscutella cichoriifolia Loisl. XVI, 49.
Blaniulus guttulatus Grtn. XX, 81.
Blechnum Spicant Rth. XVIII, 57; XIX, 58.
Blindia acuta Br. eur. XVI, 17.
Blitum virgatum L. XVIII, 73.
Blütengalle an Calamagrostis epigeios XX, 83.
— — — phragmitoides XX, 82—84.
— — Phleum Boehmeri XX, 83.
Balbitius apicalis Worth. Sm. XVII, 36.
— Boltonii (Pers.) XVII, 36.
— conocephalus (Bull.) XVII, 36.
— fragilis (L.) XVII, 36.
— purifluus Lasch XVII, 36.
— tener Berkl. XVII, 36.
Boletinus clavipes Sacc. XVI, 20.
Boletus alutarius Fr. XX, 63.
— asprellus Fr. XX, 63.
— aurantiacus Jacobasch XVIII, 40; XIX, 24, 25.
— aurantiporus Horox XIX, 24, 25.
— bovinus L. XIX, 25; XX, 63.
— castaneus Bull. XX, 63.
— cavipes Klotzsch XVI, 20; XVII, 123; XVIII, 69; XX, 63.
— chrysenteron Fr. XX, 63.
— collinitus Fr. XX, 63.
— cruentus Ventur. XX, 63.
— cyanescens Bull. XX, 63.
— edulis Bull. XX, 63.
— elegans Schum. XIX, 24, 25; XX, 63.
— eriophorus Rostk. XX, 63.
— erythropus Pers. XX, 63.
— felleus Bull. XX, 63.
— flavidus Fr. XX, 63,
— flavus With. XIX, 24; XX, 63.
— floccopus Vahl XX, 63.
— granulatus L. XX, 63.
— hieroglyphicus Rostk. XX, 63.
— laricinus Berkl. XX, 63.
— lilaceus Rostk. XX, 63.
— lupinus Fr. XX, 63.
— luridus Schaeff. XX, 63.
— luteus L. XIX, 25; XX, 63.
— Meyeri Rostk. XX, 63.
— pachypus Fr. XX, 63.
— parasiticus Bull. XX, 63.
— piperatus Bull. XX, 63.
— pumilus Sauter XX, 63.
— purpurascens Rostk. XX, 63.
— purpureus Fr. XX, 63.
— regius Krombh. XX, 63.
— roseus Winter XX, 63.
— rubescens Trog. XX, 63.
— Satanas Lenz XVIII, 69; XX, 63.
— scaber Fr. XX, 63.
— sericeus Krombh. XX, 63.
— squamigerus XVI, 20.
— strobilaceus Scop. XX, 63.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Boletus subtomentosus L. XX, 63.
— sulfureus Fr. XX, 63.
— torosus Fr. XX, 63.
— tridentinus Bres. XX, 63.
— umbrinus Pers. XX, 63.
— vaccinus Fr. XX, 63.
— variegatus Sw. XX, 63.
— versipellis Fr. XX, 63.
— viscidus L. XX, 63.
Botrychium Lunaria Sw. XVII, 3; XVIII, 57, 69; XIX, 58.
Bovista XVIII, 27.
— nigrescens Pers. XX, 67.
— nuciformis Wallr. XX, 67.
— plumbea Pers. XX, 67.
— tunicata Fr. XX, 67.
Brachyodus trichodes N. & H. XVII, 6.
Brachypodium glaucovirens Murb. XVI, 34.
— pinnatum P. B. XVI, 138.
— silvaticum R. & Schol. XVI, 138.
Brachythecium albicans Br. & Sch. XVII, 13.
— glareosum Br. & Sch. XVII, 13.
— populeum Br. & Sch. XVII, 13.
— pseudoplumosum Brid. XVII, 13.
— reflexum Br. & Sch. XVII, 13.
— rivulare Br. & Sch. XVII, 13.
— rutabulum Br. & Sch. XVII, 13.
— salebrosum Schpr. XVII, 13.
— velutinum Br. & Sch. XVII, 13.
Brakteomanie bei Daphne Mezereum XVI, 26.
Bromus, Pleospora auf XVIII, 37.
— Alopecurus Poir. XX, 51.
— arvensis L. XVI, 35.
— — umbrosus XVI, 35.
— asper Murr. XVI, 138.
— cappadocicus Boiss. & Bal. XX, 49.
— — v. major Hskn. & Bornm. XX, 49.
— commutatus Schrad. XVI, 29.
— erectus Huds. XVIII, 74.
— induratus Hskn. & Bornm. XX, 48.
— — v. major Hskn. & Bornm. XX, 49.
— inermis Leyss. XVIII, 57.
— secalinus L. XVI, 35, 138.
— squarrosus L. XX, 50, 51.
— Torgesianus Hskn. & Bornm. XX, 50.
— transsilvanicus Steud. v. angustifolius Sagorski XVI, 34.
— — — montenegrinus Sagorski XVI, 34.
Brunella s. Prunella.
Bryum alpinum Huds. XVI, 17.
— argenteum L. XVII, 9, 16.
— bimum Schreb. XVII, 9.
Bryum caespitosum L. XVII, 9.
— capillare Dill. XVII, 8.
— cirrhatum H. & H. XVII, 15.
— Duvalii Voit XVII, 9, 17.
— erythrocarpum Schwgr. XVII, 19.
— inclinatum Br. & Sch. XVII, 9.
— intermedium Brid. XVII, 9.
— pallens Sw. XVII, 9.
— pendulum Schpr. XVII, 9.
— pseudotriquetrum Schwgr. XVII, 9.
— roseum Dill. XIX, 129.
— Zierii Dicks. XVI, 17.
Bunias orientalis L. XVIII, 41, 59, 79.
Bupleurum falcatum L. XVII, 24; XIX, 61, 120.
— longifolium L. XVIII, 63; XIX, 61.
— rotundifolium L. XIX, 61.
Butomus umbellatus L. XVI, 37; XVIII, 68; XIX, 90.
Buxbaumia aphylla L. XVI, 16; XVII, 11.
— indusiata Brid. XVI, 16; XVII, 11.
Buxus sempervirens L. XVI, 105.

Calamagrostis Adans., lusus subbiflorus bei XX, 74 ff.
— arundinacea (L.) Rth. XVI, 31, 137; XX, 77, 79.
— — subbiflora XX, 76, 80.
— — viridis XVII, 123.
— — vivipara XVII, 99, 123.
— — monströs XX, 76, 81.
— — v. brachyclada Tgs. XVI, 31; XVII, 99; XVIII, 57.
— — — — interrupta XVII, 123.
— — — — monströs XX, 76, 81.
— — × epigeios XVII, 101; XX, 53, 54, 61, 62, 91.
— — — — hirta XVII, 100, 101.
— — — — subbiflora XX, 75, 78, 80.
— — — — viridis XVII, 100.
— — × Halleriana subbiflora XX, 75, 80.
— — × lanceolata XVI, 32; XVII, 101; XX, 54, 61.
— — — — perarundinacea XVI, 32; XVII, 101, 123; XX, 80.
— — — — perlanceolata XVII, 127; XX, 80, 91.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Calamagrostis arundinacea × lanceolata puberula XVI, 32.
— — — subbiflora XX, 53, 74, 76, 77, 80.
— — — — viridis XVII, 101, 123, 124.
— — × neglecta XX, 76.
— — × phragmitoides, monströses Rudiment bei XX, 81.
— — × varia XVII, 124; XVIII, 47; XX, 52.
— acutiflora (Schrad.) Rchb. s. C. arundin. × epig.
— bihariensis Simk. s. C. epig. × varia.
— chalybaea XX, 77, 79.
— epigeios (L.) Rth. XVI, 31, 137; XVII, 85—87, 93, 97, 98, 123; XX, 55, 79.
— — variegata XX, 53.
— — virdis XX, 53.
— — v. laeviculmis Degen XX, 53.
— — — paralia Fr. XVII, 99; XX, 53.
— — — pseudoacutiflora Tgs. XVI, 31.
— — — subapicalis Tgs. XX, 53.
— — — subgeniculata Tgs. XX, 53.
— — — subquinquenervis XX, 53.
— — monströs XVII, 127; XX, 53.
— — Blüthengalle an XX, 83.
— — × lanceolata XVII, 93—99, 123; XX, 54.
— — × litorea XVII, 76, 101; XX, 53, 54.
— — — — perepigeios XVII, 101.
— — × neglecta XX, 54 ff.
— — × varia XVII, 91; XX, 54, 61.
— Gaudiniana Rchb. s. C. lanceolata canescens.
— Halleriana (Gaud.) P. B. XVI, 31, 137; XVII, 85—87, 90, 91, 99, 122, 123; XX, 52, 79.
— — pilosa XX, 91.
— — viridis XVII, 99.
— — v. gracilescens (Blytt) XVI, 137; XVII, 87; XX, 52.
— — — hypacrathera Tgs. XVII, 99; XX, 52.
— — — hypathera Tgs. XVII, 99; XX, 52.
— — — minutivalvis Tgs. XX, 52.
— — — mutica Tgs. XX, 52.
Calamagrostis Halleriana v. rivalis Tgs. XVII, 76 ff.
— — — subgeniculata Tgs. XVII, 99; XX, 52.
— — × varia XVII, 88 ff.; XX, 54, 61.
— — × varia intermedia XVII, 92.
— — × varia pervaria XVII, 93.
— — × varia viridis XVII, 93.
— Hartmaniana Fr. s. C. arund. × lanceol.
— Haussknechtiana Tgs. s. C. arund. × varia.
— hirta F. L. List XVII, 100.
— Huebneriana Rchb. s. C. epigeios viridis.
— indagata Tgs. & Hskn. s. C. arund. × Haller.
— lanceolata Rth. XVI, 31, 32, 137; XVII, 85—87, 93, 97, 98; XVIII, 73; XX, 52, 61, 79.
— — canescens XVI, 18; XVII, 124.
— — ramosa XVI, 30.
— — simplex XVI, 30.
— — viridis XVI, 30.
— — v. dubia Sanio XVII, 91.
— — — Gaudiniana s. f. canescens.
— — — hypacrathera Tgs. XVII, 94, 99; XX, 52.
— — — rigens Sanio XVII, 91.
— — — subulivalvis Tgs. XVII, 52.
— lapponica (Wlnb.) Hartm. XX, 77, 79.
— laxa Host XVII, 76.
— litorea (Schrad.) P. B. XVI, 32; XVII, 76, 80, 122; XX, 79, 80.
— — subbiflora XX, 74, 75, 80.
— — v. micrantha Tgs. XVII, 100.
— — — persica Boiss. XVII, 100.
— — × varia XX, 54, 61.
— — der Leipziger Floren XVII, 76 ff.
— montana Host XVI, 30.
— neglecta (Ehrh.) Fl. Wett. XVI, 30; XX, 55 ff., 77, 79.
— — v. borealis Laest. XX, 60.
— Neumaniana Tgs. s. C. epig. × lanceol.
— phragmitoides Hartm. XX, 52, 54, 79.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Calamagrostis phragmitoides monströs XX, 81.
— — Blüthengalle an XX, 82, 83.
— Prahliana Tgs. s. C. Halleriana × varia.
— strigosa Wlnb. XX, 60—62.
— tenella (Schrad.) Link XVII. 122; XX, 51, 79, 80.
— — viridis XVII, 99.
— — v. aristata K. XX, 51.
— — — mutica K. XVII, 99.
— Torgesiana Hskn. s. C. litorea × varia.
— varia (Schrad.) Link XVI, 30, 31; XVII, 88, 90—92, 100. 122, 124; XVIII, 73; XX, 52, 77, 79.
— — subbiflora XX, 75, 80.
— — umbrosa XX, 52.
— — v. inclusa Tgs. XVI, 30; XVII, 99; XX, 52.
— villosa Mutel s. C. Halleriana.
— Wirtgeniana Hskn. s. C. epig. × litorea.
Calamintha Acinos Clairv. XVI, 134.
— — weiß blühend XVII, 127.
— grandiflora Mnch. XVI, 39.
— Nepeta Clairv. XVI, 39.
Calla palustris L. XVI, 136.
Callitriche vernalis Kütz. XVIII, 62.
Calluna vulgaris Salisb. XVI, 133.
Calocera cornea Fr. XX, 66.
— palmata (Schum.) XX, 66.
— viscosa (Pers.) XX, 66.
Camelina dentata Pers. XVIII, 54.
— grandiflora Boiss. XX, 7, 8.
— hispida Boiss. XX, 8.
— subapressa Hskn. & Bornm. XX, 7, 8.
Campanula acutiloba Vatke XX, 33.
— argentea Lam. XX, 30.
— Aucheri DC. XX, 30.
— canescens Wall. XX, 31, 32.
— cissophylla Boiss. & Hskn. XX, 31—33.
— — v. brachycalyx Bornm. XX, 32.
— compacta Boiss. & Heldr. XX, 34.
— Cymbalaria Sibth. & Sm. XX, 31, 32.
— glomerata L. XVII, 31; XIX, 78.
— hemschinica C. Koch XX, 35.
— humillima DC. XX, 32.
— incanescens Boiss. XX, 31.
— latifolia L. XX, 70.
— Ledebourii Trautv. XX, 30.
— luristanica Freyn XX, 31.
— mardinensis Bornm. & Sint. XX, 31.
Campanula michauxioides Boiss. XX, 33.
— — v. dilacerata Bornm. XX, 33.
— myosotidifolia Boiss. XX, 30.
— olympica Boiss. XX, 35.
— patula L. XVII, 30.
— peregrina L. XX, 35.
— perpusilla DC. XX, 32.
— persepolitana Boiss. & Ky. XX, 32.
— persicifolia L. XIX, 77.
— Portenschlagiana R. & Sch. XVI, 42.
— pterocaula Hskn. XX, 34.
— pulvinaris Hskn. & Bornm. XX, 29.
— rapunculoides monströs XVI, 25.
— Rapunculus L. XIX, 77.
— Ruprechtii Boiss. XX, 30.
— sessiliflora Boiss. XX, 36.
— tridendata Schreb. XX, 30.
— — v. stenophylla Boiss. XX, 31.
Camptothecium lutescens Br. & Sch. XVII, 12; XIX, 128.
— nitens Schpr. XVII, 12.
Campylopus flexuosus Brid. XVI, 17; XVII, 5.
— fragilis Dicks. XVII, 18.
— turfaceus B. S. XVII, 5.
Campylostelium saxicola B. S. XVII, 7.
Cardamine pratensis L. XVII, 23.
— — weiß blühend XVII, 125.
— impatiens L. XVI, 126; XVIII, 79.
Carduus acanthoides L. weiß blühend XVII, 123; XX, 90.
— — × crispus XVII, 123.
— — — nutans XVI, 132; XVII, 127.
— crispus L. XIX, 73.
— defloratus L. XIX, 129, 135.
— — × platylepis XVII, 122.
— nutans L. weiß blühend XVII, 124.
Carex acuta L. XVII, 123; XVIII, 73.
— brizoides L. XVI, 7.
— Cajanderi Kükth. XVII, 115.
— canescens L. XVIII, 56.
— — v. fallax F. Kurtz XVII, 115.
— cryptocarpa C. A. Mey. XVII, 115.
— curvata Knaf XVI, 7.
— Davalliana Sm. XVI, 18, 29; XVIII, 56; XIX, 96; XX, 91.
— — Sieberiana XVI, 29.
— digitata L. XVI, 136; XIX, 96.
— dioica L. XVIII, 56.
— distans × Hornschuchiana XVIII, 44.
— disticha Huds. XVIII, 56.
— echinata Murr. s. C. stellulata.
— filiformis L. XVIII, 41.
— flava L. XVI, 29.
— — v. lepidocarpa Tsch. XVI, 29, 36.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Carex Hornschuchiana Hppe. XVI, 29; XVIII, 44.
— — gynobasis XVI, 29.
— — refracta XVI, 29.
— Lyngbyei Hornem. XVII, 115.
— montana L. XVI, 136; XIX, 96.
— muricata L. v. Pairaei F. Schultz. XVI, 29.
— Oederi Ehrh. XVI, 17; XVIII, 56.
— ornithopoda W. XVI, 18; XIX, 96, 135; XX, 91.
— paniculata L. XVIII, 41; XX, 91.
— paradoxa W. XIX, 5.
— pauciflora Lightf. XVI, 136.
— praecox Schreb. XVIII, 73.
— pulicaris L. XVIII, 56.
— remota L. XIX, 96.
— riparia Curt. acrogyna XVIII, 44.
— — v. reticulosa XVIII, 73.
— salina W. XVII, 115.
— Schreberi Schrank XVIII, 56.
— stellulata Good. XVI, 136.
— subspathacea Wormskj. XVII, 115.
— teretiuscula Good. XIX, 5.
— vulgaris Fr. XVI, 136.
Carlina acaulis L. XIX, 73.
— — coerulescens XVII, 121.
— vulgaris L. XVIII, 65; XIX, 73.
Carpinus Betulus L. XVI, 136.
— duinensis L. XVI, 37.
Catharinea XIX, 20, 22.
— Haussknechtii XIX, 22.
— undulata W. & M. XIX, 21, 22.
Caucalis arvensis Huds. XVI, 47.
— daucoides L. XIX, 64.
Cecidien an Juniperus excelsa MB. XIX, 127.
— — Haloxylon Ammodendron XIX, 127.
Cecidomyia-Larven an Calamagrostis XX, 82—84.
— — — Festuca pratensis XX, 84.
— — — Phleum Boehmeri XX, 83.
— — — Phragmites communis XX, 84.
— — — Poa nemoralis u. P. trivialis XX, 84.
— — — Secale XX, 84.
— — — Triticum XX, 84.
— tritici XX, 84.
Celtis australis L. XVI, 38; XVIII, 47.
Centaurea Bornmuelleri Hskn. XX, 21.
— divergens Vis. XVI, 44.
— gilanica Bornm. XX, 23.
— iberica Fisch. XVI, 18.
— Jacea L. XVII, 125.
— — v. commutata K. XVI, 7.
Centaurea montana L. XVII, 30, 118; XVIII, 65; XIX, 74, 130, 135.
— Pecho Alboff XX, 23.
— pergamacea DC. XX, 23.
— phrygia L. XVIII, 65; XIX, 74.
— psephelloides Freyn & Sint. XX, 23.
— pseudophrygia s. C. phrygia.
— pyrrhoblephara Boiss. XX, 23, 24.
— Scabiosa L. XIX, 74.
— — Galle an XVI, 15.
— solstitialis L. XVIII, 65.
Centranthus ruber DC. XVI, 82.
Cephalanthera ensifolia Rich. XVIII, 68; XIX, 136.
— grandiflora Bab. s. C. pallens.
— pallens Rich. XIX, 93, 136.
— — Form von XVI, 29; XVII, 75.
— — monströs XVII, 74.
Cephalaria leucantha Schrad. XVI, 45.
Cerastium arvense × triviale XVII, 127.
— brachypetalum Desp, XVIII, 42, 54.
— filiforme × latifolium XVII, 122.
— glutinosum Fr. XVI, 128; XVIII, 42, 54.
Ceratodon purpureus Brid. XVII, 7.
Ceratophyllum demersum L. XX, 88.
Ceterach officinarum W. XVII, 121.
Chaerophyllum aromaticum L. XX, 71.
— aureum L. XVI, 131.
— hirsutum L. XVI, 131; XVIII, 64; XX, 70.
Chaetotropis chilensis XX, 78.
Chamaesphacos ilicifolius Schrenk XVIII, 51.
— — v. longifolius Bornm. & Sint. XVIII, 51.
— longiflorus Bornm. & Sint. XVIII, 51.
Chamagrostis minima Borkh. XIX, 132.
Chara flexilis L. XVIII, 69.
— fragilis Desv. XVIII, 69.
Cheilanthes fimbriatus Vis. s. Ch. Szovitzii.
— Szovitzii Fisch. & Mey. XVI, 33.
Chenopodium glaucum L. XIX, 88.
— hybridum L. XVIII, 68.
— rubum L. XVIII, 68; XIX, 88.
— Vulvaria L. XVIII, 68; XIX, 88.
Chondrilla juncea L. XVIII, 72; XIX, 75.
Chrysanthemum corymbosum L. XVIII, 65; XIX, 70, 130.
— inodorum L. s. Tripleurospermum.
— Leucanthemum L. v. foliosum Willk. XX, 90.
— — monströs XVII, 125.
— segetum L. XVIII, 65; XIX, 71.
Chrysosplenium alternifolium L. XVIII, 63.
— oppositifolium L. XX, 71.
Cichorium Intybus L. XVII, 24.
— — weiß blühend XX, 90.
Cicuta virosa L. XVIII, 54, 63; XX, 88, 90.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Cicuta virosa L. v. tenuifolia Froelich XVII, 122.
Cinclidotus fontinaloides P. B. XVII, 7.
Cineraria spathulifolia Gmel. XVII, 7, 118; XVIII, 65; XIX, 71.
Circaea alpina L. XVI, 129; XVIII, 62.
— intermedia Ehrh. XVIII, 55.
— lutetiana L. XVIII, 62.
Cirsium acaule L. XVI, 132; XIX, 72.
— — caulescens XVIII, 44.
— — × arvense XVIII, 35.
— — × lanceolatum XVI, 28; XVIII, 44.
— — × oleraceum XVI, 28; XIX, 72.
— — × palustre XVI, 132; XVIII, 35.
— argenteum Vest s. C. arvense.
— arvense Scop. v. argenteum Vest XVI, 28; XX, 90.
— — — decurrens Tgs. XVI, 28.
— — × oleraceum XVI, 28; XX, 91.
— bulbosum All. s. C. tuberosum.
— — × oleraceum s. C. olerac. × tuberos.
— canum Much. XIX, 72.
— — × oleraceum XIX, 72.
— Dominii M. Schulze s. C. eriophor. × palustre
— eriophorum Scop. XVIII, 65; XIX, 72.
— — monströs XVII, 125.
— — × lanceolatum XVIII, 35.
— — × palustre XVIII, 34.
— heterophyllum All. XVI, 132.
— — × palustre XVI, 132.
— lanceolatum Scop. deformiert XVI, 28.
— — × oleraceum XVIII, 35.
— oleraceum × palustre XVI, 28, 132.
— — × tuberosum XVI, 28.
— palustre Scop. XIX, 72.
— tuberosum All. XVI, 28; XVIII, 65; XIX, 72.
Cladonia XIX, 58.
Clavaria abietina Pers. XX, 66.
— acuta Sowb. XX, 66.
— amethystina Bull. XX, 66.
— apiculata Fr. XX, 66.
— aurea Schaeff. XX, 66.
— Botrytes Pers. XX, 66.
— byssiseda Pers. XX, 66.
— cinerea Bull. XX, 66.
— coralloides L. XX, 66.
— corrugata Karst. XX, 66.
— crispula Fr. XX, 66.
— cristata Pers. XX, 66.
— flaccida Fr. XX, 66.
— flava Schaeff. XX, 66.
Clavaria formosa Pers. XX, 66.
— fragilis Holmsk. XX, 66.
— grisea Pers. XX, 66.
— inaequalis Fl. Dan. XX, 66.
— Kunzei Fr. XX, 66.
— Ligula Schaeff. XX, 66.
— muscoides L. XX, 66.
— palmata Pers. XX, 66.
— paludicola Libert XX, 66.
— pistillaris L. XX, 66.
— rufescens Schaeff. XX, 66.
— rufoviolacea Barl. XX, 66.
— rugosa Bull. XX, 66.
— spinulosa Pers. XX, 66.
— succica Fr. XX, 66.
— tenacella Pers. XX, 66.
Claviceps auf Anthoxanthum XVII, 123.
— purpurea Fr. XIX, 57.
Clematis sp. culta monströs XVII, 125.
— Vitalba L. XVII, 32.
— Viticella L. XVI, 50.
Climacium dendroides W. & M. XVII, 12.
Clinopodium vulgare L. XVI, 39, 134.
Cocconeis Placentula Ehrb. XIX, 136.
Cocconema lanceolatum Ehrb. XIX, 136.
Cochlearia Aucheri Boiss. XX, 6.
— — v. minor Boiss. XX, 6.
— heterophylla Hskn. & Bornm. XX, 5.
— Sintenisii Hskn. XX, 6.
Coeloglossum viride Hartm. s. auch Platanthera v. XVII, 67; XVIII, 68; XIX, 93.
— viride × Orchis incarnata XIX, 117.
— — × — maculata XVII, 67; XIX, 117.
Colchicum autumnale L. XVII, 26.
Colutea arborescens L. XVI, 70; XVII, 125.
Comarum palustre L. XVIII, 62; XX, 88.
Conium maculatum L. XVIII, 63.
Convallaria majalis L. XVII, 26, 118; XIX, 95.
— multiflora L. XVII, 30; XIX, 95.
— verticillata L. XVI, 108; XVII, 118; XIX, 56, 69.
Convolvulus cantabrica L. XVI, 41.
— sepium L. XVI, 41.
Coprinus alopecius Fr. XVII, 36.
— aratus Berkl. & Br. XVII, 36.
— atramentarius (Bull.) XVII, 36.
— comatus Fr. XVII, 36.
— coopertus Fr. XVII, 36.
— cyclodes Fr. XVII, 36.
— deliquescens (Bull.) XVII, 36.
— digitalis (Batsch) XVII, 36.
— domesticus (Pers.) XVII, 36.
— ephemeroides (Bull.) XVII, 36.
— ephemerus Fr. XVII, 36.
— extinctorius (Bull.) XVII. 36.
— filiformis Berkl. & Br. XVII, 36.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Coprinus fimetarius (L.) XVII, 36.
— — v. macrorrhizus Pers. XVII, 36.
— fuscescens (Schaeff.) XVII, 36.
— macrocephalus Berkl. XVII, 36.
— micaceus (Bull.) XVII, 36.
— narcoticus (Batsch) XVII, 36.
— nycthemerus Fr. XVII, 36.
— ovatus (Schaeff.) XVII, 36.
— picaceus (Bull.) XVII, 36.
— plicatus (Curt.) XVII, 36.
— Sceptrum Fr. XVII, 36.
— soboliferus Fr. XVII, 36.
— sociatus Fr. XVII, 36.
— stercorarius Fr. XVII, 36.
— tergiversans Fr. XVII, 36.
— truncorum (Schaeff.) XVII, 36.
Corallorrhiza innata R. Br. XVIII, 69.
— — v. ericetorum Rchb. fil. XVII, 75.
Cornus mas L. XVI, 81.
Coronilla montana Scop. XIX, 130, 135.
— — Pilz auf XX, 88.
— scorpioides K. XVI, 18.
— varia L. XVIII, 61.
— — weiß blühend XVI, 19.
Corticium Boltonii Fr. XX, 66.
— calceum (Pers.) XX, 66.
— coeruleum (Schrad.) XX, 66.
— confluens Fr. XX, 66.
— incarnatum Fr. XX, 66.
— lacteum Fr. XX, 66.
— livido-coeruleum Karst. XX, 66.
— nudum Fr. XX, 66.
— ochraceum Fr. XX, 66.
— quercinum (Pers.) XX, 66.
— roseum (Pers.) XX, 66.
— salicinum Fr. XX, 66.
— sarcoides Fr. XX, 66.
— seriale Fr. XX, 66.
Corydalis cava Schweigg. & Körte XVII, 118; XVIII, 59, 79.
— rupestris Ky. XVIII, 46.
Cotoneaster vulgaris Lindl. XVI, 129; XVIII, 90; XIX, 130.
Craterellus cornucopioides (L.) XX, 66.
— lutescens (Pers.) XX, 66.
Crepidotus alveolus Lasch XVII, 34.
— applanatus (Pers.) XVII, 34.
— chimophilus Berkl. & Br. XVII, 34.
— haustellaris Fr. XVII, 34.
— mollis (Schaeff.) XVII, 34.
— palmatus (Bull.) XVII, 34.
— scalaris Fr. XVII, 34.
Crepis abietina Boiss. & Bal. XX, 29.
— foetida L. XVI, 42,
— neglecta L. XVI, 42.
— praemorsa Tsch., XIX. 76.
— succisaefolia Tsch. XVI, 28; XIX, 76.
— virens Vill. XVI, 133.
Crucianella Sintenisii Bornm. XVIII, 49.
Crucibulum vulgare Tul. XX, 67.
Cuscuta Epithymum L. XVI, 41; XVIII, 55.
Cyathus striatus (Huds.) XX, 67.
— vernicosus Bull. XX, 67.
Cyclamen sp. culta monströs XVII, 125.
Cylindrothecium concinnum Schpr. XVI, 17; XIX, 128, 136.
Cynanchum Vincetoxicum R. Br. XVI, 133; XVII, 25, 31; XIX, 135.
— — gelb blühend XVIII, 37, 72.
— — monströs XVIII, 40.
Cynodon Dactylon Pers. XVI, 36.
Cynodontium polycarpum Schpr. XVII, 5.
Cynoglossum Columnae Biv. XX, 40.
— — Ten. XX, 40.
— nebrodense Guss. XX, 40, 41.
— — v. natolicum Bornm. XX, 40.
— officinale L. XVIII, 67; XX, 40.
— pictum Ait. XX, 40.
Cyperus fuscus L. XVIII. 56; XIX, 96.
Cyphella muscigena Fr. XX, 66.
Cypripedium Calceolus L. XVII, 38; XVIII, 69; XIX, 94, 136.
— — v. citrinum Hergt XVII, 39.
— — — flavum Rion XVII, 39; XIX, 101.
— — — viridiflorum M. Schulze XVII, 39.
— — monströs XVII, 38, 39; XX, 91.
Cystopteris fragilis Bernh. XVI, 139; XIX, 58, 98.
— — v. anthriscifolia K. XVI, 34.
— — — anthriscifolia lati-secta XVIII, 45.
— — m. polydactyla XVIII, 35.
Cystopus Tragopogonis (Pers.) XVII, 125.
Cytisus nigricans L. XVI, 128; XVIII, 61.
— ramentaceus Sieb. XVI, 48.
— Weldeni Vis. XVI, 48.

Dacryomyces stillatus N. ab E. XX, 67.
Dactylis glomerata L. XVI, 35.
— — hispanica XVII, 124.
Daedalea cinerea Fr. XX, 65.
— cinnabarina Secr. XX, 65.
— confragosa (Bolt.) XX, 65.
— latissima Fr. XX, 65.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Daedalea quercina (L.) XX, 65.
— unicolor (Bull.) XX, 65.
— zonata Schwein. XX, 65.
Daphne Mezereum L. XVI, 134; XIX, 88.
— — monströs XVI, 26, 29.
Datura Stramonium L. XVI, 41; XVIII, 67.
Delphinium Consolida L. XVII, 23.
— orientale Gay XX, 92.
Dentaria bulbifera L. XVII, 115, 118; XVIII, 54, 59, 79.
Denticula sinuata Sm. XIX, 136.
Dermocybe anomala Fr. XVII, 34.
— anthracina Fr. XVII, 34.
— azurea Fr. XVII, 34.
— canina Fr. XVII, 34.
— cinnabarina Fr. XVII, 34.
— cinnamomea (L.) XVII, 34.
— colymbadina Fr. XVII, 34.
— decumbens (Pers.) XVII, 34.
— depexa Fr. XVII, 34.
— fucatophylla Lasch XVII, 34.
— infucata Fr. XVII, 34.
— orellana Fr. XVII, 34.
— raphanoides (Pers.) XVII, 34.
— sanguinea (Wulf.) XVII, 34.
— subnotata (Pers.) XVII, 34.
— veneta Fr. XVII, 34.
Dianthus Armeria L. XVIII, 80; XIX, 98.
— Carthusianorum L. XVIII, 80; XIX, 98.
— ciliatus Guss. XVI, 48.
— deltoides L. XVIII, 81.
— obcordatus Reut. & Marg. XVI, 49.
— prolifer L. XVIII, 60.
— sanguineus Vis. XVI, 48.
— setisquameus Hskn. & Borm. XX, 8.
— superbus L. XVIII, 60, 72, 81.
Dichodontium pellucidum Schpr. XVII, 5.
Dicranella cerviculata Schpr. XVII, 5.
— heteromalla Schpr. XVII, 5.
— rufescens Schpr. XVII, 5.
— squarrosa Schpr. XVI, 16; XVII, 5.
— varia Schpr. XVII, 5, 16.
Dicranodontium longirostre Schpr. XVI, 17; XVII, 5.
Dicranoweisia crispula Hdw. XVII, 5.
Dicranum flagellare Hdw. XVII, 5.
— fulvum Hook. XVII, 5.
— longifolium Hdw. XVII, 5.
— montanum Hdw. XVII, 5.
— palustre B. S. XVII, 5.
— scoparium Hdw. XVII, 5; XVIII, 129.
— spurium Hdw. XVII, 5.
— Starckii W. & M. XVII, 15.
— undulatum Turn. XVII, 5, 16.
Dictamnus albus L. XVII, 31; XVIII, 61, 83; XIX, 99.
Didymodon luridus Hornsch. XIX, 128, 129.
— rigidulus Sm. XIX, 128.
Didymophysa Aucheri Boiss. XVIII, 46.
Diervilla Lonicera Mill. XIX, 65.
Digitalis ambigua Murr. s. D. grandiflora.
— grandiflora Lamk. XVI, 133; XVII, 31; XVIII, 41, 67; XIX, 85.
— laevigata W. & K. XVI, 41.
Dionysia aretioides XVII, 127.
— bachtiarica Bornm. & Alex. XIX, 134.
— Haussknechtii Bornm. XIX, 134.
Diospyrus Lotus XVIII, 47.
Diphyscium foliosum Mohr XVII, 11.
Diplotaxis muralis DC. XVIII, 54.
Dipsacus pilosus L. XVI, 6; XVIII, 64.
— silvestris Huds. XIX, 67.
Dissodon Froelichianus saprophyt XVI, 16.
Ditrichum flexicaule Hoppe XIX, 128, 135.
Doronicum Columnae XX, 72.
Dorycnium herbaceum Vill. XVI, 48.
Draba Bornmuelleri Prantl XX, 7.
— imeretica Rupr. XX, 7.
Dracocephalum Aucheri Boiss. XVIII, 46.
Drosera rotundifolia L. XVI, 75, 127; XX, 88.
Dryas octopetala L. XVI, 72.

Echinops bipinnatus Freyn & Sint. XX, 21.
— foliosus Somm. & Lev. XX, 21.
— persicus Stev. XX, 20.
— Raddeanus Somm. & Lev. XX, 21.
Echinospermum Lappula L. XVI, 41.
Echium vulgare L. XVI, 41.
— — monströs XVI, 19.
Ecuador, Pflanzen aus XIX, 134.
Edraianthus Pumilio DC. XX, 29, 30.
Elaphomyces granulatus Fr. XIX, 57.
Elatine hexandra DC. XVIII, 82.
Elodea canadensis Rich. & Michx. XVIII, 56, 68.
Elssholzia Patrini Grcke. XVIII, 67.
Elymus arenarius L. XVII, 105; XX, 90.
— europaeus L. XVIII, 57; XX, 90.
Empetrum nigrum L. XVI, 134.
Encalypta ciliata Hffm. XVII, 8.
— contorta Lindb. XVI, 17; XIX, 128, 136.
— streptocarpa Hdw. XVII, 8, 16.
— vulgaris Hdw. XVII, 8.
Ephedra campylopoda C. A. Mey. XVI, 34.
— nebrodensis Tin. XVI, 34.
Ephemerum serratum Hoppe XVII, 9.
Epilobium adnatum Grsb. XVI, 28; XVII, 108.
— — × parviflorum XVII, 108.
— alpinum L. XVI, 129.
— anagallidifolium Lamk. XVI, 129.
— angustifolium L. XVII, 30.
— collinum Gmel. XVI, 28, 129.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Epilobium collinum × palustre XVI, 129.
— — × roseum XVI, 129.
— glanduligerum Knaf. s. E. collin. × ros.
— heterocaule Borb. s. E. montan. × ros.
— hirsutum L. XVII, 106.
— — v. contractum Hskn. XVII, 107.
— — × parviflorum XVII, 107.
— — — — seminudum XVII, 108.
— — — — sericeum XVII, 108.
— Krausii Uechtr. & Hskn. s. E. collin. × palustre.
— montanum L. XVI, 129.
— — × roseum XVI, 129.
— nutans Schmidt, Tsch. XVI, 129; XVII, 122.
— palustre L. XVI, 129.
— parviflorum Schreb. XVII, 107.
— — apricum XVII, 107.
— — tomentosum XVII, 107.
— roseum Schreb. XVI, 129.
— sericeum Schumach. XVII, 108.
Epipactis abortiva Wettst. XIX, 122.
— alba Crntz. s. Cephalanthera pallens.
— latifolia All. XVII, 29; XIX, 93.
— — Form von XVII, 74.
— — v. acutiloba Hut. XVII, 74.
— — — viridans XVII, 74.
— microphylla Sw. XVI, 17; XVII, 126, 127.
— palustris Crntz. XVI, 18; XVII, 74; XVIII, 44, 56, 68; XIX, 93.
— rubiginosa Gaud. XIX, 93.
— — pallida XIX, 122.
— — v. viridiflora Sanio XVII, 74.
— — monströs XVII, 74.
— sessilifolia Peterm. s. E. violacea.
— violacea Dur. Ducq. XVII, 74, 126; XIX, 132.
Epipogon aphyllus Sw. XX, 88.
Epithemia alpestris Sm. XIX, 136.
Equisetum arvense L. XIX, 59.
— Heleocharis Ehrh. s. E. limosum.
— limosum L. XVII, 123.
— — Limaeanum XVIII, 45.
— — verticillatum XVIII, 45.
— — — polystachyum XVI, 29.
— — m. biceps XVI, 29.
— palustre L. fallax XVIII, 44, 45.
— silvaticum L. XVII, 124; XVIII, 74; XIX, 59.
Erica Tetralix L. XX, 90.
Erigeron acer L. XIX, 68.
— canadensis L. XIX, 68.
Eriophorum angustifolium Rth. XVI, 136; XIX, 96.
— latifolium Hoppe XVI, 7, 29; XIX, 96.
— polystachyum s. E. angustifol.
— vaginatum L. XVI, 136; XX, 88.
Erucastrum Pollichii Schpr. & Sp. XVIII, 59.
Ervum cassubicum Peterm. s. Vicia cass.
— pisiforme Peterm. s. Vicia pisif.
— silvaticum Peterm. s. Vicia silvat.
Eryngium amethystinum L. v. tenuifolium Boiss. & Heldr. XVI, 46.
— asperifolium Laroche XX, 13.
— campestre L. XIX, 130.
— giganteum MB. XX, 12, 13.
— Haußknechtii Bornm. XX, 13.
Erysimum amasianum Hskn. & Bornm. XX, 2.
— cheiranthoides L. XVI, 126.
— — Mückengalle an XVIII, 43.
— — Stengelmarkgalle an XVIII, 44.
— odoratum Ehrh. XVI, 126; XVIII, 79.
— — Mückengalle an XVIII, 43.
— orientale R. Br. XVIII, 79.
— ponticum Hskn. & Bornm. XX, 1, 2.
— repandum L. XVIII, 79; XIX, 98.
— strictum Fl. Wett. XVII, 126.
— Szovitsianum Boiss. XX, 2.
— thyrsoideum Boiss. XX, 2.
Erythraea Centaurium L. XVI, 92; XVII, 25, 30; XVIII, 66; XIX, 84.
— — v. transiens Wittr. XVI, 42.
— linariifolia Pers. XVI, 17, 21; XVII, 126.
— pulchella Fr. XVIII, 66.
— — subelongata XVI, 42.
Eucladium XVII, 17.
— verticillatum Br. eur. XVI, 16; XVII, 18.
Eupatorium cannabinum L. XVI, 132; XVII, 30; XVIII, 64; XIX, 67.
Euphorbia amygdalina L. XIX, 130, 135.
— Cyparissias L. monströs XVIII, 37.
— dulcis Jcq. XIX, 89.
— Esula L. XVI, 134; XVII, 124; XIX, 90.
— platyphyllos L. XX, 90.
— — Form von XVII, 124.
— verrucosa Lmk. XVII, 118; XIX, 89.
Euphrasia lutea L. XVIII, 55, 67.
— officinalis L. XVII, 31.
— — im Harz wachsende Formen von XVII, 18—21,
— — v. montana Jord. XVI, 133.
— — — nemorosa Pers. XVI, 133.
— — — Rostkoviana Hayne XVI, 133.
— pectinata Ten. v. herzegovina Sagorski XVI, 40.
— puberula Jord. XVI, 40.
— tatarica Fisch. XVI, 41.
Eurhynchium crassinervium XVII, 15.
— praelongum Br. & Sch. XVII, 12.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Eurhynchium Stokesii Br. & Sch. XVII, 12.
— striatulum Br. XVI, 16.
— striatum Br. & Sch. XVII, 12.
— Tommasinii Ruthe XVI, 16.
Evonymus europaea L. XVIII, 61, 83; XIX, 99
Exidia saccharina Fr. XX, 67.

Fagus silvatica L. XVI, 132.
Farsetia incana R. Br. XVIII, 59.
Fegatella conica Raddi XIX, 58, 136.
Ferulago galbanifera K. XVI, 46.
Festuca arundinacea Schreb. XIX, 130.
— elatior L. XIX, 130.
— — Cecidomyia-Larven an XX, 84.
— elatior × Lolium perenne XVIII, 44.
— — — — — Form von XVI, 29.
— gigantea Vill. XVI, 138; XIX, 130.
— heterophylla Haencke XVI, 138; XIX, 130.
— loliacea Curt. s. F. elatior × Lol. perenne.
— Myurus L. XVI, 34; XIX, 130.
— ovina L. XIX, 130, 131.
— — v. duriuscula K. barbulata XIX, 132.
— — — — genuina XIX, 132.
— — — glauca Schrad. XVI, 138; XIX, 131, 132.
— — — sulcata Hack. XIX, 130, 132.
— — — valesiaca Schleich. XIX, 132.
— — — vulgaris K. firmula XIX, 132
— — — — genuina XIX, 132.
— pratensis Huds. s. F. elatior.
— rubra L. XIX, 130.
— sciuroides Rth. XIX, 130.
— silvatica Vill. XVI, 124; XVIII, 57; XIX, 130.
Filago arvensis Fr. XIX, 69.
— germanica L. XVIII, 64; XIX, 69.
Filipendula Ulmaria Maxim. s. Spiraea Ulm.
— vulgaris Mnch. s. Spir. Filipend.
Fissidens adiantoides Hdw. XVII, 5; XIX, 136.
— bryoides Hdw. XVII, 5.
— exilis Schpr. XVII, 5.
— incurvus Schwgr. XVII, 5.
— pusillus Wils. XVII, 5.
— taxifolius Hdw. XVII, 5.
Fistulina hepatica (L.) XX, 63.
Flammula abrupta Fr. XVII, 33.
— alnicola Fr. XVII, 33.
— azyma Fr. XVII, 33.
— carbonaria Fr. XVII, 33.
— decipiens Worth. Sm. XVII, 33.
— flavida (Schaeff.) XVII, 33.
— gummosa Lasch XVII, 33.
Flammula helomorpha Fr. XVII, 33.
— limulata Fr. XVII, 33.
— Liquiritiae (Pers,) XVII, 33.
— lubrica Fr. XVII, 33.
— ochrochlora Fr. XVII, 33.
— paradoxa Kalchbr. XVII, 33.
— penetrans Fr. XVII, 33.
— spumosa Fr. XVII, 33.
— Tammii Fr. XVII, 33.
Fontinalis antipyretica L. XVII, 11.
— squamosa Dill. XVI, 17; XVII, 11.
Fragaria collina Ehrh. v. Hagenbachiana Lange XVI, 7.
— elatior Ehrh. monströs XVII, 115.
— vesca L. XVII, 24.
Fraxinus monströs XVII, 125.
Fritillaria alpina Freyn & Sint. XX, 47.
— armena Boiss. XX, 47,
— — v. lucida Hskn. & Bornm. XX, 47.
— assyriaca Bak. XX, 45, 46.
— aurea Schott XX, 46, 47.
— Bornmuelleri Hskn. XX, 47.
— canaliculata Bak. XX, 46.
— chlorantha Hskn. & Bornm. XX, 44, 46.
— cilicico-taurica Hskn. & Bornm. XX, 46.
— conica Boiss. XX, 45.
— imperialis L. XX, 46.
— Karelini Fisch. XX, 46.
— kurdica Boiss. & Noë XX, 46, 48.
— minuta Boiss. & Noë XX, 46.
— Olivieri Bak. XX, 46.
— persica L. XX, 46,
— Pinardi Boiss. XX, 46—48.
— — Stapf XX, 48.
— Reuteri Boiss. XX, 45, 46.
— Straussii Bornm. XX, 45.
— tulipifolia MB. XX, 47.
— viridiflora Post XX, 45.
— wanensis Freyn XX, 46.
— zagrica Stapf XX, 46.
Frullania dilatata L. XIX, 128.
— Tamarisci XIX, 58.
Fumaria capreolata L. XVIII, 79.
Fumaria fasciculata Schpr. XVII, 18.
— hibernica Hook. XVII, 1.
— hygrometrica Hdw. XVII, 9.
— mediterranea Lindb. XVII, 1.

Gagea arvensis Schult. XIX, 94.
— lutea Schult. XIX, 94.
— Soleimani Bornm. XVIII, 46.
Galeobdolon luteum Huds. XVI, 134; XIX, 87.
— — Winterblätter von XVI, 13.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Galeopsis acuminata Rchb. s. G. pubesc. × Tetrahit.
— Ladanum L. XVI, 134.
— — v. canescens Schult. XVI, 40.
— — — latifolia Hoffm. XVIII, 55.
— pubescens Bess. XVI, 134.
— — × Tetrahit L. XVI, 134.
— Tetrahit L. XVI, 134.
Galera conferta (Bull.) XVII, 34.
— lateritia Fr. XVII, 34.
— muiophila Lasch XVII, 34.
— mycenopsis Fr. XVII, 34.
— ovalis Fr. XVII, 34.
— pityria Fr. XVII, 34.
— rubiginosa Pers. XVII, 34.
— spartea Fr. XVII, 34.
— tenera (Schaeff.) XVII, 34.
— vestita Fr. XVII, 34.
— villaeformis Fr. XVII, 34.
Galium aristatum L. XVII, 121.
— aureum Vis. v. scabrifolium Boiss. XX, 15.
— boreale L. XIX, 66.
— Bornmuelleri Hskn. XX, 14, 15.
— Cruciata Scop. XVII, 30; XIX, 66; XX, 70.
— flavescens Borb. XX, 15.
— flavicans Borb. XX, 15.
— lucidum All. XVI, 46.
— marisense Simk. XX, 15.
— ochroleucum W. & K. XX, 15.
— purpureum L. XVI, 46.
— — v. flavescens Heuff. XX, 15.
— rhodopeum Velen. XX, 15.
— rotundifolium L. XVI, 132.
— saxatile L. XVI, 132.
— scabrifolium Halácsy XX, 15.
— silvaticum L. XVI, 132; XVIII, 66.
— silvestre Poll. XVIII, 67.
— — v. glabrum Sm. XX, 90.
— subuliferum Somm. & Lev. XX, 15.
— verum L. XVI, 132.
Geaster XVIII, 27.
— Bryantii Berkl. XX, 67.
— fimbriatus Fr. XX, 67.
— fornicatus (Huds.) XX, 67.
— hygrometricus Pers. XX, 67.
— limbatus Fr. XX, 67.
— Morganii XX, 67.
— rufescens Pers. XX, 67.
— saccatus Ell. & Ev. XX, 67.
— Schmiedeli Vitt. XX, 67.
— striatus (DC.) XX, 67.
— velutinus Lloyd XX, 67.
Genista germanica L. XVII, 31; XVIII, 83.
— sagittalis L. XVI, 48.
— tinctoria L. XVII, 24; XVIII, 83.
Gentiana campestris L. XIX, 80, 83.
— ciliata L. XVII, 31; XIX, 84.
Gentiana ciliata monströs XVI, 26.
— crispata Vis. XVI, 42.
— cruciata L. XVII, 25, 31; XVIII, 66; XIX, 80.
— germanica W. XVIII, 66; XIX, 80—82.
— — var. XIX, 81.
— obtusifolia W. XIX, 82—84.
— Pneumonanthe L. XVIII, 66; XIX, 80.
— spathulata Bartl. XIX, 82.
Geranium argenteum L. XX, 11.
— cinereum Cav. XX, 11.
— hybridum Hskn. s. G. pusill. × pyrenaic.
— palustre L. XVI, 128; XX, 70.
— phaeum L. XX, 68 ff.
— — v. austriacum Wiesb. XX, 73, 74.
— — — hungaricum Wiesb. XX, 73, 74.
— — — lividum L'Hérit. XX, 73.
— pratense L. XVIII, 83.
— pusillum × pyrenaicum XX, 10, 11.
— — — — Bruegger XX, 10.
— pyrenaicum L. XVIII, 42; XX, 10, 11, 71.
— — v. depilatum Somm. & Lev. XX, 10.
— — patulivillosum Hskn. & Bornm. XX, 10.
— rhaeticum Bruegger s. G. pyrenaicum.
— Robertianum L. XVII, 23.
— sanguineum L. XVIII, 28, 60, 83.
— silvaticum L. XVIII, 83; XIX, 99.
— — parviflorum XIX, 132.
— subcaulescens L'Hérit. v. leucophaeum Hskn. & Bornm. XX, 11.
— — — subacutum Bornm. XX, 11.
Geum rivale L. XVII, 30.
— urbanum L. XVII, 24.
Glaucium corniculatum Curt. v. tricolor Bernhardi XVII, 124.
— luteum L. XVII, 124.
Glaux maritima L. XVI, 18; XVIII, 56.
Glechoma hederacea L. XVI, 25.
Globularia Alypum L. XVI, 97.
— cordifolia L. XVI, 38.
Glyceria fluitans R. Br. XVI, 138.
— plicata Fr. XVI, 138.
Glycyrrhiza echinata L. XVI, 48.
Gnaphalium dioicum L. XVII, 32; XIX, 70.
— Pichleri Murb. XVI, 45.
— silvaticum L. XIX, 69.
— uliginosum L. XIX, 69.
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) XVII, 35.
— gracilis Berkl. XVII, 35.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Gomphidius maculatus (Scop.) XVII, 35.
— roseus Fr. XVII, 35.
— viscidus (L.) XVII, 35.
Goodyera repens R. Br. XVII, 75; XVIII, 68.
Grandinia granulosa (Pers.) XX, 65.
Gratiola officinalis L. XVI, 41, 96.
Grimmia anodon XVII, 15.
— apocarpa Hdw. XVII, 7.
— conferta Fuck. XVII, 7.
— crinita Brid. XVII, 7.
— Donii Sm. XVII, 18.
— Hartmannii Sch. XVII, 18.
— orbicularis Brch. & Schpr. XVII, 15, 18.
— ovata W. & M. XVII, 7.
— plagiopodia Hdw. XVII, 7.
— pulvinata Sm. XVII, 7.
Guepinia helvelloides Fr. XVIII, 69; XX, 67.
Gurkenpflanzen, durch Tausendfüße beschädigt XVIII, 44.
Gymnadenia albida Rich. XVIII, 68; XIX, 93.
— — v. tricuspis Beck. XVII, 69; XIX, 118, 119.
— — × conopsea XIX, 118.
— — × nigra XVII, 69; XIX, 119.
— — × Herminium Monorchis XIX, 119.
— angustifolia Ilse XVII, 70.
— Aschersonii Bruegger s. G. albida × conopsea.
— conopsea R. Br. XVII, 70; XIX, 93.
— — weiß blühend XVII, 70.
— — v. densiflora Fr. XVII, 71.
— — — — weiß blühend XVII, 71.
— — — ecalcarata Rchb. fil. XVII, 71.
— — — sibirica Rchb. fil. XVII, 71.
— — monströs XVII, 70; XIX, 119.
— — × nigra XVII, 71; XIX, 120.
— — — — brachystachya XVII, 71.
— — — — megastachya XIX, 120.
— — × odoratissima XVII, 72; XIX, 120.
— — × Orchis latifolia XVII, 72.
— — × — incarnata XIX, 120.
— nigra Rchb. fil. XVII, 68; XIX, 118.
— — gelb blühend XVII, 68.
— — variegata XVII, 68.
— — × odoratissima XVII, 68; XIX, 118, 119.
— odoratissima Rich. XVII, 69; XIX, 119.
Gymnadenia odoratissima oxyglossa XVII, 69; XIX, 119.
— — × rubra XVII, 70.
— rubra Wettst. XVII, 69; XIX, 118.
Gymnostomum rupestre Schleich. XVII, 6.
— tenue Schrad. XVII, 6, 17.
Gypsophila aretioides XVII, 127.
— fastigiata L. XVII, 126.
— muralis L. XVIII, 60; XX, 88.
— repens L. XIX, 49.
Gyroweisia tenuis Schr. XVII, 1.

Haloxylon Ammodendron, Cecidium an XIX, 127.
Harmamyia poae an Poa nemoralis XX, 84.
Haußknecht, C., Nekrolog XVIII, 1 ff.
Haussknechtia elymaitica Boiss. XVIII, 10.
Hebeloma birrus Fr. XVII, 33.
— claviceps Fr. XVII, 33.
— crustuliniforme (Bull.) XVII, 33.
— diffractum Fr. XVII, 33.
— fastibile Fr. XVII, 33.
— firmum Pers. XVII, 33.
— glutinosum Lindgr. XVII, 33.
— holophaeum Fr. XVII, 33.
— longicaudum Pers. XVII, 33.
— magnimamma Fr. XVII, 33.
— mesophaeum Fr. XVII, 33.
— mussivum Fr. XVII, 33.
— petiginosum Fr. XVII, 33.
— sinuosum Fr. XVII, 33.
— spoliatum Fr. XVII, 33.
— sterile Fr. XVII, 33.
— strophosum Fr. XVII, 33.
— testaceum Batsch XVII, 33.
— versipelle Fr. XVII, 33.
Hedera Helix L. XIX, 64.
Hedwigia ciliata Hdw. XVII, 8.
Heleocharis carniolica K. v. prolifera Borb. XVI, 36.
— palustris R. Br. v. major Sonder XVI, 36.
Helianthemum vulgare Gaertn. XVII, 30.
Helichrysum angustifolium DC. XVI, 84.
— arenarium DC. XVII, 31, 105, 125; XVIII, 55.
Heliotropium europaeum L. XVI, 41.
Helleborus viridis L. XVI, 10; XIX, 135.
Helminthia echioides Gaertn. XVIII, 65.
Helvella brevipes Gill. XVIII, 28.
— elastica Bull. XVII, 125.
— Ephippium Lév. XVII, 125.
Hepatica s. Anemone.
Heracleum Sphondylium L. XVI, 46, 131.
— — rot blühend XVI, 19.
— — monströs XVI, 19.
— — v. elegans Jcq. XX, 90.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Herbar, altes, in Hildburghausen XVIII, 28.
— des Dr. Ratzenberger in der Gothaer Bibliothek XVIII, 35, 36.
Herbare, alte, in der Gothaer Bibliothek XVI, 20.
„Herbarium Haußknecht", Stiftung XVIII, 19, 20.
Herniaria glabra L. XX, 90.
Heterocladium dimorphum Br. & Sch. XVII, 11.
— heteropterum Br. & Sch. XVII, 18.
Hieracium alpinum L. XIX, 49.
— aurantiacum L. XVIII, 66.
— Auricula L. XIX, 76.
— boreale Fr. XVI, 133.
— magyaricum s. auch H. praealtum K. v. Bauhini K.
— — × pratense XVIII, 35.
— murorum L. XVI, 133; XIX, 77.
— Obornyanum N. P. s. magyar. × prat.
— praealtum Vill. XVIII, 55; XIX, 76.
— — agronomon XVI, 43.
— — Fussianum XVI, 44.
— — glabriceps XVI, 44.
— — gracillimum XVI, 42, 43.
— — hololeion XVI, 44.
— — minutiflorum XVI, 43.
— — sub-Fussianum XVI, 42—44.
— — veleticum XVI, 42, 43.
— — ziljevanum XVI, 44.
— — v. Bauhini K. XVII, 18.
— — — florentinum (W.) K. XVI, 28, 42.
— pratense Tsch. XIX, 76.
— umbellatum L. XVI, 133.
— vulgatum Fr. XVI, 133; XIX, 76.
Himantoglossum hircinum Spr. XVII, 67.
Hippocrepis comosa L. XVIII, 85; XIX, 100, 135.
— unisiliquosa L. XVI, 71.
Homalia trichomanioides Br. & Sch. XVII, 12,
Homalothecium sericeum Br. & Sch. XVII, 12.
Homogyne alpina Cass. XVI, 132.
Hordeum secalinum Schreb. XVIII, 57; XIX, 97; XX, 91.
— murinum L. XVIII, 69; XIX, 97.
Hydnum aurantiacum Alb. & Schw. XX, 65.
— auriscalpium L. XX, 65.
— candidum Schmidt XX, 65.
— cinereum Bull. XX, 65.
— cirrhatum Pers. XX, 65.
— compactum Pers. XX, 65.
— coralloides Scop. XVIII, 69; XX, 65.
— cyathiforme Schaeff, XX, 65.
— diversidens Fr. XX, 65.
Hydnum ferrugineum Fr. XX, 65.
— fulgens Fr. XX, 65.
— fuliginoso-violaceum Kalchbr. XX, 65.
— graveolens Delast. XX, 65.
— imbricatum L. XX, 65.
— leoninum Fr. XX, 65.
— melaleucum Fr. XX, 65.
— Quéletii Fr. XX, 65.
— repandum L. XX, 65.
— rufescens Pers. XX, 65.
— scabrosum Schaeff. XX, 65.
— Schiedermayeri Heufl. XX, 65.
— scrobiculatum Fr. XX, 65.
— velutinum Fr. XX, 65.
— versipelle Fr. XX, 65.
— zonatum Batsch XX, 65.
Hydrocharis Morsus ranae L. XVIII, 56.
Hydrocybe balaustina Fr. XVII, 35.
— candelaris Fr. XVII, 35.
— castanea (Bull.) XVII, 35.
— damascena Fr. XVII, 35.
— decipiens Pers. XVII, 35.
— diluta Pers. XVII, 35.
— duracina Fr. XVII, 35.
— fasciata Fr. XVII, 35.
— firma Fr. XVII, 35.
— fulvescens Fr. XVII, 35.
— germana Fr. XVII, 35.
— illumina Fr. XVII, 35.
— isabellina Batsch XVII, 35.
— Krombholzii Fr. XVII, 35.
— lencopus Bull. XVII, 35.
— milvina Fr. XVII, 35.
— pateriformis Fr. XVII, 35.
— Reedii Berkl. XVII, 35.
— rigens Fr. XVII, 35.
— rubricosa Fr. XVII, 35.
— saniosa Fr. XVII, 35.
— saturnina Fr. XVII, 35.
— subferruginea Batsch XVII, 35.
— tortuosa Fr. XVII, 35.
Hydrurus foetidus (Vauch.) XIX, 128.
Hylocomium brevirostre Schpr. XIX, 136.
— splendens Hdw. monströs XX, 91.
Hyoscyamus niger L. XVII, 25; XVIII, 67.
— — v. agrestis Kit. XVIII, 67.
Hypericum Coris L. XX, 87.
— elegans Steph. XVI, 18.
— glutinosum Ait. v. vestitum Christ XIX, 126.
— — Phytoptocecidium an XIX, 126.
— hirsutum L. XVIII, 82; XIX, 99.
— humifusum L. XVIII, 82; XIX, 99.
— montanum L. XVIII, 82; XIX, 99.
— perforatum L. XVII, 23.
— pulchrum L. XVIII, 54, 82.
— quadrangulum L. XVIII, 82; XIX, 99.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Hypericum tetrapterum Fr. XVIII, 82.
Hypholoma aelopus Fr. XVII, 35.
— Artemisiae Passer. XVII, 35.
— Candolleanum Fr. XVII, 35.
— capnoides Fr. XVII, 35.
— cascum Fr. XVII, 35.
— coriarium Comm. critt. ital. XVII, 35.
— dispersum Fr. XVII, 35.
— egenulum Berkl. XVII, 35.
— elaeodes Fr. XVII, 35.
— epixanthum Fr. XVII, 35.
— fasciculare Huds. XVII, 35.
— intensum Passer. XVII, 35.
— lacrymabundum Fr. XVII, 35.
— melantinum Fr. XVII, 35.
— pyrotrichum Holmsk. XVII, 35.
— silaceum Pers. XVII, 35.
— storeum Fr. XVII, 35.
— sublateritium Schaeff. XVII, 35.
— velutinum Pers. XVII, 35.
Hypnum alopecurum XVII, 13.
— arcuatum Lindl. XVII, 14.
— brevirostrum Schpr. XVII, 14.
— chrysophyllum Brid. XVII, 13, 14; XIX, 128.
— commutatum Hdw. XIX, 135, 136.
— cordifolium Hdw. XVII, 14.
— Crista castrensis L. XVII, 14.
— cupressiforme L. XVII, 14.
— cuspidatum L. XVII, 14.
— exannulatum Guemb. XVII, 13.
— falcatum Brid. XVII, 13.
— filicinum X. XIX, 135.
— fluitans Dill. XVII, 13.
— incurvatum Schrad. XVII, 18; XIX, 136.
— intermedium Lindl. XVII, 13.
— Kneiffii B. S. XVII, 13.
— loreum L. XVII, 13.
— Mackayi Brid. XVI, 17.
— molluscum Hdw. XVII, 14; XIX, 128, 135.
— palustre Huds. XVII, 14; XIX, 135.
— purum L. XVII, 14.
— revolvens Sw. XVII, 13.
— rugosum L. XVII, 13; XIX, 128.
— Schreberi W. XVII, 14.
— scorpioides Dill. XVII, 13.
— splendens B. S. XVII, 14.
— squarrosum L. XVII, 13
— stellatum Schreb. XVII, 13.
— stramineum Dicks. XVI, 17; XVII, 14.
— subsulcatum Schpr. XVII, 13.
— triquetrum L. XVII, 13.
— uncinatum Hdw. XVII, 13.
— vernicosum Lindl. XVII, 13.
Hypochoeris maculata L. XVII, 29.
Hyssopus officinalis L. XX, 91.
Iberis roseo-purpurea Sagorski XVI, 49.
Ilex Aquifolium L. XVI, 68.
Illecebrum verticillatum L. XVIII, 55.
Impatiens Noli tangere L. XVI, 128.
— parviflora DC. XVIII, 60.
Imperatoria Ostruthium L. XVI, 131.
Inocybe asinina Kalchbr. XVII, 33.
— auricoma Batsch XVII, 33.
— caesariata Fr. XVII, 33.
— calamistrata Fr. XVII, 33.
— capuzina Fr. XVII, 33.
— deglubens Fr. XVII, 33.
— descissa aurivenia Fr. XVII, 33.
— destricta Fr. XVII, 33.
— dulcamara Alb. & Schw. XVII, 33.
— eutheles Berkl. & Brid. XVII, 33.
— fibrosa Sowb. XVII, 33.
— flocculosa Berkl. XVII, 33.
— geophylla Sowb. XVII, 33.
— grata Weinm. XVII, 33.
— lacera Fr. XVII, 33.
— lanuginosa Bull. XVII, 33.
— lucifuga Fr. XVII, 33.
— mamillaris Passer. XVII, 33,
— mutica Fr. XVII, 33.
— obscura Pers. XVII, 33.
— perbrevis Weinm. XVII, 33.
— phaeocephala Vill. XVII, 33.
— pyriodora Pers. XVII, 33.
— relicina Fr. XVII, 33.
— rimosa Bull. XVII, 33.
— sambucina Fr. XVII, 33.
— scabella Fr. XVII, 33.
— triulca Fr. XVII, 33.
Inoloma alboviolaceum Pers. XVII, 34.
— argentatum Fr. XVII, 34.
— argutum Fr. XVII, 34.
— bolare Pers. XVII, 34.
— Bulliardii Pers. XVII, 34.
— callisteum Fr. XVII, 34.
— cinereoviolaceum Fr. XVII, 34.
— craticium Fr. XVII, 34.
— cyanites Fr. XVII, 34.
— muricinum Fr. XVII, 34.
— pavonium Fr. XVII, 34.
— sublanatum Sowb. XVII, 34.
— suillum Fr. XVII, 34.
— traganum Fr. XVII, 34.
— violaceum (L.) XVII, 34.
Inula britannica L. XVIII, 55, 64.
— candida (L.) XVI, 44.
— Conyza DC. XVI, 132; XIX, 69.
— Helenium L. XVI, 132.
— hirta L. XIX, 69.
— — × salicina XIX, 69.
— Oculus Christi L. XVI, 44.
— salicina L. XVII, 31; XVIII, 64; XIX, 68.
Iris bohemica Schmidt XVI, 7; XVIII, 28.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Iris Gueldenstaedtiana Lepech. XX, 43.
— Haussknechtii Bornm. XX, 43.
— Kerneriana Aschs. & Sint. XX, 43, 44.
— ochroleuca L. XX, 44.
— Pseudacorus L. XIX, 94.
— salsa Pall. XX, 43.
— sibirica L. XVI, 18, 29; XIX, 94.
Irpex canescens Fr. XX, 65.
— fuscoviolaceus Fr. XX, 65.
— lacteus Fr. XX, 65.
— paleaceus Thore XX, 65.
Isatis tinctoria L. XVIII, 80.
Isopyrum caespitosum Boiss. & Hoh. XVIII, 46.
Isothecium myurum Brid. XVII, 12.

Jasione montana L. XVII, 30; XIX, 77.
Juncus acutiflorus Ehrh. XVI, 136.
— anceps Laharpe v. hercegovinus Sagorski XVI, 36.
— — × lamprocarpus XVI, 37.
— bufonius L. XVI, 136.
— — v. fasciculatus K. XVIII, 41; XX, 90.
— effusus L. XVI, 136.
— filiformis L. XVI, 136; XIX, 96.
— Leersii Marss. XVI, 36.
— Murbecki Sagorski s. J. anceps × lamprocarpus
— spuarrosus L. XVI, 136.
— supinus Mnch. XVI, 136.
— Tenageia Ehrh. XVIII, 56.
Jungermannia Muelleri N. ab E. XIX, 128.
Juniperus communis L. XVI, 113.
— excelsa MB. XIX, 127.
— macropoda Boiss. s. J. excelsa.
— Oxycedrus L. XVI, 113.
Jurinea frigida Boiss. XVIII, 46.

Kirsche, monströse XVIII, 33.
Kryptogamen in Thals Sylva hercynia XIX, 49 ff.

Lactuca abietina (Boiss. & Bal.) XX, 29.
— adenophora Boiss. & Ky. XX, 26.
— albana (Stev.) XX, 28.
— Bourgaei (Boiss.) XX, 28.
— cacaliaefolia (MB.) XX, 28.
— cataonica Boiss. & Hskn. XX, 26—28.
— deltoidea C. A. Mey. XX, 26—28.
— dubia (C. Koch) XX, 28.
— mulgedivides Boiss. & Ky. XX, 26, 27.
— muralis (L.) Less. XVI, 132; XIX, 75; XX, 90.
— perennis L. XVIII, 66; XIX, 75.
Lactuca prenanthoides (MB.) XX, 28.
— salicifolia (C. Koch) XX, 29.
— Scariola L. XVIII, 55, 66; XIX, 75.
— seticuspis Boiss. XX, 26—28.
— sonchoides Boiss. & Bal. XX, 26, 27.
— variabilis Bornm. XX, 27, 28.
— virosa L. XVII, 126.
— Visianii Bornm. XX, 29.
— sonchifolia DC. XX, 29.
— — Panč. XX, 29.
— — (Vis. & Panč.) XX, 29.
— — W. XX, 29.
Lamium crinitum Montb. & Auch. XVIII, 46.
— maculatum L. v. lacteum Wallr. XVIII, 73; XIX, 132.
Lampsana grandiflora Boiss. XVII, 122.
Lappa minor DC. XVI, 132.
— nemorosa Koernicke XVII, 122; XIX, 73.
Laserpitium latifolium L. XVII, 31; XVIII, 63; XIX, 64, 130, 135.
— prutenicum L. XVIII, 63.
Lasiagrostis Calamagrostis Link XVI, 36; XVII, 105.
Lathraea Squamaria L. XIX, 86.
Lathyrus montanus Bernh. s. Orobus tuberosus L.
— niger Bernh. s. Orobus niger.
— Nissolia L. XVI, 18.
— palustris L. XVIII, 41.
— pratensis L. v. sepium XX, 70.
— silvestris L. XVI, 128; XVIII, 62, 86.
— vernus Bernh. s. Orobus vernus.
Lavandula Stoechas L. XVI, 97.
Lavatera thuringiaca L. XVI, 48; XVII, 126.
Lemanea fluviatilis Ag. XVI, 17.
— torulosa Ag. XVI, 17.
Lemna gibba L. XIX, 91.
— polyrrhiza L. XVIII, 73.
Leonurus Cardiaca L. XVI, 134; XVII, 32; XVIII, 56; XIX, 87.
Lepidium Draba L. XVII, 105; XVIII, 80.
— graminifolium L. XVI, 49.
— latifolium L. XVIII, 59.
— ruderale L. XVIII, 59.
Lepigonum rubrum Wlnb. XVI, 128; XX, 90.
Leptobryum pyriforme Schpr. XVII, 9, 16.
Leptotrichum flexicaule Schpr. XVII, 1, 7, 16.
— homomallum Schpr. XVII, 7.
— pallidum Hpe. XVII, 7.
— tortile Hpe. v. pusillum Br. Sch. XVII, 7.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Lepturus persicus Boiss. XX, 51.
— — v. glaberrimus Hskn. XX, 51.
— pubescens Bertol. XX, 51.
Leskea catenulata Metten. XVI, 16.
— polycarpa Ehrh. XVII, 11; XIX, 128.
Leucanthemum vulgare Sm. s. Chrysanthem. Leucanth.
Leucobryum glaucum Schpr. XVII, 5, 16.
Leucodon sciuroides Schwgr. XVII, 12.
Leucojum vernum L. XVII, 118; XIX, 94.
— — monströs XVI, 19.
Levisticum officinale K. XVI, 131.
Libanotis montana All. XVIII, 63; XIX, 62, 130, 135.
Ligustrum vulgare L. XIX, 79.
Lilium bulbiferum L. XVI, 10; XX, 92.
— Martagon L. XVII, 30; XIX, 94.
— — v. Cattaniae Vis. XVI, 37.
Linaria arvensis Desf. XVIII, 67.
— vulgaris Mill. XVII, 25, 30.
— — v. albida Jacobasch XVI, 19.
— — — citrina XVI, 19.
— — — Hahnii Feld XVI, 19.
— — monströs XVI, 24; XVIII, 37.
— — — mit Pelorien XX, 89.
Linosyris vulgaris Cass. s. Aster Linosyris.
Linum perenne L. XX, 90.
— tenuifolium L. XVII, 125, 126; XVIII, 60, 82.
Listera cordata R. Br. XVI, 136; XVIII, 31; XIX, 122.
— ovata R. Br. XVII, 29; XIX, 94.
— — Formen von XVII, 75.
— — monströs XVII, 75.
Lithospermum officinale L. XVII, 126.
— purpureo-coeruleum L. XVII, 30; XVIII, 28; XIX, 85, 135.
Littorella lacustris L. XIX, 88.
Lolium perenne L. cristatum XIX, 97.
— temulentum L. XVI, 34.
Lonicera amoena Zabel s. L. floribunda × tatarica.
— Caprifolium L. XVI, 81; XVIII, 72.
— coerulescens Dippel s. L. tatarica × Xylosteum.
— etrusca Savi XVI, 46.
— floribunda × tatarica alba XVI, 8.
— — — — rosea XVI, 8.
— micranthoides Zabel s. L. nigra × tatar.
— nigra L. XVI, 132; XVII, 118; XIX, 65.
— — glabrescens XVI, 8.
— — grandibracteata XVI, 8.
— — latifolia XVI, 8.
— — puberula XVI, 8.
— — × tatarica XVI, 8.
Lonicera nigra × Xylosteum XVI, 8.
— tatarica × Xylosteum XVI, 8.
— Xylosteum L. XVI, 8; XIX, 65.
— — glabrescens XVI, 8.
— — longipedunculata XVI, 8.
— — stenophylla XVI, 8.
— — subcordata XVI, 8.
— — thuringiaca XVI, 8.
— — vulgaris XVI, 8.
Lophocolea heterophylla N. ab E. XIX, 129, 135.
Lotus corniculatus L. XVI, 48.
— minoriflorus Bornm. XX, 92,
— tenuifolius Rchb. XVI, 18.
— uliginosus Schk. XVI, 128.
Lotus der Ilias XVIII, 47.
— — Lotophagen XVIII, 47.
— des Virgil und Plinius XVIII, 47.
Lotusbirne XVIII, 47.
Lotusholz XVIII, 47.
Lunaria biennis Mnch. XX, 88.
— rediviva L. XVIII, 54.
Lupinus polyphyllus Lindl. XX, 88.
Luzula flavescens Gaud., Mycocecidium an XIX, 125.
— Forsteri DC., Mycocecidium an XIX, 125.
— pallescens Bess. XVI, 136.
— multiflora Lej. v. sudetica W. XVI, 136.
— pilosa W. v. prolifera Doell XIX, 125.
— — Mycocecidium an XIX, 125.
Lychnis diurna Sibth. XVI, 128.
— Flos cuculi L. mit „gefüllten“ Blüten XX, 91.
— Viscaria L. XVIII, 60, 81; XIX, 99.
Lycium rhombifolium Dippel XVII, 126.
Lycoperdon aculeatum Rostk. XX, 67.
— aestivale Bon. XX, 67.
— areolatum Rostk. XX, 67.
— Bovista L. XX, 67.
— caelatum Bull. XX, 67.
— cepaeforme Wallr. XX, 67.
— cinereum Bon. XX, 67.
— constellatum Fr. XX, 67.
— cruciatum Rostk. XX, 67.
— cupricum Bon. v. ochraceum Bon. XX, 67.
— ericaceum Bon. XX, 67.
— favosum Rostk. XX, 67.
— flavescens Rostk. XX, 67.
— foetidum Bon. XX, 67.
— fuscum Bon. XX, 67.
— — v. flavofuscum Bon. XX, 67.
— — — glaucofuscum Bon. XX, 67.
— gemmatum Batsch XX, 67.
— — v. echinatum Pers. XX, 67.
— — — furfuraceum Fr. XX, 67.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Lycoperdon gemmatum v. papillatum Schaeff. XX, 67.
— — — perlatum Batsch XX, 67.
— granulatum Wallr. XX, 67.
— hirtum Pers. XX, 67.
— laxum Bon. XX, 67.
— pistilliforme Bon. XX, 67.
— punctatum Rostk. XX, 67.
— pusillum Batsch XX, 67.
— pyriforme Schaeff. XX, 67.
— rusticum Bon. XX, 67.
— saccatum Fl. Dan. XX, 67.
— serotinum Bon. XX, 67.
Lycopodium alpinum L. XVII, 121; XIX, 59.
— annotinum L. XVI, 138; XVIII, 57, 69; XIX, 59.
— Chamaecyparissus A. Br. XVI, 44.
— clavatum L. XVI, 138; XVII, 31; XVIII, 57; XIX, 59.
— complanatum L. XVII, 121.
— inundatum L. XVI, 138.
— Selago L. XVI, 138; XVIII, 69; XIX, 59.
Lysimachia ciliata L. XVIII, 43; XIX, 8—10.
— nemorum L. XVI, 134; XVIII, 68.
— Nummularia L. XVII, 26; XIX, 133.
— punctata L. XVII, 106; XVIII, 68.
— suaveolens Schoenh. XIX, 133.
— vulgaris L. XVII, 30; XIX, 88.
— Zawadskii Wiesn. XIX, 133.
Lythrum Salicaria L. XVII, 30.

Madotheca laevigata Dumort. XVI, 17; XIX, 58.
Majanthemum bifolium Schmidt XVII, 26, 29; XIX, 95.
Malva Alcea L. XVIII, 60, 81; XIX, 99.
— moschata L. XVIII, 54, 60, 72, 82.
— silvestris L. XVI, 128.
— — v. pendula Jacob. XVII, 124.
— — — prostrata Jacob. XVII, 124.
Marchantia polymorpha L. XVII, 58, 128, 136.
Marrubium vulgare L. XVII, 26; XVIII, 56, 67.
Matricaria discoidea DC. XVIII, 55; XIX, 70.
Medicago apiculata W. XVI, 69.
— corymbifera Schmidt XVII, 106.
— lupulina L. corymbosa XVII, 106.
— — monströs XVII, 106.
Melampyrum bihariense Kerner XVI, 40.
— cristatum L. XVI, 29; XVIII, 67; XIX, 86.
— nemorosum L. XIX, 86.
— silvaticum L. XVI, 133.
— subalpinum Juratzka XVI, 40.
Melandrium rubrum Gcke. s. Lychnis diurna Sibth.
Melica Aschersoniana M. Schulze s. M. nutans × picta.
— ciliata L. XVI, 138; XIX, 97.
— nutans L. XVI, 138; XIX, 97.
— — × picta XVI, 7.
— picta C. Koch XVIII, 28, 73; XIX, 97; XX, 91.
— — viridiflora XVII, 123.
— uniflora Retz XIX, 97.
Melilotus dentata Pers. XVI, 18.
— — monströs XVII, 106.
— italica Desr. XVII, 123.
— messanensis XVIII, 47.
— officinalis L. XVII, 23.
Mentha aquatica L. XVI, 133; XVII, 25.
— — × arvensis XVI, 133.
— arvensis L. XVI, 133.
— banatica H. Braun XVI, 39.
— cervina L. XVI, 98.
— piperita L. XVI, 39.
— sativa L. s. M. aquat. × arvensis.
— silvestris L. v. candicans Crtz. XVI, 133.
Menyanthes trifoliata L. XVIII, 55, 66; XIX, 80; XX. 88.
Mercurialis perennis L. XVI, 134; XVII, 26; XIX, 90.
Meridion circulare Ag. XIX, 136.
Merulius aurantiacus Klotzsch XX. 65.
— Corium (Pers.) XX, 65.
— lacrymans (Wulf.) XX, 65.
— papyraceus Fr. XX, 65.
Metzgeria pubescens Raddi XVI, 16.
Meum athamanticum Jacq. XVI, 131; XVIII, 63.
Micromeria croatica (Pers.) XVI, 38.
— Juliana (L.) Benth. XVI, 39.
— Kerneri Murb. s. M. Juliana.
— thymifolia (Scop). XVI, 38.
Microsporen bei Sphagnum = Ustilago Sphagni XVI, 17.
Microstylis monophylla Lindl. XIX, 122.
Mimulus luteus L. XVII, 126; XX, 71.
Mnium affine Schwgr. XVII, 9; XIX, 129.
— — v. elatum Lindb. XVII, 9.
— cinclidioides Hueb. XVII, 10, 16, 17.
— cuspidatum Hdw. XVII, 9.
— hornum L. XVII, 10.
— punctatum Hdw. XVII, 9.
— rostratum Schrad. XVII, 9; XIX, 136.
— rugicum Laurer XVII, 1, 10.
— Seligeri Jur. XVII, 1, 9.
— serratum Brid. XVII, 10.
— spinosum Schwgr. XVII, 10.
— spinulosum Br. & Sch. XIX, 129, 135.
— stellare Hdw. XVII, 10; XIX, 136.
— undulatum Dill. XVII, 9; XIX, 129.
Moehringia muscosa L. XVI, 128.
— trinervia Clairv., Pilz auf XIX, 136.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Molinia coerulea Mnch. XVIII, 56.
— — arundinacea XVII, 123.
Monotropa Hypopitys L. XVI, 133; XIX, 79.
Monstrositäten XVI, 16, 19, 24—27; XVII, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 53—55, 58, 65, 70, 72—75, 106, 115, 123—125, 127; XVIII, 33, 35—37, 40, 41, 64; XIX, 102, 113, 114, 119, 121, 132; XX, 76, 81, 89, 91, 92.
Montagnites Candollei XVII, 36.
Montia rivularis Gmel. XVI, 129; XVII, 126.
Morchella bispora Sorokin XVIII, 28.
Mückengalle an Erysimum XVIII, 43.
— — Vaccinium uliginosum XVI, 6.
Mulgedium alpinum Cass. XVI, 132; XVIII, 66.
— macrophyllum DC. XVIII, 66.
— sonchifolium Vis. & Panč. XX, 29.
— tataricum DC. XX, 29.
— variabile Hskn. & Bornm. XX, 27, 28.
Muscari comosum Mill. XVI, 37; XVII, 110.
— Knauthianum Hskn. XVII, 108 bis 110.
— racemosum Mill. XVI, 7.
— Ruppianum Hskn. XVII, 108—110.
— tenuiflorum Tsch. XVII, 108—110.
— — major XVII, 108—110.
— — minor XVII, 108—110.
Myosotis caespitosa Schultz XVIII, 55; XX, 88.
— lactea Bnngh. s. M. silvatica.
— palustris With. v. strigulosa Rchb. XVIII, 73.
— silvatica Hffm. XVIII, 73.
— — weiß blühend XVI, 18.
Myosurus minimus L. XVIII, 58.
Myriophyllum spicatum L. XVIII, 90.
Myurella julacea Br. Eur. XVI, 17.
Myxacium alutipes Lasch XVII, 34.
— arvinaceum Fr. XVII, 34.
— collinitum Fr. XVII, 34.
— elatius Fr. XVII, 34.
— epipoleum Fr. XVII, 34.
— grallipes Fr. XVII, 34.
— mucifluum Fr. XVII, 34.
— nitidum Fr. XVII, 34.
— pluvium Fr. XVII, 34.
— suratum Fr. XVII, 34.
— vibratile Fr. XVII, 34.

Naucoria anguinea Fr. XVII, 34.
— arvalis Fr. XVII, 34.
— Centunculus Fr. XVII. 34.
Naucoria cerodes Fr. XVII, 34.
— conspersa (Pers.) XVII, 34.
— effugiens Quél. XVII, 34.
— hilaris Fr. XVII, 34.
— hyperella Fr. XVII, 34.
— innocua Lasch XVII, 34.
— micans Fr. XVII, 34.
— pediades Fr. XVII, 34.
— scolecina Fr. XVII, 34.
— semiorbicularis (Bull.) XVII, 34.
— sideroides (Bull.) XVII, 34.
— sobria Fr. XVII, 34.
— tenax Fr. XVII, 34.
— temulenta Fr. XVII, 34.
— Vervacti Fr. XVII, 34.
Naumann, Ferdin., Nekrolog, XIX, 1.
Navicula elliptica Kg. XIX, 136.
Neckera complanata Br. & Sch. XVII, 11.
— crispa Hdw. XVII, 11; XIX, 128, 135.
— pennata Hdw. XVII, 18.
Nelumbium speciosum W. XVIII, 47.
Neottia Nidus avis Rich. XVI, 136; XIX, 94.
Nepeta bithynica Bornm. XX, 41.
— Cataria L. XVI, 134; XVII, 31.
— grandiflora MB. XVIII, 67.
— marrubioides Boiss. & Bal. XX, 41.
— nuda L. XX, 41.
— — v. pastoralis Bornm. XX, 41.
Nicandra physaloides Grtn. XVIII, 55.
Nigella arvensis L. XVIII, 58, 78.
Nitzschia amphioxis Sm. XIX, 136.
— linearis Sm. XIX, 136.
Nuphar luteum Sm. XVII, 23; XVIII, 59, 79.
Nymphaea alba L. XVIII, 59.
— candida Psl. XVI, 125.
— coerulea XVIII, 47.
— Lotus XVIII, 47.

Odontidium mesodon Kg. XIX, 136.
Oenanthe fistulosa L. XVIII, 41; XIX, 62.
— Phellandrium Lmk. XVIII, 63.
Oenothera biennis L. XVIII, 62.
Onoclea Struthiopteris s. Struthiopteris germanica.
Ononis repens L. XVII, 24,
— spinosa L. weiß blühend XVII, 123.
Onopordon Acanthium L. XVIII, 65; XIX, 73.
Onosma albo-roseum Fisch. & Mey. XX, 39.
— — v. albiflorum Bornm. XX, 39.
— — — macrocalycinum Bornm. XX, 39.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Onosma albo-roseum v. macrocarpum Bornm. XX, 39.
Ophioglossum vulgatum L. XVII, 29; XVIII, 37, 45, 74; XIX, 58.
— — monströs XVIII, 35, 41.
Ophrys apifera Huds. XIX, 116.
— — aurita XVII, 65; XIX, 116.
— — Botteroni XVII, 65, 66.
— — friburgensis XVII, 65.
— — immaculata XIX, 116.
— — purpurata XIX, 116, 117.
— — Trollii XIX, 115.
— — monströs XVII, 65.
— arachnites Murr. XIX, 116.
— — mit abweichend geformter Lippe XVII, 55.
— — coronifera XVII, 56; XIX, 113.
— — flavescens XVII, 56.
— — intermedia XVII, 56; XIX, 113.
— — linearis XVII, 56; XIX, 113.
— — platycheila XVII, 56.
— — monströs XVII, 55.
— — × aranifera XVII, 57, 63, 64.
— — × muscifera XVII, 57.
— aranifera Huds. XVII, 58, 60.
— — atrata specularia XVII, 63.
— — fissa XVII, 60.
— — flavescens XIX, 114.
— — fucifera XVII, 59, 61; XIX, 114, 115.
— — — monströs XIX, 113.
— — genuina XIX, 114, 115.
— — litigiosa XVII, 61, 62.
— — pseudo-speculum XVII, 59—62; XIX, 115.
— — rotulata XVII, 59, 61; XIX, 115.
— — subtrilobata XVII, 61.
— — virescens Gren. XVII, 59, 62.
— — — Moggr. XVII, 58, 59; XIX, 114, 115.
— — — monströs XIX, 114.
— — viridiflora XVII, 59.
— — monströs XVII, 58.
— — × Bertolonii XVII, 62.
— — — — disjecta XVII, 63.
— — — — Gelmii XVII, 62, 63.
— — — — pseudo-Bertolonii XVII, 63.
— — × muscifera XVIII, 35.
— — — — apiculata XVII, 64.
— — — — gibbosa XIX, 115.
— — — — hybrida XVII, 64; XIX, 115.
— Bertolonii Mor., Abweichungen der Lippe XVII, 65.
— Botteroni Chod. XIX, 116.
Ophrys cornuta Stev. XIX, 117.
— exaltata Ten. XVII, 57.
— fuciflora (Crntz.) s. O. arachnites.
— fusca Lk. iricolor XIX, 113.
— hybrida Pokorny gibbosa XVIII, 35.
— integra Sacc. XVII, 48; XVIII, 35; XIX, 116, 117.
— lutea × Scolopax XVII, 62.
— lutescens Grelet XVII, 61.
— muscifera Huds. XVIII, 68; XIX, 93, 135, 136.
— — abweichend gefärbt XVII, 55.
— — gelblichweiß blühend XIX, 113.
— — apiculata XVII, 55; XIX, 113.
— — bombifera XVII, 55; XIX, 113.
— — monströs XVII, 54; XIX, 113.
— obscura Beck XVII, 56, 57.
— Tommasinii Vis. XVII, 65; XIX, 115.
Orchis baltica Klinge XIX, 108.
— brachiolata Lang XIX, 117.
— cochleata Fleischm. & M. Schze. XVII, 46.
— cordigera Fr. XVII, 52.
— — v. bosniaca (Beck) XVII, 53.
— coriophora L. v. fragrans Gr. & Godr. XVII, 41; XIX, 102.
— — monströs XVII, 70.
— coriophora × ustulata XIX, 102.
— cruenta Mueller XIX, 106.
— fusca Jcq. XIX, 91, 135.
— — weiß blühend XVII, 44.
— — Abweichungen XVII, 44.
— — moravica XIX, 104.
— — × militaris XVII, 44; XIX, 103, 135.
— — × Simia XVII, 44, 45; XIX, 110.
— globosa L. weiß blühend XVII, 45.
— haematodes Rchb. XIX, 105.
— Huteri M. Schze. s. O. Morio × variegata.
— incarnata L. XIX, 92, 107, 109.
— — weiß blühend XVII, 48.
— — Abänderung XVII, 48.
— — albiflora XIX, 105.
— — brevicalcarata XVII, 49.
— — genevensis XVII, 49.
— — haematodes × Traunsteineri XIX, 107.
— — lanceata XIX, 105, 106.
— — ochroleuca XVII, 49; XIX, 105.
— — serotina XVII, 49; XIX, 105.
— — × latifolia XVII, 49; XIX, 105—107, 109.
— — — — weiß blühend XIX, 107.
— — × (latifolia × maculata) XVII, 49; XIX, 110.
— — × maculata XVII, 49; XIX, 108, 110.
— — × Traunsteineri XVII, 49; XIX, 110.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Orchis Kromayeri M. Schze. s. O. maculata × mascula.
— latifolia L. XVII, 50; XIX, 92, 106, 109, 111.
— — baltica XVII, 51.
— — brevifolia XVII, 51; XIX, 111.
— — helodes XIX, 112.
— — impudica XVII, 51.
— — pumila XVII, 51; XIX, 111.
— — × maculata XVII, 51; XIX, 111.
— — × Morio XVIII, 35; XIX, 111.
— — × sambucina XVII, 51; XIX, 111.
— — × Traunsteineri XVII, 52; XIX, 111.
— laxiflora Lmk. micrantha XIX, 105.
— macra Klge. XVII, 49.
— maculata L. XVIII, 68; XIX, 62, 106, 109.
— — weiß blühend XVI, 18.
— — Formen der XIX, 112.
— — helodes XVII, 54.
— — Meyeri XVII, 53, 54; XIX, 112.
— — saccigera XVII, 53.
— — sudetica XIX, 112.
— — monströs XVII, 53.
— — × mascula XVIII, 35; XIX, 112, 121.
— — × Traunsteineri XVII, 54; XIX, 112.
— mascula L. XIX, 92, 135.
— — weiß blühend XVII, 54; XIX, 104.
— — acutiflora XVII, 45.
— — cochleata XVII, 47.
— — obtusiflora XVII, 45; XIX, 104.
— — speciosa XVII, 45; XIX, 104.
— — — monströs XVII, 45.
— — — × pallens XVII, 46.
— — Stabiana XVII, 45; XIX, 104.
— — × Morio XIX, 104.
— — × pallens XVII, 46.
— militaris L. XIX, 103, 135.
— — weiß blühend XVII, 43.
— — Abänderungen der Blütenform XVII, 42, 43.
— — intercedens XVII, 42.
— — perplexa XVII, 42.
— — subsimia XIX, 103.
— — tripartita XVII, 43.
— — × Simia XVII, 44; XIX, 103.
— — — — weiß blühend XVII, 24.
— — — — monströs XVII, 44.
— — × variegata XVII, 41; XIX, 103.
— mixta Domin s. Coeloglossum viride × Orchis maculata.
— Morio L. XVIII, 68; XIX, 92.
Orchis Morio gelblich blühend XVII, 39.
— — caucasica XIX, 102.
— — monströs XIX, 102.
— — × variegata XVII, 39.
— pallens L. XVI, 7.
— — rot blühend XVII, 48.
— — ungewöhnlich duftend XVII, 48.
— — monströs XVII, 48.
— palustris Jcq. weiß blühend XVII, 48.
— — micrantha XIX, 105.
— — monströs XVII, 70.
— papilionacea × picta XVII, 39; XIX, 102.
— picta Loisl. XVII, 40; XIX, 102.
— — × Serapias hirsuta XVII, 40.
— provincialis Balb. XVII, 48; XIX, 104.
— purpurea Huds. s. O. fusca.
— Ruthei M. Schze. XIX, 108.
— saccigera Brogn. XVII, 53.
— sambucina L. bracteata XVII, 53; XIX, 112.
— — monströs XVII, 53.
— Simia Lmk. XIX, 103.
— — mit abweichender Blütenfarbe XVII, 42.
— Spitzelii Saut. XIX, 104.
— Traunsteineri Saut. XVII, 50; XIX, 109, 110.
— — Russowii XVII, 50; XIX, 110.
— — monströs XVII, 50.
— tridentata Scop. s. O. variegata.
— ustulata L. XIX, 91.
— — monströs XVII, 41.
— — × variegata XVII, 42; XIX, 103, 112.
— — — — monströs XVII, 42.
— — × variegata commutata XVII, 42.
— variegata All. XVI, 7; XVIII, 56.
— — weiß blühend XVII, 41.
— — Form von XIX, 102.
— — commutata XVII, 41; XIX, 103.
— — — weiß blühend XVII, 42.
Oreoweisia Bruntoni B. S. XVII, 18.
Origanum vulgare L. XVI, 133; XVII, 25, 31.
Orlaya Daucorlaya Murb. XVI, 47.
— grandiflora Hffm. XVI, 47; XVIII, 63; XIX, 130.
Orobanche alba Steph. XVI, 40.
— arenaria Borkh. XVII, 126.
— coerulea Vill. XVIII, 55.
— loricata Rchb. XVII, 126.
— pallidiflora W. & Grab. XVII, 121, 126.
— rubens Wallr. XIX, 86.
Orobus niger L. XVIII, 87.
— tuberosus L. XVI, 108; XVIII, 87.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Orobus vernus L. XVI, 128; XVIII, 86.
Orthotrichum affine Schrad. XVII, 8.
— anomalum Hdw. XVII, 8.
— cupulatum Hffm. XVII, 8.
— diaphanum Schrad. XVII, 8.
— fastigiatum Bruch XVII, 8.
— leiocarpum Br. & Sch. XIX, 128.
— Lyallii Hook. & Tayl. XVII, 8; XIX, 123, 135.
— obtusifolium Schrad. XVII, 8; XIX, 128.
— pumilum Sw. XVII, 8.
— rupestre Schleich. XVII, 8.
— speciosum N. ab E. XVII, 8.
— striatum Hdw. XVII, 8.
— Sturmii H. & H. XVII, 8.
Oxalis Acetosella L. XVI, 128; XVII, 30.
— stricta L. XVIII, 61.
Oxytropis pilosa DC. XVII, 126; XVIII, 61, 85.
— — Vergrünung von XVIII, 37.

Paliurus australis Grtn. XVI, 68.
Paludella squarrosa Ehrh. XVI, 16; XVII, 10, 16, 17.
Panaeolus acuminatus Fr. XVII, 36.
— caliginosus Jungh. XVII, 36.
— campanulatus (L.) XVII, 36.
— fimicola Fr. XVII, 36.
— fimiputris (Bull.) XVII, 36.
— leucophanes Berkl. & Br. XVII, 36.
— papilionaceus Fr. XVII, 36.
— Phalaenarum Fr. XVII, 36.
— remotus (Schaeff.) XVII, 36.
— retirugis Fr. XVII, 36.
— separatus (L.) XVII, 36.
— sphinctrinus Fr. XVII, 36.
Panicum Crus galli L. XVIII, 56.
Papaver bracteatum Lindl. XVIII, 46.
— dubium L. maculatum XVII, 124.
— glaucum L. XVIII, 71.
— orientale L. XVIII, 46.
— Rhoeas L. tricolor XVI, 19; XVII, 124.
Parietaria alsinifolia Del. XX, 42.
— lusitanica L. XX, 42, 43.
Paris quadrifolia L. XVII, 29; XVIII, 56; XIX, 95, 136.
Parnassia palustris L. XVIII, 54, 60; XIX, 60.
Pastinaca sativa L. XVI, 46.
Paxillus Alexandri Fr. XVII, 35.
— atrotomentosus (Batsch) XVII, 35.
— chrysophyllus Trog. XVII, 35.
— crassus Fr. XVII, 35.
— extenuatus Fr. XVII, 35.
— giganteus (Sowb.) XVII, 35.
— griseotomentosus (Secr.) XVII, 35.
— involutus (Batsch) XVII, 35.
Paxillus lepista Fr. XVII, 35.
— pannoides Fr. XVII, 35.
— sordarius Pers. XVII, 35.
Pedicularis silvatica L. XIX, 86.
— tuberosa L. v. elongata Kerner XX, 92.
— — — — brevirostris XX, 92.
— — — — subapetala XX, 92.
— — — — monströs XX, 92.
Peganum Harmala L. XVI, 67.
Pelorien von Linaria vulgaris XVIII, 37; XX, 89.
Peltigera XIX, 58.
Peplis Portula L. XX, 88.
Petasites albus Grtn. XVIII, 55; XIX, 67.
— officinalis Mnch. XVI, 132; XVII, 24; XIX, 67.
Peucedanum alsaticum L. XVIII, 63; XIX, 64.
— Cervaria (L.) Cuss. XVII, 24, 31; XVIII, 63; XIX, 63, 130.
— officinale L. XVII, 24; XIX, 63, 64.
Peziza tuberosa Bull. s. Sclerotium tuberosum
Phacelia tanacetifolia Benth. XVIII, 41—43, 73; XX, 88.
Phallus caninus Schaeff. XX, 68.
— impudicus L. XX, 68.
Phascum bryoides Dicks. XVII, 18.
— curvicollum Ehrh. XVII, 6.
— cuspidatum Schreb. XVII, 6.
— piliferum Schreb. XVII, 6.
Phegopteris s. Polypodium.
Phelodendron amurense Rupr. XX, 88.
Philonotis calcarea Br. & Sch. XVII, 10.
— fontana Brid. XVII, 10.
Phlegmacium allutum Fr. XVII, 34.
— anfractum Fr. XVII, 34.
— arcuatum (Alb. & Schw.) XVII, 34.
— calochroum Fr. XVII, 34.
— cephalixum (Secr.) XVII, 34.
— claricolor Fr. XVII, 34.
— compar (Weinm.) XVII, 34.
— cyanopus (Secr.) XVII, 34.
— decoloratum Fr. XVII, 34.
— elegantius Fr. XVII, 34
— emollitum Fr. XVII, 34.
— fulgens (Alb. & Schw.) XVII, 34.
— fulmineum (Pers.) XVII, 34.
— glaucopus (Schaeff.) XVII, 34.
— intentum Fr. XVII, 34.
— largum Fr. XVII, 34.
— latum Fr. XVII, 34.
— liratum Fr. XVII, 34.
— maculosum (Pers.) XVII, 34.
— multiforme Fr. XVII, 34.
— Napus Fr. XVII, 34.
— nemorense Fr. XVII, 34.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Phlegmacium olivaceum Batsch XVII, 34.
— orichalceum Batsch XVII, 34.
— percome Fr. XVII, 34.
— russum Fr. XVII, 34.
— saginum Fr. XVII, 34.
— sebaceum Fr. XVII, 34.
— turmale Fr. XVII, 34.
— varium (Schaeff.) XVII, 34.
— vespertinum Fr. XVII, 34.
Phleum asperum Vill. XIX, 96.
— Boehmeri Wib. XVII, 123.
— — Blütengalle an XX, 83.
Pholiota adiposa Fr. XVII, 33.
— aegerita Fr. XVII, 33.
— aurivella Batsch XVII, 33.
— Brigantii Fr. XVII, 33.
— caperata (Pers.) XVII, 33.
— capistrata Cookē XVII, 33.
— comosa Fr. XVII, 33.
— curvipes (Alb. & Sch.) XVII, 33.
— heteroclita Fr. XVII, 33.
— leochroma Cooke XVII, 33.
— luxurians Fr. XVII, 33.
— marginata Batsch XVII, 33.
— muricata Fr. XVII, 33.
— mustelina Fr. XVII, 33.
— mutabilis (Schaeff.) XVII, 33.
— praecox (Pers.) XVII, 33.
— pudica (Bull.) XVII, 33.
— pumila Fr. XVII, 33.
— radicosa (Bull.) XVII, 33.
— Secretani Fr. XVII, 33.
— spectabilis Fr. XVII, 33.
— squarrosa Mueller XVII, 33.
— subsquarrosa Fr. XVII, 33.
— terrigena Fr. XVII, 33.
— tersa Fr. XVII, 33.
— tuberculosa Fr. XVII, 33.
Phragmites communis Trin., Cecidomyia-Larven an XX, 84.
Physalis Alkekengi L. XVII, 25; XVIII, 67.
Physcomitrium pyriforme Brid. XVII, 9.
Physoptychis gnaphalodes DC. XVIII, 46.
Phyteuma nigrum Schmidt XIX, 77.
— orbiculare L. XVI, 28; XVIII, 55; XIX, 77, 130.
— rigidum W. XX, 38.
— spicatum L. XIX, 77.
Phytoptocecidien an Hypericum glutinosum XIX, 126.
Picea excelsa Link s. auch Abies excelsa.
— — v. Hagemanniana Topf XVI, 10.
Picnomon Acarna L. XVI, 44.
Picris hieracioides L. XIX, 74.
— — verbändert XX, 91.
Pilostyles Haussknechtii Boiss. XVIII, 9.
Pimpinella magna L. XVI, 77.
Pimpinella Saxifraga L. XVI, 131; XVII, 31.
— — monströs XVI, 19.
Pinnularia radiosa Sm. XIX, 136.
Pinus montana Mill. XVI, 138.
— orientalis Falk s. Haloxylon Ammodendron.
— silvestris L. XVI, 138.
— uliginosa Neum. s. P. montana.
Pirola chlorantha Sw. XVIII, 55; XIX, 78.
— — monströs XVI, 19.
— minor L. XVII, 24, 29; XIX, 79.
— rotundifolia L. XIX, 78.
— secunda L. XIX, 79.
— umbellata L. XVIII, 66.
— uniflora L. XVIII, 55, 66; XIX, 79.
Pirus aucuparia Grtn. s. Sorbus auc.
— communis XVII, 103.
— bollwylleriana DC. XVII, 102—105, 116; XX, 88.
— — Synonyme von XVII, 104, 105.
Pistillaria micans Fr. XX, 67.
Plagiochila asplenoides M. & N. XVI, 16.
Plagiothecium denticulatum B.S. XVII, 12.
— Ruthei Limpr. XX, 87.
— silesiacum B. S. XVII, 12.
— silvaticum B. S. XVII, 12.
— undulatum B. S. XVII, 12.
Plantago altissima L. XVI, 38.
— carinata Schrad. XVI, 37.
— — bidens XVI, 37.
— — graminifolia XVI, 38.
— lanceolata L. XVI, 38.
— major L. XVII, 26.
— — v. minima DC. XX, 88.
— — monströs XVI, 16.
— maritima L. XVI, 18.
Platanthera bifolia Rich. XIX, 93.
— — patula XVII, 72; XIX, 121.
— — pervia XVII, 72.
— — robusta XVII, 72.
— — subalpina XIX, 121.
— — monströs XVII, 72; XIX, 121.
— — × chlorantha XVII, 73; XIX, 122.
— chlorantha Cust. XVI, 136; XIX, 93, 122.
— — Formen von XVII, 73.
— — patula XIX, 122.
— — tricalcarata XIX, 121.
— — Wankelii XVII, 73.
— — monströs XVII, 73; XIX, 121.
— hybrida Bruegg. s. P. bifolia × chlorantha.
— solstitialis Bnngh. s. P. bifolia.
Platygyrium repens B. S. XVI, 18.
Pleospora auf Bromus, Triticum XVIII, 37.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Pleuridium alternifolium B. S. XVII, 7.
— nitidum B. S. XVII, 7.
— subulatum B. S. XVII, 7.
Pleurospermum austriacum Hffm. XVI, 7.
Poa bulbosa L. XVI, 124.
— Chaixi s. P. sudetica.
— dura Scop. XVI, 7.
— fertilis Host XVIII, 74.
— hybrida Gaud. XVII, 122.
— nemoralis L. var. XX, 80.
— — v. glauca K. XVIII, 73.
— — — rigidula M. & K. XVIII, 73.
— — mit Gallen von Harmamyia Poae XX, 84.
— palustris Rth. s. P. fertilis.
— pratensis L. XVI, 138.
— sudetica Haencke XX, 71.
— trivialis L. XVI, 138.
— — v. stricta Doell XVI, 18.
— — Cecidomyia-Larven an XX, 84.
Podanthum Aizoon Hskn. XX, 37.
— brachylobum Boiss. XX, 35—37.
— — v. Sintenisii Hskn. XX, 37.
— cappadocicum Boiss. XX, 37.
— cichoriiforme Boiss. XX, 36.
— controversum Boiss. XX, 38.
— cordifolium Hskn. XX, 33.
— lanceolatum W. XX, 38.
— — v. controversum Boiss. XX, 38.
— — — flagellatum Hskn. & Bornm. XX, 38.
— — — rigidum Boiss. XX, 38.
— obtusifolium Hskn. XX, 37.
— pterocaulon Sint. exs. XX, 34.
— pulchellum Boiss. XX, 36.
— Sintenisii Hskn. XX, 35.
Podospermum laciniatum DC. XVIII, 65; XIX, 75.
Pogonatum XIX, 17, 20.
— aloides P. B. XVII, 11.
— nanum P. B. XVII, 10.
— urnigerum Schpr. XVII, 11.
Polygala amara L. XVIII, 54; XIX, 135.
— — v. austriaca K. ramosa XVI, 7.
— — — rubriflora Wiesb. XVI, 7.
— depressa Wender. XVI, 127; XVII, 126.
— serpyllacea Weihe s. P. depressa
Polygonatum s. auch Convallaria.
— Haussknechtii Bornm. & Sint. XVIII, 46, 52—54.
— — v. stenophyllum Bornm. & Sint. XVIII, 52.
— multiflorum All. s. Convallaria multiflora.
— verticillatum All. s. Convallaria vertic.
Polygonum Bistorta L. XVII, 26.
— Persicaria L. XVII, 26.
— tataricum Grtn. XVII, 123.
— tomentosum Schnk. XVIII, 41.
Polykladie bei Campanula rapunculoides XVI, 25.
Polypodium Dryopteris L. XVII, 32; XVIII, 74; XIX, 58.
— Phegopteris L. XIX, 58.
— Robertianum Hffm. XIX, 59, 135.
— vulgare L. XVII, 32; XIX, 58, 97.
— — auritum XVI, 29.
Polyporus abietinus (Dicks.) XX, 65.
— adustus (W.) XX, 64.
— albidus Trog. XX, 64.
— alligatus Fr. XX, 64.
— alutaceus Fr. XX, 64.
— amorphus Fr. XX, 64
— annosus Fr. XX, 64.
— applanatus Wallr. XX, 64.
— arcularius (Batsch) XX, 63.
— betulinus (Bull.) XX, 64.
— biennis (Bull.) XX, 63.
— bombycinus Fr. XX, 65.
— borealis (Wnbg.) XX, 64.
— brumalis (Pers.) XX, 63.
— cinctus Berkl. XX, 65.
— conchatus (Pers.) XX, 64.
— confluens (Alb. & Schw.) XX, 64.
— connatus Fr. XX, 64.
— corticola Fr. XX, 65.
— crispus (Pers.) XX, 64.
— cristatus (Pers.) XX, 64.
— cryptarum (Bull.) XX, 64.
— cuticularis (Bull.) XX, 64.
— elegans (Bull.) XX, 64.
— epileucus Fr. XX, 64.
— erubescens Fr. XX, 64.
— farinellus Fr. XX, 65.
— ferruginosus Fr. XX, 65.
— Fibula Fr. XVI, 20; XX, 64.
— floccosus Fr. XX, 65.
— fomentarius (L.) XX, 64.
— frondosus (Fl. Dan.) XX, 64.
— fulvus Fr. XX, 64.
— fuscolutescens Fuck. XX, 65.
— giganteus (Pers.) XX, 64.
— gossypinus Lev. XX, 64.
— hirsutus (Wulf.) XX, 65.
— hispidus (Bull.) XX, 64.
— igniarius (L.) XX, 64.
— imbricatus (Bull.) XX, 64.
— incarnatus (Alb. & Schw.) XX, 65.
— intybaceus autt. XX, 64.
— kymathodes Rostk. XX, 64.
— laciniatus Pers. XX, 63.
— lentus Berkl. XX, 63.
— lepideus Fr. XX, 63.
— leporinus Fr. XX, 64.
— lucidus (Leys.) XX, 64.
— lutescens Pers. XX, 65.
— marginatus Fr. XX, 64.
— Medulla panis (Pers.) XX, 65.
— melanopus (Sw.) XX, 64.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Polyporus molluscum Fr. XX, 65.
— Montagnei Fr. XX, 64.
— nigricans Fr. XX, 64.
— nitidus Fr. XX, 65.
— obducens Pers. XX, 65.
— obliquus (Pers.) XX, 65.
— officinalis (Vill.) XX, 64.
— ovinus (Schaeff.) XX, 63.
— pallidus Schulz XX, 64.
— perennis (L.) XX, 64.
— petaloides Fr. XX, 64.
— picipes Fr. XX, 64.
— pictus (Schultz Starg.) XX, 64.
— populinus Fr. XX, 64.
— radiatus (Sowb.) XX, 64.
— ravidus Fr. XX, 64.
— resinosus (Schrad.) XX, 64.
— rhodellus Fr. XX, 65.
— Ribis (Schum.) XX, 64.
— rufopallidus Trog. XX, 64.
— rufus (Schrad.) XX, 65.
— rutrosus Rostk. XX, 63.
— Schweinitzii Fr. XX, 63.
— sinuosus Fr. XX, 65.
— Spongia Fr. XX, 64.
— spumeus (Sowb.) XX, 64.
— squamosus Fr. XX, 64.
— stereoides Fr. XX, 65.
— stypticus (Pers.) XX, 64.
— subsquamosus (L.) XX, 63.
— substriatus Rostk. XX, 64.
— sulfureus (Pull.) XX, 64.
— tomentosus Fr. XVI, 20; XX, 64.
— triqueter (Sowb.) XX, 64.
— umbellatus Fr. XX, 64.
— unitus Pers. XX, 65.
— Vaillantii Fr. XX, 65.
— vaporarius Fr. XX, 65.
— varius Fr. XX, 64.
— vegetus Fr. XX, 64.
— velutinus Fr. XX, 65.
— vernalis Fr. XX, 63.
— versicolor (L.) XX, 65.
— vulgaris Fr. XX, 65.
— Wynnei Berkl. XX, 65.
— xoilopus Rostk. XX, 63.
— zonatus Fr. XX, 65.
Polysaccum crassipes DC. XX, 68.
Polystichum cristatum Rth. XVII, 124; XVIII, 48.
— Filix mas Rth. XVI, 138; XIX, 58.
— Oreopteris DC. m. bifidum XVI, 30.
— spinulosum DC. XVI, 138; XIX, 58.
— — v. dilatatum Sw. XVI, 138.
— — — — oblongum XVI, 138.
Polytrichaceen, Biologie der XIX, 17 ff.
Polytrichum aloides Hdw. XVII, 123; XIX, 18, 58.
— alpinum XIX, 18, 19.
Polytrichum commune L. XVII, 11; XIX, 17—20.
— formosum Hdw. XVII, 11; XIX, 18, 20, 21, 58.
— gracile Dicks. XVII, 11; XIX, 18.
— juniperinum W. XVII, 11; XIX, 18, 20.
— nanum Hdw. XVII, 123; XIX, 18.
— perigoniale Mich. XVII, 18.
— piliferum Schreb. XVII, 11; XIX, 18, 58.
— strictum Banks XVII, 11; XIX, 18.
— urnigerum XIX, 18, 19.
Populus balsamifera L. XVIII, 73.
Potamogeton alpinum Balb. s. P. rufescens.
— crispus L. XIX, 90.
— densus L. XIX, 91.
— lucens L. XIX, 90.
— natans L. XIX, 90.
— pectinatus L. XVIII, 41.
— perfoliatus L. XIX, 91.
— rufescens Schrad. XVI, 37.
— trichoides Cham. & Schldl. XIX, 91.
— — condylocarpus XIX, 91.
Potentilla alba L. XVII, 29; XVIII, 62, 89; XIX, 100.
— — × Fragariastrum XVI, 8.
— argentea L. XVI, 28, 128; XVIII, 88.
— chrysocraspeda Lehm. XX, 12.
— — v. minor Boiss. XX, 12.
— Fragariastrum Ehrh. XVIII, 89.
— fragarioides v. ternata Maxim. XX, 12.
— Freyniana Bornm. XX, 12.
— hybrida Wallr. s. P. alba × Fragariastrum.
— lignosa W. XX, 92.
— minima Hall. v. major Lehm. XX, 12.
— opaca L. XVI, 7; XVIII, 72, 89.
— — × verna XIX, 135.
— pilosa W. XVIII, 62.
— procumbens Sibth. XVI, 128; XVIII, 89.
— reptans L. XVII, 24.
— rubens Crtz. s. P. opaca.
— silvestris Neck. s. P. Tormentilla.
— ternata Bruegg. XX, 12.
— — Freyn XX, 12.
— — C. Koch XX, 12.
— thuringiaca Bernh. XVII, 111; XVIII, 62, 89; XIX, 97, 100.
— Tormentilla Schrk. XVI, 128; XVII, 24, 32.
— xylorrhiza Boiss. & Hoh. s. P. lignosa.
Poterium polygamum W. & K. v. platylophum Jord. XVII, 105.
Pottia bryoides Lindb. XVII, 18.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Pottia cavifolia Ehrh. XVII, 6.
— lanceolata C. Muell. XVII, 6.
— minutula B. S. XVII, 6.
— truncata Fuernr. XVII, 6.
Prenanthes purpurea L. XVI, 132; XVIII, 65; XIX, 49.
Primula algida Stapf XX, 39.
— auriculata Lmk. XX, 39.
— — v. Bornmuelleri Hskn. XX, 38.
— — — calva Hskn. & Bornm. XX, 39.
— Berninae Kern. s. P. hirsuta × viscosa.
— elatior × officinalis XVIII, 56.
— graveolens Hegetschw. s. P. viscosa.
— hirsuta All. XX, 93.
— — × viscosa XX, 93.
— viscosa All. XX, 93.
— — Vill. s. P. hirsuta All.
Prunella alba Pall. XIX, 87.
— — v. pinnatifida K. XVI, 40.
— grandiflora Jcq. XIX, 87.
— laciniata L. s. P. alba v. pinnatifida.
— vulgaris L. XVII, 26.
Prunus avium L. monströs XIX, 132.
— Mahaleb L. XVI, 47.
— Padus L. XVII, 118.
Psalliota arvensis (Schaeff.) XVII, 35.
— augusta Fr. XVII, 35.
— campestris (L.) XVII, 35.
— — v. praticola Vitt. XVII, 35.
— — — umbrina Vitt. XVII, 35.
— — — vaporaria Krombh. XVII, 35.
— — — villatica Brond. XVII, 35.
— cretacea Fr. XVII, 35.
— dulcidula Schulzer XVII, 35.
— fulveola Lasch XVII, 35.
— haematosperma (Bull.) XVII, 35.
— haemorrhoides (Kalchb.) XVII, 35.
— pratensis (Schaeff.) XVII, 35.
— rusiophylla Lasch XVII, 35.
— sagata Fr. XVII, 35.
— semota Fr. XVII, 35.
— setigera Fr. XVII, 35.
— silvestris (Schaeff.) XVII, 35.
— silvicola (Vitt.) XVII, 35.
Psathyra bifrons Berkl. XVII, 36.
— conopilea Fr. XVII, 36.
— corrugis (Pers.) XVII, 36.
— gossypina (Bull.) XVII, 36.
— gyroflexa Fr. XVII, 36.
— Noli tangere Fr. XVII, 36.
— obtusata Fr. XVII, 36.
— spadiceogrisea (Schaeff.) XVII, 36.
— stricta Trog. XVII, 36.
Psathyrella caudata Fr. XVII, 36.
— crenata Lasch XVII, 36.
— disseminata (Pers.) XVII, 36.
— gracilis Fr. XVII, 36.
Psathyrella hiascens Fr. XVII, 36.
— impatiens Fr. XVII, 36.
— subatrata Fr. XVII, 36.
Psephellus Bornmuelleri Hskn. XX, 22, 23.
— dealbatus W. XX, 22.
— incanescens Boiss. XX, 23.
Psilocybe agraria Fr. XVII, 36.
— atrorufa (Schaeff.) XVII, 36.
— bullacea (Bull.) XVII, 36.
— callosa Fr. XVII, 36.
— canobrunnea Fr. XVII, 36.
— cernua Fl. Dan. XVII, 36.
— clivensis Berkl. & Br. XVII, 36.
— coprophila (Bull.) XVII, 36.
— elongata (Pers.) XVII, 36.
— hygrophila Fr. XVII, 36.
— murcida Fr. XVII, 36.
— nemophila Fr. XVII, 36.
— nuciseda Fr. XVII, 36.
— polycephala Paulet XVII, 36.
— semilanceata Fr. XVII, 36.
— spadicea Fr. XVII, 36.
— tegularis Schum. XVII, 36.
Ptarmica anthemoides Bornm. XX, 15, 16.
Pterocephalus kurdicus Vatke XX, 33.
— Putkianus Boiss. & Ky. XX, 33.
Pterogonium gracile Sw. XVI, 17.
Pteridium aquilinum Kuhn s. Pteris aqu.
Pterigynandrum filiforme Hdw. XVI, 17; XVII, 11.
Pteris aquilina L. XVIII, 57; XIX, 59, 98.
— — v. lanuginosa Hook. XVI, 30; XVIII, 57.
Puccinia Arenariae Winter XIX, 136.
— fusca Winter auf Anemone nemorosa XIX, 57.
— Stipae Hora XVIII, 37.
Pulicaria vulgaris Grtn. XVIII, 55.
Pulmonaria azurea Bess. XIX, 85.
— — × officinalis XVIII, 73.
— mollis Wolff XIX, 85.
— officinalis L. XVI, 41; XVII, 25, 29; XIX, 85.
— — weiß blühend XVIII, 44.
Pulsatilla vulgaris Mill. (s. auch Anemone Pulsat.) XVII, 29; XVIII, 58, 77; XIX, 98.
— — monströs XVI, 19.
Pylaisia polyantha Schpr. XVII, 12; XIX, 128.
Pyrethrum Achilleae DC. XX, 18.
— anserinaefolium Hskn. XX, 18.
— argenteum W. v. helichrysiflorum Hskn. & Bornm. XX, 20.
— cappadocicum DC. XX, 19.
— cinereum Grsb. XX, 18.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Pyrethrum corymbosum (L.) XX, 18.
— eginense Hskn. XX, 18.
— heterophyllum Hskn. XX, 17.
— heterotomum Bornm. XX, 17.
— Haussknechtii Bornm. XX, 19, 20.
— leucanthemifolium Porta & Rigo XX, 16.
— leucopilodes Hskn. XX, 19.
— nitens Boiss. & Noë XX, 19.
— Parthenium Sm. XVI, 18, 45.
— pectinatum Hskn. XX, 16, 17.
— ponticum Alboff XX, 18.
— poteriifolium Ledeb. XX, 18.
— Starckianum Alboff XX, 18.

Quercus pubescens W. XVI, 105.

Racomitrium aciculare Brid. XVII, 7.
— affine v. obtusum Lindb. XVII, 18.
— canescens Brid. XVII, 8.
— — v. ericoides B. S. XVII, 8.
— heterostichum Brid. XVII, 8.
— lanuginosum Brid. XVII, 8.
— microcarpon Hdw. XVII, 8.
— sudeticum XVII, 15.
Radulum orbiculare Fr. XX, 65.
— tomentosum Fr. XX, 65.
Ramischia secunda Grke. s. Pirola sec.
Ranunculus aconitifolius L. v. platanifolius (L.) XVI, 58.
— arvensis L. mit Urocystis-Galle XVI, 6.
— bulbosus L. blaßgelb blühend XVIII, 37, 71.
— crymophilus Boiss. & Hoh. XVIII, 46.
— hederaceus L., XVIII, 54.
— lanuginosus L. XVIII. 58, 78; XIX, 98.
— nemorosus DC. XVI, 125; XVII, 118; XVIII, 58, 78; XIX, 98.
— Philonotis Ehrh. XVI, 18, 49.
— polyanthemus L. XVIII. 78; XIX, 98.
— sardous Crtz. s. R. Philonotis.
— sceleratus L. XVIII, 58.
Rapistrum rugosum All. XVII, 123.
Ratzenberger, Caspar, Herbarium des XVI, 4, 50 ff.
Reseda lutea L. XVIII, 59, 80.
— luteola L. XVIII, 60.
— Phyteuma L. XVI, 49.
Rhabdoweisia fugax B. S. XVII, 4.
Rhamnus cathartica L. XVI, 48; XVIII, 61.
— Frangula L. XVI, 128.
Rhinanthus angustifolius Gmel. XVI, 18.
— glandulosus Simk. XVI, 40.
Rhinanthus hirsutus All. XVI, 133.
Rhizobium Leguminosarum Fr. XIX, 57.
Rhizopogon luteolum Fr. XX, 68.
— rubescens Tul. XX, 68.
Rhodobryum roseum Schreb. XVII, 9, 16.
Rhododendron intermedium Tsch. XVII, 122.
Rhus Cotinus L. XVI, 69.
Rhynchostegium rusciforme Br. Eur. XIX, 128.
Ribes alpinum L. XVI, 131.
— Grossularia L. v. pubescens K. XVII, 118.
— nigrum L. XVIII, 63; XX, 90.
— rubrum L. XVIII, 55.
— Uva crispa L. s. R. Grossularia v. pubescens.
Robinia monströs XVII, 125.
Roggen, Sprossungen am XX, 89.
Rosa agrestis Savi XVIII, 70.
— — × gallica XVIII, 70, 71.
— arvensis Huds. XIX, 130.
— — v. baldensis A. Kern. XVI, 47.
— canina L. XVIII, 70.
— — v. dumetorum (Thuill.) XVIII, 70.
— cinnamomea L. XVIII, 54.
— coriifolia Fr. XIX, 135.
— gallica L. XVII, 118; XVIII, 33, 62, 88; XIX, 100.
— — v. pumila Christ XVIII, 72.
— — × glauca XVIII, 72.
— — × graveolens XVIII, 33, 70.
— — × Jundzilliana XVIII, 72.
— — × rubiginosa XVIII, 70.
— — × — consanguinea XVIII, 34.
— glauca × tomentosa XVIII, 34.
— graveolens Gren. XVIII, 70.
— micrantha Sm. XIX, 135.
— munimenti Keller XVIII, 71.
— Naumannii M. Schze. XIX, 5.
— omissa Déségl. v. Schulzei Keller XVIII, 72.
— pimpinellifolia DC. XVII, 118; XVIII, 54, 62, 87; XIX, 100.
— pomifera Herrm. XVII, 111; XVIII, 62.
— pumila L. fil. s. R. gallica
— repens Wib. s. R. arvensis.
— rubiginosa L. XVIII, 70.
— tomentosa Sm. XVI, 128.
— — v. cristata Christ XVIII, 72.
— — — Hampeana Grsb. XVIII, 72.
— — — Jundzilliana Christ XVIII, 72.
Rosmarinus officinalis L. XVI, 99.
Roßkastanienblätter, zerschlitzte XVIII, 44.
Rubus caesius L. XVI, 128.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Rubus saxatilis L. XVI, 128; XVIII, 62, 88; XIX, 100.
Rudbeckia laciniata L. XVIII, 55.
Rumex Acetosella L. XVI, 21; XVII, 31.
— — v. angiocarpus Murb. XVI, 38.
— aquaticus L. XIX, 88.
— conglomeratus × maritimus XX, 88.
— crispus × obtusifolius XVII, 106.
— cristatus Wallr. s. R. crispus × obtusifolius.
— Hydrolapathum Huds. XVII, 106.
— maritimus L. XX, 88.
— obtusifolius L. XVII, 106.
— — v. silvestris Wallr. XVII, 106.
— sanguineus L. XVI, 103.
— scutatus L. XVI, 103.
Russula aurata With. XVIII, 69.
Ruta divaricata Ten. XVI, 48.
— patavina L. XVI, 48.

Sagina apetala L. XVIII, 54.
— nodosa E. Meyer XX, 90.
Sagittaria sagittifolia L. XVI, 37, 136; XVIII, 56, 68; XIX, 90.
Salicornia fruticosa L. XVI, 102.
— herbacea L. XVI, 102.
Salix amygdalina L. XX, 91.
— aurita L. XVI, 136.
— — × Caprea XVII, 126.
— — × cinerea XVIII, 27, 73.
— — × nigricans XVII, 126.
— — × purpurea XVII, 126.
— — × viminalis XVII, 126.
— bicolor Ehrh. XVI, 15.
— Caprea × repens XVII, 126.
— cinerea L. undulata XVIII, 27.
— — × nicricans XVII, 126.
— — × purpurea XVII, 126.
— — × repens XVII, 126.
— fragilis L. XVI, 136.
— hippophaëfolia W. & Gr. XVIII, 27.
— multinervis Doell s. S. aurita × cinerea.
— purpurea × viminalis XX, 91.
— repens L. XVI, 29; XVIII, 56.
— Trevirani Spr. s. S. hippophaëfolia.
— triandra × viminalis XVIII, 27.
Salsola Kali L. XVI, 18.
Salvia glutinosa L. XVIII, 67.
— pratensis L. XVII, 25.
— — rot blühend XVI, 29.
— — monströs XVI, 25.
— Sclarea L. XVI, 40.
— silvestris L. XIX, 87.
— — monströs XVI, 25.
— verticillata L. XVIII, 67; XIX, 87.
Sambucus Ebulus L. XVIII, 64.
Sambucus racemosa L. XVI, 132; XIX, 65.
Samolus Valerandi L. XVI, 18; XVIII, 41.
Sanguisorba officinalis L. XVII, 31.
Sanicula europaea L. XVII, 29; XIX, 60.
Saponaria ocymoides L. XVI, 128; XVII, 122, 123.
— officinalis L. XVI, 128; XVIII, 60.
— Vaccaria L. XVIII, 60.
Saprophyte Moose XVI, 16.
Sarothamnus scoparius L. XVIII, 61, 83; XX, 90.
Satureja cuneifolia Ten. XVI, 38.
— montana L. XVI, 38; XX, 91.
Saxifraga aizoides × caesia XVII, 122.
— Cotyledon L. XVI, 131.
— decipiens Ehrh. XVI, 131.
— — v. quinquefida XVI, 131.
— granulata L. XIX, 60.
— hypnoides L. XVI, 131.
— — v. deficiens Pouzol XVI, 131.
— patens Sternb. s. S. aizoides × caesia.
— sponhemica Gmel. XVI, 131.
— tridactylites L. XVIII, 42.
Scabiosa agrestis W. & K. XVI, 45.
— columbaria L. XVII, 24.
— — monströs XVIII, 64.
— graminifolia L. XVI, 46.
— leiocephala Hppe. XVI, 45.
— leucophylla Borb. XVI, 45.
— — foliosa XVI, 45.
— — typica XVI, 45.
Scandix infesta L. XVI, 47.
Scheuchzeria palustris L. XVI, 136.
Schistostega osmundacea W. & M. XVI, 124; XVII, 8.
Schivereckia Bornmuelleri Prantl XX, 6, 7.
— imeretica Rupr. XX, 7.
— podolica Bess. XX, 7.
— — Boiss. XX, 7.
Schlangenfichte XVI, 10.
Schlitzblättrigkeit bei Aesculus Hippocastanum XIX, 10 ff.
— — anderen Bäumen XIX, 16.
Scirpus carniolicus s. Heleocharis carn.
— Holoschoenus L. v. australis L. XIV, 36.
— lacustris L. XIX, 96.
— maritimus L. XVIII, 69; XIX, 96.
— palustris L. s. Heleocharis pal.
— pauciflorus Lightf. XVI, 18.
— silvaticus L. XIX, 96.
— Tabernaemontani Gmel. XVIII, 56.
Scleroderma areolatum Ehrh. XX, 68.
— Bovista Fr. XX, 68.
— verrucosum Bull. XX, 68.
— vulgare Fl. Dan. XX, 68.
Scleranthus annuus L. XVI, 129.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Scleranthus perennis L. XVI, 129.
Sclerotinia tuberosa Fuck. auf Anemonen XVI, 5, 6.
Scolopendrium officinarum Sw. XIX, 58.
Scorpiurus muricatus L. XVI, 71.
Scorzonera amasiana Hskn. & Bornm. XX, 24, 25.
— cilicia Boiss. XX, 25.
— cinerea Boiss. XVIII, 46; XX, 25.
— elata Boiss. XX, 25, 26.
— — v. angustifolia Boiss. XX, 25.
— graminifolia L. XX, 26.
— hispanica L. XIX, 75.
— — v. asphodeloides Wallr. XVI, 28.
— humilis L. XIX, 74.
— intricata Boiss. XX, 26.
— leptoclada Hskn. & Bornm. XX, 25.
— macrocephala DC. XX, 26.
— rupicola Hskn. XX, 25, 26.
— tortuosissima Boiss. XX, 26.
Scrophularia canina L. XVI, 41.
— nodosa L. XVII, 31.
Scutellaria galericulata L. XVII, 30; XIX, 87.
Secale Cereale L. monströs XVIII, 40.
— — Cecidomyia-Larven an XX, 84.
Sedum acre L. XVI, 130.
— album L. XVI, 28, 130; XVII, 31.
— alpestre Vill. XVI, 47.
— annuum L. XVI, 129.
— dasyphyllum L. XVI, 130.
— hispanicum L. XVI, 130.
— maximum Sut. XVI, 130.
— purpurascens K. XVI, 130; XVIII, 62, 90.
— purpureum Link s. S. purpurascens.
— reflexum L. XVI, 130; XVIII, 63; XIX, 59.
— — v. rupestre L. XIX, 60.
— repens Schleich. XVI, 47.
— villosum L. XVIII, 62.
Seligeria calcarea Br. Eur. XVII, 6; XIX, 128, 129.
— Doniana C. Muell. XVI, 16; XVII, 6.
— pusilla B. S. XVII, 6.
— recurvata B. S. XVII, 6.
— tristicha B. S. XVII, 6.
Selinum Carvifolia L. XVIII, 55.
Sempervivum arachnoideum L. XVI, 130.
— arenarium K. XVI, 130, 131.
— Funkii Braun & K. XVI, 130, 131.
— globiferum L. XVI, 131.
— montanum M. & K. XVI, 130, 131.
— soboliferum Sims. XVI, 130, 131.
Senecio erraticus Bert. XVI, 45.
— erucifolius L. XVI, 28; XVIII, 65, 72; XIX, 71; XX, 90.
— Jacobaea L. XVIII, 65.
Senecio nemorensis K. v. Fuchsii K. XVI, 132; XVIII, 72; XX, 71.
— — — nemorensis W. XIX, 72.
— rupestris W. & K. XVI, 45.
— saracenicus L. XVIII, 55.
— spatulifolius DC. s. Cineraria sp.
— vernalis W. & K. XVIII, 41; XX, 91.
— Visianianus Papaf. XVI, 45.
Serapias Garbariorum Murr s. Orchis picta × S. hirsuta.
— hirsuta Lap. v. refracta Murr XVII, 66.
Serratula microcephala Trautv. XVIII, 50, 51.
— tinctoria L. XVII, 32; XIX, 74.
Seseli annuum L. XVIII, 63; XIX, 62.
Sesleria argentea Savi v. cylindrica DC. XVI, 36.
— — — hercegovina Beck XVI, 36.
— coerulea Ard. XIX, 135.
Setaria italica P. B. XVIII, 56.
Sherardia arvensis L. XIX, 65.
Sideritis curvidens Stapf, Verbreitung von XVI, 122, 123.
— montana L. v. cryptantha Boiss. XVI, 123.
— purpurea Talb. XVI, 122, 123.
— romana L. v. mutica Boiss. XVI, 122, 123.
Sieglingia s. Triodia.
Silaus pratensis L. XIX, 62.
Silene dichotoma Ehrh. XVI, 28; XVII, 105; XVIII, 54, 72.
— noctiflora L. XVIII, 60.
— nutans L. XVI, 128; XVIII, 81; XIX, 99.
Sisymbrium austriacum Jcq. XVII, 105.
— Jrio L. XVII, 105.
— officinale Scop. XVIII, 79.
— Sophia L. XVIII, 79.
— strictissimum L. XVII, 122.
Solanum Dulcamara L. XVI, 41; XIX, 85.
— miniatum Bernh. XVI, 29.
— nigrum L. XVIII, 67.
Soldanella alpina L. XVII, 122.
— minima Hppe. XVII, 122.
— — × pusilla XVII, 122.
— pusilla Baumg. XVII, 122.
Solidago canadensis L. XVIII, 64.
— Virga aurea L. XVI, 132; XVII, 31.
Sonchus paluster L. XVII, 106; XVIII, 66.
Sorbus alpinus J. Bauh. XVII, 102.
— Aria Crtz. XVII, 102, 103.
— aucuparia L. XVI, 129.
— domestica L. XVII, 103, 118, 119; XX, 90.
— torminalis Crtz. XIX, 135.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Sorghum halepense Pers. XVI, 36.
Sparassis crispa (Wulf.) XX, 66.
Sparganium minimum Fr. XX, 90.
— neglectum Beeby, v. microcarpum L. M. Neum. XVI, 36.
— ramosum Huds. XVI, 36.
— simplex Huds. XVI, 136.
Specularia Speculum DC. XVII, 123.
Spergula arvensis L. XVI, 128.
Spergularia rubra Pers. s. Lepigonum rubrum.
Spermatozoiden bei Gingko, Cycas, Zamia XVI, 4.
Sphaerangium muticum Schpr. XVII, 6.
Sphaerella Oerteliana Sacc. auf Coronilla montana XX, 88.
Sphagnum acutifolium Ehrh. XVI, 17; XVII, 14; XIX, 58.
— contortum Schultz XVII, 15.
— cuspidatum Ehrh. XVII, 15.
— cymbifolium Ehrh. XVII, 14.
— — v. compositum XVII, 14.
— — — fuscescens XVII, 14.
— — — purpurascens XVII, 14.
— Dusenii C. Jens. XVII, 15.
— fimbriatum Wils. XVII, 14.
— Girgensohnii Russ. XVII, 14.
— — v. gracile Grav. flagellaris XVII, 14.
— — — — densum XVII, 14.
— laricinum Spr. XVI, 16.
— laxifolium C. M. v. falcatum C. M. XVII, 15.
— — — plumosum Sch. XVII, 15.
— medium XVII, 15.
— mendocinum Sull. XVII, 15.
— molluscum Bruch XVII, 15.
— obtusum XVII, 15.
— papillosum XVII, 15.
— recurvum Pal. v. flagellare Roell XVII, 15.
— — — — mucronatum XVII, 15.
— — — majus Angstr. amblyphyllum XVII, 14.
— rigidum v. compactum Schpr. XVII, 14.
— rubellum XIX, 58.
— Russowii v. Girgensohnioides Warnst. XVII, 14.
— squarrosum Pers. XVII, 14.
— subsecundum N. ab E. XVII, 14.
— — v. gracile C. M. XVII, 14.
— — — brachycladium Roell XVII, 14.
Sphagnum subsecundum v. parviflorum Warnst. XVII, 14.
— teres Angstr. XVII, 15.
— — v. elegans Roell XVII, 15.
Spiraea Aruncus L. XVI, 129; XVII, 31; XVIII, 62, 90.
— Filipendula L. XVII, 30; XVIII, 62, 89; XIX, 100.
— Ulmaria L. XVI, 129; XVII, 30, 32; XVIII, 89.
— — v. denudata (Hayne) K. (= concolor) XVI, 129.
Spiranthes aestivalis Rich. monströs XVII, 75.
— autumnalis Rich. XVIII, 56.
Splachnum sphaericum Sw. saprophyt XVI, 16.
Sprossungen am Roggen XX, 89.
Stereum conchatum Fr. XX, 66.
— disciforme Dev. XX, 66.
— ferrugineum Bull. XX, 66.
— frustulosum Fr. XX, 66.
— hirsutum W. XX, 66.
— lilacinum Batsch XX, 66.
— ochroleucum Fr. XX, 66.
— Pini Fr. XX, 66.
— purpureum Pers. XX, 66.
— repandum Fr. XX, 66.
— rufum Fr. XX, 66.
— rugosum Fr. XX, 66.
— sanguinolentum Alb. & Schw. XX, 66.
— spadiceum Fr. XX, 66.
— tabacinum Sowb. XX, 66.
Stachys alpina L. XIX, 130.
— germanica L. XVIII, 42.
— lanata L. XVIII, 73.
— recta L. XVII, 25; XVIII, 55; XIX, 87, 130; XX, 91.
Staehelina Sintenisii Bornm. XVIII, 50, 51.
Stellaria glauca With. XVIII, 54.
Stenactis annua N. ab E. XVIII, 64.
Stengelmarkgalle an Erysimum XVIII, 44.
Stiftung „Herbarium Haußknecht" XVIII, 19, 20.
Stropharia aeruginosa Curt. XVII, 35.
— albocyanea Desmaz. XVII, 35.
— Coronilla Bull. XVII, 35.
— melasperma Bull. XVII, 35.
— obtusata Fr. XVII, 35.
— semiglobata Batsch XVII, 35.
Struthiopteris germanica W. XVI, 114, 131; XVII, 122; XIX, 59.
Sturmia Loeselii Rchb. XVII, 75.
Succisa pratensis Mnch. XVII, 30; XIX, 67.
Symphytum officinale L. XVII, 25.
— — weiß blühend XIX, 85.
Syringa vulgaris L. XVI, 133.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Tanacetum corymbosum Sch. Bp. s. Chrysanthemum cor.
Tapeinanthus brahuicus Boiss. XVIII, 51.
— laetivirens Hskn. XVIII, 51.
— persicus Boiss. XVIII, 51, 52.
Taraxacum officinale Wigg. v. palustre DC. XIX, 75.
— — v. salinum DC. XVI, 18.
Taxus baccata L. XVI, 113; XVIII, 30, 69; XIX, 135.
Tayloria serata Br. Eur. XVI, 16.
Teesdalia nudicaulis R. Br. XVIII, 59.
Telamonia armillata Fr. XVII, 35.
— bivela Fr. XVII, 35.
— bovina Fr. XVII, 35.
— brunneofulva Fr. XVII, 35.
— bulbosa Sowb. XVII, 35.
— evernia Fr. XVII, 35.
— gentilis Fr. XVII, 35.
— helvola Fr. XVII, 35.
— hemitricha Pers. XVII, 35.
— himnulea Fr. XVII, 35.
— iliopoda Fr. XVII, 35.
— impennis Fr. XVII, 35.
— incisa Fr. XVII, 35.
— injucunda Weinm. XVII, 35.
— lanigera Fr. XVII, 35.
— limonia Fr. XVII, 35.
— macropus Fr. XVII, 35.
— plumigera Fr. XVII, 35.
— psammophila Fr. XVII, 35.
— quadricolor Scop. XVII, 35.
— torva Fr. XVII, 35.
Telekia speciosa Baumg. XVIII, 64.
Tetraphis pellucida Hdw. XVII, 10.
Tetraplodon urceolatus Br. Eur. saprophyt XVI, 16.
Teucrium Botrys L. XVII, 26.
— Chamaedrys L. XVI, 40; XVIII, 68; XIX, 130.
— massiliense L. XVI, 101.
— montanum L. XVI, 15, 101; XIX, 130.
— Scordium L. XVII, 30.
— Scorodonia L. XVI, 134; XVIII, 56.
Thal, Joh., die Kryptogamen in dessen Sylva Hercynia XIX, 49 ff.
Thalictrum aquilegifolium L. XVIII, 58.
— elatum Jcq. XVI, 50.
— flavum L. XVIII, 42.
— foetidum L. v. glabrum K. XVI, 49.
— minus L. XIX, 135.
— simplex L. XVI, 50.
— — v. alpicolum Jord. XVI, 50.
Thamnium alopecurum B. S. XVII, 12.
Thelephora anthocephala Fr. XX, 66.
— biennis Fr. XX, 66.
Thelephora caryophyllea Pers. XX, 66.
— contorta Karst. XX, 66.
— coralloides Fr. XX, 66.
— cristata Pers. XX, 66.
— fastidiosa Fr. XX, 66.
— laciniata Pers. XX, 66.
— multizonata Berkl. & Br. XX, 66.
— palmata Scop. XX, 66.
— radiata Holmsk. XX, 66.
— sebacea Pers. XX, 66.
— terrestris Ehrh. XX, 66.
Thesium intermedium Schrad. XIX, 89.
— montanum Ehrh. XIX, 89, 130.
— pratense Ehrh. XVI, 134; XIX, 130.
Thlaspi perfoliatum L. XIX, 98.
Thrincia hirta Rth. XVI, 18.
— tuberosa DC. XVI, 89.
Thuidium abietinum Br. & Sch. XVII, 11; XIX, 128.
— delicatulum B. S. XVII, 11.
— recognitum Lindb. XVII, 11.
— tamariscinum B. S. XVII, 11.
Thymus montanus W. & K. XVI, 38.
— vulgaris L. XVI, 98.
Thysselinum palustre Hffm. XVII, 123.
Tilia platyphyllos Scop. XVI, 128.
Timmia austriaca Hdw. XVI, 17.
— bavarica Hessl. XVI, 17.
Timroth, Henricq, „Art der Kräuter-Mahlerei," kolor. Zeichnungen XVI, 13.
Tithymalus s. Euphorbia.
Tortella tortuosa Limpr. XIX, 128.
Tozzia alpina L. XX, 88.
Tragopogon major Jcq. XIX, 74.
— pratensis L. monströs XVII, 125.
Trauerfichte XVI, 10.
Trametes Bulliardii Fr. XX, 65.
— gibbosa Pers. XX, 65.
— hexagonoides Fr. XX, 65.
— odorata Wulf. XX, 65.
— rubescens Alb. & Schw. XX, 65.
— serpens Fr. XX, 65.
— suaveolens (L.) XX, 65.
— Trogii Berkl. XX, 65.
Trematodon ambiguus Hornsch. XVII, 5, 116.
Tremella albida Huds. XX, 67.
— elegans Fr. XX, 67.
— fimbriata Pers. XX, 67.
— foliacea Pers. XX, 67.
— frondosa Fr. XX, 67.
— intumescens Engl. Bot. XX, 67.
— mesenterica Schaeff. XX, 67.
— violacea Relh. XX, 67.
— viscosa Berkl. XX, 67.
Tremellodon auriculatum Fr. XX, 65.
— gelatinosum Pers. XX, 65.
Tribulus orientalis Kern. XVI, 48.
Trichocolea tomentella N. ab E. XVI, 16

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Tricholoma Russula Schaeff. XVIII, 69.
Trichostomum cylindricum C. M. XVII, 6.
— rubellum Rab. XVII, 6.
Trientalis europaea L. XVI, 134; XVIII, 56.
Trifolium alpestre L. XVIII, 61, 83.
— aureum Pollich. XVI. 128.
— brachystylum Knaf XVII, 106.
— fragiferum L. XVIII, 47, 61.
— incarnatum L. XVIII, 61.
— medium L. XVIII, 84.
— montanum L. XVIII, 84.
— ochroleucum L. XVIII, 83, 84.
— pratense L. weiß blühend XVI, 19; XVIII, 72.
— — v. pedicellatum Knaf XVII, 106.
— — monströs XVII. 106.
— rubens L. XVIII. 84.
Triglochin palustre L. XVI, 37; XVIII, 68.
Triodia XX, 79.
— decumbens P. B. XVI, 137.
Triplachne nitens XX, 78.
Tripleurospermum inodorum Sch. Bp. v. discoideum. XVI, 18.
— v. salinum Wallr. XVII. 106.
Trisetum XX, 79.
— flavescens s. Avena fl.
Triticum, Pleospora auf XVIII, 37.
— Cecidomyia-Larven an XX, 84.
— caninum L. glaucum XVIII, 74.
— glaucum Desf. XVI, 34.
— pungens Pers. XVI, 34.
— repens L. glaucum XVIII, 74.
— — v. Leersianum Schrk. XVI, 138.
Trochiscanthes nodiflorus W. XVIII, 2.
Trollius europaeus L. XVIII, 78; XIX, 98.
Tubaria crobulus Fr. XVII, 34.
— embolus Fr. XVII, 34.
— furfuracea Pers. XVII, 34.
— inquilina Fr. XVII, 34.
— pellucida Fr. XVII, 34.
— stagnina Fr. XVII, 34.
Tulostoma mammosum Micheli XX, 68.
Tunica prolifera Scop. XVI, 128; XVIII, 80.
— Saxifraga Scop. v. aggregata Vis. XVI, 49.
Turgenia latifolia Hffm. XVIII, 63; XIX, 64, 130.
Turritis glabra L. XVI, 125; XVIII. 59, 79.
Tussilago Farfara L. XVII, 24.
Typha angustifolia L. XVIII, 41, 42; XIX, 91.
— — × latifolia XVIII, 42.
— latifolia L. XVIII, 42; XIX, 91.
Tydhula erythropus Bolt. XX, 66.
Typhula gyrans Batsch XX, 66.
— peronata Pers. XX, 66.
— sclerotioides Fr. XX, 66.
— variabilis Riess XX, 66.

Ulex europaeus L. XVIII. 61.
Ulmus montana With. XVI, 135.
Ulota Bruchii Hornsch. XVII, 8.
— crispa Brid. XVII, 8.
— crispula Bruch XVII, 8.
Urocystis spec. auf Ranunculus arvensis XVI, 6.
Urtica dioica L. v. angustifolia Ledeb. XVI, 134.
— — f. galeopsifolia Wierch. XVI, 135.
— — — glabrata Clementi XVI, 134.
— — — Haussknechtii Boiss. XVI, 135.
— — — microphylla Hausm. XVI. 135.
— — — mitissima Hskn. XVI, 134.
— — — monoeca Tsch. XVI, 135.
— — — pubescens Ledeb. XVI, 135.
— — — subinermis Uechtr. XVI, 134.
— — — umbrosa Wedd. XVI, 134.
— pilulifera L. XX, 90.
Usnea XIX, 58.
Ustilago Luzulae Sacc. auf Luzula-Arten XIX, 125, 126.
— Sphagni Nawaschin XVI, 17.
Utricularia vulgaris L. XVI, 23; XVIII. 68; XIX, 87.

Vaccaria parviflora Mnch. s. Saponaria Vaccaria.
Vaccinium intermedium Ruthe XIX, 23.
— Myrtillus L. XVI, 133; XIX. 24. 78.
— — v. coronatum Jacobasch XVIII, 40; XIX. 23, 24.
— — — erythrocarpum Aschs. & Magn. XIX, 23.
— Oxycoccos L. XVI, 133; XX, 88.
— uliginosum L. XVI, 133; XIX, 24.
— — Mückengalle an XVI, 6.
— Vitis idaea L. XVI, 133; XIX, 78.
— — — v. microcarpum Hskn. XVI, 133.
Valeriana officinalis L. XVI, 132; XVII. 31.
Ventenata XX, 79.
Verbänderung XX, 91.
Verbascum Lychnitis L. XVII. 25.
— phoeniceum L. XVI, 7.
— thapsiforme Ehrh. monströs XVI, 19.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verbascum Thapsus L. XVI, 133.
Verbena officinalis L. XVI, 40.
Vergrünung von Aquilegia XIX, 126.
Veronica agrestis L. XVI, 133.
— arvensis L. XVI, 133.
— Aucheri Boiss. XVIII, 46.
— Buxbaumii Ten. XVI, 133.
— fruticulosa L. XVI, 131.
— gentianoides Vahl XX, 41, 42.
— — v. latifolia Boiss. XX, 41, 42.
— — — pontica Hskn. & Bornm. XX, 41, 42.
— latifolia aut. XIX, 86.
— officinalis L. XVI, 44, 133; XVII, 25, 30; XIX, 85.
— praecox L. XVIII, 55.
— prostrata L. XVI, 7.
— scutellata L. XVII, 123.
— serpyllifolia L. XVI, 133.
— spicata L. XVIII, 67; XIX, 86.
— — v. Barrelieri Schott XVI, 41.
— Teucrium L. s. V. latifolia.
Verpa bohemica (Krombh.) v. bispora Cooke XVIII, 28.
Viburnum Lantana L. XIX, 65, 130.
— Opulus L. XVI, 132; XIX, 65.
Vicia cassubica L. XVIII, 40, 86; XIX, 100.
— pisiformis L. XVIII, 86; XIX, 100.
— silvatica L. XVIII, 86; XIX, 100.
— varia Host XVI, 47.
Vinca minor L. XVII, 25; XIX, 79.
Vincetoxicum officinale Mnch. s. Cynanchum Vincetoxicum.
Viola aetnensis Raf. XX, 87.
— aetolica Boiss. & Heldr. XIX, 37, 40, 45.
— alajensis W. Beck. XIX, 37, 40.
— alba Bess. XVIII, 39, 40.
— — × silvatica XVIII, 38.
— alpestris DC. XIX, 26—29, 35.
— — × calcarata XVIII, 38.
— altaica Ker XIX, 26; XX, 87.
— appendiculata DC. XIX, 36, 37, 40—42.
— arvensis Murr. XIX, 26—40, 43, 48.
— — communis XIX, 30.
— — curtisepala XIX, 30.
— — Kitaibeliana XIX, 31, 37—40.
— — — nana XIX, 38, 40.
— — sublilacina XIX, 30.
— — valesiaca XIX, 31.
— — Kulturversuch mit XX, 87.
— austriaca Kern. XVIII, 30.
— Beckiana Fiala XVIII, 39.
— Beraudii Bor. XVIII, 30.
— Bertolonii Salis XX, 87.
— biflora L. XVIII, 30.
— bosniaca Forman. XVIII, 39.
Viola Bubani Timb. XVIII, 39.
— caespitosa Lange XIX, 48.
— — Willk. XVIII, 30.
— Caflischii Woerl. XVIII, 29.
— calcarata L. XVIII, 30; XIX, 26, 27; XX, 87.
— canescens Jord. XIX, 43.
— canina L. XVIII, 29, 72.
— — v. macrantha DC. XVIII, 75.
— — — silvestris Lamk. XVIII, 75.
— — × elatior XVIII, 29.
— — × Riviniana XVIII, 72.
— — × rupestris XVIII, 30.
— — × silvestris XVIII, 72.
— — × uliginosa XVIII, 37.
— — Rchb. XVIII, 29.
— caspia (Rupr.) typica XVIII, 28.
— — v. mesenderana XVIII, 28.
— — — obtusa Freyn & Sint. XVIII, 28.
— Cavillieri W. Beck. XVIII, 30, 39.
— cazorlensis Gandog. XVIII, 28.
— cenisia L. XVIII, 39.
— chelmea Boiss. & Heldr. XVIII, 74, 75.
— — Halácsy XVIII, 39.
— Christii Wolf s. V. alpestris × calcarata.
— collina × arenaria XVIII, 38.
— curtisepala Wittr. XIX, 26, 40.
— cyanea Celak. XVIII, 30.
— declinata W. & K. XVIII, 39; XIX, 26, 27.
— Dehnhardti Ten. XVIII, 39, 40.
— delphinantha Boiss. XVIII, 28.
— Demetria Prolongo XIX, 38, 40, 46, 47.
— diversifolia (Ging.) W. Beck. XVIII, 39.
— Dubyana Burnat XX, 87.
— ebracteolata Fenzl XIX, 36, 41, 42.
— elatior Fr. XVIII, 29.
— epipsila Ledeb. XVI, 126, 127; XVIII, 38.
— — v. gymnophylla Khek XVI, 127.
— — × palustris XVI, 127.
— Eugeniae Parlat. XX, 87.
— glabrata Sal.-Marschl. XVIII, 39.
— gracilis Boiss., Halácsy XX, 87.
— — Clem. XX, 12.
— — Sibth. & Sm. XVIII, 30, 39; XIX, 27; XX, 87.
— Heldreichiana Boiss. XIX, 42.
— helvetica Bruegg. s. V. alpestris × calcarata.
— Henriquesii Willk. XIX, 38—40, 46.
— heterophylla Bertol. XVIII, 39; XX, 87.
— hirta × odorata XVIII, 39.
— — × — permixta XVIII, 71.
— — × — pseudosepincola XVIII, 71.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Viola hirta × pyrenaica XVIII, 39.
— hispida Lamk. XIX, 26, 27.
— hymettia Boiss. & Heldr. XIX, 37, 38, 40, 43.
— Jaborneggii Khek XVI, 127.
— Kitaibeliana R. & Sch. XIX, 42—44.
— lancifolia Thore XVIII, 29.
— latisepala Wettst. XIX, 26, 27.
— libanotica Boiss. XVIII, 74, 75.
— lutea Huds. XVIII, 39; XIX, 26, 27.
— — Velen. XVIII, 39.
— macedonica Boiss. & Heldr. XIX, 37, 40, 44.
— Mercurii Orphan. XIX, 38, 40.
— minima Gaud. XIX, 43.
— mirabilis L. XVIII, 38; XX, 71.
— — × odorata XVIII, 37.
— — × silvatica XVI, 27; XVIII, 29.
— — × — scapigera XVIII, 29.
— modesta Fenzl XIX, 36, 40, 41.
— montana L. XVIII, 29.
— — v. Einseleana F. Schultz XVIII, 29.
— — — nemoralis (Kuetz.) W. Beck. XVIII, 29.
— — — — × pumila XVIII, 29.
— — — — × Riviniana XVIII, 29.
— — × Riviniana XVIII, 29.
— — — — Benziana XVIII, 29.
— — × Sieheana XVIII, 75, 76.
— — × uliginosa XVIII, 37, 38.
— — Mumbyana Boiss. & Reut. XIX, 26, 27; XX, 87.
— nebrodensis Psl. XX, 87.
— nemoralis Kuetz. XVIII, 29.
— occulta Lehm. XIX, 40, 44.
— odorata L. XVII, 23.
— oenipontana Murr XVIII, 39.
— olympica Boiss. XIX, 27; XX, 12, 87.
— — vegeta XIX, 27.
— olyssiponensis Rouy XIX, 38, 40, 45.
— oreliensis W. Beck. XVIII, 75, 76.
— palmensis Webb XX, 87.
— palustris L. XVI, 126, 127; XVIII, 38.
— — v. epipsila (Ledeb.) Klinge XVI, 127.
— — — major Hskn. glabrescens XVI, 127.
— — — — pubinervis XVI, 127.
— — — scanica Fr. XVI, 126, 127.
— — × uliginosa XVIII, 38.
— papillaris Boiss. & Hoh. XVIII, 47.
— parvula Tin. XIX, 36, 37, 40—42.
— — v. glabrata Heldr. XIX, 37, 42.
— perplexa Gremli XVIII, 29.
Viola pindicola v. umbrosa Forman. XIX, 45.
— pratensis M. & K. XVIII, 29.
— pseudogracilis Rigo, Strobl XVIII, 30.
— pubinervis Rehm & Wol. XVI, 127.
— pumila Chaix XVIII, 29.
— pyrenaica Ram. XVIII, 39.
— Rafinesquii Greene XIX, 35.
— Riviniana Rchb. v. XVIII, 71.
— — × scotophylla XVIII, 38.
— — × silvatica XVIII, 72.
— — × uliginosa XVIII, 37.
— rupestris Schmidt v. protensa Beck XVIII, 29, 30.
— Ruprechtiana Borb. XVI, 127.
— saxatilis Schm. XIX, 39, 40.
— Schultzii Billot XVIII, 29.
— sciaphila K. XVIII, 39.
— scotophylla Jord. XVIII, 39, 40.
— — v. glaberrima W. Beck. XVIII, 39, 40.
— sepincola W. Beck. XVIII, 30.
— — Jord. XVIII, 30.
— Sieheana W. Beck. XVIII, 28, 75, 76.
— silvatica Fr. XVI, 127; XVII, 23; XVIII, 28.
— silvestris Lamk. s. V. silvatica.
— spathulata W. XVIII, 47.
— splendida W. Beck. XVIII, 30, 39.
— stagnina Kit. XVIII, 29.
— suavis MB. XVIII, 39.
— Subasii Evers XVIII, 39.
— suecica Fr. XVI, 126, 127.
— tenella Muhlb. XIX, 35.
— thessala Boiss. & Sprun. XVIII, 39.
— thasia W. Beck. XIX, 37, 40, 44.
— tricolor L. XVI, 127; XIX, 26—40, 44, 48; XX, 87.
— — v. alpestris XIX, 32.
— — — arvensis Murr. XVIII, 72.
— — — hortensis XIX, 34; XX, 87.
— — — Machadeana Henriqu. XIX, 39.
— — Kulturversuch mit XX, 87.
— trimestris Ging. XIX, 38, 40, 46, 47.
— uliginosa Schrad. XVIII, 38.
— umbrosa Saut. XVIII, 39.
— valesiaca Thomas XIX, 43.
— Vandasii Velen. XVIII, 29.
— Zoysii Wulf. XX, 87.
Viscaria vulgaris Roehl. s. Lychnis Visc.
Viscum album L. auf Acer platanoides XVIII, 63.
— — — Obstbäumen XVIII, 63.
Vitex Agnus castus L. XVI, 40.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Webera nutans Hdw. XVII, 9.
— carnea Schpr. XVII, 9.
— cruda Schpr. XVII, 9.
— elongata Schwgr. XVII, 9.
Weisia crispa Lindb. XVII, 4.
— microstoma C. Muell. XVII, 4.
— viridula Brid. XVII, 4.
Weißkohlblätter mit Intumeszenzen XVIII, 44.
Winterblätter von Galeobdolon luteum XVI, 13.
Woodsia ilvensis R. Br. s. W. rufidula.
— rufidula Beck. XX, 87.

Xanthium spinosum L. XVIII, 55, 64.
— strumarium L. XVIII, 55.
Xeranthemum annuum L. XX, 91.

Zannichellia palustris L. XIX, 91.
Zizyphus Lotus XVIII, 47.
— vulgaris Link XVI, 68.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis

der in den „Mitteilungen" des Thüringischen Botanischen Vereins, Neue Folge, von Heft XVI (1901) bis Heft XX (1904/1905) enthaltenen Abhandlungen.

Becker, Über *Viola chelmea Boiss. & Heldr.* . Heft XVIII, 74.
— *Viola Sieheana W. Bckr. und Viola montana L. × Sieheana W. Bckr. hybr. nova* . . „ XVIII, 75.
— Systematische Behandlung der *Viola arvensis* s. l. auf Grundlage unserer phylogenetischen Kenntnisse. Mit 1 Tafel . . „ XIX, 26.
Bliedner, A., Weitere Beiträge zur Flora von Eisenach . . . . . „ XVIII, 54.
Bornmüller, J., Über die weitere Verbreitung von *Sideritis curvidens Stapf* . . . . „ XVI, 122.
— Plantae nonnullae ex Asia Media novae. I. „ XVIII, 49.
— Novitiae Florae Orientalis. Series I. . . . „ XX, 1.
Brückner, Ad., Verzeichnis im Herzogtum Coburg aufgefundener Laubmoose mit Einschluß der Torfmoose . . . . . „ XVII, 1.
— Nachtrag dazu . . . . . „ XVII, 18.
Diedicke, H., Teratologische Mitteilungen . . „ XVI, 24.
Eckardt, W., Beiträge zur Kenntis der Thüringischen Pflanzenwelt . . . . . „ XVIII, 57.
Haußknecht, C, Ein Beitrag zur Flora des Fichtelgebirges . . . . . „ XVI, 123.
— Über Geschichte und Vorkommen der Hambuttenbirne *(Pirus Bollwylleriana DC.)* . „ XVII, 102.
— Zur Flora von Eisleben . . . . . „ XVII, 105.
— Noch einmal *Muscari tenuiflorum.* Eine Erwiderung . . . . . „ XVII, 108.
Jacobasch, E., *Vaccinium Myrtillus Dumort. var. coronatum mihi* . . . . . „ XIX, 23.
— *Boletus aurantiacus mihi* nova spec. . . . „ XIX, 24.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Koch, E., Neue Beiträge zur Kenntnis der deutschen Planzenwelt. 1. Thüringen . . Heft XVIII, 76, 77; XIX, 59.
— Nachtrag dazu . . . . . „ XIX, 98.
Lehbert, Rud., Über den lusus subbiflorus und andere Abweichungen und Abnormitäten der Blüte bezw. des Ährchens der Gattung *Calamagrostis Adans.* Mit 2 Tafeln . . „ XX, 74.
Osswald, L., Die Gattung *Euphrasia* im Harz und in den angrenzenden Gebieten . . . „ XVII, 18.
Quelle, F., Zur Biologie der Polytrichaceen . „ XIX, 17.
— Die Kryptogamen in Thals „Sylva Hercynia" „ XIX, 49.
Reinecke, C., *Rosa gallica* × *agrestris f. munimenti R. Keller* . . . . . „ XVIII, 70.
— Weitere Beiträge zur Flora von Erfurt . . „ XVIII, 71.
Sagorski, E., Beitrag zur Flora der Herzegovina . . . . . „ XVI, 33.
Schultze-Wege, Johanna, Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze (Fortsetzung) . . . . . „ XVII, 33; XX, 63.
Schulze, Max, Nachträge zu „Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Österreichs und der Schweiz." IV. Mit Abbildungen im Text „ XVII, 37.
Torges, E., Botanische Ergebnisse aus dem Jahre 1901:
1. Aus den Floren Thüringens und des nordöstlichen Bayerns . . . . . „ XVI, 27.
2. Zur Gattung *Calamagrostis Adans* . . „ XVI, 30.
— Zur Gattung *Calamagrostis Adans:*
1. Die vermeintliche *Calamagrostis litorea* der Leipziger Flora . . . . . „ XVII, 76.
2. *Calamagrostis rigens Lindgr.* . . . . „ XVII, 81.
3. *Calamagrostis Halleriana* × *varia* n. hybr., *C. Prahliana m.* . . . . . „ XVII, 88.
4. *Calamagrostis epigeios* × *lanceolata, C. Neumaniana m.* . . . . . „ XVII, 93.
5. Einige andere Beiträge . . . . . „ XVII, 99.
— Zur Gattung *Calamagrostis Adans* . . . „ XX, 51.
Thomas, Fr., *Lysimachia ciliata L.* in Thüringen „ XIX, 8.
— Die meteorologischen Ursachen der Schlitzblättrigkeit von *Aesculus Hippocastanum* „ XIX, 10.
Wein, K., Beiträge zur Flora von Wippra. I. *Geranium phaeum L.* im Unterharze bei Wippra. Mit 1 Skizze im Text . . . „ XX, 68.
Zahn, G., Das Herbarium des Dr. Caspar Ratzenberger (1598) in der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha . . . , ... „ XVI, 50.

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Zahn, G., Zwei kleine Herbarien aus der Zeit Herzog Ernsts des Frommen (1601—1675) in der Handschriftensammlung der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha . . . . . Heft XVII, 22.

Nekrologe.

Dr. Ernst Biltz, gest. den 10. Januar 1903 . . Heft XVIII, 1.
Hofrat Prof. Carl Haußknecht, gest. den 7. Juli 1903 . . . . . „ XVIII, 21.
Marine-Stabsarzt a. D. Dr. Ferdinand Naumann, gest. den 26. Juli 1902 . . . . . „ XIX, 1.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1904-1905

Band/Volume: NF_20

Autor(en)/Author(s): Redaktion der Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Artikel/Article: Register, Verzeichnis uns Nekrologe I-XL