©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze.

Von **Johanna Schultze-Wege.**

(Fortsetzung von Heft XV, S. 41 ff.).

I. Hymenomycetes.

A. Agaricini.

3. Dermini.

Pholiota *caperata (Pers.), terrigena Fr., Secretani Fr., praecox (Pers.), radicosa (Bull.). pudica (Bull.), leochroma Cooke, aegerita Fr.* (Münchengirn bei Friedrichroda), *capistrata Cooke* (Wilder Graben b. Weimar), *Brigantii Fr.*, (Schwarzathal), *luxurians Fr., comosa Fr.* (am Wurzelhals von *Cactus Ackermani), heteroclita Fr., aurivella, Batsch, squarrosa Müll., subsquarrosa Fr., spectabilis Fr., adiposa Fr., tuberculosa Fr., curvipes (Atb. et Schw.), muricata Fr., tersa Fr.* (Ettersberg), *mutabilis (Schaeff.), marginata Batsch, mustelina Fr., pumila Fr.;*

Inocybe *relicina Fr., calamistrata Fr., lanuginosa (Bull.), dulcamara (Alb. et Schwein.) pyriodora (Pers.), lacera Fr., flocculosa Berkl.* (Belvedere), *capucina Fr.* (Kösen), *asinina Kalchbr.* (Belvedere), *mutica Fr.* (Ettersberg), *deglubens Fr.* (Belvedere u. Legefeld), *obscura (Pers.), fibrosa Sowb., phaeocephala Vill.* (Göttersitz bei Kösen), *hiulca Fr., rimosa Bull., eutheles Berkl. et Br., destricta Fr., perbrevis Weinm., descissa f. aurivenia Fr., auricomus Batsch, grata Weinm., sambucina Fr., caesariata Fr.* (Naumburg a. S.), *lucifuga Fr., geophylla Sowb., scabella Fr., mammilaris Passer.* (Ettersberg);

Hebeloma *mussivum Fr. (Kösen), sinuosum Fr., fastibile Fr., glutinosum Lindgr.* (Ettersberg), *testaceum Batsch, firmum Pers.* (Arlberg b. Berka), *claviceps Fr., birrus Fr.* (Göttersitz), *versipelle Fr., strophosum Fr., mesophaeum Fr., holophaeum Fr., crustuliniforme (Bull.), longicaudum Pers., diffractum Fr.* (Weimar), *spoliatum Fr., sterile Fr., magnimamma Fr.* (Naumburg a. S.), *petiginosum Fr.;*

Flammula *paradoxa Kalchbr., Tammii Fr.* (Ettersberg), *abrupta Fr.* (Blankenhain), *decipiens Worth. Smith* (Schwarzathal), *lubrica Fr., gummosa Lasch, spumosa Fr., carbonaria Fr., alnicola Fr., flavida (Schaeff.), azyma Fr., penetrans Fr., Liquiritiae*

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

(Pers.), *limulata Fr.* (Silbergrund b. Oberhof), *ochrochlora Fr.* (Berka), *helomorpha Fr.;*

Naucoria *hilaris Fr.*, *anguinea Fr. (Kösen)*, *micans Fr.*, *centunculus Fr.*, *hyperella Fr.*, *innocua Lasch*, *cerodes Fr.*, *scolecina Fr.* (Paulinzella), *sideroides (Bull.)*, *vervacti Fr.*, *pediades Fr.*, *semiorbicularis (Bull.)*, *arvalis Fr.*, *tenax Fr.*, *temulenta Fr.*, *sobria Fr.*, *conspersa (Pers.)*, *effugiens Quél.;*

Galera *lateritia Fr.*, *tenera (Schaeff.)*, *ovalis Fr.*, *conferta (Bolt.)*, *spartea Fr.*, *vittaeformis Fr.*, *rubiginosa Pers.*, *mniophila Lasch*, *pityria Fr.*, *mycenopsis Fr.*, *vestita Fr.*:

Tubaria *furfuracea (Pers.)*, *stagnina Fr.*, *pellucida (Bull.)*, *embolus Fr.* (Naumburg a. S.) *crobulus Fr.*, *inquilina Fr.;*

Crepidotus *palmatus (Bull.)* *alveolus Lasch*, *mollis (Schaeff.)*, *applanatus (Pers.)*, *scalaris Fr.* (Ettersberg), *haustellaris Fr.*, *chimonophila Berkl. et Br.* (Leinagrund).

4. Cortinarii.

Phlegmacium *claricolor Fr.*, *turmale Fr.*, *sebaceum Fr.*, *varium (Schaeff.)*, *cyanopus (Secr.)*, *largum Fr.*, *nemorense Fr.* (Kösen), *percome Fr.*, *latum Fr.*, *saginum Fr.* (Ettersberg), *cephalixum (Secr.)*, *russum Fr.* (Belvedere), *anfractum Fr.*, *multiforme Fr.*, *Napus Fr.*, *allutum Fr.*, *glaucopus (Schaeff.)*, *calochroum Fr.*, *arquatum (Alb. et Schw.)*, *fulgens (Alb. et Schw.)*, *fulmineum (Pers.)*, *elegantius Fr.*, *orichalceum Batsch*, *emollitum Fr.*, *decoloratum Fr.*, *maculosum (Pers.)*, *intentum Fr.* (Ettersberg), *vespertinum Fr.*, *liratum Fr.*, (Weimar), *compar (Weinm.)*, *olivascens Batsch;*

Myxacium *alutipes (Lasch)*, *arvinaceum Fr.*, *collinitum Fr.*, *mucifluum Fr.*, *elatius Fr.*, *grallipes Fr.* (Ettersberg), *suratum Fr.*, *nitidum Fr.*, *epipoleum Fr.* (Ettersberg), *pluvium Fr.*, *vibratile Fr.* (Berka);

Inoloma argutum Fr. (Greifenstein b. Blankenburg), *argentatum Fr.*, *violaceum (L.)*, *cyanites Fr.*, *muricinum Fr.*, *cinereo-violaceum Fr.*, *alboviolaceum (Pers.)*, *traganum Fr.*, *suillum Fr.* (Legefelder Wald), *callisteum Fr.*, *Bulliardii (Pers.)*, *pavonium Fr.* (Belvedere), *bolare Pers.*, *craticium Fr.* (Berka), *sublanatum Sowb.;*

Dermocybe *decumbens (Pers.)*, *canina Fr.*, *azurea Fr.*, *anomala Fr.*, *cinnabarina Fr.*, *sanguinea (Wulf.)*, *anthracina Fr.*, *cinnamomea (L.)*, *orellana Fr.*, *infucata Fr.* (Belvedere), *fucatophylla Lasch*, *colymbadina Fr.*, *subnotata (Pers.)*, *raphanoides (Pers.)* *depexa Fr.*, *veneta Fr.* (Schwarzburg);

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Telamonia *macropus Fr., lanigera Fr.* (Kirchfelsen im Schwarzathal), *bivela Fr., bulbosa (Sowb.), torva Fr., impennis Fr., plumigera Fr.* (Schoppendorf), *evernia Fr., quadricolor (Scop.), armillata Fr., limonia Fr., helvola Fr., hinnulea F.* (Süßenborner Holz), *gentilis Fr., bovina Fr., injucunda (Weinm.)* (Berka), *brunneofulva Fr., psammocephala Fr., incisa Fr., iliopodia Fr., hemitricha (Pers.);*

Hydrocybe *firma Fr., subferruginea (Batsch), damascena Fr., duracina Fr., candelaris Fr.* (Weimar), *illumina Fr.* (Ettersberg), *tortuosa Fr., diluta (Pers.), saturnina Fr., castanea Bull., balaustina Fr.* (Legefeld), *isabellina (Batsch), rubricosa Fr., pateriformis Fr.* (Gottlob b. Friedrichroda), *rigens Fr., fulvescens Fr., Krombholzii Fr., Reedii Berkley* (Ilmenau), *leucopus (Bull.), decipiens (Pers.), germana Fr.* (Naumburg a. S.), *saniosa Fr., milvina Fr, fasciata Fr.*

5. Paxillus

Paxillus *giganteus (Sowb.), sordarius (Pers.), Alexandri Fr., lepista Fr., extenuatus Fr., involutus (Batsch), atrotomentosus (Batsch), griseotomentosus (Secr.) chrysophyllus Trog., crassus Fr.* (Naumburg a. S.), *panuoides Fr.*

6. Gomphidius.

Gomphidius *glutinosus (Schaeff.), roseus Fr., viscidus (L.), maculatus (Scop.)* (Griesbachfelsen im Schwarzathal), *gracilis Berkl.* (Berka).

7. Pratelli.

Psalliota *augusta Fr., arvensis (Schaeff.), cretacea Fr., pratensis (Schaeff.) fulveola Lasch, campestris (L.), a. praticola (Vitt.), b. umbrina (Vitt.), c. villatica (Brond.), d. vaporaria (Krmbh.), silvicola (Vitt.), silvatica (Schaeff.), haemorrhoidaria (Kalchbr.), setigera Fr.* (Weimar und Schwarzathal), *sagata Fr.* (Steiger b. Erfurt), *semota Fr.* (Grunstedter Holz), *dulcidula Schulzer* (Kl. Ettersberg), *rusiophylla Lasch, haematosperma (Bull.);*

Stropharia *aeruginosa Curt., albocyanea Desmaz., coronilla (Bull.), obturata Fr., melasperma (Bull.), semiglobata Batsch;*

Hypholoma *silaceum (Pers.), sublateritium (Schaeff.) capnoides Fr., epixanthum Fr., elaeodes Fr., fasciculare Huds., aelopus Fr.* (Schwarzathal), *dispersum Fr., storeum Fr.* (am Dammbachgrunde b. Berka), *lacrymabundum Fr., pyrotrichum Holmsk., velutinum (Pers.), melantinum Fr.* (Legefeld), *cascum Fr., coriarium Comm. Critt. Ital.* (Kösen), *intonsum Passer., Artemisiae Passer.* (Schwarzathal), *Candolleanum Fr., egenulum Berkl.* (Weimar);

©Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.

Psilocybe *nemophila Fr.* (Schneekopf), *elongata (Pers.), agraria Fr.* (Belvedere), *coprophila (Bull.), bullacea (Bull.), atrorufa (Schaeff.), nuciseda Fr., tegularis Schum.* (Ettersberg), *callosa Fr., semilanceata Fr., canobrunnea Fr., spadicea Fr., hygrophila Fr.* (Belvedere-Allee), *polycephala Paulet, cernua Fl. Dan., murcida Fr., clivensis Berkl. et Br.*, (Belvedere);

Psathyra *conopilea Fr., corrugis (Pers.), stricta Trog., gyroflexa Fr., spadiceo-grisea (Schaeff.), obtusata Fr., bifrons Berkl.* (Tautenburg), *gossypina (Bull.), Noli tangere Fr.*

8. Coprinarii.

Panaeolus *separatus (L.), leucophanes Berkl. et Br.* (Rödchen), *fimiputris (Bull.), phalaenarum Fr., retirugis Fr., remotus (Schaeff.), sphinctrinus Fr., campanulatus (L.), papilionaceus Fr., caliginosus Jungh., acuminatus Fr., fimicola Fr.;*

Psathyrella *subatrata Fr., gracilis Fr., impatiens Fr., hiascens Fr., caudata Fr., crenata Lasch, disseminata (Pers.).*

9. Coprinus.

Coprinus *comatus Fr., ovatus (Schaeff.), atramentarius (Bull.), soboliferus Fr., fuscescens (Schaeff.), picaceus (Bull.), extinctorius (Bull.), fimetarius (L.), var. b. macrorrhizus (Pers.), tergiversans Fr., micaceus (Bull.), truncorum (Schaeff.), aratus Berkl. et Br.* (Weimar), *alopecius Fr., deliquescens (Bull.), digitalis (Batsch), ephemeroides (Bull.), cyclodes Fr.* (Weimar), *narcoticus (Batsch), macrocephalus Berkl.* (Kösen), *nycthemerus Fr., domesticus (Pers.), stercorarius Fr., coopertus Fr.* (Berka), *ephemerus Fr., sociatus Fr., plicatilis (Curt.), filiformis Berkl. et Br.* (Weimar), *sceptrum Fr.*

10. Bolbitius.

Bolbitius *Boltonii (Pers.), fragilis (L.) conocephalus (Bull.), apicalis Worth. Smith* (Göttersitz bei Kösen), *tener Berkl.* (Schwarzathal), *purifluus Lasch.*

Zwar nicht in Thüringen, aber doch in Deutschland, wo er noch nirgends erwähnt wird, im Walde bei Düsseldorf in einem hohlen Baumstumpf, habe ich *Montagnites Candollei* gefunden, der bisher nur im Meeressande bei Montpellier und in Algier beobachtet wurde. Alle Merkmale stimmen, bis auf die breiteren, bauchigen Lamellen, deren kräftige Ausbildung eine Folge des nahrhaften Standortes sein mag.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: NF_17

Autor(en)/Author(s): Schultze-Wege Johanna

Artikel/Article: Verzeichnis der von mir in Thüringen gesammelten und gemalten Pilze. 33-36