

Zitomislic, ca. 40 m. Eine Form mit ungewöhnlich großen Blättchen (2 cm lang, 1 cm breit). Die ganze Pflanze ist vollständig kahl. Nach der Beschaffenheit der Frucht und den übrigen Eigenschaften gehört sie jedoch zweifellos zu *Th. foetidum* L. Sie dürfte einen höher gelegenen Standort haben, von dem aus Samen durch die Narenta hinabgekommen ist.

Thalictrum elatum Jcq. Hort. bot. Vind. III, p. 49, t. 95 (1776). In riesigen Exemplaren in Hecken bei Bojiste, 950 m.

Thalictrum simplex L. Fl. Suec. ed. II, p. 191 (1755). Neve-sinsko polje, 850—950 m; — *var. alpicola* Jord. 1864, Velez planina bei 1500 m zusammen mit *Gentiana crispata* Vis. — Stimmt vollständig überein mit Exemplaren aus den Hautes-Alpes.

Clematis Viticella L. Sp. pl. p. 543 (1753). In Hecken bei Mostar, 80—150 m.

Das Herbar des Dr. Caspar Ratzenberger (1598) in der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha.

Von G. Zahn.

Dieses älteste Herbarium Thüringens vom Jahre 1598 befindet sich unter der Bezeichnung Codex chartaceus I 153—156 in der Handschriftensammlung der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Ein Seitenstück zum Gothaer Herbar von demselben Verfasser aus dem Jahre 1592 besitzt die Königliche Bibliothek zu Cassel. Dieses ist mit längeren Unterbrechungen 1859—1870 von Dr. H. Fr. Kessler, Cassel (Verl. v. A. Freyschmidt), bearbeitet und nach damaliger Erfahrung als das älteste deutsche Herbar bezeichnet worden.

Das Gothaer Herbar umfasst vier verschieden starke Bände in Holzdeckel. Diese sind außen mit gepresstem Leder überzogen und theilweise noch mit Messinghaken versehen. Das erste Blatt jedes 50 cm langen, 20 cm breiten Bandes enthält ein mit der Hand in bunten Farben ausgeführtes Titelbild, in dessen Umrahmung verschiedene, meist erkennbare Pflanzen arrangiert sind; der Titel selbst ist nach damaligem Gebrauche weitläufig und umständlich und in verschiedenen Schriftzeichen und Farben geschrieben. Ursprünglich

sind die aus starkem Handpapier bestehenden Blätter der Bände einzeln beklebt und beschrieben und später erst vereinigt worden. Manche Pflanze ist anfangs auf Papier befestigt gewesen, sorgfältig ausgeschnitten und anscheinend mit Tischlerleim — wie alle übrigen — aufgeklebt worden. Für größere Pflanzen benutzt R. zwei Blätter. Die Vollständigkeit der meisten Exemplare an Wurzeln, Blättern, Blüthen und Früchten ist bewundernswerth. Leider sind aber auch einige Pflanzen nur durch ein oder mehrere Blätter veranschaulicht, sodass sie schwer zu deuten sind. Manche Blüthen und Blätter sind durch Insektenfraß zerstört; aber im Ganzen ist die Sammlung doch gut erhalten; Buchsbaum zeigt sogar noch die grüne Farbe, Levkojen lassen die Blütenfarbe erkennen; einzelne Blüthen hat R. in Farben wiedergegeben. Eigenthümlich ist, dass er viele Pflanzen in Theile zerlegt und diese symmetrisch wieder zusammenfügt, sodass der Habitus ganz verändert ist. Bei einigen Exemplaren verschmäh't R. nicht, Blätter oder Blüthen anderer Pflanzen zuzufügen; fremde Früchte, z. B. *Tamarindus* garniert er mit Weidenblättern, *Cassia* mit Eschenblättern. R. zählt nicht die einzelnen Seiten, sondern die Blätter fortlaufend durch das ganze Werk, schiebt jedoch oft noch Blätter ein, sodass eine neue Numerierung nöthig wurde, um die einzelnen Pflanzen bezeichnen zu können. Im B. I findet sich ein lateinisches und deutsches Register, dessen Ausdrücke nicht immer mit denen der betreffenden Seiten übereinstimmen. Das Hauptregister enthält 2101 Namen für Pflanzen, welche wegen der zahlreichen Synonymen auf 928 Arten zusammenschmelzen. Das Casseler Herbar enthält 740 Arten in 3 Bänden. Unter den 928 Arten sind freilich c. 55 Dubletten, Farbenvarietäten, Monstrositäten. Wenige Pflanzen bezeichnet R. nur mit dem Gattungsnamen; zumeist fügt er Artnamen hinzu, was bemerkenswerth ist, da die botanische Kunstsprache zu jener Zeit erst in den Anfängen war. Er wählt bereits Größen-, Farben-, Ortsbezeichnungen, aber auch die Namen von Heiligen, z. B. *Flos Divae Otyliae*, mythische Bezeichnungen, z. B. *Sagitta Herculis*, Ortsangaben, z. B. *Glycyrrhiza Bambergica*, Glieder von Thieren, mit welchen Pflanzentheile eine entfernte Aehnlichkeit haben, z. B. *Pes caprae*. Zuweilen hilft er sich mit Zahlen, z. B. *Volubilis I*, *Volub. II* für verschiedene Pflanzen; sehr häufig führt er Namen berühmter Botaniker, Gelehrter des Alterthums an. Hervorzuheben ist, dass 50 Benennungen auch heute noch üblich sind. Bei wichtigeren Pflanzen fügt er Bezeichnungen in fremden Sprachen an, z. B. bei *Chelidonium majus* außer 13

lateinischen und griechischen Synonymen noch 11 arabische, 2 italienische, 3 spanische, 3 französische, 2 böhmische, 4 deutsche Namen; bei einigen Pflanzen ist auch die ungarische Sprache vertreten. Die deutschen Namen bieten dem Sprachforscher eine reiche Fundgrube; eigenartig ist ihre Orthographie, besonders die Häufung der Konsonanten, z. B. Hyrtzschwurtzell, ferner die Inkonsequenz der Schreibweise (Eichbaum und Eychbaum), umständlich die Ausdrucksweise (*Erysimum orientale* = „Durchwachs mit Steckrubleinblettern“). Manche Namen sind noch volksthümlich, andere mythologisch interessant. Leider sind die Fundorte nur bei 57 Pflanzen angegeben, darunter 16 aus Deutschland. Diese Angaben, sowie zahlreiche medizinische, kulturhistorische, botanische Bemerkungen sind in lateinischer Sprache verfasst; nur bei der Oelgewinnung aus *Olea* ist eine längere deutsche Beschreibung zu finden, in welcher auch der thüringischen Waidmühlen in Vergleichung mit den Oelpressen gedacht wird. Bemerkungen, welche allgemeinen Werth haben dürften, sind in der Ausführung im Originaltext wiedergegeben worden.

Von einer systematischen Anordnung ist nichts zu finden, obwohl R. sagt „er habe die Kräuter mit viel Fleiß zusammen und in drei unterschiedliche Theil gebracht“; höchstens kann man eine Unterscheidung in Bäume, B. I, und in Kräuter, B. II, III, IV, annehmen. Der ganze Charakter der Zusammenstellung ist pharmazeutisch; dafür spricht 1) die Aufnahme von 73 Drogen (Rad., Herb., Sem., Gummi u. s. w., welche im Casseler Herbar fehlen, 2) die Vorrede zum II. B. des Gothaer Herbars: „aus- und einlendische Gewechse so zum Haupt, Lungenn, Leber, Miltz, Magen, Nieren und anderenn dienlichenn u. s. w.“, 3) eine Bemerkung in der Dedikation zum Casseler Herbar: „aus diesem meinem Herbario vivo können Junge Medici und Medicinae Tyrones innerhalb 8 tagenn so viell aus und Einlendische kreuther und Simplicia kennen lernen, als ich ohn ferniglichenn wol in zehenn oder zwölf jahrenn zu lernen und zu kennenn nicht vermochte, wie denn disfalls dieser mein Herbarius in einer Bibliothek solchenn Tyronibus nützlichenn und sehr diehnlichenn sein würde“.

Wie das Gothaer Herbar in den Besitz der Herzoglichen Bibliothek gekommen ist, kann bis jetzt nicht nachgewiesen werden. Es scheint von Herzog Ernst dem Frommen nach dem Tode R.s, welcher 1603 erfolgte, erworben worden zu sein. R. hat dasselbe 1602 noch in Händen gehabt, was aus einer Bemerkung bei *Nicotiana* hervorgeht, „nata anno 1602 ex semine ab Amsterdamo misso“. Da die betreffenden Rechnungsablagen aus der Zeit Ernsts d. Fr.

vor einigen Jahren eingestampft worden sind, wird ein sicherer Nachweis wohl für immer ausbleiben.

Die Nachrichten über R.s Leben sind sehr spärlich und unvollkommen. Dr. Kessler hat in Saalfeld, dem Heimathsorte R.s, sowie in Naumburg, dem späteren Aufenthaltsorte, ziemlich erfolglose Nachforschungen angestellt. Ein Hinweis auf das Gothaer Herbar findet sich in Tenzels „monatlichen Unterredungen etlicher guten Freunde von allerhand Büchern und anderen annehmlichen Geschichten“ (Leipzig 1691). Darin sagt T., dass er besagtes Herbar mehrmals in Händen gehabt habe; es beliefe sich die Zahl der gesammelten Pflanzen auf 1300. Einen zweiten Hinweis bringt Jöchers Gelehrten-Lexikon I. I., p. 1922, freilich mit Unrichtigkeiten bezüglich des Geburtsortes und der Abstammung R.s. Beide Quellen führt auch Dr. Kessler an. Als neu sind folgende Angaben hinzuzufügen. 1) Aus dem Gelehrten-Lexikon von Chr. W. Kestner (Jena 1740). Bei Nennung des Medicus und Freundes von Luther, Mathias Ratzenberger 1501 bis 1559 warnt er, „diesen nicht zu verwischen mit Caspar R., der ein Herb. viv. verfasst habe“. 2) Aus Casp. Sagittarius historia bipartita Eccardi II (Jena 1718). Hier heißt es, R. sei den 22. Nov. 1603 gestorben und es sei von ihm ein Herb. viv. von 1598 in 4 Bänden in der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha vorhanden. Eine ähnliche Notiz findet sich auch 3) in Zedlers Gelehrten-Lexikon von 1741. 4) In dem Catal. Codicum manuscript. Bibl. Gothanae v. Cyprian (1714), pag. 72 steht: C. R. herbarium vivum incredibili labore confectum anno 1598 finitum“, während eine spätere Katalogbemerkung allerdings besagt, dass das H. R. vor einigen Jahren als gänzlich zerfallen und unbrauchbar entfernt worden sei. — R.s Lebensgeschichte muss daher zusammengestellt werden aus der erwähnten Dedikation, aus den Vorreden zu seinen Herbarien und aus eingestreuten Notizen in denselben. Nach seinen Angaben hat R. 37 Jahre hindurch „große Mühe, vleys unnd unkosten darahngewendet“, sich in der „Erkenntnis“ von Thieren, Pflanzen und Mineralien zu üben. Er bezog 1554 die Universität Wittenberg und lernte durch die „Herbationes der Doktoren Vitus Winschemius und Casparus Peucerus, sonderlichen aber auff und umb den Polensberg und in dem Hölzleinn, die Rothe mark genannt, viel und allerley kreuther“ kennen; 1557—1558 studierte er in Jena und sammelte „umb und auf dem Kunitzer und Gleißberge“ viele Pflanzen. Als junger Medicus reiste er 1559 über Augsburg, Innsbruck, Trident nach Italien, besuchte 1560 das südliche Frankreich und hielt sich

wahrscheinlich längere Zeit in Montpéllier auf (er erwähnt hier seinen „Lehrer Rondeletius“), lernte nach dem Gothaer Herbar Orleans und Troyes kennen und wendete sich nach dem Casseler Herbar über Genf, Lausanne, Solothurn, Zürich, Basel, Constanz, Ravensberg, Memmingen, Augsburg und Ingolstadt nach Nürnberg. Nach Dr. Kessler führte er von Lyon bis Nürnberg „Einen halben Saumm“ (c. 2½ Ctr.) und von da bis Saalfeld „bey dreyenn Cenntner Kreuter, Früchtenn, Sahnenn, Mehrfischenn, mehrgewehsenn und aller Anderer Sortenn“ mit sich. Um 1564 muss er sich in Naumburg als „Medicus Physikus“ niedergelassen haben; das bezeugt eine Notiz im Casseler Herbar (*Carthamus* 1564 in seinem Garten zu N. gezogen). Hier oder in Ortrant (nach Jöcher) ist er 1603 gestorben.

Das Pflanzenmaterial hat R. theils auf seinen Reisen zusammengetragen, theils in seinem „Lust und Kreutergarten selbst gezelet und gepflanzt“, theils aus „Lysibona, Antorff (Antwerpen), Dantzick, Wyen“ auch „andern Oerter Lustgartenn per amicos, Doctores Medicos, Pharmacopaeios, Hortulanos, Materialistas“ zugeschickt erhalten. Hieraus entstanden die beiden Herbarien. Sie haben nur historischen Werth, der aber dadurch erhöht wird, dass R. einer der ersten Aerzte und Botaniker — wenn nicht der erste — in Deutschland gewesen ist, welcher die Methode anwendete, getrocknete Pflanzen auf Papier zu befestigen und mit Namen und Bemerkungen zu versehen. Hieraus erklärt sich die Bezeichnung „Herbarius vivus, Lebendig Kreuterbuch“, zum Unterschiede von den damals üblichen gedruckten und illustrierten Kräuterbüchern.

In Folgendem bringe ich nun, wortgetreu und unter Beibehaltung der Schreibweise R.s, Titel und Vorreden und dann die Aufzählung der Pflanzen seiner Sammlung nach seiner Benennung bz. Bezeichnung und mit seinen Bemerkungen zu ihnen. Der heutzutage gültige wissenschaftliche Name, wie er sich aus meiner z. Th. recht schwierigen Bestimmung ergeben hat, ist (*kursiv* gedruckt) der Original-Benennung vorangestellt. — Die Reihenfolge der Pflanzen im Herbar habe ich nicht beibehalten; sondern ich habe diese, der besseren Uebersicht wegen, systematisch geordnet, und zwar die Phanerogamen nach Th. Durand, Ind. gen. phanerog. (Berlin, Bornträger, 1888), die Kryptogamen in umgekehrter Folge nach A. Engler, Syllabus der Pflanzenfamilien (Berlin, Bornträger 1898).

Bei der Bestimmung sind u. a. benutzt worden:

Codex botan. Linnaeanus, Syst. Vegetab., bearb. v. E. Richter,
Willdenow, Anleit. z. Selbststud. d. Botanik,
Hayne, Darstell. u. Beschreib. d. in d. Arzneikunde gebräuchl.
Gewächse,
Endlicher, Enchirid. botan.,
Koch, Synops. fl. germ.,
Berger, Bestimmung d. Gartenpflanzen, Erlangen 1855,
Leunis, Synopsis,
Gärcke, Fl. v. Deutschl., 17. Aufl.

„Herbarius vivus,
Lebendig Kreuterbuch

aller Gewechss, Beume, Stauden, Heckenkreuter, Wurtzeln, Blüet,
Blomenn, Früchte, Saamenn, Gummaten, Hartzichenn Safften, Ge-
würtz, Getreide, Meer- u. Wassergewechsenn, so in Deutsch, Frank-
reich und Welschenn Landen, in Hispanien, Indien, Türckey und
andernn Orten der newenn Welt wachsende durch mich

Casparum Ratzenberger Salveldensem,

der Ertzney Doctorem und der Stadt Naumburgk ann der Sala
Medicum Physicum zum theill in oberwehtenn auslendischenn Landenn
selbst eingesamlett. zum theill aber ims meinenn Lust- und Kreuter-
garten selbst gezielett und gepflanzett und von Lyzibona, Antorff,
Dantzick, Wyen, auch andern Oerter Lustgartenn sambt derselbigen
rechtenn Nahmenn inn Mancherley sprachenn, und so viel müglichen
inn ihrer Natürlicher und Lebendiger erwachung der Wurtzeln,
Stemme, Blettern, Blüten, Blumenfrüchten und Saamen mitt allenn
fleiß zusammen und in drey unterschiedlige theil gebracht.

Das erste theill, inn welchenn die Bewme, Stauden und Hecken
lauts folgenden Registers befunden werden.“

Anno 1598.

2. Index acuratissimus latinus omnium plantarum, stirpium,
arborum nempe fruticum, subfruticum, herbarum, plantarum, foliorum,
florum, seminum fructuum, tum communium tum Aromaticorum, lig-
norum, Radicum, Gummatum, Succorum omnis generis, tam inquil-
norum quam exoticorum. Quae partim Germania sponte producit,
partim ab exteris Regionibus et nationibus per Amicos meos, Doctores
Medicos, Pharmacopaeios, Hortulanos, Materialistas mihi fidelissime
allata communicata transmissa.

In horto meo Medico Naumburgi singulari magnoque labore, diligentia enata et producta sunt, ex illis etiam quam plurima in hunc usque diem coluntur.

Atque in hisce quatuor Tomis Herbariorum vivorum artificiali glutino affixa conspiciuntur et habentur“. (Folgt das lateinische Register.)

3. „Deutsch Register“. (Inhaltlich ähnlich dem vorigen.)

4. Das Vorwort zum B. II. kennzeichnet den medizinischen Charakter der Pflanzen. Aehnlich das Vorwort zum B. III. . . . „Kräuter und simplicia so zur Wundt Artzeney, volgendts so da Dollenn tragenn, Bulbacia, Tuberosa, Orchides et similia, Coronaria, Narcotica, Deleteria, Lactaria, Carduata, Convolvuli, Amplexibiles, Leguminosa, Trifoliata et Miscellae aliquot congenerum plantarum zusammengebracht“ etc.

„Tomus IV. continens: Carduata, Frumenticia, Herbacia, Aquatica; Chirurgica, Convolvula, Trifoliata, Leguminosa et Siliquata per me C. R. collecta.“

5. Authores, ex quibus hoc opus desumptum est et a me in hisce quatuor tomis vivorum herbariorum citati:

Aetius. Avicenna. Anguillaris. Apuleius. Antonius Musa Brassavolus. Andreas Lavina. Adamus Lonicerus. Amatus Lusitanus. Averrhoës. Almansor. Aristoteles. Arnoldus Villanovanus. Aloisius Anguillara. Actuarius. Athenaeus. Alexander Trallianus. Aurelius Cornelius Celsus. Andreas Bellunensis. Andreas Caesalpinus. Antonius Fumanellus. Conradus Gesnerus Tigurinus. Carolus Clusius. Casparus Bauhinus Botanicus. Columella. Dioscorides. Democritus. Guilhelmus Turnerus Anglus. Galenus. Guilhelmus Rondoletius. Guilhelmus Varignama. Garcias de Orca. Halyabbas. Hieronymus Tragus. Hieronymus Brunsuicensis. Hyppocrates. Johannes Thalius. Johannes Ruellius. Joachimus Camerarius. Jacobus Manlius. Janus Cornarius. Jacobus Theodorus Tabernaemontanus. Jacobus Sylvius. Johannes Dalechampius. Johannes Mesues Damascenus. Johannes Vigonius. Johannes Serapio. Leonhardus Fuchsius. Leonhardus Rauwolfius. Lucius Columella. Mesues. Mathias Lobelius Lugdunensis Herbarius. Mattheus Sylvaticus. Marcellus Vergilius Florentinus. Mattheus de Gradi. Nicolaus Monardes. Nicander. Orpheus. Otto Brunsuicensis. Plinius. Paulus Aegineta. Pythagoras. Palladius. Petrus Andreas Matthiolus. Petrus Pena. Rhazes. Rombertus Dodonaeus. Reimundus Lullius. Stephanus Glossographus Halybatis. Simon Januensis. Simeon Sethi. Theophrastus. Theodorus Gaza. Valerius Cordus. Varro. Zoar Arabs“.

Phanerogamae.¹⁾**Ranunculaceae.**

- 1.* *Clematis Vitalba* L. (*Vitis nigra*, *Clematis tertia* — Wald-Reben, Lienen) I 63, 1 [III 491].
2. — *recta* L. (*Flammula*, Fl. Jovis — Brenwurtz, Blätter Zug) IV 537, 2.
- 3.* — *Viticella* L. (*Clematis peregrina* fl. coer., Cl. altera Dioscoridis — Frembde blaue Wald Reben) I 64, 1 [I 66].
4. — *integrifolia* L. (Cl. caerul. pannonica Caroli Clusii) I 63, 3.
5. — *Flammula* L. (Cl. peregrina) I 63, 4.
6. *Thalictrum flavum* L. (*Rutta pratensis major*, R. *Vulneraria*, Thal. majus pratense, *Saxifraga lutea Monspeliensium* — Groß wiesen Rautte, Wundt R., Heyll Blatt) II 295, 1.
- 7.* — *minus* L. (*Rutta pratensis minor*, R. *montana minor*, Thal. minus — Klein Wiesen Rautte) II 295, 2 [III 554].
8. — *angustifolium* Jacq. — ohne Blüthe — (R. *pratensis media*, Th. medium) II 296, 1 und 298 als (Th. *Hispanicum* III).
9. — *aquilegifolium* L. (Th. *hispanicum majus*) II 296, 2 und II 297, 1 als (Th. *hispanicum medium*).
- 10*. *Anemone ranunculoides* L. (*Ranunculus* III Dioscoridis, R. *nemorosus luteus*, *Batrachium* III Dioscor. — Gelbe Walddt Heenle) III 501, 3 [III 388].
11. — *nemorosa* L. (R. *nemorosus purpureus* — Liecht Rott Walddt Heenle, Purpurbraun W. H.) und (R. *nemor. albus*, R. IV Dioscoridis, R. *luteus*, R. *Phragmitis albus* — Weis W. H., Augenwurtzell) III 501, 1. 2.
- 12*. — *silvestris* L. (R. *major albus* — Weis Anemonen Roeslein) III 507, 1 [III 460].

¹⁾ Die mit * bezeichneten Pflanzen befinden sich auch im Casseler Herbar und zwar unter der in Klammern [. . .] angegebenen Ziffer. Vgl. Dr. Kesslers Bearbeitung.

Pflanzen mit Fundortangabe R.s sind durch ein o hervorgehoben.

R.s Namengebung und Bemerkungen sind in Parenthese (. . .) gesetzt.

Die Ziffern am Ende jeder Nennung geben Band und Blatt des Gothaer Herbars an.

Gleichlautende oder wiederkehrende Wörter sind abgekürzt worden, z. B. W = Wurzel, K = Kraut.

13. *Pulsatilla vulgaris* Mill. (Puls. fl. purp., Herba Venti, Cauda vulpis, Nola culinaria — Purpur braun Küchenschellen) III 507, 2 und 508, 1 als (P. fl. alb.)
- 14*. *Hepatica nobilis* Schreb. (H. aurea, H. nobilis, Trifolium nobile, Tr. aureum, Tr. magnum Trinitas, Oxys Pliniana et Lobellii — Gulden LeberKrautt, Edelleber Kr., Gulden Klehe) eine Blüthe gemalt — II 173, 1 [II 82].
- 15*. *Adonis vernalis* L. (Helleborus Hippocratis, Buphtalmum Dioscoridis, Pseudohelleborus, H. Ferulaceus Theophrasti, Heleborastrum, Consiligo — Wyldt Nießwurtzell) III 461, 2 [III 394].
16. — *aestivalis* L. (Anemone album et luteum — Gelb Anemonen Rößlein) III 497.
17. *Ranunculus aconitifolius* L. fl. pl. (R. constantinopolitanicus fl. alb. dupl. — Weisgefüllter Hanenfuß v. Const.) III 502, 1.
- 18.o — *aconitifolius* L. var. *platanifolius* (R. sylvaticus fl. alb. simpl., R. maximus foliis fere Aconiti seu Platani — Weysser Waldthanenfuß, Weyss Trollenblum. „In sylva Thuringiaca inter Schleusingen et Ilmenaw“) III 504, 1.
19. — *polyanthemus* L. (R. sylvestris — Wylder Hanenfuß) III 504, 2.
20. — *Philonotis* Ehrh. (R. albus, Batrachium album — weiser Hanenfuß) III 501, 4.
21. — *auricomus* L. (R. aquaticus — Wasser Hanenfuß) III 505, 1.
22. — *arvensis* L. (R. arvensis angustifolius fl. alb. — Acker Hanenfuß mit weisser blüht.) und (fl. lut. — Wylder Hanenfuß) III 505, 4 — 506, 1.
23. — *lanuginosus* L. (R. sextus Matthioli — Gelber garten Hanenfuß) III 505, 3.
24. — *repens* L. (R. dulcis, Batr. latifolium salutiferum — Süser Hanenfuß) III 504, 3.
25. — *repens* L. fl. plen. (R. domesticus luteus fl. dupl. — Gelber gefüllter garten Hanenfuß) III 502, 2 und (flos Ranunculi duplicati proliferi), eine Prolifikation.
26. — *bulbosus* L. (R. minor — kleiner brennender H.) III 506, 2 und als (R. Vinealis, Pestis Vinearum — Weingarten hanenfuß, kriech. Wein Hanenf.) III 505, 2.
27. *Batrachium fluitans* Wimm. (Feniculum aquaticum — Wasserfenchell) III 415, 2.
28. — *divaricatum* Wimm. (Viola palustris — Wasser Violen) III 489, 1.

29. *Ficaria verna* Huds. (Chelidonium minus, Scrofularia minor — Feygwartzkrautt, ScharbocksKr., BieberHödlein) III 303, 2.
- 30*. *Caltha palustris* L. (Amelion Plinii, Populago, Caltha palustris — Dotterblomen, Mooßblomen) IV 586, 2, [III 613].
- 31*. *Trollius europaeus* L. (Ranunculus nemorosus seu Alpinus luteus, Flos Trollius Gesneri, Ran. glomeratus — Waldd Botterblomen, Trollblomen) III 503, 1 [III 389].
- 32*. *Helleborus viridis* L. (Hell. niger, Veratrum nigrum — Schwartz Niesse Wurtzell, Christ W.) III 459 [III 392].
33. — *niger* L. ein Blatt, das Übrige von *Astrantia major* (Veratrum nigrum styriacum — Steyermerker Christ W.) III 461, 1.
34. *Eranthis hiemalis* Salisb. (Ran. Illyricus fl. lut., Aconitum Matthioli. Ac. hyemale Camerarii) III 503, 2.
35. *Nigella sativa* L. (N. communis, Melanthium, Gith, Melaspermum, Anthemium Theophrasti, Cyminum nigrum, Nigella Romana und weitere 8 Synonyme — Schwarzer Kummel, St. Katharienen Kraut, Schabab) III 326, 2.
- 36*. — *sativa* fl. pl. (N. flore duplici, Melanthium Citrinum, Nig. Citrina, Chrysomelanthium — Gelber Gefüllter Nardenkummel, Gelb. Römischer Koriander) 327, 1 [III 504].
- 37*. — *arvensis* L. (N. sylvestris — Wylder schwarzer Kummel) III 327, 2 [III 505].
- 38*. *Aquilegia vulgaris* L. (Aqu. fl. simpl. tum multiplicibus colorum, Desiderium Theodori Gazae, Pothum Theophrasti, Aethonychium, Leontostomium, Leo Columellae, Aquileia, Columbina, Akaleia, Ancholia — Akeley allerley farben, einfach und gefüllte) III 302 [II 206].
- 39*. *Delphinium Ajacis* L. (Consolida Regalis fl. incarnato) III 493, 2 [II 209], desgl. (Cons. Reg. sativa fl. coerul. und fl. alb.) III 494, 1. 2.
- 40*. — *Consolida* L. (Consolida regalis sativa coer. fl. dupl., Cons. regia, Herba Divae Otyliae, Flos D. O., Equitis calcar, Calcar equestre, Fl. equestris, Pes Alaudae, Corydalopodium, Coridapodium, Cornuata, Cornuta — Zam blaw Ritters Sporn, St. Otylien Kr., Ritter Blom, Lerchen Klawe) III 495, desgl. (Cons. Regalis arvensis vel sylvestris, Calcatrippa sylv. — Wyld Ritters Sporn) III 496, 1 [II 208].
- 41*. — *Staphys agria* L. ohne Blüthe (Staphis agria, Herba pedicularis, Pituitaria — Stephanskörner, Lewse Kr.) III 456, 1. Im Casseler H. [III 398] ohne Deutung.

42. *Aconitum Napellus* L. (Nap. major — Gros Eysen Hüttle, Narren Kappen, Mönchs Kappen) III 466.
 43. — *Lycocotum* L. (ohne Namen) III 467, 1.
 44. — *Anthora* L. (Antora, Antitora, Ac. salutiferum, Zedoaria et Napellus Moysis Avicennae — Gifft heill) III 467, 1.
 45. *Actaea spicata* L. (Christophoriana, Herba St. Christophori, Costus niger — St. Christoffels Kr.) III 323, 1.
 46. *Paeonia officinalis* L. fl. simpl. (Peonia fl. simpl. — Gemein einfach Peonien Rosen) III 464, 1.2.

Berberidaceae.

- 47*. *Berberis vulgaris* L. (Berberis, Oxyacantha Galeni, Crespinus — Saurach, Sauerdorn, Persich-Peisselbeer, Erbsell. — Bem. Daraus hergestellter Syrup sehr gebräuchlich. Die gelbe Rinde wird von den Färbern gebraucht.) I 67, 1 [I 84].

Nymphaeaceae.

48. *Nymphaea alba* L. (N. alba, Nenuphar officinarum — Weiss Seheblomen, Weiswasser Mohn, Haar Wurtzell) IV 587, 2.
 49. *Nuphar luteum* Sm. (Nymphaea lutea — Gelb Seheblomen, Gelb Wasser Mohn) IV 587, 1.

Papaveraceae.

50. *Papaver Rhoeas* L. (P. erraticum, P. fluidum, P. rubeum — Klapper Rosen, Klatsch R., Korn R., Feldt Magsahmen, Hirnschaal, Grindt Magen) III 513, 2.
 51. — *somniferum* L. (P. sativum fl. rubr. — Rotter Mahn, R. Magsamen, R. Öl Magen) III 512, 2 und fl. alb. 513, 1.
 52. *Glaucium luteum* Scop. (Papaver cornutum, Cornutum, P. corniculatum, nebst ital., span., franz., böhm. Bezeichnung — Wylder gehoernetter Magsahmen, Gelb Öl Magen) III 512, 1.
 53*. *Chelidonium majus* L. (Ch. majus, Herba lucis, H. impetiginaria, Hirundinia Apuleii, Esclarea, Coelidonium Alchimistarum, Hirundinaria major, Pandiomia radix, Philomedium, Othonium, Fabium, Crataea, Aubium. Dazu 11 arabische, 2 ital., 3 spanische, 3 franz., 2 böhm. Bezeichn. — Schellwurtz, Schellkrautt, Schwalbenkr., Gilbkr.) III 303, 1 [II 207].
 54*. *Corydalis cava* Schwegg. (Pistolochia seu Fumana bulbosa fl. alb., Capnus Chelidonia, Capnium Chel., Cap. Phragmites, Cap. Sepiaria, Thesium Theophrasti, Pes Gallinacei Plinii, Fumaria tuberosa, Aristolochia concava, Ar. adulterina, Radix cava, Tonitruum fuga — Holwurtzel, Hanensperr,

Donnerflog) III 474, 2 [III 387], desgl. (Pist. fl. purp.) III 475, 1.

55. — *fabacea* Pers. (Fumaria bulbosa seu tuberosa minor — die aller kleinste Hohlwurtzel) III 475, 2.

56*. *Fumaria officinalis* L. (Fumus terræ, Corydaliu Marmarites, Capnogorgium, Caliochtum, Cantharis, Fumaria, Herba Fumida, Cerefolium Felinum, Cer. Columbinum — Erdt-
rauch, Wyldte Rautte, Taubenkropf, Tauben Körbel,
Katzen Kr., Nonnen Kr.) III 475, 3 [III 386].

Cruciferae.

57. *Matthiola annua* Sw. (Leucojum album — Weis welsch Violen)
u. (L. fl. rubr. purp. et violac. — Veyll braunrot W. V.)
III 486, 2 — 487.

58* — *sinuata* R. Br. (Leucojum marinum, Viola maritima,
Tripolia Montepessulanorum — Welsch Meer Violen)
III 488, 1 [II 218 ohne Deutung].

59. *Cheiranthus fruticosus* L. (Leucojum flavum, Cheirum luteum —
Gelb Violen) III 491, 2.

60. *Nasturtium officinale* R. Br. (Sisymbrium aquaticum, Sium
aquaticum, Nast. aqu., Sisymb. Cardamine, Laver — Brun
Kreß) III 338, 1.

61. — *silvestre* R. Br. (Eruca palustris minor — Klein gelb
Wasser Rauken) III 334, 3 — 332, 2 — 334, 1.2 — 335, 1.

62. — *palustre* DC. (ohne Namen) III 334, 3.

63. — *amphibium* R. Br. (Eruca palustris major I, Rhaphanus
aquatica, Rapistrum aqu. — Wasser Hederich, Gros
Wasser Rauken, Wasser Rettig) III 333.

64. *Barbarea vulgaris* R. Br. (Herba Crescio, Barbarea, Pseudo-
bunium — Wintter Kres, Barbell Kr., Gelber Senff) III 332.

65. *Cardamine pratensis* L. (Cardamine, Sisymbrium alterum Dios-
coridis — Gauchblomen) III 335, 2.

66*. *Dentaria bulbifera* L. (D. quinquefolia, D. coralloides Cordi,
D. Alabastrites Lobelii — Zahnkraut) III 446, 6 [III 523].

67. — *digitata* Lam. (D. major, D. heptaphyllum, D. baccifera,
Sanicula dentaria, Consolida Dentaria, Symphytum dent. —
Groß Zahnkr., Korallen W., Kor. Guntzel, Kor. Sanickel)
III 446, 7.

68. *Anastatica hierochuntia* L. (Rosa hierichuntia, R. St. Mariae,
R. Hierosolymitana — Rosa Hierichunt. — „Ejus syl-
vestrem speciem, quam in Syria — in Arabia deserta,

ad littora maris rubri — crescentem invenit D. Rauwolfius mihi communicavit.“) I 61, 1.

69. *Lunaria graeca* L. (Alyssum Dodonaei, Lun. graeca, L. lutea) III 489, 2.
- 70*. — *biennis* Mnh. (Flos Violae lunaris cum suo semine, Bulbonac, Viola latifolia, Lun. graeca, Sinapi persicum — Osterblomen, Pfennigbl., Mohnveyll) III 490 — 491, 1 [II 216].
71. *Alyssum calycinum* L. (Al. minimum Caroli Clusii) III 355, 1 — 355, 2.
72. *Cochlearia officinalis* L. (Cochlearia — Löffelkr.) III 336, 2.
73. — *Armoracia* L. (Armoracia — Merrettig) III 371.
- 74*. *Sisymbrium officinale* Scop. (Verbenaca) IV 642 [III 520].
75. — *Sophia* L. (Sophia Chirurgorum) III 341.
76. *Alliaria officinalis* Andr. (Alliaria — Knoblochskr., Leuchell, Halskr.) II 168, 2.
77. *Erysimum hieraciifolium* L. var. *virgatum* Rth. (Leucoium sylvestre minutis foliis — Klein wildt gelb Violen) III 486, 1.
78. *orientale* R. Br. (Perfoliata Napellica seu Napifolio domestica — Durchwachsmit Steckrubleinbletern) III 313, 1. 2. — 339, 1.
79. *Camelina sativa* Crtz. (Sesamum — Dotter) IV 597, 3 — 598, 1.
80. *Brassica Napus* L. (Eruca sylvestris — Weisser wylder Senff, Wylde Rauken) III 328, 2 und (Napus sylvestris — Rube Saht) III 340, 2.
81. — *oleracea* L. (Eruca domestica, Sinapi domesticum — Grawer Senff) III 331, 1. 2.
82. — *oleracea* var. *caulorapa* (Caulrapum, Caulorapa — Rübenkohl) IV 647, 1.
83. — *oleracea* var. *botrytis* L. (Br. prolifera florida — Blumenkohl) IV 647, 2.
84. — *oleracea* var. *laciniata* (Br. Selenisia latifolia — Breytt Krauskohl) IV 648, 1.
85. — *oleracea* var. *imbricata* (Br. Sel. angustifolia — Schmal Krauskohl) IV 648, 2.
86. *Sinapis alba* L. (Eruca sylvestris major, Sinapi sylvestre — Gelber Senff) III 339, 3.
87. — *nigra* L. (Irion, Erysimum — Wegsenff, Hederich) III 340, 1.
88. *Eruca sativa* Lam. (Er. Italica, Er. sativa — Weisser Garten Senff, Garten Rauken) III 327, 3.
89. *Capsella Bursa pastoris* Vent. (Bursa pastoris major, Thlaspi fatuum Gesneri — Gros Teschellkr., Hiertten Teschel) III 357, 1.

90. *Coronopus Ruellii* All. (Cor. repens, C. arvensis, Cor. Theophrasti — Kriechender Krehenfuß, Feld Hirtzschorn, Acker H.) III 321.
91. *Lepidium Draba* L. (Arabis, Draba — Türkischer Kress) III 338, 2.
92. — *sativum* L. (Nasturtium — Kresse) III 336, 1.
93. — *campestre* R. Br. (Thlaspi majus — Bauernsenff) III 353, 1 — 352, 2 — 354, 2.
94. — *ruderalc* L. (Thlaspi minus — Klein Besem Kr.) III 356, 1.
95. *Teesdalea nudicaulis* R. Br. (ohne Namen) III 339, 2.
96. *Biscutella laevigata* L. (Thlaspi clypeatum Caroli Clusii) III 356, 2.
97. *Thlaspi arvense* L. (Pilosella siliquosa Thlaspi folio) III 355. und (Nummularia — Pfennig Deschell Kr.) III 353, 3 — 355, 3.
98. — *perfoliatum* L. (Thl. medii Holeracei) III 355, 1. 2. 4.
99. — *alliaceum* L. (Thlaspi primum Caroli Clusii odore et sapore fere Allii) III 351, 3.
100. *Iberis umbellata* L. z. Theil (Thlaspi creticum, Thl. Candiae umbellatum Iberidis folio Lobelii, Draba sive Arabis Dodonaei) III 351, 2.
- 101*. *Isatis tinctoria* L. (Is. sylvestris — Wylder Weydt) III 324, 2 [II 225].
102. *Neslea paniculata* Desv. (Turritis — Thurm Kr.) III 352, 1 und (Bursa pastoris major, Thl. fatuum Gesneri — Gros Teschell Kr., Hierrtten Daschell) abgesehen von den Grundblättern III 354, 1.
103. *Myagr. perfoliatum* L. (Myagr. monospermon) IV 597, 1.
104. *Raphanistrum Lamprocarpa* Grtn. (Rapum sylvestre, Napus sylv. — Wild Rüben, Rübesahtt.) III 328, 1.

Capparidaceae.

- 105*. *Capparis spinosa* L. (Capparis — Kapern) II 231, 1 [III 368].

Resedaceae.

106. *Reseda lutea* L. (Reseda I, Eruca Cantabrina, Er. Hispanica — Spanisch Rauken und Reseda II — Wyld Rauken) III 319, 1. 2.
107. — *Luteola* L. (Catanace, Damnamene, Damnamete, Cannis, Gotium, Arcopus, Arcopodium, Archaris, Jovis radius, Datisca, Crepula, Luteum, Lutea, Luteola, Unguis Milvinus — Streich Kr, Starek Kr.) III 318, 1.

Cistineae.

108. *Helianthemum vulgare* Grtn. (Flos Solis Matthioli, Hel. fl. lut. et fl. alb., Panax Chironium — Sonnen Guntzell) II 228, 2.
109. — *oclandicum* Whlbn. (Hel. parvissimum Cistifolio seu Chamaecistus) II 229, 1.
110. — *Fumana* Mill. (Chamaecistus folio Thymi, Panax Chironium angustioribus foliis — Klein Kisten Roeßlein, Kl. Sonnenblomen) III 363, 2.

Violarieae.

111. *Viola odorata* L. (V. purpurea, V. Martialis et Martia — Blaw Violen, Purpurbraun Mertzen Violen) — 1 Blüthe gemalt. II 171, 2. Angefügt 2 Sentenzen.
- 112*. — *tricolor* L. (V. tricolor, Herba Trinitatis, Jacea, Flammea Dodonaei, H. clavellata — Freysamkr., Dreyfaltigkeitsblomen, Stiefmutterle) II 172, 2 [II 210] — Mediz. Bem. Aus Blüthen, Kraut und Stengeln wird ein Wasser destilliert und bei der Gallischen Krankheit (morbo Gallico) gegeben, morgens u. abends, 9 Tage und mehr. Das großblüthige Bergveilchen ist einzig in seiner Art, doppelt größer als das gemeine, aber ohne Geruch und wächst auf den Helvetischen Bergen.
113. — *canina* L. zwei Blüten, die Blätter von *Viola hirta* L. (V. montana inodorata — Wald oder Wild blaw Violen, Bl. Wasser Violen) II 172, 1.

Polygaleae.

114. *Polygala vulgaris* L. (Pol. fl. alb. et fl. coerul., Flos Ambarualis Dodonaei — Weis und blaw Kreutzblomen) II 230 1.

Caryophylleae.

115. *Dianthus barbatus* L. (Charyophyllus Carthusianorum ruber — Rot Karthuser Neglein oder Scharlachblom) III 478 und 479, 1 (fl. alb.)
- 116*. — *Carthusianorum* L. (Char. montanus — Rot Donner Negle) III 480, 1 — 479, 2 [II 215].
117. — *Armeria* L. (Char. montanus minor — Klein Donner neglein od. Grasneglein) III 480, 2 und (Char. petreius simplex ruber — Klein Rothsteinnegle) III 477, 2.
118. — *Caryophyllus* L. (Ch. multiplex fl. rubr. et alb., Betonica altilis, Vetonica Coronaria, V. domestica, Herba Tunica — Roth gefüllte Neglein u. Weiß gef. N.) III 476, 1. 2.

119. *Dianthus superbus* L. (Char. plumarius albus) III 477, 1.
120. *Vaccaria parviflora* Mnh. (Papaver spumium) III 514, 1.
- 121*. *Saponaria officinalis* L. (Saponaria — Seiffen Kr., Speichell W.) III 488, 2 [II 222].
122. *Silene vulgaris* Grcke. (Herba articularis — Splispettell Kr., Gliedt Kr. Gliedweich) III 483, 3 u. (Lychnis sylvestris plumaria — Pflawm Mergen Roeßle) III 484, 2.
123. — *nutans* L. (Lychnis sylvestris III Clusii folliculis striatis — Wyldt Himmel Roeßle m. gestreiffen Stenglein) III 484, 1 u. (Otites, Lychn. sylvestris — Ohrlöffel Kr.) III 485, 2.
124. — *Otites* Sm. (Sesamoides Salmanticum Caroli Clusii) III 492, 2.
- 125*. — *Armeria* L. (Muscaria, Muscipula, Viscago) II 180 2 [II 17].
- 126*. *Lychnis Githago* Lam. (Lychn. arvensis — Raden) III 483, 1 [II 220].
- 127*. — *Chalcedonia* L. (L. Chalc., Flammula Iovis — Zinober Roeßlein, Sternblomen) III 481, 1 [II 213].
128. *Coronaria tomentosa* A. Br. (Lychn. domestica — Sammett Roeßlein) III 482, 2.
129. — *Flos cuculi* A. Br. (Fl. Cuculi — Bauch Blome) III 485, 1.
130. *Viscaria vulgaris* Roehl. (Lychn. sylv. subpurpur. flor. seu incarnatis — Wyldt Marien Roeßle mit leybfarb Blomen) III 492, 1.
131. *Melandryum rubrum* Grcke. (Lychn. coronaria fl. rubeis et albis, Rosa dominorum, R. Mariana, Rosula coelestis, Mosanthos — Rott u. weis Mergen Roeßlein, Frawen R., Himmel R.) III 481, 2.
132. — *album* Grcke. (L. coron. fl. alb.) III 482, 2.
133. *Cerastium arvense* L. (ohne Namen) III 343, 4 und (Holostium, Caryoph. arvense minus — Weis klein Ackernegeßel Gras) IV 562, 2.
134. *Stellaria Holostea* L. (Agrostis, Gramen floridum, Holostium Dioscoridis, Chamaecissum Oribasii, Gram. Leucanthemum, Gr. virgineum, Euphrasia graminea — Blumengras, Augen Trostgras, Junffergras) IV 562, 1.
135. — *nemorum* L. (Alsines palustris fl. alb., Anagallis aquatica — Wasser Negellkr.) III 351, 1 — 347, 2.
- 136*. *Arenaria serpyllifolia* L. (Alsine minima) IV 563, 1 [III 513].

Portulaceae.

137. *Portulaca oleracea* L. *silvestris* DC. (Port. sylv. — Wildt Portulack) III 369, 1 — 368, 1.

Tamariscineae.

- 138*. *Myricaria germanica* Desv. (*Myrica* sive *Tamarix* — Tamarisken. — „Pocula ex trunco tornata in illisque vinum infusum et ebibitum contra Melancholiam, Hypochondriacam et splenis affectus praestat“.) I 51, 1 [I 39].

Hypericineae.

139. *Hypericum hirsutum* L. (*Ascyrum* — Hartt Hew.) III 312, 1.
 140. — . . . ? . . . (Hyp. Alexandrinum — Alexandr. Hartt Hew, Cerinthe Plinii) III 311.
 141*. — *perforatum* L. (Hyp., Perforata. Fuga Demonum — St. Johanniskr., Hart Hew, Konrats Kr.) III 310, 2 [III 561].

Malvaceae.

- 142*. *Malva Alcea* L. (*Alcea*, Bismalva — Siegmars Wurtzell) IV 604, 1 [III 404].
 143. — *nicacensis* All. (*Alcea peregrina*, *Malva Veneta* — Wetter Roeßle) IV 604, 3.
 144*. — *crispa* L. (*M. crispa* — Kraus Pappeln) IV 602 [III 405].
 145*. — *rotundifolia* L. (*M. sylvestris* — Hasen Pappeln) IV 601, 1 [III 406].
 146. *Althaea rosea* Cav. (*M. arborea simpl. et dupl. fl.* — Herbst Rosen m. einf. u. gef. Rosen) IV 603.
 147*. — *officinalis* L. (*Althea* — Eybisch) IV 604, 2 [III 403].
 148. — . . . ? . . . (*Malva arborea*, *Alth. Indica*, *Alth. arborescens* Clusii — Baum Eibisch). Ohne Blüthe. III 606.

Tiliaceae.

- 149*. *Tilia platyphyllos* Scop. (*T. foemina* — Lindenbaum) I 73, 1 [I 109].

Lineae.

150. *Linum usitatissimum* L. (*L. commune* — Gem. Leyn) IV 596, 1.

Zygophylleae.

151. *Guajacum officinale* L. (*Arbor ligni sancti seu Guaiacum*, *Lignum indicum*, *L. sanctum* — Franzosen Holtz. — Bem. Auf der Insel St. Domingo reichlich wachsend; es ist dies die Insel, welche in der neuen Welt zuerst von den Spaniern besetzt worden ist. — Franzosenholz dauert im Garten aus und bringt zuweilen Frucht, muss aber vor Kälte geschützt werden.) I 2, 1.

Geraniaceae.

- 152*. *Geranium sanguineum* L. (Ger., Haematodes Robertianum,

- Ischaemus, Ger. sanguinarium, G. cruinum, G. montanum, Sanguinaria radix) III 359, 1.
- 153*. — *pratense* L. (G. Batrachium, G. coeruleum, Batr. coerul., G. Batrachoïdes, Gratia dei coerulea — Hanenfuß Storchschnabell, Gottes Gnad, Blawschnabelkr.) III 358, 2. — Beide im Casseler H., aber anders gedeutet.
154. — *Robertianum* L. (Ger. pratense — Wiesen Storckenschn.) aus verschiedenen Pflanzen zusammengesetzt III 359, 2 [II 162]; desgl. als (Ger. I Tabernaemontani, Alidonia minor Hieronimi Tragi, Sideritis heraclea cratenae, S. crat. Dioscoridis, Ger. Rupertianum, G. vulnerarium, Gratia Dei, Rubea muscata) III 361, 1; desgl. als (G. foetidum, Makrorhizon — Stinckent Storckenschnabell) III 362, 1.
155. — *silvaticum* L. (ohne Namen) III 361, 2.
156. — *palustre* L. (Ger. tuberosum Joachimi Camerarii — Blawer St.) III 360, 2.
157. *Erodium moschatum* L'Hér. (Ger. muscatum, Acus muscata — Thysam Schnabell Kr.) III 360, 1.
- 158*. — *cicutarium* L'Hér. (G. minus, G. arvense, G. inodorum — Acker St.) III 362, 2 [II 164].
- 159*. — *gruinum* W. (G. Creticum vel ex Candia) III 358, 1 [II 164].
- 160*. *Oxalis Acetosella* L. (Alleluja, Acetosa trifoliata, Oxys Plinii — Buch Ampffer, Sauerklee, Buchklee, Hasenklehe) III 184 [II 128].

Rutaceae.

- 161*. *Ruta graveolens* L. (R. domestica, R. Peganium, Rhysimum Nicandri, Eriphium Apuleii — Wein Rautte) II 131, 1 [II 28].
- 162.o* *Dictamnus albus* L. (Fraxinella, Chamaefraxinus, Diptamus vulgaris albus — Gem. weiser Diptam. — „Cum fructu vel semine primo vidi in agro Tridentino anno 1559, deinceps in montibus declivis circa inclytam Scholam Portanam copiosissime flore tum subrubro tum subalbicante.“) I 46, 1 [III 529].
- 163.o* *Peganium Harmala* L. (R. sylvestris — Wildte Rautte, Berg R. — „Hanc ipsam collegi in Gallia Narbonense ad radicem montis Lupi. Amat montana et inculta loca.“) II 131, 2 [II 29].
164. *Melia Azedarach* L. (Sabdariffa Lobelii, Satteriff, Asceterach) III 322.

Ilicineae.

- 165.o* *Ilex Aquifolium* L. (Agrifolium, Aquifolium — Waldt Distelln, Stechpalmen, Stechbaum, Stechapfell — „Frequens in saltibus Luneburgensibus.“) I 75 [I 49].

Celastrineae.

- 166*. *Evonymus europaeus* L. (Evonimus — Spindelbaum, Gelb Zweckholtz, Hanhödchen) I 41, 1 [I 90].

Rhamneae.

167. *Rhamnus Frangula* L. (Alaternus Turneri) I 74, 3.
 168.o *Paliurus australis* Grtn. (Rh. Dioscoridis et Matthioli, Spina Judaica — Stechdorn — „Crescit in agro Monspeliensi et in Italia circa Veronam. Apud nos quoque hyemem nisi sit admodum acris ferre potest, alioquin diligenter erit a frigore muniendus.“) I 68, 1.
 169.o* *Zizyphus vulgaris* Lam. (Z. arbor, Zizypha, Jujuba — Brustbeerlein — „Augusti temporibus ex Affrica in Italiam translatus est. In Gallia Narbonensi in hortis copiosissime alitur, floret ibidem mense Februario et Martio.“) I 6, 2 [I 12].

Aceraceae.

- 170*. *Acer Pseudoplatanus* L. (A. major — Groß Ahorn) I 81, 1 [I 79, aber anders gedeutet].
 171*. — *campestre* L. (A. minor — Klein A., Maß Holder) I 81, 2 [I 80].

Staphyleaceae.

- 172*. *Staphylea pinnata* L. (Pistacia communis, Staphylodendron Plinii — Pimpernussle, Biebernussle) I 43, 1 [I 61, anders gedeutet].

Anacardiaceae.

173. *Pistacia vera* L. der Fruchtstand; Blätter von *Staphylea* (Pist. italica — Welsch Pimpernussle. — Bem. Wird in Menge von Alexandria und Damaskus nach Venedig gebracht und zu Öl verarbeitet u. s. w.) I 46, 2.
 174*. — *Lentiscus* L. (L. — Mastixbaum) I 77, 1 [I 38] und (Terbinthus, — Terbenthin Baum. — Bem. Es gibt hohe und niedrige Arten, die ersteren in Syrien, die letzteren in Macedonien. Im römischen Italien sind sie groß und stark) I 76, 2 [I 37].

- 175.o *Rhus Cotinus* L. (Cotonus vel Cotinus, Philostephanon Aristotelis — Gelb Presilgenholtz. — Bem. Eine Art Ölbaum, womit die Sieger in den Olympischen Spielen bekränzt wurden. — „Nascitur in Apennino monte. Ego vero copiosissime vidi in monte Cethi prope Magalonam ubi hanc ipsam collegi. In Galliarum Provincia unde etiam Lugdunum et exinde per mercatorem Norinbergensem Lanzigerum dictum ad nos apportatur.“) I 9, 6 [I 16].

Leguminosae.

176. *Lupinus hirsutus* L. (Lup. — Feigboohnen, Wolffs B.) IV 614, 1.
 177*. — *luteus* L. (L. Hispanicus luteus — Gelbfeigsbohnen, Gelb Spanisch Violon) IV 614, 2 [III 458].
 178*. — *angustifolius* L. (L. Hisp. coeruleus — Blau Span. F.) IV 614, 3 [III 458].
 179*. *Genista germanica* L. (Genistella spinosa seu aculeata, Genista — Klein stechent Pfriemen, Deutsch Ginster) I 70, 1 [I 72].
 180. — *tinctoria* L. (G. tinct., Infectoria — Farb Pfriemen, Streichblumen) I 70, 2.
 181. *Sarothamnus scoparius* Wimm. (Genista, Genista, Spartium — Ginst, Genster, Pfriemen — Mediz. Bem. —) I 69, 2.
 182. *Cytisus siliquosus falcatus* Bauh. (Cytisus Dioscoridis et Marantae, Cyt. cornuta — Beißklehe, Behirnetter G.) I 68, 2.
 183. — *sessilifolius* L. (Trifolium fruticans acetosum Monspeliacum — Baumichter Sauer Kleehe von Montpellier) IV 616, 1.
 184. *Ononis spinosa* L. (On., Anonis, Restabonis, Remora Aratrii, Acutella — Hawhehell, Staalkr., Ochßenbrech) IV 628, 2.
 185. *Trigonella Foenum graecum* L. (Foen. Gr. — Siebengezeit, Bockshorn, Fönigreck) IV 628, 1.
 186.o *Medicago apiculata* W. und Früchte verwandter Formen (Medica, Trifol. cochleatum, Foenum gallicum — Schnecken Klehe, Frantzosisch Häw. — „Circa montem Pessulanum omnes hae species maxima copia seruntur. Ibi etiam hasce omnes collegi.“ — Bem. über d. Werth für das Vieh) IV 619, 3.
 187*. — *sativa* L. (Trif. pratense II) IV 617, 1 [III 446].
 188. — *circinnata* L. (Auricula muris, Guminosa Camerarii) III 316, 3.
 189*. *Melilotus officinalis* L. (Mel. copiosis flor. luteis, Sertula regia, S. campanea, Mel. saxifraga, Saxifr. lutea — Honnig Klee mit gelber blüet, Gelb. Stein Klehe) IV 621, 2 [III 445].

190. *Melilotus alba* Lam. (*M. pulcherrimus* fl. alb., *M. nobilis*, *M. urbana*, *M. vera* — Edler weiser Stein Kleehe, Unser lieben Frauen schüchlein) IV 622, 1.
191. — *sulcata* Desf. (*M. Italica* — Welscher St. Kl.) IV 621, 1.
192. *Trifolium arvense* L. (*Lagopodium*, *Lagopus*, *Trif. humile* — Katzenkleehe) IV 617, 2.
193. — *squarrosus* L. (ohne Namen) IV 617, 3.
194. — *alpestre* L. (*Tr. majus* Tragi, *Cytisum aliquorum*, *Lagopus alter*, *Lag. maximus Lobelii* — Gr. Geys Kleehe) IV 618, 2.
- 195*. — *rubens* L. (ohne Namen) IV 618, 1 [III 452].
196. — *pratense* L. (*Tr. prat. purpureum* — Braun Wiesen Kl.) IV 618, 3.
197. — *montanum* L. (*Tr. prat. album* — Weyser wiessen Kl.) IV 619, 1.
198. — *agrarium* L. (*Tr. prat. primum* — Gelber wyesen Kl., Feldt Kl.) IV 616, 2.
199. *Anthyllis Vulneraria* L. (*Scabiosa* fl. lut., *Anthyllis Leguminosa Lobelii*, *Lagopodium luteum Tabernaemontani*) II 146, 2.
200. — *tetraphylla* L. (*Trif. Halicabulum*, *Tr. vesicarium*, *Cicer sylv. aliquorum*) IV 619, 2.
- 201*. *Securigera Coronilla* DC. (*Securidaca*, *Hedysarum* — Peltz-schen) IV 638, 2 [III 434].
202. *Lotus tetragonolobus* L. (*L. pulcherrimus*, *Tetragonolobus* fl. ruberrimo. — Bem. Manche haben sie *Pisum rubrum* genannt) IV 620 und (*Pisum paralyticum*, Gicht Erbßen) IV 636, 2.
- 203*. *Galega officinalis* L. (*Gralegia*, *Galega*, *Galea*, *Regalea*, *Regallicum*, *Herba gallica Fraccastorii*, *H. Daneta*, *H. Galeni*, *Rutta Capraria*, *Castracana*, *Thorina*, *Martanica herba*, *H. sarracena*, *Taurina*, *H. Nesa*, *Capragina*, *Rutta gallica*, *Giarga*, *Giarca* — Beys Rautte, Flecken Kr.) IV 627, 2 [III 441].
- 204.o *Colutea arborescens* L. (*Col. vesicaria* — *Folia senae Germanicae* — Schafflinsen, Lynsenbaum, Deutsch Senettbletter, Welsch Lynsen. — Bem. Zu Alexander d. Gr. Zeiten auf den Liparischen Inseln verbreitet, später nach Gallien und Deutschland übertragen. „Sponte crescit circa Mons-pessulum ad montem Lupi in valle.“ I 69, 1 [I 69].
205. *Astragalus hamosus* L. (*Hedysarum alterum* — *Securidaca minor*) IV 638, 3.
206. — *glycyphyllos* L. (*Pisum sylvestre perenne* — Wildt Erbßen) IV 636, 1.

207. *Glycyrrhiza glabra* L. (Liquiritia Bambergica, L. siliquosa, Dulcis Radix — Süßholz) IV 537, 1.
- 208.o *Scorpiurus muricatus* L. (Scorpioïdes Bupleurifolio, Sc. fol. Bupl. Dodonaei, Telephium Anguillarae, „quod plerisque locis aridis et montosis nasci traditur in olivetis quoque Narbonensis Galliae et alius Matthiolo depictum, in Galliae vinetis nonnullis spontaneum.“) IV 628, 3.
209. *Ornithopus perpusillus* L. (Hedysarum IV, Ornithopodium Romberti Dodonaei) IV 631, 1.
210. *Coronilla vaginalis* Lam. (Hedys. sylv. II — Gelbe Steinwicken) IV 630, 1 und (Hedysarum I sylv., Securidaca sylv., Scorpioïdes sylv. — Peltzschen) IV 629, 2.
- 211*. — *varia* L. (Hed. sylv. III — Weiß Peltzschen od. Steinwicken) IV 630, 2 [III 435].
- 212*. — *scorpioides* K. (Scorpiodes Dioscoridis — Scorpionskr.) IV 629, 1 [III 443].
213. *Hippocrepis comosa* L. (Onobrichis Clusii II) IV 631, 2.
- 214.o — *unisiliquosa* L. (Sferra de Cavallo, Ferrum equinum — „Provenit incultis quibusdam et apricis Italiae et Narbonensis Galliae locis.“) IV 638, 4.
- 215*. *Onobrychis sativa* L. (On. Clusii III — Ilanen Kopff, Wyld Hopffen Kr.) IV 632, 1 [III 442].
216. *Cicer arietinum* L. (Cicer — Zieser Erbeis, Kychern) IV 622, 2.
217. *Vicia Cracca* L. (Cracca minor arborescens et scandens — Wyld Baum Wycken) IV 633.
218. — *cassubica* L. (Cr. minor scandens — Klein wildt Baum W.) IV 635.
219. — *sativa* L. (Vicia major, Aracus major — Groß wyldt W.) IV 637, 2 und als (Erviolae — Klein Erbeßen) IV 624, 2.
220. — *silvatica* L. (Pisum sylv. I scandens — Wyld Erbeßen) IV 634.
221. — *Narbonensis* L. (Pisum nigrum — Schwartz Erbeßen) IV 624, 1.
- 222*. *Ervum hirsutum* L. (Vicia minor — Kl. Vogelwycken) IV 638, 1 [III 439].
223. — *Ervilia* L. (Cicerculae — Klein Kychern) IV 623, 1.
224. *Lathyrus tuberosus* L. (Chamaebalanus, Apios Fuchsii, Tragi et Cordi — Erckelnuss, Erdtnuss, Erdt Feygen) IV 637, 1.
225. — *silvester* L. (Cicercula sylv., Lath., Pis. graecorum — Wyld Kychern, W. Erven oder Erbßen) IV 626.

226. — *platyphyllos* Retz (Ervum nigrum) IV 623, 2.
 227*. — *sativus* L. (Ervum album) IV 623, 3 [III 423].
 228*. — *vernus* Bernh. (Orob. Pannonicus Caroli Clusii, Astragalus quorundam) IV 627, 1 [III 431].
 229. *Phaseolus multiflorus* W. (Phas. Brasilianus rub. — Rote Präsilgen oder Indianisch Bohnen) IV 615, 2.
 230. — *lunatus* L. (Phas. alb. Brasil., Ph. Indicus — Weis Präsilgenbohnen, Ind. B.) IV 615, 1.
 231*. — *vulgaris* L. (Smilax hortensis variorum generum et colorum [6 Reihen mit halbierten Bohnen versch. Form] — Allerley Art und Farben Turckisch oder welsche Boonen, Steyg Phaselln) IV 613, 1 [III 420].
 232. *Ceratonia Siliqua* L. (Siliqua dulcis — St. Johannis Brodt) — daneben Griech., Arab., Ital., Span., Fransös., Böhm. Bezeichnung. I 1, 3.

Rosaceae.

- 233*. *Amygdalus communis* L. (Am. — Mandelbaum) I 40, 2 [I 106].
 234. *Prunus Armeniaca* L. (Amarena, Armeniaca et praecocia — Marellen. — Bem. Es giebt große und kleine M.) I 29, 2.
 235*. — *Persica* Stok. (Persica malus — Pfersingbaum. — Bem. Den Namen hat er von Persien erhalten, einer Gegend des Orients, von wo diese Baumart zuerst in unser Gebiet gebracht worden ist) I 40, 1 [I 107].
 236. — *domestica* L. (Pr. ungarica — Ungarisch Pflaumenbaum, Schquescen) I 78.
 237. — *insititia* L. (Pr. comm. — Gem. Pflaumen) I 79.
 238. *Filipendula Ulmaria* Maxim. (Ulmaria, Barba Caprae, Barba Hirzi, Potentilla major Anguillae, Argentilla — Geißblatt, Wurmwortzell, Wurm Kr.) II 291, 1.
 239*. — *hexapetala* Gil. (Filip., Oenanthe Leucanthemum, Cerascomium, Vitiflora Theodori Gazae, Saxifraga rubea, Umi-flora — Rotter Steinbrech, Filipendell W.) II 284, 2 [III 464].
 240. *Aruncus silvester* Kostel. (Drymopogon, Pycnocomum Tragi — Waldbart) II 289, 3.
 241*. *Rubus Idaeus* L. (R. Jd., R. hircinus — Hynbeer, Bocksbeer — im Casseler H. Hindtbeer) I 33, 1 [I 87].
 242*. — *fruticosus* L. (R. communis seu arvensis — Kratzbeer, Brombeer) I 33, 2 [I 88].
 243. *Dryas octopetala* L. (Chamedris montana fl. alb. — Berg ga-

manderle — „In montibus Helvetiis copiosissime crescit.“)
II 227, 2.

- 244*. *Geum urbanum* L. (Cariophyllata, Sanamunda, Avartia, Herba Benedicta — Benediktw., Ben. Kr.) IV 639, 1 [II 203].
245. *Fragaria viridis* Duch. (Frag., Fragrum, Fragum, H. Fragae Apuleii, Fragula Jacobi Manlii, Mora terrestris, Fructus terrae — Erdtbeer Kr., Erdtbeere) III 320, 1.
- 246*. *Potentilla recta* L. (Quinquefolium luteum majus Theophrasti, Tormentilla Hispanica, Pentaphyllum majus luteum, Pentapetes, Pempedula, Mercurii herba Aetii — Gelb gros funfffinger Kr., Funff Blatt) IV 607, 1 [III 454].
- 247*. — *verna* L. (Quinquef. prim. petreum minus — Klein stein funfffinger Kr.,) IV 608, 1 [III 456].
- 248*. — *argentea* L. (Quinquef. II petr. majus — Groß St. F. Kr.) IV 608, 2 [III 455].
249. — *supina* L. (Qu. repens — Kriechendt F. F. Kr.) IV 609.
- 250*. — *alba* L. (Qu. album — F. F. Kr. mit weißer Bluet) IV 610, 1 [III 455].
251. — *anserina* L. (Anserina, Chenobosum, Pabulum anserinum, Pastus ans., Herba Mercurialis, Argentana, Pot. Agrimonia sylv., Tanacetum sylv. — Genserich, Genße-Kr., G. Garbe, Grunsing, Silberkr.) II 175, 1 und II 290, hier Blüten und Stengel von *P. reptans*.
- 252*. — *silvestris* Neck. (Tormentilla, Chrysogonium, Chrysospermum, Dapsis, Arcophthalmus Arilana, Heptaphyllum, Septifolium, Consolida rubra, Betularia, Herba Tremola pandectarii — Tormentill, Herz- Feig- Blut- Rott- Ruhr- Birchwurtzel, Rottheylwurtzel.) IV 607, 2 [III 457].
- 253*. *Comarum palustre* L. (Quinquefolium palustre, Qu. fragiferum, Heptaphyllum fragif. Plinii — Wasser F. F. Kr.) IV 608, 3 [III 454].
- 254*. *Alchemilla vulgaris* L. (Sanicula, Sanaria, Sennicula, Diapensia, San. quinquefolia, Consolida quinqu., Ferrara minor — Sanickel, Sennickel) II 291, 2 [III 532].
- 255*. *Agrimonia Eupatoria* L. (Agr., Eupatorium graecorum Dioscoridis — Vom König Eupator gefunden, daher auch Königskraut — Hepatorium, Hepatilis, Eupat. Plinii, Marmorella, Concordia, ferner noch 13 Synon. — Odermennig, Agrimonien Kr., Königskrautt, Bruchwurtz) II 175, 2 [II 19].

256. *Sanguisorba officinalis* L. (Pimpinella Italica major, Sorbastella, Sorbaria, Sorbus pumilis, Pimpinella, Sanguinaria, Barbula Christi, Sanguisorba pratensis, Thriallis Alexandri •Benedicti — Gros Sperber Kr., Gr. welsch Bibernell, Gr. Kolblen Kr., Gr. Blut Tropffen, Wurm W.) II 286.
- 257*. — *minor* Scop. (Pimp. Ital. minor, Sanguisorba minor — Klein Sp. Kr., Kl. welsch B.) II 287, 1 [III 333].
258. *Rosa alba* L. (R. alba, candida simpl. et plen. — Weis Gartten Rosen, Leibfarb Rosen) I 57, 3. 4.
259. — *lutea* Mill. (R. l. — Gelb Rosen — Auf dem Apennin in Italien zuhause) I 60, 1.
- 260*. — *gallica* L. (R. provincialis minor — Klein Provintz R.) und (R. granatae — Gr. R., Zucker R.) I 60, 2 [I 78].
- 261*. *Cydonia vulgaris* Pers. (Cotonea malus — Quittenbaum. — Bem. Es giebt zweierlei Früchte, die einen sind birnförmig, „B. Qu.“, die anderen apfelförmig, „A. Qu.“) I 28, 1 u. 38, 1 [I 108].
- 262*. *Pirus aucuparia* Grtn. (Sorbus sylv. secunda, Sorb. Aucupalis — Rott Vogellbeer, Wyld Sperberbaum) I 54, 1 [I 94].
- 263*. — *domestica* Sm. (Sorb. domestica, Torminalis dicta Crataegus Theophrasti — Speierling, Spuerapfel, zamer Sperberbaum) I 53, 3 [I 93].
- 264*. — *torminalis* Ehrh. (Sorb. tertia sylv. — Arlesbaum, Aria Theophrasti. — Bem. „Ab anibus maxime appetitur.“) I 54, 2 [I 95].
- 265*. *Crataegus oxyacantha* L. (Acuta spina — Hagedorn) I 66, 2 [I 85].
- 266*. *Cotoneaster vulgaris* Lindl. (Vitis Idaea rubra — Steinbeerlein. — Bem. „Pena et Lobelius Amelanchier nomine describere videntur, Josias Simlerus Pyrum petraeum appellat etc.“) I 62 [I 76].

Saxifragaceae.

- 267*. *Saxifraga granulata* L. (S. alba — Weißer Steinbrech) II 284, 1 [III 465].
268. — *Aizoon* Schrk. (ohne Namen) III 369, 4.
269. *Chrysosplenium alternifolium* L. (Ranunculus minima, Herb. muscata seu muscatella — Biesamkrautt) III 506, 3.
- 270*. *Parnassia palustris* L. (Hepatica alba communis, Gramen hederaceum — Weis Leberblomen.) II 173, 2 [II 83].

271. *Philadelphus coronarius* L. (*Syringa alba* — Syringbaum — „Quidam dicunt ex Hispania in nostras regiones pervenisse.“) I 34, 1.
- 272*. *Ribes rubrum* L. (Rib. — St. Johannesbeerlein, St. Joh. Treuble) I 66, 1 [I 82].
- 273*. — *Grossularia* L. (*Uva crispa major*, *Uva spina*, *Grossularia* — Gr. Kreuselbeer, Gr. Klosterbeer, Stechdorn.) I 67, 2 [I 83].

Crassulaceae.

274. *Sedum album* L. (*S. minus haematroïdes* fl. alb. — Klein Katzen Treuble m. weiß. Bl.) III 366, 3.
275. — *reflexum* L. (*S. min. haem. fl. lut.* — Klein Hauswurtz m. gelb. Blumen) III 366, 4.
276. — *spathulatum* W. & K. (*Telephium minus*, *Cepaea Alphonsi Paucii*, *Marina* — Klein Wundt Krautt) III 366, 2.
277. — *purpureum* Link (Tel. III fl. purp., *Sempervivum Italicum* — Braun Wundt Kr.) III 367, 1 und (Tel. I. fl. purp., *Fabaria*, *Crassula major* — Wundt Kr., Knaben Kr., Bruchwurtz, Dondboone) III 365, 2.
278. — *maximum* Sut. (Tel. alterum fl. alb. — Wundt Kr. m. weißer Blüett) III 366, 1.
279. — *Rhodiola* DC. (*Rhodia radix*, *Rosea rad.* — Rosenwurtzel) III 367, 2.
280. — *Sempervivum soboliferum* Sims. (*Semp. majus*, *Barba Jovis* — Gr. Hauswurtz, Donnerbaum) III 365, 1.

Droseraceae.

- 281.o *Drosera rotundifolia* L. (*Rorella*, *Ros Mariae*, *R. Solis*, *Salsiora*, *Solaria* — Sonnen Daw, Sindaw) „Musci genus, quod multis in locis sylvosis, humidis et apricis inter alia musci albicantis et subrubentis genera apud nos quoque in sylva non longe a latomiis crescit.“ — Mediz. Bem. II 174, 1.

Haloragaeae.

282. *Hippuris vulgaris* L. (*Hipp. sine foliis*, *Hipp. nuda* — Schaffthew ohne Bletter) IV 582, 1.

Myrtaceae.

- 283*. *Caryophyllus aromaticus* L. (*Car. cum suis fol. et fruct.* — Krahmneglein — Antophylli et pseudocharyophylli — Mutterneglein. — Bem. Wachsen auf den Moluccen und an einigen Orten Zeylons nicht zu fern vom Meere, aber auch nicht zu nahe. Folgt Beschreibung des Baumes, der Blüthe) I 5, 1 [I 3].

Lythrarieae.

284. *Lythrum Salicaria* L. (*Lysimachia purpurea* I. II. — Brauner Weyderich) IV 588, 1. 2.
- 285*. *Punica Granatum* L. (*Malus granata domestica* — Granat Apfelbaum, Mal. gr. dulc. — Sueß Gr. A. u. M. punicum acidum — Sauer Gr. A., Mal. gr. sylvestr. — Wildter Gr. A.) fl. pl. et fl. simpl. I 28, 2—29, 1 [I 7].

Onagrarieae.

286. *Epilobium angustifolium* L. (*Lysimachia Salicaria* I, L. siliquosa, *Salicaria major* — Weyderich) IV 588, 3 u. (*Lys. Sal. sive siliquosa altera*) IV 589, 1.
287. — *pubescens* Rth. (*Lys. Sal. seu siliquosa* III) IV 589, 2.
288. *Circaea Lutetiana* L. (*Pyrola alpina*, Herb. St. Stephani, *Circaea Lut.*, *Circ. Monspeliensisina Lobelii* — St. Stephans Kr.) II 294.

Cucurbitaceae.

- 289*. *Momordica Elaterium* L. (*Cucumer asininus*, *Cucumis sylv.*, *Cucum. erraticus* — Wylder Kukumer, Spratz Kurbis, Esel K.) II 202, 1 [III 497].
- 290*. — *Balsamina* L. (*Momordica*, *Balsamina mas*, *Bals. Cucumerina*, *Viticella*, *Charantia*, *Pomum mirabile*, *P. Hierosolymitanum* — *Balsam Apffell*) IV 640, 2 [III 530].
291. *Cucumis Melo* L. (*Melo*, *Pepo*, *M. P.* — Melonen, Pheben) II 201, 1.
- 292*. — *sativus* L. (*Cuc.*, — Kukumern, Korcken, Gurcken) II 201, 2 [III 496].
293. *Cucurbita Lagenaria* L. (*Cuc.*, *Lagen.* — Trinckkürbis, Flaschen K.) II 200, 1.
294. — *Pepo* L. (*Cucurb. Indica* — Indianisch K.) II 200, 2 [III 498].

Umbelliferae.

- 295*. *Eryngium campestre* L. (*Er.*, *Ingerinalis*, *Centum capita* — Mannstrew, Kraus Diestell, Bracken D.) IV 545, 1 [II 254].
- 296*. — *planum* L. (*Er. coeruleum* — Blaw Meer Wurtzell, Bergsbrackendistell) IV 544, 2 [II 251].
- 297*. *Astrantia major* L. (*Sanicula alpina* — Welsch Berck Sanikell) u. (*San. alp. fl. incarn.* — Berck S. mit leibfarber Bl.) III 460, 1. 2. [III 393].
- 298*. *Sanicula europaea* L. (*Alchimilla*, *Leontopodium Herbariorum*, *Psiadium* (*Drosium*) *Valerii Cordi*, *Drosera*, *Heliodrosium*, *Pes Leonis*, *Planta* L., *Brancha* L., *Stellaria officinarum*,

- Artincilla — Syndaw, Synnaw, Gulden Genserich, Lewen Fuß, Unser Frauen Mantell, Lewen Tappern) II 292, 1 [III 538].
- 299*. *Bupleurum longifolium* L. (Perfoliata sylvestris — Wylder Durchwachs) III 312, 2 [III 559].
- 300*. — *perfoliatum* Lam. (Perfol. domestica — Durchwachs, Stops Loch, Bruchwurtzell.) III 313, 3 [III 558].
- 301*. *falcatum* L. (Sanamunda, Bupleur. angustifolium, Isophyllon Cordi, Elaphobosum — Heyl aller Welt, Hasen Oehrle) III 325 [III 535].
302. *Apium graveolens* L. (Ap. aquaticum, Eleoselinum, Helioselinum, Ap. rusticum, Ap. palustre, Pupilla oculi, Paludapium — Eppich, Eppe, Bauern E., Wasser Merk, Wilder E.) III 404, 1.
303. *Ammi majus* L. (Ammioselinum, Bubonium Hippocratis, Perpedium, Ammum adulterinum — Ammey Peterlein) III 410, 1.
304. *Petroselinum sativum* Hoffm. (Petr. commune hortense, Apium sativ., Ap. selinum, Ap. domesticum — Petersilge, Gartten Eppich, Peterlein) III 400, 2.
- 305*. *Falcaria Rivini* Host (Chritmus Agrios, Chr. spinosus, Chr. arvensis, Crethamus agrios, Chr. terrestris, Herba Falcaria — Bacillen, Sichell Kr., Sichel Moeren, Acker Bacillen, Feldt B. III 421 [III 341].
306. *Sium latifolium* L. (Apium majus aquat., Sium m. a., Laver aquat., Sium odorat., Apium fontanum, Pastinaca aquatica, Berula, Lauercula, Ranella — Wasser Peterlein, Brunnen P., Wasser Moerllen) IV 579, 1.
- 307*. — *Sisarum* L. (Siser, Sisarum, Sis. Jacobi Sylvi, Chervillum, Servillum, Servilla — Grützel Moerle, Geyerlein, Gartten Rapuntzell, Gierlein, Klingell Ruble, Kl. Moerle, Zucker Wurtzell) III 399 [III 336].
308. *Berula angustifolia* K. (Pastinaca aquatica — Wasser Pastaney) III 394.
- 309*. *Aegopodium Podagraria* L. (Aegop., Pes Caprae, Podagraria, Herba Gerhardi — Geysfus, Hynfuß, Zyperleins Kr., Podagrams Kr., Hinlauff, Wytzscherling) III 398, 2 [III 257 mit. and. Namen].
- 310.o* *Pimpinella magna* L. (Pimp. major, Tragi Selinum, Pimp. Nicolai Myrvolii, Pampinaria Ruellii, Pampinula, Bipennula, Pampinella, Bimpinella, Petrasindula Simonis Januensis, Saxifragia — Gros Biebernell) II 285 [III 326] und (Pimp. maxima, Ulmaria, Barba caprina Fuchsii

- et Tragi — der allergröste Bibernell. „Nascitur in pratis et torrentium ripis. Hanc inveni in prato prope torrentem Ryppach dictum juxta sedem Nobilis Hans a Teuchern in Doelitzsch 1590.) III 405, 1.
- 311*. — *Saxifraga* L. (Pimp. major — Gros Bibernell) III 404, 2 [III 330] und (Tragoselinum minus, Pimpin. minima — Kl. Bibernell, Stein B., Kl. Stein Peterlein, Kl. Kraus B., Mauer P.) III 405, 2.
- 312*. — *Anisum* L. (Anisum, Anes. — Anys, Aenyß) III 385, 3 [III 346].
313. *Myrrhis odorata* Scop. (Cerefolium Hispanicum, Chaerophyllum majus — Spanisch Kerffell, Großer Kerbel) III 422 [III 291].
314. *Chaerophyllum bulbosum* L. (Cicuta — Schierling, Wuterich, Doller Kerbel) III 409.
315. — *silvestre* L. (Pastinaca sylvestris I — Wildt Pastaney, Wildt Moeren) III 389, 2.
- 316*. *Scandix Pecten Veneris* L. (Scandix, Herba scanaria, Acida, Acula, Acicula, Pecten Veneris Plinii, Chaerophyll. aculeatum, Cerefolium Aciculatum — Nadell Kr., N. Kerffell, Venusschtrell, Nadel Moeren, Schnabel M., Schnabell Kerffell) III 426 [III 294].
317. *Seseli tortuosum* L. (Ses. Massiliense I — Sesel v. Marsilien) III 377, 4 u. (Ses. Mass., Ses. Massilioticum, Sili, Sese-linum, Cordyla, Platycyminum, Saxifraga montana, S. major, Siler montanum — Sesell, S. Kr., Marsilischer S., Berg S., Roßkümmel, Zyrmet) III 378.
318. — *montanum* L.? (Ses. Massil. III fol. Foeniculaceis, Siler montanum, Saxifr. mont. — Steinbrech, Berg Sesel, Roßkümmel) III 377, 6.
319. — *annuum* L. (Pastin. sylv. II — Wildt Pastaney, W. Moeren) III 390, 1.
- 320*. *Foeniculum vulgare* Mill. (Foen., Marathrum — Fenchell) III 385, 2 [III 343] u. III 416.
- 321*. *Crithmum maritimum* L. (Feniculum marinum — Meerfenchell) III 417, 1 [III 339].
322. *Oenanthe aquatica* Lmk. (Phellandrium, Oenanthe Phell.) III 415, 1 u. (Myrrhis aquatica) III 423.
323. — *fistulosa* L. (Gramen junceum II — Wasser Bintzengras) IV 567, 3.
324. *Aethusa Cynapium* L. (Petroselinum sylvestre — Wyldt Petersilge, Gleiskraut) III 401, 1.

- 325*. *Silaus pratensis* Bess. (Seseli Massilense II) III 377, 5 und (Feniculum sylvestre (pratense, erraticum, equinum, caprinum), Mium (Maranthum) Dioscoridis, Mysineum Plinii, Thymarnotium, Hippomarathrum — Rosfenchell, Geisfenchell, Wylder F., Wiesen F.) III 417, 2 [III 347].
326. *Bubon macedonicum* L. (Petroselinum maced., Apium saxatile, Ap. petreium, Petr. Estreaticum — Macedonisch Peterlein, Stein Eppich, Stein P.) III 400, 1.
- 327*. *Meum athamanticum* Jacq. (Meu, Meum, Anethum sylvestre, A. ursinum, A. tortuosum, Sistra — Beerwurtz, Wilder Dill, Beeren D., Beeren Fenchell, Haus Merck, Matten W., Hertz Wurtz) III 388 — NB. Wurzelschopf fehlt.
328. *Libanotis montana* All. (Lybanotis prima — Gros schwarz Hirtzschwurtzell) III 379, 1.
329. *Selinum Carvifolia* L. (Pastinaca sylvestris III) III 393, 2.
- 330*. *Angelica silvestris* L. (Ang. sylv. minor aquatica — Wildt Angelick, Wasser A., Klein A.) III 402 u. III 397.
- 331*. *Archangelica officinalis* Hoffm. (Angelica domestica, A. major, Radix sancti spiritus, Costus niger, Costum nigr., Panax Angelicum, Angelica — Angelick, Heiligen Geist Wurtz, Engelw.) III 396 [III 258].
332. *Ferula Ferulago* L. (Ferulago, Marthecia, Fer. minor — Klein Ferul Kr., Kl. stercken Kr.) III 425.
333. *Peucedanum Cervaria* Cuss. (Lybanotis Theophrati II, Liban. major, L. Cervaria major, Roris marinum umbelliferum) III 380 u. (Liban. III Theophr. nigra, Lea herba, Campsanema, Liban. fructifera, Chamedyosmus Apuleii, Macae-rinthe, Theopnoë, Salutaris herba, Libanthis herbacea, Rosmarinum herbae., Herb. incensaria — Rosmarin Kr., Weyrauch Wurtz, Schwartz Hirtzschwurtz, Schw. Hirtzsch Peterlein) III 383, 2.
334. — *alsaticum* L. (Meum Athamant. II — Oelßnütz W.) III 389, 1 u. (Siler montanum) III 413.
- 335*. — *Oreoselinum* Mnch. (Oreosel., Petroselin. montanum, Apium montan., Ap. saxatile, Ap. cervinum, Petr. cerv., Elaphoselinum, Polychrestum Cordi, Polymetum Gesneri, Gesneri Montapium — Bergk Peterlein, Bergk Petersilge, Stein P.) III 408, 1 [III 305].
- 336*. — *officinale* L. (Peuced., Bonus genius, B. Daemon, Herba stataria, Satarium Janii Coronarii, Herb. sulphurata, Pina-

- stella, Fenic. Porcinum, Cauda porc., Herb. Thuris, Anethum coeleste — Haarstrang, Hew Fenchell, Himmell Dill, Haar Starck) III 418 [III 298].
- 337*. *Imperatoria Ostruthium* L. (Ostrucium, Imperatoria, Magistrantia — Meister W., Magistrantz, Keyser W., Astrantz) III 398, 1 [III 256].
338. *Pastinaca sativa* L. (Angelica sylv. major — Wildt Angelick) III 393, 1 und (Pastin. sylv., Elaphoboscum erraticum et sylv. — Wildt Hirtzsch Pastinach) III 395.
- 339*. *Heracleum Sphondylium* L. (Branca ursina germanica, Sphondyl., Chorodanum, Spondylis, Nisyris, Verticillaris, Herb. Rutinalis, Chamaeplatanus, Planta ursina, Panaces sylvestre Ruellii, Panaria sylv. Guilhelmi Regini, Platantella Fumanelli—Beeren Klaw, Beeren Tatz, B. Tapp) III 412, 1 [III 302].
340. *Coriandrum sativum* L. (Coriandr., Corium, Corianum, Coriamum, Coliandrum, Anethum cemicarium — Coriander, Koliander, Wantzen Dill) III 384, 1.
- 341*. *Daucus Carota* L. (Pastin. communis sativa, Staphylinus, St. luteus, Past. domestica, Carota lutea, Past. lutea, Baucia hortensis, Past. sat. Dioscoridis, Past. crocca, Dauc. croc. — Gelbe Moeren, Zam M., Zam Pastaney, Gelbe Ruben.) III 391 und (Pastin. erratica, P. sylvestris, Staphylin. sylv., Past. rustica, Dauc. sylv., D. bracosia, Baucia sylv., Carota rustica, P. sylv. tenuifolia, D. asininus, Past. asin., Phistrum Apuleii — Wyldt Pastenach, W. Moeren, Vogelnest, Esels Möhren) III 392.
342. *Caucalis daucoides* L. (Caucalis III — Kletten Kerffel) III 406, 2 und (Cauc. II.) III 408, 2.
343. *Turgenia latifolia* Hoffm. (Caucalis, Pes pulli, P. gallinaceus, Damasium, Cauc. Plinii, Apium arvense, Petrosel. arvense, Lappula arv., L. campestris — Kletten Kerffel, Kl. Peterle, Roth Acker Kletten) III 406, 1.
344. *Torilis Anthriscus* Grtn. (Caucalis IV — Kletten Kerffel) III 407, 1 und (ohne Namen) III 410, 2 u. 411.
345. *Laserpitium latifolium* L. (Seseli Aethiopicum album, Libanotis Theophrasti alba, L. cachryfera, L. cervina, Cervaria radix alba) III 383, 1.
346. — *pruthenicum* L. (Meum Athamant. I) III 387.

Araliaceae.

- 347*. *Hedera Helix* L. (Hed. Hel. — Kleiner Ephew, Baum E. —

Bem. „Nonnulli ab Edo deducunt, quod parietes edat atque consumat“ etc. I 82, 2 [III 471].

Cornaceae.

348.o* *Cornus mas* L. (Cornus — Kornelbaum, Kurbeeren, Welsch Kyrsen, Khurlenbaum. — „Sponte et copiosissime in monte declivi et sylvoso, vulgo dem Saal Bergk e regione inclyta Scholae Portanae crescit.“ I 43, 2 [I 92].

349*. — *sanguinea* L. (Corniolus — Hartriegell) I 44, 1 [I 91].

Caprifoliaceae.

350. *Sambucus nigra* L. (Samb. domestica — Hollunder) I 57, 1.

351. — *racemosa* L. (Samb. cervinus seu montana — Walddt Holl., Hirsch H.) I 58, 1.

352. *Ebulum humile* Grck. (Ebulus — Attich — quasi Chame-sambucus) I 57, 2.

353. *Viburnum Opulus* var. *roseum* L. (Sambucus palustris mas, fl. conglobato, Samb. rosea — Gefüllt Rosen Hollunder) I 55, 2 u. (Samb. rosea montana) I 56, 1.

354*. — *Opulus* L. (Samb. palustr. foemina — Schwelckenbaum oder Schneeballen) I 55, 1 [I 96].

355*. — *Lantana* L. (Viburnum — Schlingbaum) I 42, 1 [I 12].

356. *Lonicera nigra* $\times$ *Xylosteum* ? (Frangula, Alnus nigra — Faulbaum) I 72, 2.

357.o* *Lonicera Caprifolium* L.? (Periclymenos, Matris sylva, Caprifolium, Lilium inter spinas — Walddt Winde, Zeunling, Je lenger je lieber, Geisblatt. „Rondeletius praeceptor meus in monte Pessulano Galliarum . . . exhibebat) I 61, 2 [I 63].

Rubiaceae.

358*. *Galium Mollugo* L. (Gallion fl. alb. — Weis Meger Kr.) III 342, 2, und (Stellaria — Sternkrautt — aus verschiedenen Pflanzen zusammengesetzt) III 344, 1 [III 545].

359*. — *verum* L. (Gallion fl. luteo, Galatium — Meger Kr., Wallstrohe, Unser lieben frawen Bettstrohe, Laab Kr.) III 342, 1 [III 546].

360. — *uliginosum* L. (Aparine minor, Speronella — Kl. Kleberkr.) III 345, 2.

361. — *silvaticum* L. (Stellaria — Stern Kr.) III 345, 1.

362. *Asperula glauca* Bess. (Mollugo, Gallion album — Gros Bergstern, Meger Kr.) III 343, 1.

- 363*. — *cynanchica* L. (Gall. album minus I. III — Kl. Acker Meger Kr.) III 343, 2. 3 [III 548].
- 364*. — *odorata* L. (Matris [= Magistris] sylva, Hepatica stellata, H. cordialis, H. sylv. — Walddt Meister, Stern Leberkr., Hertz Freude) III 344, 2 [III 543].
365. — *tinctoria* L. (Stellaria — Sternkraut) III 344, 3.

Valerianaceae.

- 366*. *Valeriana Phu* L. (Phu Ponticum, Valer. Pontica major, Val. Italica, Ph. Valeriana — Welscher Baldrian, Narden Kr., N. Wurtz, Spicken W., Dennemarek, Katzen Kr., Theriaks W., Augen W.) II 120, 1 [III 374].
367. — *celtica* L. (Nardus Celtica Romana, Spica Celt. Rom. — Keltisch Narden, Römisch Spicka) II 118, 2 [III 371].
368. — *Jatamensi* ? (Nardus Indica, Spica Ind. — Indianisch Narden) II 118, 1.
- 369*. — *officinalis* L. (Val. communis, Nard. agrios, Olus album Dodonaei — Baldrian, Katzen W.) II 120, 2 [III 375].
370. *Valerianella olitoria* Munch. (Alsines minima Thlaspi folio) III 347, 5 und ohne Namen IV 563, 2.
- 371.o *Centranthus ruber* DC. (Val. rubea, Val. alpina — Rott Baldrian — „Crescit sua sponte circa Pisas et in Liguria, apud veteres aliqui putant esse Limonium, alii Condurdum, alii pro Been rubro habent.“) II 119, 2.

Dipsaceae.

- 372*. *Dipsacus Fullonum* Mill. (Dips., Labrum Veneris, Carduus Fullonum — Karten Diestell, Buben Streel, Weber Karten) IV 549, 2 [II 241].
- 373*. — *pilosus* L. (Carduus arvensis, Cirsium arv. — Acker Distelln) IV 551, 1 [II 135].
- 374*. *Scabiosa arvensis* L. (Scab. major ex coeruleo purpureo flore II — Gros braun blau Skabiosen oder Apostemkraut) II 146, 1 und *Sc. arv. fol. pinnatis* (Sc. arv. fl. coerul. — Skabiosen m. blauen Blumen) II 147, 1 und *Sc. arv. integrifolia* (Sc. montana II fl. purpurascens — Apostemkr. m. purpurfarber blüett) II 148, 2 [II 147].
375. — *columbaria* L. fl. alb. (Scab. fl. alb. montana I — Skab. mit weissen Bl.) II 147, 2.
376. — *ochroleuca* L. (Scab. minor fl. alb. — Apostemkr. m. w. B.) II 149, 1 und (Sc. fl. ex albo coeruleis) II 149, 2 und (Scab. lutea — Gelb Skab., Katzen Klehe, Hasenfuss,

Hasen Kl.) NB. Blätter von *Anthyllis vuln.* IV 556, 2
und (Scab. min. alba — Weis Skab.) IV 557, 1.

Compositae.

- 377*. *Eupatorium cannabinum* L. (Organum aquat., Herb. Kunigundi, Marum Dioscoridis et Platerarii, Eup. Avicennae, Eup. Cannab., Cannabina aquat., Trifol. Cervinum, Consolida Cerv., Eup. adulterinum — Wasser Dosten, Kunigundt Kr., Hirtzsch Klee, H. guntzell, Dostenkr., Albkr., Hirtzschwundkr.) II 177, 1 [II 21].
- 378*. *Solidago Virga aurea* L. (Serratula tinct. fl. luteis — Gelb Schartenkr.) IV 555, 1 [II 156].
379. *Bellis perennis* L. (Bell., Bellium, Flos bellius, Parthenium, Herb. Arthulica, Consolida minor, Solidago minima — Genß Blumen, Maßlieben, Zeitlosen, Osterblumen, Magdt Lieben) II 277, 3.
380. *Aster Tripolium* L. (Tripolium. — „Frequens nascitur in littore Veneto, vulgo Lydo dicto, secundo anno florem producit“) II 108, 2.
381. — *Amellus* L. (Serratula tinct. minor I II III — Klein Scharten Kr.) IV 552, 1. 2. 3 u. 554, 1. 2. 3 u. 553, 2.
- 382*. *Linosyris vulgaris* Cass. (Linaria aurea altera) II 283, 2 u. (Lin. aur., Lin. pannonica, Osyris Austriaca — Göllden Leinkr.) II 282, 2 [III 397].
- 383*. *Erigeron acre* L. (Conzioödes Gesneri fl. subpurp.) II 223, 2 u. 223, 4 [II 114].
384. *Inula Conyza* DC. (Serratula tinct. major — Gr. Scharten Kr., Färber Sch.) IV 552.
385. — *germanica* L. (Virga aurea, Solidago Sarracenica — Göllden Wundt Kr., Heidnisch W. Kr.) IV 575, 1.
- 386*. — *hirta* L. (Conyza major) IV 577, 3 [II 177].
387. — *britannica* L. (Con. maj.) IV 576, 2. 3. 4 u. 577, 1. 2. 4.
- 388*. — *Helenium* L. (Hel., Enula, En. Campana, Inula — Alant Wurtzell) II 151, 1 [III 506].
389. *Pulicaria vulgaris* Grtn. (Conyza minor — Kl. Durwurtzell) IV 578, 1.
- 390*. *Filago germanica* L. (Gnaphalium commune — Ruer Kr.) II 106, 2 [II 31].
391. *Gnaphalium silvaticum* L. (Gn. magnum, Pseudoleontopodium Matthioli) II 107, 1.

- 392*. — *dioicum* L. (Gn. III montanum suave rubens u. album, Amaranthus albus — Rothlechtig Engelblomen.) II 220, 1. 2. 3 [III 602].
- 393.o* *Athanasia maritima* L. (Gn. marinum — Meer Ruhr Kr. — „In littore maris prope montem Pessulanum. In locis maritimis prope Frontignan. 1560.“) II 106, 1 [II 32].
- 394*. *Helichrysum arenarium* DC. (Stoechas citrina. Amaranthus citr., Am. luteus, Helichr. germanicum — Mattenkr., Reinblomen, Jungling) II 121, 2 [III 601].
- 395.o* — *angustifolium* DC. (Heliochrysum, Am. Galeni, Holochr. Alexandri Benedicti, Elichrysimis — Sonnengoldtblom, Provintz G. Bl. — „In Galliarum Provincia copiose crescit.“) II 240, 1 [III 600] und (Heliochryson — Sonnenblomen) III 469, 2.
- 396*. *Xanthium Strumarium* L. (Lappa minor, Xanth. — Klein Kletten) II 152, 1 [II 245].
- 397*. *Helianthus annuus* L. (Chrysanthemum Peruvianum, Corona imperialis, Cor. regia, Flos Solis — Gros Sonnenblomen v. Peru. — Bem. über Wuchs, Schönheit, Namen; gleichsam als Monolog der S.) II 279, 1 [II 51].
- 398*. *Tagetes erecta* L. *citrina* (Flos Aphricanus, Tanacetum peruvianum Cordi. Chrysanth. Tanacetum, Charyophyllos Indicus, Fl. Tunetanus, Fl. Indica, Taget. Ind. — Sammett Blumen, S. Röslein, Indian. Neglein, Ind. Blom., Thunes Bl.) II 260 [II 212] und fl. pl. (Fl. Aphr. multiflorus — Gros gef. gelbe Thunes Bl.) II 261.
399. *Achillea nobilis* L. (Ach., Millefolium nobile — Edelgarbe, Feldt G., Weiser Reinfarn) II 272, 2.
- 400*. — *Ageratum* L. (Ageraton, Eupator. Mesues, Costus minor hortensis Gesneri, Menta corymbifera minor Cordii, Balsamita minor Dodonaei, Herb. Julia, Bals. costina — Kl. Leber Balsam, Balsam Kr., Kl. Kostenbalsam, Welsch Frawen Müntz. — Medizin. Bem.) II 176, 1 [II 20].
- 401*. — *Millefolium* L. (Millef. I, Chiliophyllus, Stratiotes Dioscoridis, Millef. Stratiotes, Mill. terrestre, Supercilium Veneris, Lumbus Veneris, Costa canina — Garbe, Tausent Blatt, Berbell, Barben Kr., Schabab, Pfaffripp) II 273, 1. 2 [II 48].
- 402*. — *Ptarmica* L. (Ptarm. — Wylder Bertram) II 272, 1 [III 603].
- 403*. *Santolina Chamaecyparissus* L. (Cyparissus, Abrotanum foemina, Santolina, Cypariss. pumila — Kypressen) II 123, 2 [I 33]

- u. (Cyp. sylv. I, Abrot. campestre, Abr. Siculum vel Sicilianum, Thelyphtorium, Telyphtamnum, Abr. cupressinum, Apr. foem. — Wildt Cypreß, Stabwurtz Weible, Cypress. Stabwurtz. — Bem. Hieronymus Bertram, Gärtner in Dresden, hält es für eine Art Ceder 1597) II 124 u. 125, 1.
404. *Anthemis Cotula* L. (Adonium fl. alb.) II 276, 1.
405. — *arvensis* L. (Bellis major sylvestris repens — Wildt kriechende weis Johannes Blom) II 276, 2.
- 406.o* — *nobilis* L. (Chamomilla Italica, Chamomelum Romanum, Ch. nobile, Ch. Romana — Welsch Kamillen, Römisch K. — „In Italia circa villam Adriani et in Gallia circa Troys proveniens.“) II 270, 1.
- 407.o* — *maritima* L. (Matricaria marit. — Meer Bertram. — „Extra montem Pessulanum in locis maritimis ad Pisciniam pagi Peru 1560.“) II 274, 2 [II 41] [III 362].
- 408*. — *tinctoria* L. (Chrysanth. sylv. — Wildt Gelb Johannesbl.) II 280 [II 54].
409. *Chrysanthemum corymbosum* L. (Tanacetum anglicum — Englisch Reinfarn) II 265, 1.
410. — *Leucanthemum* L. (Bellis major, Buphtalmum majus — Gros Johannis Bl.) II 277, 1.
411. *Pyrethrum inodorum* Sm. (ohne. N.) II 277, 2.
- 412*. *Matricaria Chamomilla* L. (Cham. communis, Anthemis, Leucanthemum, Melanthemum, Diocallia, Ratula Solis, Herb. superba, Euanthemum Hypocratis, Anthemium Theophrasti, Anthemisium Tralliani, Proserpina herba Plinii, Ovalina, Amalocia — Kamillen Bl., Magdt Bl., Laugen Bl.) II 271, 1 u. 270, 2.
- 413*. — *Parthenium* L. (Matr. communis, Anthemis tenuifolia — Mertram, Mutterkraut) II 274, 1 u. (Matr. odorata, Matronaria, Amarella, Amarusca, Tagetes, Oculus solis, Matronella, Parthen. adulterinum, Pseudoparth., Artemisia Traganthi, Onicanthe, Onanthemum — Mertram, Bocksbl., Matronen, Metterich, Mawer Kr., Mutter Kr., Feber Kr., Sonnenaug, Magdblomen) II 265, 2 [II 40].
414. — *eximia* Hort. (Matric. fl. pl., Anthem. tenuifolia fl. pl. Tabernaemontani — Gefüllt Mertram) II 266.
- 415*. *Tanacetum vulgare* L. (Tanac. I, Athanasia, Herb. immortalis, Daneta, — Reinfarn, Wurm Kr.) II 264 [II 42].

- 416*. — *Balsamita* L. (*Menta* Graeca, *M. Sarracenic*a, *M. Corymbifera*, *Balsamita* major Romberti Dodonaei -- Bach Balsam Muntz, Wasser M., Römische Salbey) II 256, 1 [II 95] und (*M. Gr.*, *M. odorata* — Unser lieben Frauen Müntz, Röm. S. — Bem. *Costus hortorum* bei Geoponicus. — Medizin. Bem. — *Salvia* wird es genannt, weil es unzählige gesund und wohl erhält) II 259.
- 417*. *Artemisia Abrotanum* L. (*Abr. mas*, *Scoparia rutta* Caroli Clusii — Stabwurtz Menle, Gerttw., Garthagen, Garthaber, Garthan, Schoswurtz, Gertelkr., Abrautten) II 244, 1 [II 25].
- 418*. — *Absinthium* L. (*Abs. commune*, Herb. Aloina, *H. fortis*, *Abs. rusticum* — Wermuth, Feldt W., Wero Muht) II 243, 1 [II 22].
419. — *caerulescens* L. (*Abs. maritimum* seu *Ponticum latifolium*) II 241, 2.
420. — *pontica* L. (*Abs. I*, *Seryphium montan. commune* — Welsch Bergk Wermuth) II 240, 2 a. b. u. 241, 3 und (*Abrot. foemina* — Stabwurtzell Weib) II 243, 2.
- 421.o — *maritima* L. (*Abs. seryphium angustifolium* — „In lacubus salsis Franckenhusanis Hercinae“) II 241, 1.
- 422*. — *santonica* L. (*Abs. santon.*, *Abs. Alexandrinum*, *Abs. Nabatheum Avicennae* — Alexandrinisch Wermuth, Wurm Samen. Medizin. Bem.) II 241, 4 [II 22].
423. — . . . ? . . . (*Abs.*, *Ponticum Galeni*, *Abs. minus*, *Abs. tenuifol.*, *Abs. nobile*, *Absinthiolium Averhois* — Pontischer W.) II 242, 1.
424. — . . ? . . (*Abs. marin. Gallicum* — Französ. Meer W.) II 242, 2.
425. — *vulgaris* L. (*Artemisia alba* — Weyser Beyfuß) II 262 und (*Art. rubea* — Roter B., St. Johannes Gurtell) II 263, 1.
426. — *campestris* L. (*Art. sylvestris* — Wylder B.) II 263, 2.
- 427*. — *Dracunculus* L. (*Drac. minor*, *Tragoncella*, *Drac. hortulanus*, *Drac. esculentus* — Dragon Kr., Dragoncell) III 471, 2 [III 556].
- 428*. *Tussilago Farfara* L. (*Tuss. minor*, *Ungula Caballina* — Huff Lattick) II 155, 2 [II 248].
429. *Petasites albus* Grtn. (*Tuss. alpina*) II 156, 1.
- 430*. — *officinalis* Mnch. (*Petas. seu Tuss. major fl. alb.* — Pestilentz W.) II 154, 2 u. (*Pet. comm.*, *Persolata Plinii et Dalechampii*) II 155, 1 [II 246].

431. *Arnica montana* L. (Damasonium Dioscoridis, Alisma, Arnica, Chrysanthemum latifol., Plantago alpina — Gros Lucians Kr., Mutterw., Engellw.) III 456, 2.
432. *Cineraria maritima* L. (Cynaria, Cinerar., Anthemisia marina) II 275, 2.
433. — *campestris* L. (Jacobea pannonica Caroli Clusii) II 268, 2.
434. — *palustris* L. (Sempervivum aquat., Sedum aquatile, Stratiotes potamicus) III 364, 3.
- 435*. *Pinardia coronaria* Lssng. (Chrysanthemum Dioscor. Chalcitis, Chalcas, Cagla, Calanthum, Calanthemum, Garuleum, Caltha — Gartten Goldt Bl., Gart. gelb Johannes Bl.) II 279, 2 [II 53].
436. *Senecio paludosus* L. (Sonchus aquaticus I, — Wasser Sonchen Kr.) II 216.
437. — *nemorensis* L. (Sonch. major aqu. in montibus crescens, Jacobea II Caroli Clusii) II 218, 1.
438. — *saracenicus* L. (ohne Namen) III 305, 2.
439. — *viscosus* L. (Senetio fl. odorato) II 267.
440. — *Fuchsii* Gmel. (ohne Namen) IV 575, 2.
441. — *silvaticus* L. (Sen. major — Gr. Kreutz W.) II 268, 1.
- 442*. — *Jacobaea* L. (Sen. major, Flos Jacobi, Jacobea — St. Jacobs Bl.) II 268, 3 [II 47].
- 443*. — *crucifolius* Huds. (Jacobea altera) II 269 [II 46].
- 444*. — *vulgaris* L. (Sen. minor — Kreutz W.) II 275, 1 [II 45].
445. *Calendula officinalis* L. (Cal. fl. plen. et dupl., Caltha poetica, Calthula, Solis sponsa, Buphtalmum Columellae — Ringelblumen mit einfachen und gedoppelt blomen. — „Crescit sua sponte circa Monspelium“. — Schliesst nachts die Blüthen. — Medizin. Bem.) II 133, 1. 2; desgl. Prolifikation II 132.
446. *Echinops sphaerocephalus* L. (Carduus sphaer., Spina peregrina, Chameleon verus Tragi, Card. echinatus, Bella spina Italarum — Spheren Distell, Welsch D.) IV 544, 1.
447. *Xeranthemum annuum* L. (Stoebe incana fol. Ptarmicae Austriacae) III 493, 1.
- 448*. *Carlina acaulis* L. var. *caulescens* (Chameleon niger — Gr. od. schwarz Eberw.) IV 545 [II 235].
- 449*. — *vulgaris* L. (Onopordon, Scolymus sylvestris — Weg-Distell) IV 540, 2 u. 541, 1.
- 450*. *Lappa officinalis* All. (L. major, Personatia, Bardana — Gr. Kletten). — NB. 3 Blätter einer anderen Pflanze. II 151, 2 [II 244].

451. *Carduus acanthoides* L. (*Acanthium* sylv. vulg. fl. alb. — Weisse Weg Distell) IV 540, 1.
452. *Cirsium arvense* Scop. (*Acanthium* vulg. fl. purp. — Weg Distell mit purpurfarber bluett) IV 539.
- 453*. — *oleraceum* Scop. (*Carduus aquaticus* — Wasser D.) IV 551, 2 [II 134].
454. — *acaule* L. (*Chamaeleon albus*, *Carlina* — Kl. od. weis Eberw.) IV 546.
455. — . . ? . . (*Cirs. Italicum* — Welsch Ochsenzunge) IV 543.
456. *Cnicus benedictus* L. (*Carduus Bened.* — Cardobenedicten, Gesegeter Distell) IV 541, 2.
- 457*. *Cynara Cardunculus* L. (*Scolymus aculeatus*, *Carduus*, *Cinara* — Stechent Aretischock) III 547 [II 239].
- 458*. *Silybum Marianum* Grtn. (*Carduus Marian.*, *C. lacteus*, *Spina alba*, *Bedegarim* — Marien Distell, Frawen D., Stechkrautt) IV 549, 1 [II 240].
459. *Serratula tinctoria* L. (*Serr. tinct. media*) IV 554, 2 [II 152].
460. *Centaurea Phrygia* L. (*Conyza* sylv. — Walddt Durw.) IV 576, 1.
- 461*. — *Cyanus* L. (*Cyan. sylv.*, *Hermes*, *Alysus*, *Baptisecula*, *Baptisescera*, *Blaveola*, *Braveola*, *Flos Zachariae*, *Fl. frumenti* — Blaw Kornblomen, Rocken Bl., *Zacharias Bl.*) III 496, 2 [II 220].
- 462*. *Jacea* L. (*Jacea* — Flockblomen) IV 556, 1 [II 151].
- 463*. — *Scabiosa* L. (*Scab. Centaurica*) IV 555, 2 und (*Scab. major seu Centaurica* II — Gr. braun Scab., *Apostem Kr.*) II 145 [II 150].
464. — *Centaureum* L. (*Cent. majus*, *Rhaponticum*, *Rheuponticum* — Gr. Tausend Gulden Kr., *Rhapontick*). NB. ohne Blüthe. — Bem. Nach dem Centauren Chiron benannt, von welchem Achilles unterwiesen wurde. — Wird aus Apulien vom Gargano gebracht und für *Rhapontika* verkauft) II 179.
465. *Crupina vulgaris* Pers. (*Chondrilla rara Lobelii*, *Crupina Belgicum*) II 203, 2.
- 466*. *Cichorium Intybus* L. (*Cich. sativ. secund.*) II 199, 1 und (*Cich. commune*, *C. sylv.*, *Intybus erraticus*, *J. rusticus* Marcelli, *Amarago et Ampulla Theodori Gazae*, *Heliotropium caeruleum*, *Amica et Sponsa solis*, *Solsequium caeruleum*, *Rostrum porcinum Guilhelmi Placentini*, *Citroxinum Plinii*, *Ambuleia Celsi*, *Toximon Dydimi et Constantini* — Gemein Feldt Hyndtleufft, Sonnenwyrbell) II 199, 2 [II 116].

- 467*. *Cichorium Endivia* L. (Cich. Italicum fl. alb. — Welsch Hyndt L. m. w. Bl.) II 196 [II 115] und (Cich. sativum I, End. italica seu Romana crispa, Lactuca Intibacea — Ital. Wegwart od. Endivien, Krauser Endiv. Salat) II 198 u. II 195, 1.
- 468*. *Lampsana communis* L. (Sonch. sylv. III — Mist Wildt Sonchen Kr.) II 212, 2 [II 125].
469. *Rhagadiolus stellatus* Grtn. (Rh. Caesalpinii, Hieracium siliqua falcata Bauhini, Hierac. Tabernaemontani) II 289, 4.
470. *Zacyntha verrucosa* Grtn. (Zac., Verrucaria Matthioli, Cichor. verruc. Gesneri — Mediz. Bem.) II 199, 3.
471. *Helminthia echioides* Grtn. (Scolymus Theophrasti, Eringium Vegetii) IV 542 u., ohne Namen, 550, 1.
472. *Crepis praemorsa* Tsch. (Hierac. maj. latifol., Accipitrina major — Gr. Habbicht Kr.) II 207, 1.
473. — *biennis* L. (Sonchus laevis altissimus III Caroli Clusii) II 215 und (Hierac. majus Dioscoridis — Gr. Habbicht Kr.) desgl. (Accipitrina major altera) II 222, 1 2.
474. — *succisaefolia* Tsch. (Sonch. sylv. aemulus) II 213, 2a.
475. — *tectorum* L. (Sonchus laevis minima) II 214.
476. — *rubra* L. (Chondrilla Cretica fl. subpurpurascens) II 202, 2.
477. *Hieracium murorum* L. (H. maj. Dioscoridis, Hieracia, Sonchites Diosc., Accipitrina Apuleii, Lactuca accipitr.) II 208, 1.
478. — *alpinum* L. (Hier. min. I) II 206, 2.
479. — *Auricula* L. (Pilosella quarta) II 219, 4.
480. — *Pilosella* L. (Pilos. minor I. II.) II 219, 2.
481. — *boreale* Fr. (Sonch. sylv. aemulus) II 213, 2b.
482. — *umbellatum* L. (Hierac. parvum III) II 223, 3.
483. — *porrifolium* L. (Hyoseris angustifolia) II 224, 3.
484. — *echioides* W. et K. (Pilosella major — Gr. Nagel Kr., Gr. Maus Ohrlein) II 218, 2 u. 219, 1.
- 485.*o *Thrinicia tuberosa* DC. (Taraxacon maritimum bulbiferum fl. lut., Chondrilla marina rotunda et bulbosa, Ch. altera Dioscoridis. — „In littore prope Pisciniam pagi. Peru in Galliarum Provincia 1561“) II 209 [II 119].
- 486*. *Apargia autumnalis* Hffm. (Hierac. nigrum, Chondrilla sylv. fl. lut., Schwartz Habbicht Kr., Gelb Wegwartt) II 223, 1 [II 113 anders gedeutet].
487. — *hispida* Hffm. (Hyoseris latifolia, H. mascula) II 221 und (Hier. minus II seu pusillum) II 207, 2.

- 488*. *Taraxacum officinale* Web. (Taraxacon, Caput Monachi, Aphaca, Dens Leonis, D. caninus, Rostrum porcinum, Ambuleia — Pfaffen Roerle, Pfaffenblatt) II 210, 1 [II 117].
- 489*. *Chondrilla juncea* L. (Chondr. lutea, Ch. viminea) II 203, 1 [II 118].
490. *Lactuca quercina* L. (Sonchus sylv. I — Wildt Waldt Haßen Kohl) II 210, 2.
491. — *sativa* L. (Lact. Intibacea — Krausser Endivien Salat) II 194, 1.
492. — *virosa* L. (Lact. sylv., Endiv. sylv. — Wildt Endivien) II 194, 2.
493. *Prenanthes muralis* L. (Sonch. sylv. II — Wildt Sonchen Kr.) II 212, 1.
494. *Sonchus arvensis* L. (Cicerbita I — Ferckel Kr.) II 205, 2 u. 206, 1 und (S. sylv. major) II 213, 1.
- 495*. — *oleraceus* L. (Sonch. laevis II) II 208, 2 u. 205, 1 und (Sonch. laevis, Lactucella, Olus leporinum, O. anserinum, Carduus anser., Leporis pabulum, Lact. leporina Apuleii — Haßen Kohl) II 204, 2 [II 121, 122].
- 496*. — *asper* All. (S. asper — Gensse Distell, Saw D.) Blüten von *S. arvensis*. II 204, 1 [II 120].
- 497*. *Tragopogon pratensis* L. (Tr., Hirci barbula — Bocksbartt, Gauchbrodt) III 326, 1 [III 519].
498. *Scorzonera hispanica* L. (Scorz., Viperaria, Scorsonera — Schlangen Kr., Schl. Mordt) III 328, 3.
499. — *purpurea* L. (Sc. angustifolia fl. ex coerul. purp. fragrant.) III 328, 4.

Campanulaceae.

500. *Jasione montana* L. (Scabiosa minor fl. coerul. — Blaw Scabiosen) IV 557, 2.
501. *Phyteuma spicatum* L. (Rapunculus nemorosus — Waldt od. wyldt Rapuntzell) III 500, 2.
502. *Campanula bononiensis* L. (Camp. I — Blaw Glöcklein Bl.) III 499, 4.
- 503*. — *Trachelium* L. (Cervicaria major, Vulvaria, Campan. — Halskraut) III 498, 2 [II 138].
504. — *Rapunculus* L. (Rap. minim. hortens. — Kl. Zam Rapunzel) III 500, 3.
- 505*. — *rapunculoides* L. (Rap. sylv. I. II. III. — Wildt Rapunzel) III 498, 3 u. 499, 1. 2.
- 506*. — *glomerata* L. (Rap. sylv. IV) III 499, 3 [II 137].
507. — *persicifolia* L. (Camp. II) III 499, 5 und (Rapunculus V) III 500, 1.

- 508*. *Campanula Medium* L. (*Viola Mariana*, *Medium Dioscoridis* — Marien Glöcklein, Glockenblome) III 498, 1 [II 137].

Vacciniaceae.

- 509*. *Vaccinium Vitis Idaea* L. (*Myrtus* seu *Myrtillus idaea* — Meelbeere) I 50, 1 [I 57].
 510*. — *Myrtillus* L. (*Myrt. communis* — Gem. blaue Heydelbeer) I 48, 2 [I 56].
 511*. — *Oxycoccus* L. (*Erica baccifera* I — Beerbeumle) I 52, 2 [I 42 anders gedeutet].
 512. — *uliginosum* L. (*Myrtus* seu *Myrtillis major* — Rausch Jagersbeer) I 49, 1 und (*Erica baccif. major* — Gr. Beerbeumle) I 53, 1.

Ericaceae.

- 513*. *Calluna vulgaris* Salisb. (*Er. major* — Welsch Heyde) I 51, 2 u. 52, 1. 3. 4 [I 40, 41].
 514*. *Ledum palustre* L. (*L. germanicum*, *Cistus germ.*, *Rosmarinus sylvestr.* — Wyldter Rosmarin, Schabenkr.) II 230, 2 [III 568].
 515*. *Pirola rotundifolia* L. (*Pyrola*, *Beta sylvestris* — Winttergrün, Waldt Mangoldt, Holtz M.) II 293, 3 [III 533].

Plumbagineae.

- 516*. *Statice Limonium* L. (*Limon. Matthioli*, *Behen rubeum Cordi*, *Pseudo-Behen rubeum officinarum* — „Nascitur copiose ad littus maris Venetiani vulgo a Lio.“) II 112 [III 361].

Primulaceae.

- 517*. *Primula officinalis* Jacq. (*Pr. veris*, *Herb. paralysis*, *H. Arthritica*, *Bethonica alba*, *Verbasculum odoratum* — Schlüsselblomen, Himmell Schl., St. Peters Schl., Handt Schuchblomen) II 292, 2 [III 540].
 518*. — *Auricula* L. (*Sanicula alpina*, *Auric. ursi*, *Paralysis alpina*, *Arthrit. funaria Gesneri* — Beer Sanickell, Wohlschmeckend Schlüsselbl.) II 293, 1. 2. [III 539].
 519. — *farinosa* L. (ohne N.) III 369, 2.
 520*. *Cyclamen europaeum* L. (*Cycl.*, *Cyclaminus*, *Panis porcinus*, *Malum [Pomum] terrae* — Schweinß Brodt, Sew Br., Erdtapffel. — „A Clusio primum communicatus.“) III 465 [III 369].
 521*, *Anagallis coerulea* Schreb. (*An. coer.* — Blaw Gauchheill) III 346, 2 [III 510].
 522. — *arvensis* L. *phoenicea* Lmk. (*An. Phoenicea* — Rotter G., Kolmar Kr.) III 347, 1.

523*. *Lysimachia vulgaris* L. (Lys. lutea — Gelber Weyderich)
IV 590, 1 [III 417].

524*. — *Nummularia* L. (Numm., Sepentaria, Centum morbia —
Igel-, Schlangen-, Pfennig Kr.) IV 583, 1 [III 609].

525. *Coris monspeliensis* L. (C. Gallorum, C. Monspeliaca — Erdtkiefer
v. Montpellier) III 363, 1

Oleaceae.

526*. *Jasminum fruticans* L. u. fl. alb. (Jasmeni fl. lut., Gessiminum, Josmenum — Gelb Veill Reb) u. (J. fl. alb.) I
64, 2. 3 [I 28].

527*. *Fraxinus excelsior* L. (Fr., Ornus — Eschenbaum, Aschenb. —
Bem. „fructus Fr. lingua avis dicti.“) I 45 [I 81].

528*. *Olea europaea* L. (Olea — Ölbaum — Bem. über Gewinnung
des Öls u. s. w.; die Pressen verglichen mit den Thüringer
Waidmühlen) I 36, 1 [I 53].

529*. *Ligustrum vulgare* L. (Lig. — Beinholtz, Rein Weyden, Mundt-
holtz) I 41, 2 [I 97].

Apocynaceae.

530*. *Vinca minor* L. (Clematis Daphnoides, Vinca peruviana —
Süngrün, Ingrün. — Bem. Meist mit blauer Blüthe, zu-
weilen weiß- und rothblühend; gefüllte Bl. v. Klusius aus
Österreich überschickt) I 63, 2 [164 als *V. major*].

Asclepiadeae.

531*. *Vincetoxicum officinale* Mnch. (Asclepias, Vincet., Hirundinaria —
Schwalbenwurtz) III 313, 4 [III 524].

Gentianaceae.

532.o* *Erythraea Centaurium* Pers. (Cent. minus, Febrifuga, Fel terrae —
Tausent Gulden Kr., Fieber Kr., Erdtgall, Aurin. —
„In sylvula prope Augustam Vindeliciam, Fritbergum
versus“) II 180 [II 18].

533. *Gentiana cruciata* L. (Cruc., Gent. minor — Modelgeer, Kreutzw.,
Sperenstich) III 462, 1.

534. — *germanica* W. (Gent. minor I — Kl. wyld Enzian
Himmelstengell) III 462, 2.

535. — *ciliata* L. (Gent. min. II) III 463, 1. 2. 3. 4. 5 und (Gentianella IV) 462, 6.

536. — *campestris* L. (Gentianella I) III 462, 3.

537. — *verna* L. (Gentianella III) III 462, 4.

538*. — *acaulis* L. (Pneumonanthe, Viola Calathiana — Lungen-
blom) III 462, 5 [III 400].

Polemoniaceae.

- 539*. *Polemonium coeruleum* L. (Valeriana Graeca — Griechisch Baldrian) II 121, 1 [III 376].

Boragineae.

540. *Cordia Sebestena* Grtn. (Sebesten — Schwartzte Brustbeerlein — Myxa Graecis vel Myxaria — Nuclei Seb. et fruct. in nucl.) I 7, 1.
541. *Cynoglossum officinale* L. (Cynogl. — Hundtszunge) II 166, 2 und (Buglossum sylv. I — Wildt Ochsen Z. — Echium Fuchsii. — NB. 2 Blätter von *Anchusa*) II 167, 2.
542. *Echinosperrum squarrosum* Rehb. (Alsines aquat. fol. Veronicae — Wasser Hunerdarm m. blawer Bl.) III 348, 2.
543. — . . ? . . (Auricula Myris coerulea — Blaw Meus Ohrle) II 219, 3.
544. *Asperugo procumbens* L. (Aparine major Plinii, Alysson repens germanicum Lobelii — Gr. Kleb Kr.) III 346, 1.
545. *Symphytum officinale* L. *patens* Sibth. (Symph. fl. purpur., S. majus, Consolida major, Inula rustica, Confirma major, Conserva maj., Solidago — Braun Walwurtz, Schwartz W., Schmeerw., Beynwell) III 323, 2.
546. — *officinale* L. *bohemicum* Schm. (Symph. fl. alb. — Weis Beyn Welle) III 324, 1.
547. *Borago officinalis* L. (*Borago domestica* — Boragen, Burretsch) II 166, 1.
548. *Anchusa officinalis* L. (Buglossum italicum, B. hortense, Lingua Bubuta, L. bovis — zam Ochsenzunge) II 167, 1.
- 549* *Pulmonaria officinalis* L. (Pulm. herba — Lungenkr, Blaw Schloßelblomen, Hirtzs Mangold, H. Kohl) II 158 [II 81].
550. *Myosotis caespitosa* Schlz. (*Echium scorpioides*) III 349, 1. 2.
- 551*. — *palustris* With. (Ech. aquat. II — Wasser Vergiess mein nichtt) III 350, 1 [III 509] und (*Alsines fontana* — Brunnen Vogelkr.) III 347, 4.
552. — *versicolor* Pers. (*Alsines minor* — Kl. Vogell Kr.) III 347, 1. 2.
- 553*. *Lithospermum officinale* L. (Lith. sive Milium solis majus, Mil. Georgianum — Gr. Meerhirsen od. Steinsahmen) 287, 2 und (Mil. sol. minus, Lith. min. — Kl. Stein Hirsen, Meer H.) II 288 [II 186].
554. — *arvense* L. (Milium solis sylv. — Wylder Stein Hirsen) II 289, 1.

Convolvulaceae.

- 555*. *Convolvulus Soldanella* R. Br. (Brassica marina, Sold., Soldana — Meerkohl) II 107, 2 [III 351].
- 556o*. — *Scammonia* (Scammonea — Skammonien. — „Hanc ipsam inveni in Gallia Narbonensi ad littus maris prope pagum Peru.“) II 108, 1 [III 352].
- 557* — *sepium* L. (Volubilis major, Smilax laevis, Conv. major, Campanella major — Gr. Winde, Winden Kr., Zaun-
glocken, Baum W.) IV 611, 2 [III 424].
558. — *arvensis* L. (Volub. arv. III) IV 612, 3.
559. *Cuscuta Epithymum* L. (Epithymus — Thymseyden) II 225, 3.
560. — *Epilinum Whe.* (Cusc., Cassutha, Podagra Lini) II 226, 1.

Solanaceae.

- 561*. *Lycopersicum esculentum* Mill. (Pomidoria, Pomaris, Pomaurea — Lieb Aepffel, Gold A.) III 518, 2 [III 490].
- 562*. *Solanum Dulcamara* L. (Clematis non urens, Glykypicron, Amarum dulce — Bren Linen, Je lenger je lieber) IV 538 [III 487].
563. — *Melongoena* L. (Mel., Melanzana, Mala insana) III 520, 2.
564. — *ovigerum* Don (Poma Aethiopica) III 519, 2.
- 565*. — *Pseudocapsicum* L. (Siliquastrum rotundum angustifolium — Runder Indian-Pfeffer) III 515, 1 [III 489].
566. — *fruticulosum Bauh.* (Solan. fruticosum, S. arborescens, Strychnodendron, Amomum Plinii — Baumechter Nachtschatten) III 516, 1.
567. — . . . ? . . . (ohne Namen, fehlt Blüthe) III 516, 2.
- 568*. — *nigrum* L. (Sol. comm., Uva Lupina, U. Vulpis, Morella, Vesicatoria, Solatrum — Nachtschatten, Sew Kr.) III 518, 1 [III 500].
569. — *tuberosum* L. (Tarthophili, Tartoffi, Solan. tuberos. esculentum, Pappar Hispanorum et Indorum, Pycnocomon Dioscoridis — Grueblingbaum. — „Ex Virginia primum illata in Angliam et exinde in Galliam et alias nationes.“) IV 644.
- 570*. *Physalis Alkekengi* L. (Sol. Halicabulum, Alk., Vesicaria — Jüden Kyrsen, Boberellenschlatten) III 515, 2 [III 499].
- 571*. *Capsicum annuum* L. (Siliquastrum, Piper Indicum, P. calecuticum, P. Brasilianum, Capsic. — Presilien Pfeffer, Indisch Pf., Kalgutischer Pf.) III 514, 2 [III 488].

- 572*. *Atropa Belladonna* L. (Sol. somniferum — Schlaff Beer) III 521, 1 [III 499].
- 573*. *Datura Stramonium* L. (La Durla dora Lusitanorum, Sol. foetidum pomo spinoso Bauhini — Igelkolben, Stinckende Stachel Nüsle. — Bem. Wächst in Malabar und Indischen Gegenden) III 520, 1.
- 574*. — *metel* L. zum Theil (Solan. spinos., Stramonia, Pomum spinosum, Nux metellis, Hippomanes — Stech Apffel, Rauch A.) III 523, 1 [III 493].
- 575*. *Hyoscyamus niger* L. (H. commun., Faba Suilla, Apollinaris, Symphoniaca Paladii, Herb. canicularis, Dens Caballinus — Bilsam Kr., Doll Kr., Schlaff Kr., Hew Bone, Rindtsw., Zigeuner Kr.) III 511, 2 [III 482].
576. *Nicotiana virginica* Hort. (Nic. foemina fl. incarnato. — „Nata anno 1602, ex semine ab Amsterdam misso.“) III 508, 2.
577. — *macrophylla* Spreng.? (N. folium) — NB. 1 Blatt III 509.
- 578*. — *Tabacum* L. (Nic. Petum Indorum. ? , Herba sancta, Tab., Hyoscyamus Peruianus Dodonaei — Indianisch Beinwelle, Ind. Wundt Kr. — „Nulla salutifero se comparet herba Tabaco — Viribus hoc omnes exsuperat reliquas.“) III 510 [III 484].
- 579*. — *rustica* L. (Nic. seu petu foemina, Hyosc. Peruian. — Ind. Bylsamkr.) III 511, 1 [III 483].

Scrophularineae.

580. *Verbascum Blattaria* L. (Blatt. Phoenicea, Verbasculum — Rotbraun Mottenkr.) III 377, 2.
581. — *Lychnitis* L. (Verb. foemina — Wullkraut Weible) — NB. 1 Blatt von *Primula*. III 377, 1.
582. — *Thapsus* L. (Thaps. barbatus mas, Verb. mas, Candelaria, Candela regis, Lanaria — Wulkrautt Mänle, Königs Kertzen, Brenkr., Himmell Brandt, Unholden Kertze) III 375.
583. *Linaria minor* Desf. (Antirrhinum sylv. — Wylder Orantt) IV 640, 1.
584. — *genistifolia* Mill.? (Lin. parva Tabernaemontani fl. lut.) IV 597, 2.
- 585*. — *vulgaris* Mill. (Lin., Osyris, Herb. urinalis — Sam Kr., Lein Kr., Flachs Kr., Wylder Flachs, Unser Frawen Fl., Krötten Fl., Nabel Kr.) II 281 [III 557].
586. — *arvensis* Desf. (Lin. fl. purp. — Lein Kr. mit blawen Bl.) II 282, 1.

- 587*. *Antirrhinum majus* L. (Ant. sativum — Garten Orantt, Kalbs-Naße, Hundtskopff, Brackenhauptt) IV 639, 2 [III 605].
588. *Scrophularia Hoppii* K. (Rutta canina — Hundts Rautt) II 297, 2.
- 589*. — *nodosa* L. (Scr. major, Ficaria, Castrangula, Mille morbia, Cynocrambe — Braunw., Sew W., Feigwurtzkr., Wurm W.) III 310, 1 [III 410].
- 590.o *Gratiola officinalis* L. (Gr., Gratia Dei, Limnesion [Centaurides] Valerii Cordi, Papaver spumium Anguillarae — Wildt Aurin, Weis Aurin. — „Flore luteo reperi non procul a Genua ad rivulum quendam“. — Medizin. Bem.) II 177, 2.
- 591*. *Digitalis purpurea* L. (Dig. purp., Nola sylvestris — Braun Finger Hutt, Braun Walddt Glöcklein) III 373 [II 133].
- 592*. — *ambigua* Murr. (Dig. lutea — Gelb F., Geel W. Glöcklein) III 374 [II 134].
593. *Veronica triphyllos* L. (Alsines recta — Hunner Rauten) III 347, 3.
594. — *officinalis* L. (ohne Namen) II 226, 2.
- 595*. — *Teucrium* L. (Teucr. — Gr. Bathengell) II 227, 3 [II 56].
596. — *Chamaedrys* L. (Teucr. alterum — Kl. Bathengell) II 228, 1.
597. — *spicata* L. (Veron. foemina Dodonaei, Ver. spicata coerulea) II 229, 2.
598. — *Beccabunga* L. (Berula, Anagallis aquatica major, Sium aquat., Laver aquat. — Gr. Bachbungen, Wasser B.) III 337, 1.
599. — *Anagallis* L. (Ber. minor, Anag. aqu. min. — Kl. Bachbungen, Kl. Wasser B.) III 337, 2.
600. — *montana* L. (Elatine) III 347, 3.
- 601*. *Euphrasia officinalis* L. (Euphr., Opthalmica, Ocularis herba — Augentrost, Hirnkrautt) II 134 [II 129].
602. — *Odontites* L. (Syderitis montana — Gelber Augentrost, Melampyrum) II 137, 1.
603. *Rhinanthus major* Ehrh. (Alectorolophus, Crista galli major) III 357, 2 und (Melampyrum alterum) IV 600.
604. *Melampyrum pratense* L. (Miliun sylv., Crataegonum Dioscoridis, Crataeonum, Crataeum Theophrasti — Walddt Hiersen) IV 600, 2.
- 605*. — *nemorosum* L. (Parietaria sylv. — Wyld Tag und Nacht) IV 599, 1 [III 408].
- 606*. — *arvense* L. (Melamp., Triticum Vaccinum, Tr. nigrum, Tr. bovinum — Kuhe Weytzen, Mohren W., Wachtell W.) IV 599, 2 [III 407].

Orobanchaceae.

- 607*. *Lathraea Squamaria* L. (Dentaria Matthioli, Crocodilia, Aneblatum, Radix squamaria — Sommer W., Erven W.) III 446, 5 [III 382].
- 608*. *Orobanche rubens* Wallr. (Orob. I, Cauda Leonis, Mala herba, Herb. Tauri, H. vaccae — Sommer W., Ervenwürger) III 446, 3 [III 380].
609. — . . . ? . . . (Orob. II — Schuppen W., Anblatt, Freysam Kr., Blumen Kr., St. Georgen W.) III 446, 4.

Lentibularieae.

- 610*. *Pinguicula vulgaris* L. (Ping. Gesneri) III 369, 3 [II 211].

Acanthaceae.

- 611*. *Acanthus mollis* L. (Ac. verus — Welsch Beeren Klaw) III 412, 2. 3 [III 300].

Selagineae.

- 612.o* *Globularia Alypum* L. (Alypum, Herba terribilis Gallorum — Alipum vom Berg Ceto. — „In monte Cethi Galliarum prope Magalonam copiose provenit. Egomet ispe hanc collegi 1562“) I 30, 1 [I 19].

Verbenaceae.

- 613*. *Verbena officinalis* L. (Verb. erecta, Peristereum, Trygonium, Junonis Lacryma, Mustela sanguis, Feria, Ferrara, Exupera matricalis, Herb. sanguinalis, Panchranium, Herb. Veneris Acelii, Columbina, Columbaria — Eysenkrautt Menle, Eysenreich, Eysenhart, Tauben Kr.) IV 641 [III 520].
614. *Vitex Agnus Castus* L. (Vitex agn. cact. — Schafmullen, Keuschbaum, Abrahams B. — Längere Bem. über Wachsthum und Namen) I 36, 2.

Labiateae.

- 615*. *Ocimum Basilicum* L. (Basil., Ocym. fl. purp. et fl. alb. odore Citrimali — Basielien) II 171, 1 [II 91] und (Ocym. crispum chariophyllatum — Kl. Negel Basilien, Edel Bas.) = var *crispum* II 170, 3.
- 616*. *Lavandula officinalis* Chaix (Lavendula major fol. majoribus, Pseudonardus, Spica nardus — Spicknarden) II 117, 2 u. 118, 1 [III 371].
- 617.o* *Stocchas* L. (Stechas arabicum — Stechas Kr., Türkischer Hopfen. — „Circa montem Pessulanum in sylvia Grammidana dicta inter Cisti et Ledis pecies copiosissime crescit.“) II 122, 1 [III 599].

- 618*. *Mentha Pulegium* L. (Pul. commune — Poley) II 115, 1 [II 36].
- 619.o* — *cervina* L. (Pul. Cervinum — Welscher Hysop, Hirtz Poley. — „In monte Pessulano Galliarum Provinciae copiosissime provenit locis palustribus. In hortis nostris cultura facillime assuescit.“) II 110, 2 [II 35].
620. — *sativa* L. (Menth. crispa balsamita, Sysimbrium domesticum — Kraus Muntz, Krausser Ballsam) II 255 u. (M. aquatica odore Ocymi) II 256, 2.
- 621*. — *crispa* L. (M. crisp. vera) II 253 [II 96 ohne Deutung].
622. — *longifolia* var. *viridis* (Mentastrum, Menta equina, M. Caballina — Wilder Ballsam, Wyldt Muntz, Roßmuntz) II 254, 1.
- 623*. — *silvestris* L. (Mentastr. aquat. — Bachbalsam Muntz, Wasser Roß M.) II 254, 2 [II 98].
- 624*. — *arvensis* L. (Calamenta arv., Cal. agria — Acker M.) II 249, 2 [II 97].
625. — *aquatica* $\times$ *arvensis* (Sysimbrium sylv. — Korn M.) II 250, 1.
- 626*. *Lycopus europaeus* L. (Syderitis aquatica) II 135 [III 596].
627. *Origanum Dictamnus* L. (Diptamus Creticus — Kretischer Diptam) II 126, 1.
628. — *hirtum* Link var. *heracleoticum* Benth. (Or. creticum, Orig. Heracleoticum — Kret. Wermuth, Spanischer Dosten) II 126, 2.
629. — *megastachyum* K. (Or. cret., Creticum fl. alb. — Gem. Dosten mit weisser Bl.) II 127, 2 u. (O. cr. fl. purp.) II 129, 1. 2
- 630*. — *vulgare* L. (Or. commune sylv. — Gem. Wildt Dosten) II 130, 1. 2; desgl. fl. alb. (Or. comm. fl. alb.) II 128, 1. 2 [II 109].
631. — *Majorana* L. (Maj., Samsuchus, Amaracus — Majoran, Maheran) II 122, 2 und (Maj. tenuifolia — Winter Majoran) II 123, 1.
- 632.o *Thymus vulgaris* L. (Thym. — Röm. Quendell, Welscher Qu., Thimian Kr.) II 225, 1 und (Th. creticus — Kretisch Thim. Kr., Französ. Th. K. — „In Gallia Narbonense et circa Montempessulanum in sylvis Roris marini copiosissime crescit.“) II 225, 2.
- 633*. — *Serpyllum* L. (Serp., Merpyllum — Quendell, Feldt Roetgen) II 115, 2 und desgl. fl. alb. (Serp. II fl. alb.) II 116.
634. *Satureja hortensis* L. (Satur. — Pfefferkr.) II 258.

- 635*. *Hyssopus officinalis* L. (Hyss. comm. fl. coerul. — Hysop) II 152, 2 und (Hyss. fl. alb.) II 153 1. 2.
- 636*. *Calamintha officinalis* Mnch. (Calamenta montana vera et Gallica — Berkmüntz) II 247, 1 [II 100].
637. — *Acinos Clairv.* (Puleg. mont., Polium veterum, Clinopodium majus — Berek Poley, Stein P., Würbeldosten) II 114.
- 638*. *Melissa officinalis* L. (Mel. comm., Melissophyllum, Apiastrum, Melitis, Citronella, Citrago — Melissen, Bienenkr., Immenblatt, Biensauge, Mutterkr.) II 163, 1 [II 88].
639. — . . . ? . . . (Calamenta quadrangularis gallica) II 248.
640. *Salvia Aethiopis* L. (Aethiopis, Aeth. Phlomitis, Cotonaria Monspelienisium cand. et toment. fol. — Morenkr.) III 377, 3.
641. — *officinalis* L. (S. acuta, S. minor., S. auriculata — Kreutz-Salbey, Spitz S.) II 257, 1 und (S. major — Gr. od. breitt S. — Bem. „Cur moritur homo, cui Salvia crescit in horto, Salvia cum Ruta faciunt tibi pocula tuta“). II 257, 2.
642. — *Sclarea* L. (Horminium hortense, Orvala, Sclarea — Gartten Scharlach Kr.) II 169, 2.
643. — *pratensis* L. (Horm. sylv. fl. alb. — Wildter Scharlach m. weiß. Bl.) II 169, 1 u. 170, 1.
644. — *glutinosa* L. (Colus Jovis, Orvala III Dodonaei) II 168, 3.
645. — *verticillata* L. (Horm. fl. incarn. — Wildt Scharlachkr., W. Salbey m. leibfarber Bl.) II 170, 2.
646. *Clinopodium vulgare* L. (Nepetha sylvestris) II 250, 2.
- 647.o *Rosmarinus officinalis* L.¹ (Rosmarinum, Rosm. coronarius, Libanotis — Rosmarien. — „In Gallia Narbonense et circa Monspensulum sua sponte tam copiose crescit, ut sylvas faciat“) II 117, 1.
648. *Nepeta nuda* L. (Menta felina sativa angustifolia, Nepetha, Sclarea hispanica Clusii) II 164, 2.
- 649*. — *Cattaria* L. (Cattaria major, C. latifolia, Menta fel. major — breytt blettericht Katzen Nept oder Katzenmuntz) II 251 und (Gatt. comm., M. felina comm., — Katzen M.) II 252 [II 104].
- 650*. *Dracocephalum Moldavica* L. (Melissa turcica, M. Moldavica — Türkisch Melissen) II 164, 1 [II 89].
651. *Scutellaria galericulata* L. (Syderitis aquat. altera fl. eleganter coeruleis. — Bem. Pena und Lobelius zählen sie zu den Lysimachien unter Galericulatae) II 136, 2:

652. *Brunella vulgaris* L. (Menta aquat., Sisymb. aquat. — Wasser Muntz, W. Nept, Bach M.) II 449, 1. — NB. Ohne Blüthe.
- 653*. — *grandiflora* Jacq. (Prunella — Braunellen, St. Antoni Kr.) III 305, 1 [II 131].
654. *Melittis Melissophyllum* L. (Melissa sylv. — Wildt Melissen Kr.) II 163, 2.
- 655*. *Sideritis montana* L. (Stachis seu Sid. mansfeldica et Hercinia) II 136, 1 u. 141, 1.
- 656*. *Marrubium vulgare* L. (Marr., Prasium — weisser Andorn, Gottesvergieß) II 138, 1 [III 593].
657. — *creticum* Mill. (M. cret. — Kretischer Andorn) II 137, 2.
658. *Glechoma hederacea* L. (Hedera terrestris I, Chamaecissus, Corona terrae — GundelReb, Gundermann, Erdt Ephew) I 83, 1.
659. *Stachys recta* L. (St. comm., Syderit. prima Dodonaei et Fuchsii — Zeysig Kr.) II 142, 1.
- 660*. — *annua* L. (Syd. odore feniculaceo) II 142, 1 [III 594].
661. — *arvensis* L. (Syd. arvensis I) II 142, 2.
- 662*. — *germanica* L. (St. Dioscoridis et Matthioli — Wolriechender Andorn) II 140 [III 589].
- 663*. *Galeopsis Ladanum* L. (Syd. arv. II) II 143 [III 595, anders gedeutet].
664. *Leonurus Cardiaca* L. (Card. — Hertzgespan, Hertzgespeer) II 139, 1.
665. *Lamium album* L. (L. alb., Paronichia herba, Panaritium, Urtica lactea, Anonium album — Taubenehe, Todten Nessel) III 307, 2.
666. — *purpureum* L. (Hedera terrestris II) I 83, 2.
- 667*. — *maculatum* L. (Lam. purp., Urtica mortua, U. iners — Braun Todt- oder Taub Nessel) III 308, 1. 2 [III 507].
668. *Galeobdolon luteum* Huds. (Lam. lut., Anonium lut. — Gelb Taub N.) III 308, 3. 4.
- 669*. *Molucella laevis* L. (M. Constantinopolitana, Melissa Const., Cardiaca syriaca — Syrisch Hertzgespan) II 165 [II 90].
670. *Ballota nigra* L. (Marrubium ballotes, M. foetidum, M. nigrum — Schwartz stinkender Andorn) II 138, 2.
- 671*. *Phlomis Herba venti* L. (Syder. Monspeliaca, Herb. venti Gallo- rum — Gliedt Kr.) II 139, 2 [III 587].
- 672*. *Teucrium Chamaedrys* L. (Cham., Chamerops, Linodrys, Trizago, Quercula, Serratula, Calamandrina — Gamanderlein, Kl. Batengell, Blaumanderle, Erdt Weyrauch, Vergieß mein nicht) II 227, 1 [II 55].

- 673*. *Teucrium Botrys* L. (Iva Muscata, Chamaeypitis III — Edell Gamander, Feld Cypreß, Iven Kr.) III 364, 1 [II 30 ohne Deutung].
674. — *Marum* L. (Mar. — Ambeerbaum) II 127, 1.
- 675.o* — *montanum* L. (*Polium campestre* — Wildt Rosmarien, Feldt *Polium*. — „Nascitur copiosissime in montibus proclivibus e regione inclytae Scolae Portanae vulgo Saalbergk) II 110, 1 [II 33].
- 676.o — *Massiliense* L. (Pol. mont. seu Gallicum Monspeliense — Bergk *Polium*. — „Circa Montempessulanum et in monte Cethi Galliae Narbonensis in arenosis et incultis locis copiosissime et splendidissime. Anno 1560.“) II 109, 1.
677. — *album* Poir. (Pol. gallic., *Teuthrion*) II 109, 2.
- 678*. — *Scordium* L. (Scord. — Wasser Bathengel, Lachen Knoblauch) II 168, 1 [II 58].
- 679*. — *Scorodonia* L. (Scord. montan.) II 245, 246 [II 59].
- 680*. *Ajuga reptans* L. (*Consolida media* I. II. III, *Solidago Sarra-cenica*, Cons. Sarr. — Gulden Gunsell) III 304, 1. 2. 3 [II 131 anders gedeutet].
- 681*. — *Chamaeypitis* Schreb. (Cham., *Ajuga*, *Abiga*, *Iva Arthetica*, *Arth.*, Herb. *Apoplectica*, *Cucurbitularis* — Erdtpin, E. Kieffer, Je länger je lieber, Schlag Krautle) III 363, 3 [II 130].
682. — *Iva* Schreb. (*Iva Monspeliaca* — Erdtkieffer von Montpellier) III 363, 4.

Plantagineae.

- 683*. *Plantago Coronopus* L. (Coron., *Coronopodium*, *Pes Comicis*, *Dactylus*, *Ammonus*, *Arenaria*, *Astrium*, *Caciatrrix*, *Stilago*, *Silago*, *Pes Milvinus Columellae*, *Cervicarium herba*, *Gramen Cervinum*, *Stella maris*, *Herba stella*, *Capriola* — Krähenfuß, Hirtzschhorn, Rappenfuß, Hirschgras) III 320, 2 [II 172].
- 684*. — *maritima* L. (*Lagopus Monspeliensis* — Hasen Klehe v. Montp.) IV 617, 2 [II 171].
- 685*. — *major* L. (Pl. rosea, Pl. multiplex — Gefullter Wegrich, Rosenwegrich — NB. Monstrosität) IV 592, 1 und * (Pl. m.) IV 592, 2 [II 166].
- 686*. — *lanceolata* L. (Pl. minor Dioscor., *Lingua ovina*, Pl. media — Spitzger Wegebreit, Schaffzunge) IV 592, 2 [II 167].

Nyctagineae.

- 687*. *Mirabilis Jalapa* L. (*Viola peruiana*, *Planta indica*, *Flos mirabilis peruanus*, *Jasmeni Indici*, *Maraviglias de Peru* — *Indian. Viole*) I 65 [I 29].

Illecebraceae.

- 688*. *Herniaria glabra* L. (*Her.*, *Millegrana* — *Harm Kr.*) II 289, 2 [III 548] und (*Hern. Hollerii*, *Polygonum minus Matthioli*, *Millegr.*, *Herniola*, *Proserpinaca* — *Harm Kr.*) III 368, 2.
689. *Scleranthus annuus* L. (*Alsines minor seu petraea* — *Kl. Steyn Vogell Kr.*) III 348, 1 und (*Herba cancri*) IV 563, 3.

Amarantaceae.

690. *Celosia cristata* L. (*Amaranthus purpur. maj.*, *Flos amoris maj.* — *Groß Sammettbl.*, *Gr. Blume d. Liebe*) II 190.
691. *Amarantus hybridus* W. (*Blitum indicum seu Am. Halica* — *Welsch Blümle d. Liebe*) II 191.
692*. — *Blitum* L. (*Bl. sylv. I* — *Wylder Meyer*) III 519, 1 [III 475] und (ohne Namen) IV 525, 1.

Chenopodiaceae.

693. *Chenopodium Bonus Henricus* L. (*B. Henr.* — *Gutter Heinrich*, *Schmerbell*, *Stoltzer H.*) III 524, 2.
694. *Beta vulgaris* L. (*B. sylvestris I* — *Wyldt Mangoldt*) III 525, 2.
695. — — *var. rubra* (*B. rubea* — *Rotter M.*, *R. Ruben*) III 527.
696. *Atriplex latifolia* *Wahlb.* (*Chenopod.*, *Pes anserinus* — *Gensefuß*, *Sew Todt*) III 524, 1 u. (*Bet. sylv. II* — *Wyldt M.*) III 526, 1.
697. — *hortensis* L. (ohne Namen) III 523, 2 und (*Atriplex sativa rubea* — *Rotte M.*; *A. s. alba* — *Weisse M.*) III 521, 2 u. 522.
698*. *Camphorosma Monspeliaca* L. (*Gramen repens*, *Gr. camphoratum*) IV 574 [II 364].
699.o* *Salicornia fruticosa* L. (*Kali maritimi spec.*, *Hetruscis Soda.* — „Nascitur ad littus maris Veneti vulgo a Lyo“ II 111, 1 [III 353].
700.o — *herbacea* L. (*Kali geniculatum.* — „Ad lacus salsos Frankenschanos Harcinia.“) II 111, 3 u. 110, 4. — „Crescit ad lacum Salsum Islebiensem“.
701. *Salsola Kali* L. *var. Tragus* (*Hirci Spina*, *Tragacanthi secunda species*, *Tragon vel Tragos Tabernaemontani* — *Meerstachelkr.*, *Bocks Dorn*, *Scorpions Kr.*) II 110, 3.
702. — *Soda* L. (*Kali Cochleatum majus*) II 111, 2.

Polygonaceae.

703. *Polygonum Persicaria* L. (Pers. I, Pers. maculosa, Hydropiper, Pip. aquaticum — Flochkr., Wasser Pfeffer, Mucken Kr.) IV 584.
704. — *Hydropiper* L. (Persicaria II) IV 583, 2.
- 705*. — *amphibium* L. (Potamogeton etc.) IV 585, 2 [III 614].
706. — *Bistorta* L. (Serpentaria, Bist., Colubrina — Natter W.) II 154, 1.
- 707*. — *Convolvulus* L. (Volubilis arv. I — Kl. Winde) IV 612, 1 [III 426].
708. — *dumetorum* L. (Vol. arv. II) IV 612, 2.
- 709*. *Rumex Acetosa* L. (Acet. latifolia — Breytblettr. Sauer Ampffer) II 182, 1 und (Acet. comm. tenuifolia — Spitzbl. S. A., Salsen A., Agrest A.) II 182, 2 [II 126].
- 710.o* — *scutatus* L. (Acet. rotunda gallica — Runder S., Welscher Sauerampff. — „Crescit non solum in agro Parisiensi Aurelias usque, sed etiam in Germania et Bavaria inferiore prope Kehlhemium ad Danubium.“) II 183 [II 127].
- 711.o — *sanguineus* L. (R. rubea, Sanguis Draconis, Lapatium sang. — Drachenbluett. — „Crescit copiose in subalpinis Taurinorum montium, sua sponte quoque in Frankonia ad Tuberum fluvium.“) II 185.
712. — *Patientia* L. (Lapathum majus rotundifol. Italic. — Welsch Rhabarbar. — NB. ohne Blüthe) II 186 und (L. m. latifolium vulgo Rhabarbarum Monachorum, R. sativus — Mönchs Rhabarbar) II 187.
713. — *crispus* L. (L. sylvestre, R. sylv. — Grindt W., Hunger W., Wylder Mangoldt, W. Ampffer, Lenden Kr.) II 189.

Aristolochiaceae.

- 714*. *Asarum europaeum* L. (Azarum — Hasellwurtz. — „Odoratus reperitur in Helvetiis alpinis, zum Einsiedell, teste Gesnero“). Mediz. Bem. II 119, 1 [III 370].
715. *Aristolochia Clematitis* L. (Ar. Cl., Ar. longa communis — Oster Lucey) III 473, 1.
- 716.o* — *pallida* W. (Ar. rotunda vera — die recht runde Oster Lucey oder Hohlwurtzell. — „In montibus Euganeis prope Patavium crescit.“) III 473, 2 [III 384].
717. — *rotunda* L. (Ar. Cl. altera) III 474, 1.
- 718*. — *longa* L. (Ar. longa vera) III 472 [III 383].

Myristiceae.

719. *Myristica moschata* Thunb. (Nux moschata — Muskatnuß — N. aromatica, N. myristica, N. Badensis, N. m. cum suo mace — Muskatblomen, Macis) I 6, 1.

Laurineae.

720. *Cinnamomum iners* Reinw. (Folium Indicum — Indisch Blatt — Beschr. d. Pfl.) I 5, 2.
 721. — *Zeylanicum* Nees (Cinn., Canella — Zimmetrinden, Kanell; u. Cassia lignea [= Cortex Cinnamomi] — Beschr. d. Pfl. — „In provincia Cumaca Indiae similiter et in Zeilan frequens“.) I 3, 1.
 722*. *Laurus nobilis* L. (Laurus — Lorbeer Baum. — Bem. Tiberius vom Blitz erschreckt, bekränzte sich mit Lorbeer. — Mythische Bem. über Apollo und Daphne) I 37, 1 [I 14].

Thymelaeaceae.

- 723*. *Daphne Mezereum* L. (Granum Gnidium — Kellerhals, Seydelbast — Medizin. Bem.) I 37, 2 [I 48].

Elaeagnaceae.

724. *Elaeagnus angustifolius* L. (Olea sylvestris — Wylder Oliven B.) I 34, 2.

Loranthaceae.

725. *Viscum album* L. (V. — Mistell — Gluten vulgo Vogelleim — Bem. über d. Wachsthum) I 47, 1

Santalaceae.

726. *Thesium montanum* Ehrh. (Linum sylv., Anonimos linifolio — Wylder Leyn, Bergk L.) IV 596, 2. 3. 4. 5.
 727. — *Linophyllum* L. (An. linif. Caroli Clusii) II 283, 1.

Euphorbiaceae.

- 728*. *Euphorbia Characias* L. (Tithymalus maximus, T. dendroides — Gr. Wolffs Milch) III 529 [III 503].
 729*. *Tithymalus Lathyrus* Scop. (Lath. latifolia, Cataputia minor — Spring Kr., Spring Körner, Spr. W., Treib Kr., Scheis Kr.) III 530, 1 [III 502].
 730. — *Peplus Gaertn.* (Pepl. major — Runde Wolffs Milch) III 532, 1.
 731*. — *helioscopius* Scop. (Tith. hel. — Sonnenwend Wolffs M.) III 528 [III 502].
 732*. — *exiguus* Mueh. (Pepl. minor — Kl. Hundts Milch) III 532, 3 [III 503].
 733. — *platyphyllus* Scop. (Tith., Charac. sylv. — Wolffs M.) III 530, 2 u. 533, 1.

734. *Tithymalus Gerardianus* Kl. & G. (Tith., Char. sylv.) III 532, 2.
 735. — *Cyparissius* Scop. (Tith. Cypressinus III — Kypressen W.) III 531, 1 u. 533, 1.
 736. — *Esula* Scop. (Tith. Cypr. II — Kypr. W.) III 533, 2.
 737.o* *Buxus sempervireus* L. (B. — Buchsbaum — „In Gallia Narbonense et Provinciali sylvas faciunt. Aliqui florent et baccas ferunt, quas ipsemet vidi et decerpsi.“) I 50, 2 [I 60].
 738*. *Mercurialis annua* L. (M. mas — Bingell Kr. Menle, Merkurisch Kr. u. M. foemina — B. Kr. Weible. — NB. Die Geschlechter verwechselt) IV 594, 2 u. 595, 1 [III 411 u. 412].
 739*. *Ricinus communis* L. (R., Catapucia major, Granum regium, Palma Christi — Wunderbaum, Kreutz B., Zeckenkörner, Mollen Kr., Türkischer Hanff) IV 646 [II 249].

Urticaceae.

740. *Ulmus campestris* L. (Carpinus — Spindelbaum) I 39, 1.
 741. — *effusa* W. (Cerrus seu Cerris, Carpinus — Hageychen) I 38, 2 u. ev. 39, 2 — NB. ohne Blüthe.
 742*. *Humulus Lupulus* L. (Lup., Salictarius — Hopffen) IV 611, 1. [III 427].
 743. *Cannabis sativa* L. (Cann. mas, Canapus — Hanff d. Menle, und Cann. foem. — H. d. Weible) — NB. beide Geschlechter verwechselt IV 610, 2.
 744*. *Morus nigra* L. (M. nigra — Maulbeerbaum) I 32, 2 [I 86].
 745*. *Ficus Carica* L. (Ficus — Feigenbaum. — Bem. Zwei Bäume habe er seit 23 Jahren in seinem Garten in Pflege) I 32, 1 [I 62].
 746. *Urtica dioica* L. (U. major, U. mas — Gr. Nessel, Brenn N.) III 306, 2.
 747. — *urens* L. (U. minor — Heytter Nessel, Haber N.) III 307, 1.
 748. — *pilulifera* L. (U. Romana — Römisch N.) III 306, 1.
 749*. *Parietaria officinalis* L. (P., Peridium, Parthenium, Urceolaris, Vitraria — Tag u. Nacht, St. Peters Kr., Glas Kr.) IV 598, 2 [III 407].

Cupuliferae.

- 750*. *Corylus Avellana* L. (Cor. Avell., Nuces ponticae, N. praenestinae — Hasellnußstauden, Hasell St.) I 82, 1 [I 100].
 751.o *Quercus pubescens* W. (Cerris, Cerrus — Frembd Eychenbaum. „In Gallia Narbonense una cum Ilicibus et subere sylvas magnas facit.“) I 72, 1. — NB. In Reihen beigefügt 13 verschiedene Galläpfelformen.
 752. — *apennina* Loisl. (Qu. — Eichbaum, Qu. marina — Meereich).

- 753*. *Quercus coccifera* L. (*Ilex coccif.* [tinctoria, infectoria] *Coccus infect.* [tinctoria *Chermesina*] — Scharlachbeer, Chermesin Beerlein) I 76, 1 [I 26].
- 754*. *Castanea vesca* Grtn. (*C. equina*, Marones — Roßkastanen, Maranisch oder Spanisch Kastanen u. *Cast. commun.*) I 30, 2 u. 31, 1 [I 51].
- 755*. *Fagus silvatica* L. (*F.* — Buchbaum) I 31, 2 [I 102].
Salicineae.
756. *Salix Caprea* L. (*S. capr. latifolia* — Breyt groß Sall od. Seyll Weyden) I 77, 2 [I 101].
757. *Populus alba* L. (*P. alba* — Weis Pappelbaum, Weis P. Weyde) I 73, 2 [I 34].
758. — *nigra* L. (*P. nigra* — Schwartzter P., Schw. P. W.) I 74, 1.
Empetraceae.
- 759*. *Empetrum nigrum* L. (*Erica baccifera* II; — Bem. Blüht April, Mai, Früchte Juli, Aug.) I 53, 2 [I 52].
Orchideae.
760. *Neottia Nidus avis* Rich. (*Orch. sylvestris* *Loniceri*) III 446, 2.
- 761*. *Listera ovata* R. Br. (*Ophris*, *Pseudoorchis*, *Oph. bifolia* — Zweiblatt) III 316, 1 [III 544].
762. *Spiranthes autumnalis* Rich. (*Triorchis odorata* — Wohlriechent Knabenwurtzell) III 443, 3 und (*Testiculus min. odorat.* — Zahnw.) III 444, 3.
763. *Cephalanthera ensifolia* Rich. (*Helleborina* I. II fl. alb. — Wildt Nießw.) III 457, 2. 3.
- 764*. — *pallens* Rich. (*Hell.* III IV latif. — Wildt breytbl. N.) III 458, 1. 2 [III 390, anders gedeutet].
765. *Orchismascula* L. (*Cynosorchismaj.* I — Gr. Knaben Kr.) III 441, 1
766. — *militaris* L. (*Cyn. maj.* II) III 441, 2 und (*Testiculus Hircinus* II — Bocks Hoedtlein, Veyll W.) III 442, 2 und (*Triorch. mas* — Gr. Rag W. Menle) III 443, 1.
- 767*. *Himantoglossum hircinum* Spr. (*Testic. Galericulatus* fl. alb. — Knaben Kr. mit weiß. Bl.) III 442, 1 und (*Test. Hircinus* I — Bockshoedl., Veyll W.) III 443, 1 [III 377].
768. *Gymnadenia conopsea* R. Br. (*Triorch. foemina* — Rag W. Weible.) — NB. nur Blüthe, Bltt. v. einer anderen Orchis. III 443, 2. Desgl. (*Palma Christi montana mas* — Bergk Knaben W., Hendtleins W. Menle, Kreutzblomen) III 444, 4. 5 und (*Palm. Chr. mont. IV*) III 445, 1. 2 und (*P. Chr. palustris* — Wasser Hendtl. W.) 446, 1.

769. *Gymnadenia odoratissima* Rich. (P. Chr. mont. III — Walddt Hendtl. W.) III 445, 3.
770. *Platanthera bifolia* Richb. (Testic. vulpinus, Hermaphrotites — Fuchs Hoedtlein) III 444, 1 und (Satyrium trifol.) — NB. Nur Blüthe, das Übrige v. and. Art. III 444, 2.
- 771*. *Cypripedium Calceolus* L. (Damasonium nothum — Unser lieben Frauen Schuch) III 457, 1 [III 391].

Zingiberaceae.

- 772*. *Zingiber officinale* Rosc. (Zinziber — Ingwer — Bem. Wächst in allen uns bekannten Provinzen Indiens u. s. w.) III 435, 1 [II 1].
773. *Canna Indica* L. (Arundo Ind. latifol. florida, Cannacorus, Calamacorus, Harundo lilifera — Ind. Blumenrohr, Ind. Lylgen Rohr) IV 586, 1.

Irideae.

- 774*. *Iris foetidissima* L. (Spatula foetida, Xyris — Wandt Leusekr.) III 438, 1 [II 13].
775. — *Chamaeiris Bertol.* (Chamaeiris latif. sylv. — Gr. breitbl. Himmelschwertel) III 438, 2.
776. — *spuria* L. (Cham. tenuifol. III — Kl. Veyellw.) III 439, 1.
777. — *graminea* L. z. Theil (Cham. tenuif. I — Kl. schmalbl. Himmelschw.) III 440, 1.
778. — *sibirica* L. (Cham. tenuif. II, Ch. angustif. — Kl. V.) III 440, 2 und (Cham. radicib. Cyperinis) III 440, 3.
- 779*. — *Pseud-Acorus* L. (Acorus vulg., Ac. palustr., Pseudac., Ir. palustr. lutea, Pseudoiris. — Gelb Schwertellylgen, G. Wasser L., Drachen W.) III 433, 1 [II 8].
780. — *xiphoïdes* Ehrl. (Ir. bulbosa. — Bem. Aus dem westl. Britannien zuerst nach Belgien gelangt.) III 435, 3.
781. — *variegata* L. (Ir. var. luteo et purp. obsoleto flore) III 435, 4.
782. — *florentina* L. (Ir. Illyrica seu Florent. alb. — Veyllw. Lilien) III 435, 5 und (Ir. Ill. — Windisch V. W.) III 436.
783. — *sambucina* L. (Ir. Flor. II. — Florentinisch Blaw L.) III 437, 2.
784. — *germanica* L. (Ir. sylv. — Wyldt Himmelschwertel) III 437, 1.
- 785*. *Gladiolus communis* L. (Gl., Victorialis mas, V. rotunda, Xyphium — Aller Mann Harnisch, Sieg W., Blut W.) III 451, 5 [III 573].

Amaryllideae.

- 786*. *Narcissus poeticus* L. (N. medio luteus poet. — Halb gelb Narcissen Roeslein) III 449, 2 [III 576].

787. *Narcissus Pseudo-Narcissus* L. (Ps. N. luteus — Gelb Josephssteble, G. Hornungsblomen, Zeitloßbl.) III 449, 1.
 788*. *Leucojum vernum* L. (L. simpl. fl. alb. — Weis Hornungsbl., Sommer Thürlein) III 448, 3 [III 577] und (L. alb. bulbos. multifl. — Weis gefüllt Hornungsbl.) NB. Abnormität mit mehreren Blüten III 448, 2.

Liliaceae.

- 789*. *Smilax aspera* L. (Sm. asp. gallica, Hedera Ciliciae Gazae, H. spinosa, Rubus cervinus — Stechende Winde) IV 613, 2 [III 421].
 790. *Ruscus Hypoglossum* L. (Uvularia, Hyp., Laurus Alexandrina, Bonifacia — Zapfen Kr., Hauchblatt, Keelkr., Zungenblatt) III 314, 2.
 791*. *Asparagus officinalis* L. (Asp., Sparvus, Speragus, Herb. Coralli — Spargen, Korallen Kr.) II 193 [III 463].
 792.o *Polygonatum verticillatum* All. (Sigillum Salomonis angustif., Poligonatum angustif. — „Nascitur in saltibus Hercyniae.“) III 313, 5.
 793*. — *officinale* All. (Sig. Sal., Polygonatum latifol. — Weiswurtz) III 314, 1 [III 528].
 794. *Majanthemum bifolium* Schmidt (Unifolium, Bif., Trifol., Monophyllon — Einblatt, Zweibl.) III 315, 2.
 795*. *Convallaria majalis* L. (Lilium Convallium, Ephemeron non lethale Fuchsii — Megenblomen) III 315, 1 [II 205].
 796. *Hemerocallis flava* L. (Chamaeiris radicibus Asphodelicis) — NB. ohne Blüthe. III 440, 4.
 797*. — *fulva* L. (Lil. Asphodelicum) III 432, 2 [III 582].
 798*. *Aloë perfoliata* L. ? (Aloes — Aloenkr.) III 364, 2 [III 401].
 799. *Asphodelus luteus* L. (Asph. lut. ramosus, Asph. lut. minor — Gelb Affodil Lilien) III 428.
 800. — *ramosus* L. (Asph. fistularis Joachimi Camerarii) III 429.
 801*. — *albus* Mill. (Asph. alb. — Weiß Affodill W.) III 430, 1 [III 570].
 802*. *Anthericum ramosum* L. (Phalangium, Phalangitium, Phalangites, Liliago Cordi, Crinagrostis, Lil. gramineum — Groß Lylgen, Erdtspinnen Kr.) III 430, 2 [III 571] u. IV 573, 2.
 803. *Allium sativum* L. (Porrum domesticum — Lauch, Knoblauch) III 453, 1 und (Porr. rostrat. domest.) III 453, 2.
 804. — *rotundum* L. (Porr. sylv. rostr. rubeum — Rotter wyld Brieslauch) III 453, 3.

805. *Allium vineale* L. (Porrum sylv. — Wyld Brieslauch) III 454, 1.
806. — *sphaerocephalum* L. (P. pratense, Schoenoprasium prat. — Wiesen Brieslauch) III 454, 2.
- 807*. — *Victorialis* L. (V. mas, All. sepium, A. Anguinum Matthioli) III 452, 1 [III 574].
808. — *ursinum* L. (All. urs. — Beer Knoblauch, Wiesen K.) III 452, 2.
- 809*. *Muscari botryoides* Mill. (Hyacinthus Botr. — Blaw weiß Veyllbraun Trauben Hyacinth) III 447, 5 [III 578].
- 810*. — *comosum* Mill. (Hyac. comm. — Hyac. od. Mertzenblome) III 447, 3 [III 578].
811. — *moschatum* W. (Musc., Hyac. Botr. muscari — Frembt Trauben Hyacinth) III 447, 4 [III 577].
- 812*. *Hyacinthus orientalis* L. (Hyac. or. fl. coerul. et fl. alb. — Blawer u. Weißer frembter Hyacinth) III 448, 1. 2 [III 578].
- 813*. *Scilla maritima* L. (Sc., Squilla marina, Pancratium Clusii — MeerZwiebell aus meinem Garten 1598) III 452, 3 [III 585].
814. *Ornithogalum umbellatum* L. (Orn. Pannonicum — Ungarisch Feldt Zwiebell, Acker Z., Erdt Nuß) III 447, 1 [III 579].
- 815*. *Lilium Martagon* L. (L. cruentum angustifol.) III 435, 2 [III 580].
- 816*. — *bulbiferum* L. (Martagon rub., L. rub. et seminiferum — Rott Heydnisch Lylgen, Fewer L.) III 431 [III 584].
- 817*. *Fritillaria imperialis* L. (Tussahi, Tussai, Corona Imperialis, Lil. Persicum — Königs Kron) III 432, 1 [III 575].
818. *Tulipa silvestris* L. (Tul. lut. seu fl. lut. — Gelb Narcissen Lylgen) III 449, 3.
819. — *Gesneriana* L. (Tul. fl. purp. — Purpurfarb Narciß. Lil.) III 450 und (T. fl. violac. — Veyllbraun Narciß. Lil. — Bem. „Multiplici vincit florum genus omne colore — Huc usque a Geticis Tulipa missa jugis.“) III 451, 1.
- 820*. *Gagea arvensis* Schult. (Ornithog. lut. — Gelb Feld Zw.) III 447, 2 [III 578].
821. *Colchicum autumnale* L. (C. angustif.) III 451, 3 und (C. Germanicum, Bulbus agrestis — Zeitt Losen, Wiessen Z. L.) 451, 2. — Abnorm mit mehreren Blüten.
- 822*. *Paris quadrifolia* L. (Aconitum salutiferum, Herba Paris, Uva versa, U. vulpina — Einbeer) III 316, 2 [III 522].
- 823*. *Veratrum album* L. (Helleb. alb., Ver. alb. — Weis Niesse W.) III 458, 3 [III 395].

Typhaceae.

824. *Typha angustifolia* L. und *T. latifolia* L. vereinigt (T. palustr., T. aquat., Sceptum Morionis, Storea, Matta Scirpea — Lysch oder Moßkolben, Narren K., Wasser Kolben) IV 581, 2.
- 825*. *Sparganium ramosum* Huds. (Sp. ram., Xiphidium, Botus, Butomus Theophrasti — Gros Igels Knospen, Schwertel, Riedt Degenkr.) IV 579, 2 [II 14].
826. — *simplex* Huds. (Sp. alter. seu non ramosum) IV 580.

Aroideae.

- 827.o* *Acorus Calamus* L. (A. verus, Cal. aromaticus officinalis — Kalamus. --- „In finibus Lituaniae et versus Tanaim ac Maeotim.“) III 433, 2 u. 434.
- 828*. *Calla palustris* L. (Dracontium palustre — Wasser Drachen W.) III 470, 2 [III 367].
- 829*. *Arum maculatum* L. (Aron, Arum — Aron, Pfaffenbyndt, Deutscher Ingwer) III 470, 1 [III 366].
830. *Dracunculus minor* L. (Dracontium minus, Dracunculus m., Serpentina, Colubrina — Kl. Drachenw., Schlangen Kr.) III 471, 1.

Alismaceae.

- 831*. *Alisma Plantago* L. (Plant. aquat. major, Cochlearia palustris — Wasser Wegerich, Frosch Weg., Fr. Leffell Kr.) IV 593 und (Pl. aqu. minor — Kl. Wasser Weg.) IV 594, 1 [II 168].
832. *Sagittaria sagittifolia* L. (Sagitta Herculis, S. Magonis Plinii, S. Jovis, Sagittalis Cordi, Sagittaria aquat., Lingua serpentis, Sag. Pistanax, Phleos mas latif. Lugdunensis — Pfeyll Kr.) IV 581, 3.
- 833*. *Butomus umbellatus* L. (Iuncus Cyperinus floridus, Gladiolus Theophrasti, Gl. palustr. Cordi, Iuncus cyperoides — Kyperschwertel) IV 590, 2 [II 13].

Najadaceae.

834. *Trichlochin palustre* L. (Gramen junceum spicatum I, Schoenagrostis — Bintzengras, Squinantengr.) IV 567, 2.
835. *Potamogeton natans* L. (Potamog., Fontalis, Spicata — Sam Kr.) IV 585, 1.

Cyperaceae.

836. *Cyperus Papyrus* L. (Harundo Hispanica — Spanisch Schilff) III 439, 2.
837. — *longus* L. (Cyp. long. — Langer Wylder Galgant) III 468, 1.

838. *Cyperus rotundus* L. (Cyp. rot., Cyp. Babilonicus — Runder W. G.) und (C. rot. dulcis Theophrasti — Süßer W. G.) III 468, 2 u. 469, 1.
839. — *esculentus* L. (Trasi — Erdtnußle) III 467, 2.
840. *Scirpus Tabernaemontani* Gmel. (Juncus palustr. major, Elioschoenus — Gr. Weyherbintzen) IV 591, 1.
841. — *silvaticus* L. (Gramen Cyperinum aquaticum — Wasser Kyperngras) IV 564, 3 u. 565, 1.
- 842*. *Eriophorum angustifolium* Rth. (Linagrostis, Lana pratensis, Gramen tomentarium [tomentosum], Tomentum prat., Juncus bombycinus, Linoschoenus, Linum prat. Cordi, Gram. Eriophorum Romberti Dodonaei — Flachsg., Wiesenflachs, Mattenfl., Wiesen Wolle) IV 570, 2 [III 467].
843. *Carex paniculata* L. (Gram. caninum — Hundts Gr.) IV 566, 1.
844. — *paludosa* Good. (Gr. Typhinum III — Lischgras) III 565, 2.

Gramineae.

845. *Zea Mays* L. (Frumentum Turcicum, Fr. indicum, Milium Indicum Plinii, Maiz Indis — Türkisch Korn, Türk. Weytzen) — NB. Nebst verschiedenen Maiskörnern mit lateinischen und deutschen Farbenangaben. IV 560, 1.
- 846*. *Coix Lacryma* L. (Lachrima Job. Lithospermum Arundinaceum — Jobs Threnen) IV 558, 2 [II 190].
847. *Sorghum vulgare* Pers. (Sorgum, Melica, Melega, Sagina, Triticum Sorgum, Milium Indicum, Mil. saburum, Panicum locale, Mil. Saracenicum, Pan. Indicum, — Sorgsahmen, Welscher Hyrsen, Indian. H., Sorg Weytzen) IV 558, 1.
- 848*. *Cymbogon Schoenanthus* Spreng. (Schiananthus, Squinantum, Juncus odoratus — Kamelshew) II 125, 2 [II 5].
- 849*. *Panicum miliaceum* L. (Mil. nigrum, Cenchrus Strabonis, Paspalus Hypocratis, Pistum — Hirs, Hyrschen) IV 559, 1 und (Mil. commune — Gem. H.) IV 561, 4 [II 187].
850. — *italicum* L. (Pan., Elymus, Helymus, Melyne, Melfragum, Panica — Pfench, Pench, Seydellpennich, Pauer Korn, Fuchschwanz, Butzweytzen) IV 559, 2.
- 851*. — *Crus galli* L. (Gramen panicum acutum, Elymagrostis — Scharffenichgras) IV 567, 1 [II 188].
- 852*. *Phalaris canariensis* L. (Ph., Gramen Canariense — Kanariengras) IV 561, 3 [II 187].

- 853*. *Phalaris arundinacea* L. var. *picta* (Gr. pictum, Gr. sulcatum, Gr. striatum, Gr. Hispanicum, Gr. Tunicum — Türkisch Federkr., Welsch Gras, Spanisch Gr.) IV 563, 4 [II 190].
854. *Digitaria ciliaris* Koel. (Panic. sylv., Gr. Manna, Panicula — Wylder Fenchschwaden, Wylder Himmelthaw) IV 559, 3.
855. *Stipa pennata* L. (*Spartium austriacum* Caroli Clusii) I 68, 3.
856. — *capillata* L. (Gr. montanum majus — Gros Bergkgras) IV 568, 1.
- 857*. *Phleum pratense* L. (Gr. Typhinum I — Lischgras) IV 564, 1 [II 201].
858. *Alopecurus pratensis* L. (vereint mit vorigem) IV 564, 2.
859. *Agrostis alba* Schrad. (Gr. Harundinac. montan., Calamagr. mont., Schoenocalamum — Bergkriedtgr., Schmelen) IV 571, 3.
860. — *vulgaris* With. (*Festuca* seu *Aegilops* II — Hafferwalch, *Festulago*, *Bromus sterilis*, *Avena ster.*) IV 561, 2.
861. *Calamagrostis epigeios* Rth. (Gr. Harund. arvense — Acker Riedtgr.) IV 571, 1.
- 862*. *Phragmites communis* Trin. (Gr. Harund. aquat. — Wasser Schilffgr., W. Riedtgr.) IV 585, 1 [II 197].
863. *Melica ciliata* L. (Gr. sylv., Gr. nemorosum — Walddt Gr., Busch Gr.) IV 570, 3.
864. *Briza media* L. (Gr. Leporinum, Gr. tremulum, Panis Leporis, Linum Mariae Divae — Hasen Gr., Hasenbrodt, Unser lieben Frauen Flachs, Ziderngr.) IV 570, 1.
- 865*. *Dactylis glomerata* L. (*Hordeum murinum*, *Phoenicopteron*, *Phoenicea herba*, Hord. sterile, *Lolium murinum*, *Tritic. murin.* — Mausgerste, Maus Korn, Taab Korn) IV 566, 2 [II 191].
- 866*. *Poa trivialis* L. (Gr. paniculatum segetale — Acker Straußgras) IV 568, 2 [II 192].
- 867*. *Apera Spica venti* P. B. (*Calamagrostis* — Roergr.) IV 571, 2 [II 199].
- 868*. *Avena sativa* L. (Av., *Bromus*, *Acrospelus*, *Symphonion* — Haber, Haffer) IV 561, 1 [II 199].
869. *Bromus sterilis* L. (*Aegilops*, *Bromoides* III — Hafferwalch, Nadel Lulch) IV 573, 1.
870. — *tectorum* L. (*Aeg.* seu *Festuca*) IV 571, 4.
871. — *commutatus* Schrad. (Gr. caninum — Hundtsgr.) IV 572, 3.

- 872*. *Lolium perenne* L. (Lol., Zizania, Thyarris, Jurum — Hundts Drespe, Walch Dr., Weytzen W.) IV 568, 3 [II 200] und (Loligo — Kl. Drespen, Haffer Dr.) IV 572, 2.
873. — *multiflorum* Lmk. (ohne Namen) IV 572, 2.
- 874*. — *temulentum* L. (Lol. II) IV 572, 1 [II 200].
- 875*. *Triticum sativum* L. *hibernum* (Tr., Tr. robum — Weytzen) IV 560, 2 [II 184].
876. — *sativum turgidum* L. (Tr. Typhinum — Kaull Weytzen, Kolb W.) IV 560, 3 [II 184].
- 877*. *Secale Cereale* L. (Rogum, Sec., Secal., Brica, Farrago — Rocken, Korn) IV 560, 4 [II 185].
- 878*. *Hordeum vulgare* L. *distichum* (Hord. hyemale, H. polystichum, H. distich., H. Galatica, H. aestivum -- Winter Gerste, Sommer G.) IV 560, 5. 6 [II 185].

Coniferae.

- 879*. *Pinus Larix* L. (Lar. — Lerchen B. — Bem. Der einzige harztragende Baum, welcher nach dem Winter neue Blätter erhält) I 27, 3 [I 30].
- 880*. — *silvestris* L. (Pinus — Kyffern, Kienholtz, Hartzbaum) I 26 [I 31].
881. — *Cembra* L. (P. montana, P. maritima persimilis — Zyrbel Baum — mit Frucht) I 27, 1.
882. *Picea excelsa* Link (Abies, Picea — Thannenb., Fichte oder rother T.) — Bem. über Holzverwerthung I 24.
883. *Abies alba* Mill. (Picea — Fiechtenb.) I 25, 1.
884. *Thuja occidentalis* L. (Arbor vitae, Thuia sive Thya, „ut Galli nominant“. — Baum des Lebens. — Medizin. Bem.) I 2, 2.
- 885*. *Juniperus Sabina* L. (Sab., Savina — Sevenb., Sadeb.) I 47, 2 [I 35].
- 886.o* — *communis* L. (Juniperus minor seu communis — Wacholder Beerstaude, Kranewet Beer — „In Durlingia finitimisque ejus locis et sylva Thuringiaca quam copiosissime crescit.“ — Medizin. Bem.) I 23 [I 35].
- 887.o* — *Oxycedrus* L. (Jun. major seu Oxycedrus, Cedrus minor Matthioli — Gr. Welsch Wacholderbeerstauden mit roten Beeren. — „In Galliarum provincia copiosissime crescit in Campo Rosmarini inter Ladanum, Ledum et Ilicis species.“) I 22 [I 36].
- 888.o *Taxus baccata* L. (T. — Eybenbaum — „Gaudet locis umbrosis. Nascitur copiosissime in principio sylvae Thuringi-

cae prope Salfeldiam et Greffenthalam. In Gallia Narbonense maxima copia et grandiores.“ — „Aus diesem Eybenholtz werden die besten türkischen und ungarischen Phlytzbogen gemacht“) I 25, 2.

Kryptogamae:

Lycopodiaceae.

- 889*. *Lycopodium clavatum* L. (Muscus terrestris, Selago — Beerlapp, Gundelkr., Katzenleytterlein, Lewenfuß) II 105, 4 [III 527 anders gedeutet].
890. — *annotinum* L. (Musc. sylv., terrestr., clavatus — Beerlapp, Gundelkr., Neunheyll, Teuffells Klawe, Wolfs Kl.) II 104, 4.
- 891.o — *complanatum* L. *Chamaecyparissus* A. Br. (Chamaec., Cypar. sylv. — Wald Cypressen — „Crescit in sylva vulgo auff dem Forst ad dominos a Tautenburg“) I 48, 1.

Equisetaceae.

- 892*. *Equisetum palustre* L. (Equ. pal. seu aquaticum — Wasserschaffthew) IV 582, 2. 3. 4 [III 607].
- 893*. — *arvense* L. (Equ. arv. — Ackerschaffthew, Tauben Rock, Kannenkraut) IV 582, 5. 6 [III 606].

Ophioglosseae.

- 894*. *Ophioglossum vulgatum* L. (Oph., Lingua Vulneraria Cordi, L. serpentina — Natter Zunglein) III 317, 2 [III 541].
- 895*. *Botrychium Lunaria* Sw. (Ruta Lun., Selenitis, Lun. minor, L. Jecoraria, Lun. Botrytis, L. racemosa, Tora salutifera — Leber Rautte, Mohn R., Kl. Mohn R.) III 317, 3 [III 541].

Polypodiaceae.

- 896.o *Onoclea Struthiopteris* Hoffm. (Struth. Cordi „quod vere novo Anno 1598 in horto meo prodiit. Nascitur autem non solum Gorslariae sed frequentissima circa pagum Lutterdorffium in comitatu Honsteiniensi distantem mille passus ab Anderspergo.“) II 232, 2. 3.
- 897*. *Phegopteris Dryopteris* Fée (Filix foemina II — Farnkraut Weible) II 239, 3 [II 85].
- 898*. *Cystopteris fragilis* Bernh. (Fil. pumila saxatilis foem., Dryopteris, Filicula, Osmunda — Kl. Wurtzelfarn, Kl. Steinf., Eichfarn) II 239, 4 [II 86].
- 899*. *Polystichum Filix mas* Rth. (Fil. petraea major foemina II) II 237 [II 85] und (Fil. mas I) II 238, 2 zum Theil und (Fil. petr. maj. foem.) II 236 z. Th. und II 239, 1.

900. *Athyrium Filix femina* Rth. (Fil. mas II) II 238, 2 z. Th. u. II 236 z. Th., II 237 z. Th. (mas und fem. vereinigt).
- 901*. *Asplenium Trichomanes* L. (Trichomanes, Polytrichum, Adiantum nigrum — Wiederthron, Wiedertod, Abthon) II 160 [II 77].
- 902*. — *Ruta muraria* L. (Paronychia, R. muraria, Adianth. nigr. — Mauer Rautte, Eselsfarn) II 159 [II 66].
- 903*. — *septentrionale* Sw. (Muscus corniculatus, Holostium petraeum — Behorneter Mooß) II 162, 4 [II 79].
- 904*. *Ceterach officinarum* W. (Scolopendrium verum, Asplenium, Ceterach — Miltz Kraut) II 232, 1 [II 64].
905. *Scolopendrium officinarum* W. (Scolop., Lingua Cervina — Hirsch Zunge) II 233, 2. 3.
906. — *Hemionitis* Sw. (Hemionitis) II 234.
907. *Blechnum Spicant* With. (Lonchitis, Lanceolaris, Aspl. sylvestre — Spicantt, Gr. Miltz Kr.) II 233, 1.
- 908.o* *Adiantum Capillus Veneris* L. (Cap. Ven., Adianth. album Lugdunense. — „Hanc ego maxima in copia inveni in montibus Valconicis ad oppidum Arsedum inter Veltrium et Tridentum ad scaturigines suavissimos e rupibus exilientes. 1559, 10. Mai“) II 160, 1 [II 65] und (Cap. Ven. niger) II 231, 2.
909. *Pteris aquilina* L. (Fil. foem. maxima — Gr. Waldfarn Kr. das Weible) II 238, 1.
- 910*. *Polypodium vulgare* L. (Polyp., Filicula — Engelsüs, Tropfenwurtz, Baumfarn, Steinwurtz, Wyldes Süßw., Süßfarn) II 235 [II 87].

Hepaticae.

911. *Marchantia polymorpha* L. (Lichen, L. petraea, L. saxatilis, L. fontana, Hepatica, H. saxat. — Leberkr., Steinleberkr., Steinflechten, Moosflechten, Brunnenkraut) II 174, 2.

Musci.

912. *Funaria hygrometrica* Huds. (ohne Namen) II 162, 3.
- 913*. *Anomodon attenuatus* Hüb.? und *Neckera intricata* Ag. vermisch (Muscus arboreum — Baummooß) II 104, 3 [III 526 anders gedeutet].
914. *Polytrichum commune* L. (Adiantum aureum majus, Polytr. Apuleii — Gr. gulden Wiedertodt) II 161 u. 162, 1.
915. — *juniperinum* Hedw. (Adianth. aur. minus — Kl. gulden Wiedertodt) II 162, 2.

Lichenes.

916. *Usnea barbata* var. *hirta* Fr.? (Muscus ramosus — Astecht Mooß, Musc. corallinus sive montanus — Wildt Korallenm.) II 104, 2.
917. *Cetraria islandica* Ach. (Pulmonaria III — Stein Lungenkr.) II 157, 3.
918. *Peltigera canina* Hoffm. (Pulmonaria)II II 157, 2.
- 919*. *Sticta pulmonacea* Schaer. (Pulmonaria I — Lungenkr., Baum L.) II 157, 1 [II 80].

Fungi.

920. *Lactarius deliciosus* Fr. (Fungorum genera: Reiskern) III 455, 3.
921. *Cantharellus cibarius* Fr. (Fungi cervini — Pfifferling) III 455, 5.
922. *Inoloma violaceus* Fr. (Blawling) III 455, 6.
923. *Polyporus confluent* A. & S. (Hirtzschwam) III 455, 1.
924. *Clavaria* Arten u. a. (Capreolini — Bocksbart, Rheting, Bultze) III 455.
925. *Boletus Laricis* Jacq. (Agaricum — Thannenschw.) I 27, 4.
926. *Auricularia sambucina* Mart. (Fungi Sambucini — Holunderschwemme) I 56.
- 927*. *Elaphomyces granulatus* Fr. (Bolet. cervin. virili mentula) III 455.
928. *Morchella conica* Pers. (Tuber) III 455, 8.
929. *Accidium Euphorbiae* Pers. (Tithymalus longus — Lenglechtig Wolffsmilch) III 531, 2.

Algae.

930. Gigartinaceae: *Chondrus crispus* Lyngb. (Corallinarum verarum species — Korallengewechs) II 105, 1.
931. Corallinaceae, ev. zu Dictyotaceae II 105, 3 („Collegi in Gallia prope Melusiniam 1560“) und (Muscus marinus — Meer Moos, Korallen M.) II 104, 1.

Animalia.

1. Sertulariae et Corticatae (Muscus marinus) II 104, 5. 6 u. II 113, 9.
- 2*. Bryozoen (Halcionii species) II 113, 6. 8 [III 355 ohne Deutung].
3. Monactinellidae: Spongilla Arten II 113, 1. 2. 3. Chondrosia 113, 4.
4. Eihüllen von Buccinum II 113, 5.

Drogen.

1. Cortex Cinnamomi Cassiae v. *Cinnamomum Cassia* Blume (Cassia solutiva seu in Cannis — Kassien Roeren —

- „Multa Cassia sol. nascitur in Cayro et plerisque aliis provinciis tum orientalis tum occid. Indiae.“) I 1, 2.
2. Cort. Cinnamomi Zeylanici v. *Cinnamomum Zeylanicum* Nees (Cinnam. seu Canella) I 3, 1.
 3. Cort. rad. Capparorum v. *Capparis spinosa* L. (Cortices Capp. — Kappernwurtzellschalen) I 13, 2.
 4. Cort. rad. Mandragorae v. *Mandragora officinalis* L. (Cort. Mandr. — Alraunwurtzellschalen) I 13, 3.
 5. Fructus Cardamomi min. v. *Elletaria Cardamomi* Wght. (Cardamomum — Cardomemle) I 14, 2.
 - 6*. Fr. Cubebae v. *Piper Cubeba* L. (Piper candatum) I 8, 4 und (Cubebae) I 14, 1 [I 5].
 7. Fr. Anacardii v. *Semecarpus Anacardium* L. (Anacard. officinarum — Elephanten Leusse — „Veteris ignotum fuit. Magna est copia in Malabar et reliquis provinciis Indiae.“) I 14, 5
 8. Fr. Cajous v. *Anacardium occidentale* bei Willd. (Cajous — „Affertur ex Brasilianna regione Ulysibonam“) I 14, 6.
 9. Fr. Tamarindorum v. *Tamarindus indica* L. (Arbor tamarindifera. — „Optimi Tamarindi nascuntur in Cambaya, Malavar, Guzara Indiae regionibus.“) I 1, 1.
 10. Caryophylli v. *Caryophyllus aromaticus* L. (Charyoph. et Pseudocharyophylli — Mutterneglein) I 5, 1.
 11. Dactyli v. *Phoenix elata* Ait. (Dactili — Datteln — „Arbor palma in Italia sterilis est, in Gallia Narbonense vero et Hispania finitimis fructus fert. Ex Aegypto et Alexandria optimi afferuntur.“) I 10, 1.
 12. Myrobalani Chebulae v. *Terminalia Chebula* Grtn. (Myrobalanorum genera quinque: Chebuli, Bellirici, Indici, Citrini, Emblici) I 7, 2.
 13. Piper nigrum, album, longum v. *P. nigrum* L. und *P. longum* L. (P. n., P. alb., P. long. — P. ovatum? — „Nascuntur Malabar et Malacae — Bengala“) I 8, 1. 2. 3. 6.
 14. Carpesium v. *Carpesium cernuum* bei Linné (Carp. — „Nascitur plurimum in Syria“) I 8, 6.
 15. Sebesten (Nuclei Sebesten) v. *Cordia Sebestena* Grtn. I 7, 1.
 16. Semen Myristicae (Nux muscata et Macis) v. *Myristica moschata* I 6, 1.
 17. Sem. Strychni (Nux vomica — Kraeen Augen) v. *Strychnos Nux vomica* L. I 14, 7.

18. Sem. Cocculi (Cocci orientalis — Kockelkörner) v. *Anamirta Cocculus* Wght. I 14, 4.
19. Sem. Paradisi (Grana paradisi — Paradies Körner) v. *Anomum Granum Paradisi* Afz. I 14, 3.
20. Sem. Amomi (Amomum) v. *Eugenia Pimenta* DC. I 8, 7.
21. Xilobalsamum (Xilobalsum officinarum — Balsam Holtz, Balsamkörner, Sem. Balsami) Chrisma der katholischen Kirche I 11, 2.
22. Camphora (Camph. — „Nascitur in Burneo, Bairros. Sumatra et Pacen“) v. *Camphora officinarum* Nees und *Dryobalanops Camphora* Coleb. I 20, 7.
23. Asphalt [Mineral] (Asphaltum — Juden Bech — „Judaicum ex Sodomeo lacu affertur“) I 16, 6.
24. Gummi Arabicum (G. Arab.) v. *Acacia Ehrenbergii* Hayne u. a. I 16, 8.
25. Sarcocolla („Sarc. est liquor seu lacryma arboris Persiae“) v. *Penaea* und *Sarcocolla* Arten I 18, 5.
26. Ammoniacum (Gummi ammon. — Ammoniac Hartz — „Succus est Ferulae Lybiae et Cyrenicae“) v. *Dorema Ammoniacum* Don I 16, 7.
27. Asa foetida (A. f. — Teuffels Dreck — Laser syriacum, Succus syriacus) v. *Scorodosma foetidum* Bnge. I 16, 3.
28. Galbanum (Galb., Succus gummi vel lacryma — „Optimum est Cartilaginosum“) v. *Ferula erubescens* Boiss. I 17, 4.
29. Myrrha (M. — „Arbusecula est in Arabia nascens“) v. *Balsamodendron Myrrha* Nees I 17, 7.
30. Olibanum (Thys. Olib. — Weyrauch — „Optimum et laudatissimum est quod in montanis confragosis provenit“) v. *Boswellia serrata* Steekh. I 18, 1.
31. Euphorbium (Euph.) v. *Euphorbia officinarum* L. I 17, 1.
32. Bdellium (Bd., Malachran — „In Arabia copiosissime nascens“) I 16, 9.
33. Copal (Copal) v. *Valeria indica* L. und *V. acuminata* I 16, 5.
34. Elemi (Gummi Elemi — „Origo ejus omnino obscura est“) v. *Amyris Plumieri* DC. I 17, 2.
35. Gummi Hederae (Gummi Hed. — „Lacryma Hederae psilotrum est“) v. *Hedera Helix* L. I 17, 3.
36. Gummi Lacca (G. lacca officinarum — „E Sumatra et Martaban, ex India in Arabiam deportatur. Hodie Lusitani ex India afferunt“) v. *Aleurites laccifera* L. I 17, 5.
37. Ladanum (Lad. — „In Gallia Narbonense ex Ledi et Cisti speciebus copiosissime colligitur“) v. *Cistus ladaniferus* L. I 20, 1.

38. Succus Hypocystidis (Hypocistis „ex hypocystide ad radicem Cysti ut Orobanche proveniens in Galliarum provincia crescens“) v. *Cytinus Hypocystis* L. I 20, 2.
39. Acacia (Ac. — Aegyptischer schotten Dorn Safft — „Gummi vel succus ab Aegyptia spina, quod Acaciam vocant, emanans“) v. *Acacia vera* W. u. a. I 20, 6.
40. Scammonium (Scamm., Digridium — „Ex Mysia regione Asiae deportatur“) v. *Convolvulus Scammonia* L. I 20, 3.
41. Sanguis Draconis (S. Dr. — Drachen Bluett) v. *Pterocarpus Draco* L. u. a. I 20, 5.
42. Opium (Opium — „Optimum Thebaicum est, quod ex Cairo affertur“) v. *Papaver somniferum* L. I 20, 4.
43. Mumia (M. sepulchrorum „in Arabia fit e Myrrha, Aloe, Crocos etc.“) I 20, 8.
44. Aloes (Al. „fit ex Al. Herb. — Nascitur in Cambaya, Bengala aliisque multis locis, laudatissima vero in Socotora“) v. *Aloe socotorina* L. u. a. I 20, 9.
45. Mastix (M., Gummi lentiscinum — Mastix — „In Chio et Creta Aegai insulis“) v. *Pistacia Lentiscus* L. I 17, 6.
46. Opoponax (Oppop. officinarum, Gummi [lacryma, succus] panicis) v. *Opopanax Chironium* K. I 18, 2.
47. Storax (Styrax calamita — „Ex Syria, Pamphilia advehitur optima“) v. *Styrax vulgaris* L. I 18, 3.
48. Sandaraca (Sandaracha — Sandarach, Roter Mastytz, Druckener Furnest — „Gummi Juniperi majoris seu oxycedri dicitur“) v. *Callitris quadrivalvis* Vent. I 18, 4.
49. Serapinum (Ser., Sagapenum, Serapin Safft — „Nascitur in regione Media, lacryma Ferulae sagapeniferae“) v. *Ferula persica* bei Willd. I 18, 6.
50. Tacamahak (Tachamacha — „Ex Nova Hispania et America affertur“) v. *Elaphrium tomentosum* Jacq. u. a. I 18, 7.
51. Tragacanthum (Tr. — Dragannt — „Ex Creta, Asia et Graecia advehitur“) v. *Astragalus gummifer* Lab. u. a. I 19, 1.
52. Styrax liquidus (Liquid ambra — „Affertur ex Nova Hispania“) v. *Liquidambar styraciflua* L. I 16.
53. Benzoë (Asa dulcis, Gummi Benzoi — „Maxima provenit in Sian et Martaban“) v. *Benzoïn officinale* Hayne I 16, 2.
54. Resina Anime (Anime bianche seu blanco et Copal — „Affertur ex America et Nova Hispania“) v. *Hymenaea Courbaril* L. I 16, 4.

55. Lignum Aloes (L. Al. — „Ex India, Comorin et Zeylan“) v. *Aquillaria ovata* bei Willd. I 8, 10.
56. (Lignum Rhodi — Rosenholtz) ev. v. *Convolvulus scoparius* L. I 9, 1.
57. (Lignum Asphaltum vel Asphalatum) ev. v. *Aquilaria Malaccensis* Lam. I 9, 2.
58. (Santalum album — Weisser Sandell) und (Sant. citrinum vel pallidum — Gelber S.) v. *Santalum verum* L. I 9, 3. 4.
59. (Santalum rubrum — Rodter Sandell, ex Malaca, Timor) v. *Pterocarpus Santalinus* bei Willd.
60. Lignum Sassafras (Sassaphras — Fenchell Wurtzell — „Ex Florida, novi orbis provincia“) v. *Sassafras officinale* Nees I 10, 2.
- 61*. L. Guaiaci (Lignum guaiacanum vel guaiacum, lignum sanctum — Franzosen Holtz — „Nascitur in India orientali. Calicut Taprobana etc.“) v. *Guajacum officinale* L. I 10, 4 [I 22].
- 62*. Rhizoma Chinae (Radix Chynae — Boeken Wurtzell — „Nascitur abundantissime in Chinarum regione, in Malabar, Cochin, Cranganor etc.“) v. *Smilax China* L. I 10, 3 [I 22 ohne Deutung].
63. Radix Alcannae (Alcanna — Rothe Blut Wurtzell) v. *Achusa tinctoria* L. I 12, 2.
- 64.o R. Sarsaparillae (Salsaparilla, Smilax peruana — Portugaisch Stechenwind, Salven Paxillen Wurtzell. — „In Gallia Narbonense prope montem Pessulanum et in agro Neapolitano copiosissime crescit“) v. *Smilax sylphitica* Thunb. u. a. I 11, 1.
65. R. Turpethi (Turbethum hispanicum — „In Hispania officine utuntur loco Turbethi veri“) ev. v. *Thapsia Silphium* Viv. I 15, 6.
66. R. Turpethi (Turb. verum — „Plurimum nascitur in Cambayete, Surrate unde in Persiam, Arabiam et Lusitanam exportatur“) v. *Convolvulus Turpethum* L. I 15, 7.
67. Rhizoma Curcumae (C., Crocus Indicus, Cyperus Indicus — Gilbwurtzell — „Nascitur in regione Malauar, Canor, Calicut“) v. *Curcuma longa* L. und *C. viridiflora* Roxb. I 15, 5.
68. Tubera Jalapae (Mechoacanna, Bryonia peruana — Indianisch Gicht oder zaunrüben — „1568 primum reperta supra Mexico, quam deiecit Ferdinandus Cortesius 1524“) v. *Convolvulus Purga* Wend. u. a. I 13, 4.
69. (Behen album — weisser Wiederstoß — „Afferuntur ex Armenia“) v. *Hyperanthura Moringa* L. I 15, 1.

70. (Behen rubeum — Rother Wiederstoß — „Matthiolus Lymonii radicem esse judicat Beh. rub.“ — v. *Statice Limonium* L. I 15, 2.
71. (Costus dulcis — Sües Kosten Wurtzell — Costus amarus — Bitter K. W. — „Nascitur circa Guzurate, Cambaya exinde in Europam devehitur“) v. *Costus speciosissimus* Sm. I 15, 3. 4.
72. Rhizoma Zedoariae (Zedoaria — Zittwer) v. *Curcuma Zedoaria* Roxb. u. a. I 8, 9.
73. Rhiz. Galangae (Galanga minor — Galgant) und (Gal. major seu Acorus verus — Gr. Galgant) ev. v. *Alpinia officinarum* Fl. I 8.
74. Radix Rhei (Rhabarbarum — Rhabarber W. — „Omne Rh. quod in Italiam, Persiam et Europam importatur in Chynarum regione nascitur“) v. *Rheum palmatum* L. u. a. I 12, 3.
75. (Rhabarbarum Monachorum — Mönchs Rhab.) ev. v. *Rumex alpinus* L. oder *R. Patientia* L. I 12, 4.
76. (Rhaponticum commune seu radix Centaurii majoris — Rhapontick W.) und (Rhap. verum — „Ex Alexandria Venetias apportatur. Ab Balbirer Materialista Augustano emi libram pro 12 fl.“) v. *Rheum Rhaponticum* L. I 13, 1.
77. Bulbi Hermodactyli (Hermod. officinarum radices, II. non venenati, II. orientales, Pseudohermodactyli) v. *Colchicum variegatum* L. III 451, 4.

Unbestimmte:

1. (Auricula Leporis, Hasen Oehrle) — nur 1 Blatt III 317, 1.
2. (Panax Herculeum) III 401, 2.
3. (Alsine minima — Kleinst Vogell Krautt) III 369, 5.

Gotha, im November 1901.