

Flechten um Schramberg.

Von Pfr. Goll. (Fortsetzung von Nr. 100).

Im weitem Verlaufe der Zeit wurden entdeckt *Bryopogon bicolor* (Ehrh.) Link ster. im Trombach. *Cladonia silvatica* (L) form. *alpestris* (L) zu Finsterbach; *Parmelia tiliacea* c. fr.; *P. Mugetii* mit wenigen Früchten am Falkenstein; *P. revoluta* Flk. und *sinuosa* Smft. ster. in Thalabhängen an Tannen zwischen Sulzbach und Lauterbach. *Sticta pulmonaria* (L) zeigte sich ster. im Dunninger Walde; *Xanthoria lichenea* (Ach) Th. Fr. Weiler c. fr. auf altem Holze.

3. Krustenflechten.

- Pannaria lanuginosa* (Ach) Körb, ster. Ramsteiner Loch.
 — *brunnea* (Sw) Mass. c. fr. Gaishalde.
Massalongia carnosa (Deks) Körb. c. fr. Falckenstein, Berneck, Eselbach, Rohrbach.
Gasparrinia murorum (Amphiloma Körb) an Mauern c. fr.
Placodium saxicolum (Poll) Körb. c. fr. gemein.
Rinodina exigua (Ach) Th. Fr. c. fr.
 — *atrocinerea* Körb. c. fr.
 — *caesiella* (Flk) Körb. c. fr. an Gestein des alten Schlosses.
Callopusia vitellina Ehrh. c. fr. an Holz und Gestein.
 — *ferrugineum* (Huds) Th. Fr. ebenso.
 — *cerinum* (Ehrh) Körb. c. fr. an Bäumen.
Icmadophila aeruginosa (Scop) Trev. c. fr. an feuchten Waldstellen.
Lecanora sordida (Pers) Th. Fr. c. fr. Laichbach.
 — form. *subcarnea* (Sw) Th. c. fr. Rappenfelsen.
 — *sulphurea* (Hoffm) Ach. Ramstein.
 — — Hardt. c. fr.
 — *intumescens* (Rêbenst) Körb. c. fr. häufig an Tannen.
 — *subfusca* (L) Ach. c. fr. in verschiedenen Formen.
 — *pallida* (Schreb) Körb. c. fr. ebenso.
 — *varia*. (Ehrh) Ach. c. fr.
 — *sarcopis* (Whlbrg) Ach. c. fr. altes Holzwerk.
 — *badia* (Pers) Ach. c. fr. an Gestein.
 — *polytropa* (Ehrh) Th. Fr. c. fr. ebenso.
 — *Hageni* (Ach) Körb. c. fr. an Bäumen.

- Aspicilia gibbosa* (Ach) Körb. an Stein gemein.
 — *cinera* (L) Körb. c. fr. Falkenstein.
Ochrolechia pallescens (L) Körb. c. fr. Hohsteig.
 — *tartarea* (L) Mass. Lauterbachfelsen.
Urceolaria scruposa (L) Ach. c. fr. an Gestein gemein.
 — *broyphila* (Ehrh).
 — form. *albissima* (Ach) *gypsacea* Körb. c. fr. Schlossberg.
Pertusaria rupestris (D.C) Körb. c. fr. Schlossberg.
 — *communis* (D.C) Hohsteig.
 — *corallina* (L) Körb. gemein.
Bacidia rubella (Ehrh) Mass. c. fr. Schlossberg, Aichhalden.
Bilimbia hypnophila (Ach) Th. Fr. c. fr. hin und wieder.
Biatora lucida (Ach) Fr. c. fr. Gaishalde, Schiltachthal.
 — *granulosa* Rabenh. (*decolorans* Fr.) c. fr. Schlossberg, Bauernberg.
 — *viridescens* (Schrader) Fr. c. fr. mehrwärts.
 — *fuliginea* (Ach) Fr. c. fr. Ramsteinerloch.
Baeomyces roseus Pers. c. fr. Steigwald.
Sphyridium byssnoides (L) Th. Fr. c. fr. gemein.
Rhizocarpon geographicum (L) D.C. c. fr. Hardt, Reuthe.
 — form. *atrovirens* Fr. ebenda.
Lecidella enteroleuca Körb. c. fr. überall.
Lecidea lapicida (Ach) Ara. c. fr.
 — *macrocarpa* (D.C) Th. Fr. c. fr. in verschiedenen Formen häufig.
 — *crustulata* (Ach) Körb. häufig.
Opegrapha varia Pers., die bekannten Formen.
Graphis scripta (L) Ach. ebenso.
Arthonia radiata (Pers) ebenso wie jene in verschiedenen Formen.
Coniocybe furfuracea (L) Ach. c. fr. über der Gaishalde an Wurzeln, Eselbach.
Synechoblastus flaccidus (Ach) Körb. c. fr. Schlossberg, Gaishalde, Heubach.
Collema pulposum (Bernh) Ach. c. fr.
Leptogium lacerum (Ach) Fr. Berneck, Gaishalde.
Polychidium muscicolum (Sw) Körb. c. fr. Eselbach, Brandsteig.
Mallotium tomentosum (Hoffm) Körb. ster. Schlossberg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [1893](#)

Autor(en)/Author(s): Goll Pfr.

Artikel/Article: [Flechten um Schramberg 60-61](#)