stitut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenb

Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL) Teil 2: Myrtaceae

UWE BRAUN

Zusammenfassung: Braun, U. 2000: Typusmaterial des Herbarium der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 2: Myrtaceae. Schlechtendalia **5**: 1-10.
In der vorliegenden Arbeit werden Typuskollektionen von Arten der Myrtaceen des Herbarium der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL) aufgelistet. Die meisten Arten wurden von O. Berg, F. von Mueller, R.A. Philippi und D.F.L. von Schlechtendal beschrieben. O. Berg untersuchte das gesamte Myrtaceenmaterial von HAL im Rahmen seiner monographischen Arbeiten für die "Flora brasiliensis" (BERG 1855-1856, 1857-1859). Als Anhang werden "typusartige" Originalkollektionen verzeichnet, die möglicher Weise echte Typen sein könnten. Eine Übersicht der HAL-Typen kann auch über das Internet abgerufen werden (http://www.biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html).

Abstract: Braun, U. 2000: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (HAL). Teil 2: Myrtaceae. Schlechtendalia **5**: 1-10.
Types of species belonging to the Myrtaceae, deposited in the herbarium of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (HAL), are listed in the present paper. Most of the species concerned have been described by O. Berg, F. von Mueller, R.A. Philippi and D.F.L. von Schlechtendal. O. Berg examined all Myrtaceous collections of HAL in connection with his monographic studies for "Flora brasiliensis" (BERG 1855-1856, 1857-1859). In a separate list, "typoid" original collections, which possibly represent genuine types, are enumerated. A survey of the type collections of HAL is also available via internet (http://www. biologie.uni-halle.de/Botany/botany.html).

Mit der vorliegenden Liste der Myrtaceen-Typen wird die Übersicht der in HAL vorhandenen Typus-Kollektionen fortgesetzt (BRAUN 1998). Zwischenzeitlich wurden schon Zusammenstellungen der HAL-Typen der Ranunculaceen (HOFFMANN 1998) und der Brassicaceen (HOFFMANN 2000) veröffentlicht.
Die vorliegende Liste entspricht im Aufbau dem ersten Teil (BRAUN 1998). Die einzelnen Kollektionen werden als "Holo-, Iso- oder Syntypen" gekennzeichnet. Ist der genaue Status nicht klar, wird nur "Typus" vermerkt. Es werden die jeweiligen Namen der Arten, die bibliographischen Daten und die Typen mit HAL-Nummern angegeben. In Einzelfällen folgen Anmerkungen. In einem Anhang werden Originalkollektionen aufgezählt, die möglicherweise Typen darstellen.

Typenliste

Abbevillea schlechtendaliana O. Berg, Linnaea 27: 426 "1854" (1856) nom. nud., in Mart., Fl. Bras. 14(1): 433 (1857); Typus: "Brasilia: prov. Bahia, B. Luschnath,1831-1837", HAL 53120.

Amomis acris (var.) ***obtusata*** O. Berg, Linnaea 27: 419 "1854" (1856); Syntypus: "F.W. Sieber, Fl. Trinitatis, No.102, Insel Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 89779.

nstitut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luth

Amomis pimento (var.) ***surinamensis*** O. Berg, Linnaea 27: 419 "1854" (1856); Typus: "Surinam (in horti cult.)", HAL 49063.

Aulomyrcia alloiota O. Berg, (a. cuneata), in Mart., Fl. Bras. 14(1): 54 (1857); Syntypus: "Brasilia, Martii, Herb. Flor. Brasil., No.1231", HAL 89793.

Aulomyrcia bahiensis O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 113 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837", HAL 89794.

Aulomyrcia blanchetiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 65 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 3391, 1828-1856", HAL 89798.

Aulomyrcia botrys O. Berg, in Mart., Fl. Bras.14(1):116 (1857); Holotypus: "Brasilia, H.W. Buek", HAL 89799.

Aulomyrcia bullata O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 96 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath 110, 1831-1837", HAL 89800.

Aulomyrcia chilensis O. Berg, Linnaea 27: 38 (1855); Typus: "Chile, E.F. Poeppig, No.138 (1652B), 1827-1829", HAL 89690.

Aulomyrcia lancea O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 88 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2786, 1828-1856", HAL 89698.

Aulomyrcia mansoni O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 121 (1857); Syntypus: "Brasilia, Matto Grosso, J. Lhotsky 46, 1830-1832", HAL 89700.

Aulomyrcia ramulosa (DC.) O. Berg (var.) *subcordata* O. Berg, in Mart., Fl. Bras.14(1): 62 (1857); Syntypus: "Brasilia, Rio de Janeiro, Gomes", HAL 89710.

Aulomyrcia rosulans O. Berg, Linnaea 27: 54 (1854); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 3369, 1828-1856", HAL 89777.

Aulomyrcia sphenoides O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 63 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 1825, 1828-1856", HAL 89718.

Aulomyrcia subverticillaris O. Berg (var.) *angustifolia* O. Berg, in Martius (1857); Typus: "Brasilia, Minas Geraes, Martii, Herb. Fl. Brasil, No.1232", HAL 89803.

Aulomyrcia supraaxillaris O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 69 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 3368, 1828-1856, HAL 89804.

Aulomyrcia tenuifolia O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 68 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 2321, 1828-1856, HAL 89806.

Baeckea carnosula Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 149 (1827); (= *B. brevifolia* DC.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 278, Nova Hollandia, F.W. Sieber,VI.-XII.1823", HAL 89662.

Baeckea diffusa Sieber ex DC., Prodr. 3: 230 (1828); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 276, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89661.

Baeckea diosmoides Sieber ex DC., Prodr. 3: 230 (1828); (= *B. crenulata* DC.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.277, Nova Hollandia, F.W. Sieber,VI.-XII.1823", HAL 89660.

Baeckea ericoides Schltdl., Bot. Ztg. 4: 724 (1846); Typus: "Sumatra litus, F. Junghuhn", HAL 072108.

Baeckea fasciculata Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 149 (1827); (= *B. densifolia* Sm.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 279, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89659.

Baeckea microphylla Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 149 (1827); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 282, Nova Hollandia, F.W. Sieber,VI.-XII. 1823", HAL 89658.

Calycothrix behriana Schltdl., Linnaea 20: 650 (1847); Typus: "Australien: Auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, XI.", HAL 48919.

Calycothrix scabra DC. var. ***minor*** Schltdl., Linnaea 20: 650 (1847); Holotypus: "Australien: Im Pine forest-Wald zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr", HAL 48918.

Calyptranthes fastigiata O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 50 (1857); Syntypus: "Brasilia, Rio de Janeiro, Martii, Herb. Fl. Brasil., No.1237", HAL 89620.

Calyptranthes multiflora Poepp. ex O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 42 (1857); Syntypus: "Brasilia, Teffé, prov. Solimoes, E.F. Poeppig 2684, 1831/32", HAL 89621.

Calyptranthes schiedeana O. Berg, Linnaea 27: 28 (1855); Holotypus: "Mexico: Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, VIII. 1829", HAL 89752.

Calyptranthes schlechtendaliana O. Berg, Linnaea 27: 29 (1855); Holotypus: "Mexico: In sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, Nr.25, XII.1828", HAL 89749 (2 Bögen).

Camphomyrtus behrii Schltdl., Linnaea 20: 651 (1847); Holotypus: "Australien: Auf kalkig-sandigem Boden (Sandplaine) bei Bethanien, H. Behr, 10.I.1845, HAL 074924.

Campomanesia suffruticosa O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 448 (1857); Syntypus: "Brazil, Piauhy, Goyaz & C.G. Gardner, 1837-1841", HAL 89778.

Campomanesia synchrona O. Berg, in Mart., Fl. Bras.14(1): 444 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 3367, 1828-1856", HAL 89776.

Eucalyptus acervula Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828); (= *E. eugenioides* Sieber ex Spreng.); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 469, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823, HAL 89683.

Eucalyptus eugenioides Sieber ex Spreng., Syst. Veg. 4(2):193 (1827); Isotypus: "Australia, N.S.W., Nova Hollandia 479, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89681.

Eucalyptus fabrorum Schltdl., Linnaea 20: 656 (1847); (= *E. obliqua* L'Her.); Holotypus: "Südaustralien: Montes Barossae, H. Behr, 1844/45", HAL 89676.

Eucalyptus gracilis Sieber, in Benth., Fl. Austral. 3: 222 (1866), non *E. gracilis* F. Muell.1855, nom. illeg., pro syn. *E. crebra* F. Muell.; Typus: "Fl. Novae Holl. No. 476, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89679.

Eucalyptus granularis Sieber, in Benth., Fl. Austral. 3: 222 (1866), nom. illeg., pro syn. *E. viminalis* Labill.; Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 474, Nova Hollandia, F.W. Sieber,VI.-XII.1823", HAL 89680.

Eucalyptus incrassata Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 2 (1806); Isotypus: "Australia, Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89678.

Eucalyptus incrassata Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828), nom.illeg., non Labill.1806; Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.477, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89653.

Eucalyptus ligustrina DC., Prodr. 3: 219 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 617, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89657.

Eucalyptus micrantha DC., Prodr. 3: 217 (1828); (= *E. racemosa* Cav.); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 497, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89656.

Eucalyptus oblonga DC., Prodr. 3: 217 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.583, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89655.

Eucalyptus obtusiflora DC., Prodr. 3: 220 (1828); (= *E. rigida* Sieber, Fl. Novae Holl. No. 473, non *E. rigida* Hoffsgg.1826); Isotypus: "Fl.Novae Holl. No.473, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII.1823", HAL 89649.

stitut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenb

Eucalyptus odorata Behr in Schltdl., Linnaea 20: 657 (1847); Typus: "Südaustralien, Aldenhoven Estata, H. Behr, März 14", HAL 17754.

Eucalyptus pallens DC., Prodr. 3: 219 (1828); (= *E. obliqua* L'Her.); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.606, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89654.

Eucalyptus pauciflora Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 195 (1827); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.470, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 98677.

Eucalyptus punctata DC., Prodr. 3: 217 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 623, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89652.

Eucalyptus radiata Sieber ex DC., Prodr. 3: 218 (1828); Isotypus:"Fl. Novae Holl. No. 475, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89651.

Eucalyptus rostrata Schltdl., Linnaea 20: 655 (1847), nom. illeg. (non *E. rostrata* Cav.1797); Holotypus: "Südaustralien, Montibus Barossae, H. Behr, März 16", HAL 89675.

Eucalyptus stellulata Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No.478, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89648.

Eucalyptus stricta Sieber ex Spreng., Syst.Veg. 4(2): 195 (1827); Isotypus: "Fl. Novae Holl. No. 472, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89647.

Eucalyptus terminalis Sieber, in Benth., Fl. Austral. 3: 211 (1866), nom. inval., pro syn. *E. paniculata*; Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 468, Nova Hollandia, F.W. Sieber,VI.-XII. 1823", HAL 89674.

Eucalyptus virgata Sieber ex DC., Prodr. 3: 217 (1828); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 476, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89646.

Eugenia amazonica O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 322 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. Solimoes, E.F. Poeppig 2864, 1831/32", HAL 060214.

Eugenia buxifolia Willd. var. *parvifolia* Schltdl., Linnaea 5: 199 (1830); Typi: St.Thomas, C. Ehrenberg, 1826-1828, HAL 064824 und 064825.

Eugenia cassinoides O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 286 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89626.

Eugenia cauliflora O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 268 (1857); Syntypi: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89627, HAL 89628.

Eugenia chrysantha O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 272 (1857); Holotypus: "Brasilia, Matto Grosso, J. Lhotsky 63, 1830-1832", HAL 060213.

Eugenia corralensis Phil., Linnaea 33: 72 (1865); Typus: "Chile, Corral, R.A. Philippi, 1851", HAL 89634.

Eugenia diantha O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 239 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2862, 1828-1853", HAL 060212.

Eugenia dictyophleba O. Berg, in Mart., Fl. Bras.14 (1): 226 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. Bahia, Jacobine, S. Blanchet, 1828-1853", HAL 060211.

Eugenia distoma O. Berg, Linnaea 27: 155 (1856)
(= *Myrtus phlebophylla* Kunze in Poepp., in herb.)
Syntypus: "Pöppig, Coll. pl. Chil. II., 77 (78), Chile: In sylvis ad Talcahuano, E.F. Poeppig 456, 1827-1829", HAL 89616.

Eugenia divaricata O. Berg, Linnaea 27: 257 (1856); (= *Myrtus divaricata* Poepp., in herb.); Syntypus: "Pöppig, Coll. pl. Chil. III., 136, In Chil. austr. praeruptis ad Antuco, E.F. Poeppig 897, 1827-1829", HAL 89612.

stitut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenb

Eugenia ehrenbergii O. Berg, Linnaea 27: 153 (1854); Syntypus: "S. Domingo, C. Ehrenberg, 1828-1831", HAL 064827.

Eugenia floribunda West ex Willd., Sp. Pl. 2: 960 (1799); Typus: "Ins. S. Croix, ex herb. Willdenow", HAL 89630.

Eugenia foetida Pers. var. ***parvifolia*** O. Berg, Linnaea 27: 212 (1856); Syntypus: "S. Domingo, C. Ehrenberg, 1828-1831", HAL 063400.

Eugenia glomerata Spring ex Mart., Flora 20 (Beibl. II): 82 (1837); Typus: "Martii, Herb. Flor. Bras. No.43, Brasilia, Corcovado", HAL 89641.

Eugenia hoffmannseggii O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 315 (1857); a. (var.) *grandifolia*; Syntypus: "Brasilia, F.W. Sieber pro C. de Hoffmannsegg, 1801-1807, ex herb.Willdenow", HAL 079361.

Eugenia laevis O. Berg, Linnaea 27: 177 (1854); Typus: "St. Domingo, C. Ehrenberg", HAL 81699.

Eugenia lancea Poir., Encycl. méth., Suppl. III: 123 (1813); Syntypus: "St. Thomas, C. Ehrenberg, 1826-1828", HAL 063567.

Eugenia lateriflora Willd., Sp. Pl. II: 749 (1799); Typus: "Ins. S. Crucis, ex herb.Willdenow", HAL 89625.

Eugenia lugens O. Berg, Linnaea 27: 299 (1856); Typus: "E.F. Poeppig (No. 136, Myrtacea.)", HAL 89639.

Eugenia macrocarpa Schltdl. et Cham., Linnaea 5: 560 (1830); cf. Schltdl., Linnaea 13: 417 (1839); Syntypi: Mexico, in sylvis prope Jalapam, C.J.W. Schiede, VIII. 1828, HAL 81698 (3 Bögen).

Eugenia maculata O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 297 (1857); Syntypus: "Brasilien, Maynas, E.F. Poeppig 2409, 1831/32", HAL 060210.

Eugenia micropetala Mart., Flora 24 (Beibl. II): 108 (1841); Typi: "Brasilia, Bahia, Ilhenos, B. Luschnath 116, 1831-1837, (Mart., Herb. Fl. Bras. 685), HAL 89748 (2 Bögen), HAL 82957 (2 Bögen).

Eugenia nutans O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14 (1): 299 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 1228(?)", HAL 89783.

Eugenia platyphylla O. Berg, in Mart., Fl. Bras.14(1): 294 (1857); Syntypi: "Brasilien, Bahia, B. Luschnath 115, 1831-1837", HAL 89812 (3 Bögen).

Eugenia reticularis O. Berg, Linnaea 27: 170 (1856); Typus: "S. Domingo, C. Ehrenberg 412, 1828-1831", HAL 063399.

Eugenia rosmarinifolia Poir. a.(var.) ***angustissima*** O. Berg (1857); Syntypi: "S.Domingo, C. Ehrenberg,1828-1831", HAL 063395, HAL 063396, HAL 063397.

Eugenia salicifolia O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 312 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No.1226, Brasilia, Cujuba, HAL 063398.

Eugenia schiedeana Schltdl., Linnaea 13: 418 (1839); Syntypi: "Mexico, prope Jalapam, Aug.; inter Veracruz et Santa Fè, Jul., C.A.W. Schiede", HAL 81700 und 079363.

Eugenia sieberiana DC., Prodr. 3: 277 (1828); Syntypus: "F.W. Sieber, Fl. Triniatis No.222, Trinidad, F.Wrbna, 1822", HAL 063394.

Eugenia tierneyana F. Muell., Fragm. 4: 14 (1863-64); Typus: "Australia, Rockingham Bay, F. v. Mueller", HAL 89632.

Eugenia trichocarpa Phil., Linnaea 28: 688 (1856); Typus: "Chile, Corral, R.A. Philippi, 1851", HAL 89617.

stitut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenb

Eugenia trinitatis DC., Prodr. 3: 280 (1828); (≡ Myrtus dioica Sieber, nom.nud.); Syntypus: "Fl. Trinitatis No. 94, Ins. Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 060209.

Eugenia vernicosa O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 274 (1857); Holotypus: "Brasilia, prov. Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 060208.

Eugenia wilsonii F. Muell., Fragm. 5: 2 (1865-1866); Typus: "Australia, Rockingham Bay, F. v. Mueller", HAL 89631.

Eugeniopsis acutissima O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 144 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 89792.

Eugeniopsis affinis O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 149 (1857); Holotypi: "Brasilia, Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 89747 (2 Bögen).

Eugeniopsis grandifolia O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 149 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, ex herb. H. Kegel, B. Luschnath, 1831-1840", HAL 89619.

Gomidesia blanchetiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 14 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 3415, 1828-1856", HAL 89622.

Gomidesia clauseniana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 23 (1857); Syntypus: "Martii Herb. Flor. Brasil. No.1235, Brasilia, Minas Gerais", HAL 89751.

Gomidesia fenzliana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 20 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Flor. Brasil. No.683, Brasilia, Rio de Janeiro", HAL 89807.

Gomidesia martiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 12 (1857); Syntypus: "Brasilia, Rio de Janeiro, F. Sellow, 1814-1831", HAL 89624.

Jambosa cymifera E. Mey., in Drège, Zwei Pfl. Docum. 194 (1844); Typus: "Südafrika, Port Natal, April", HAL 89637.

Leptospermum eriocalyx Sieber ex Spreng., Syst.Veg. 4(2): 194 (1827); (= *L. parvifolium* Sm.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 313, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89667.

Leptospermum marginatum Labill., Nov. Holl. Pl. 10 (1806); Syntypus: "e Terra van Leuwin, Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89665.

Leptospermum myrsinoides Schltdl., Linnaea 20: 653 (1847); Holotypus: "Südaustralien, zwischen dem Gawler und Lightriver, H. Behr, Nov. 1844/45", HAL 89664.

Leptospermum myrtifolium Sieber ex DC., Prodr. 3: 228 (1828); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.314, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89668.

Leptospermum pendulum Sieber ex DC., Prodr. 3: 228 (1828); (= *L. attenuatum* Sm.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No.312, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89666.

Leptospermum sericeum Labill., Nov. Holl. Pl. II: 9 (1806); Syntypus: "Ins. van Diemen, Labillardiere, ex herb. Willenow", HAL 89669.

Leptospermum squarrosum Sieber, in Spreng., Syst. Veg. 4(2): 194 (1827); (= *L. scoparium* Forst.); Syntypus: "Fl. Novae Holl. No. 311, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89663.

Marlierea strigipes O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 32 (1857); Syntypi: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 686, Brasilia, Bahia, Luschnath 114, 1831-1837, HAL 89743 (2 Bögen).

Melaleuca fascicularis Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 29 (1806); Syntypus: "Australien, e Nova Hollandia (ins. Van Diemen), Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89688.

Melaleuca gibbosa Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 30 (1806), Syntypus: "Australien, e Nova Holl., Labillardiere, ex herb. Willdenow", HAL 89685.

Melaleuca squamea Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 28 (1806), Syntypus: "Australien, e Nova Holl. (ins. Van Diemen), Labillardiere, ex herb.Willdenow", HAL 89684.

Institut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Witten

Metrosideros albida Sieber ex DC., Prodr. 3: 212 (1828), nom. inval., pro syn. *Melaleuca viridiflora*; Typus: "Fl. Novae Holl. No. 319, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89644.

Metrosideros calyculatum Sieber ex DC., Prodr. 3: 223 (1828), nom. inval., pro syn. *Callistemon lineare*; Typus: "Fl. Novae Holl. No. 545, Nova Hollandia, F.W. Sieber, VI.-XII. 1823", HAL 89645.

Metrosideros chrysantha F. Muell., Fragm. 4: 159 (1864), Syntypus: "Australia, Queensland, Rockingham Bay, F. v. Mueller", HAL 89672.

Metrosideros stipularis J.A. Hook., Fl. Antarct. 2: 275 (1846); Isotypus: "Chile, ex herb. Hooker. f.", HAL 89670.

Myrceugenia chilensis O. Berg, Linnaea 27: 132 (1856); Typus: "Pöppig, Coll. pl. Chil. II. 76 (76), Chile: In sylvis ad Talcuhuano, E.F. Poeppig, Apr. 1827-1829", HAL 89618.

Myrcia bergiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 194 (1857); Syntypi: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830, HAL 89795; "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837", HAL 89796.

Myrcia caracasana Klotzsch ex O. Berg, Linnaea 27: 92 (1855); Typus: "Venezuela, Caracas, H. Karsten 4", HAL 89801.

Myrcia chilensis O. Berg, Linnaea 27: 99 (1855); Typus: "Chile, E.F. Poeppig 138, 1652 B, 1827-1829, HAL 89690.

Myrcia cujabensis O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 161 (1857); Syntypi: "Brasilien, Matto Grosso, J. Lhotsky II, No.96, 1830-1832", HAL 89691. "Brasilien, Matto Grosso, J. Lhotsky II, No.2, 1830-1832", HAL 89692.

Myrcia dasyblasta O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 207 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 1230, Cujaba", HAL 89781.

Myrcia detergens Miq., Linnaea 22: 795 (1848); Typus: "Brasilia, Bahia, J.S. Blanchet 3442, 1828-1856", HAL 89636.

Myrcia elongata O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 159 (1857) (var.) *grandifolia* O. Berg; Holotypus: "Brasilia, S. de Org., J. Lhotsky, IX.1830-1832, Fl. Sebast. n. 180", HAL 47302.

Myrcia fascicularis O. Berg, Linnaea 27: 87 (1855); Typi: "Peru, Chile, E.F. Poeppig 141, 1652, 1827-1829", HAL 82956, 2 Bögen.

Myrcia klotzschiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 169 (1857); Syntypus: "Brasilia, F. Sellow, 1831", HAL 89695.

Myrcia lacerdaeana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 193 (1857); Syntypus: "Martii Herb. Fl. Brasil. No. 1234, Brasilia, Bahia", HAL 89696.

Myrcia luschnathiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 194 (1857) Syntypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837", HAL 89623.

Myrcia magnoliaefolia DC. (var.) ***parvifolia*** O. Berg, Linnaea 8: 177 (1833); (≡ *Tetracera laurifolia* apud Willd. in herb. n. 10350); Typus: "Brasilia, Parä, F.W. Sieber, Comte ab Hoffmannsegg servus", HAL 47311.

Myrcia mansoniana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 163 (1857); Syntypus: "Brasilia, Matto Grosso, J. Lhotsky, 1830-1832, HAL 89701.

Myrcia micrantha O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 169 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, F. Sellow, 1814-1831", HAL 89702.

Myrcia opaca O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 177 (1857); Syntypus: "Martii, Herb. Fl. Brasil. No. 1233", HAL 89705.

stitut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenb

Myrcia poeppigiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 157 (1857); Syntypus: "Brasilia, E.F. Poeppig 2577", HAL 89707.

Myrcia reticulata O. Berg, Linnaea 27: 101 (1855); Syntypus: "F.W. Sieber, Herb. Mart. Suppl. Nro.47, Martinique, F. Kohaut, IV. 1819-IX.1821", HAL 47305.

Myrcia rufidula Schltdl., Linnaea 13: 416 (1839); Holotypus: "Mexico, Hacienda de la Laguna, C.J.W. Schiede, VII. 1829", HAL 89813, 3 Bögen.

Myrcia salzmannii O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 207 (1857); Syntypus: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89713.

Myrcia schaueriana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 163 (1857); Syntypus: "Brasilia, F. Sellow, 1827-1830", HAL 89715.

Myrcia sericea O. Berg, Linnaea 27: 114 (1855); Typus: "E.F. Poeppig 143, 1675", HAL 89716.

Myrcia sororica DC., Prodr. 3: 243 (1828); Syntypus: "F.W. Sieber, Fl. Trinitatis. No. 111, Ins. Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 89717.

Myrcia surinamensis Miq., Linnaea 22: 170 (1848); Typus: "Surinam, Bergendaal, H. Focke, 1835-1850", HAL 89635.

Myrciaria disticha O. Berg, ß. (var.) ***bahiensis*** O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 367 (1857); Holotypus: "Brasilia, Bahia, B. Luschnath, 1831-1837, ex herb. H. Kegel", HAL 89629.

Myrciaria splendens O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 371 (1857); (= *Myrtus verticillata* Salzm. in herb.); Syntypi: "Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 89638; "Brasilia, prov. Bahia, in sabulosis aridis, P. Salzmann, 1827-1830", HAL 060207.

Myrciaria trinitatis O. Berg, Linnaea 27: 336 (1856); Holotypus: "F.W. Sieber, Fl. Trinitatis, No. 151, Ins. Trinidad, F. Wrbna, 1822", HAL 060206.

Myrtus blanchetiana O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 418 (1857); Syntypus: "Brasilien, Bahia, J.S. Blanchet, 1828-1856", HAL 89780.

Myrtus buxifolia Swartz, Fl. Ind. Occ. II: 898 (1798); (= *Eugenia buxifolia* (Swartz) Willd.); Syntypus: "Hispaniola, Swartz, n. 9523 (?), ex herb. Willdenow" HAL 063393.

Myrtus (Eugenia?) capuli Schltdl. et Cham.,Linnaea 5: 561 (1830); [≡ *Eugenia capuli* (var.) a. *micrantha* O. Berg, Linnaea 27: 239 (1856)]; Typus: "Mexico, in sylvis Papantlae, C.J.W. Schiede, I. 1829", HAL 079362.

Myrtus krausei Phil., Linnaea 28: 638 (1856); Typi: "Chile, Corral prope Valdivia, R.A. Philippi, 1851", HAL 89746, 2 Bögen.

Myrtus limbosa Ruiz ex O. Berg, Linnaea 27: 295 (1856); Syntypus: "Peru, L.H. Ruiz, ex herb. Berolinensi", HAL 89699.

Myrtus meli Phil., Linnaea 28: 638 (1856); Typus: "Chile, Valdivia, R.A. Philippi, 1851", HAL 89615.

Myrtus microphylla Humb. et Bonpl., Pl. aequinoct. 1: 19, t. 4 (1808); Typus: "ex Amer. Mer., A. v. Humboldt, 1799-1804, ex herb. Willdenow", HAL 89791.

Myrtus repens Phil., Bot. Ztg. 15: 400 (1857); Typus: "Chile, Corral prope Valdivia, R.A. Philippi, 1851", HAL 89643.

Myrtus ruscifolia Willd., Sp.Pl. II: 970 (1799); Typus: "Ind. orient., Klein, ex herb. Willdenow", HAL 89712.

Myrtus trunciflora Schltdl. & Cham., Linnaea 5: 561 (1830); Syntypi: "Mexico, inter Mesachica et Mapilque, Dec. 1828; Papantla, Jan. 1829, C.A.W. Schiede", HAL 81701/ 1+2 (2 Bögen).

Institut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Witten

Myrtus valdiviana Phil., Linnaea 28: 688 (1856); Typus: "Chile, Corral, R.A. Philippi, 1851", HAL 89614.

Phyllocalyx luschnathianus O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 333 (1857); (≡ *Eugenia luschnathiana* Klotzsch, in herb.); Syntypi: "Brasilia, Cruz de Casma, B. Luschnath 112, 25.11.1835", HAL 82955, 2 Bögen.

Psidium persicifolium O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(2): 407 (1857); Syntypus: "Martii Herb. Fl. Brasil. No. 686, Brasilien, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2916, 1828-1856", HAL 89787.

Psidium rhombeum O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 383 (1857); Syntypus: "Brasilien, Bahia, Jacobine, J.S. Blanchet 2815, 1828-1856, HAL 89786.

Stenocalyx lucidus O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 337 (1857); Syntypus: "Brasilia, prov. St. Pauli, F. Sellow, 1814-1831", HAL 064826.

Syzygium elegans Miq. (n.sp.), in Hohenacker, Pl. Indiae or. (Terr. Canara.) 464, in herb.; Syntypus: "Prope Mercara, Febr. m.", HAL 89703.

Originalmaterial (mögliche Typen) / Original material (possible types)

Aulomyrcia caracasana O. Berg, Linnaea 27: 53 (1855)
Caracas (554), HAL 89704.

Aulomyrcia ramulosa (DC.) O. Berg (var.) ***panicularis*** O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 63 (1857)
Brasilia, H. Buek, HAL 89709.

Aulomyrcia ramulosa (DC.) O. Berg, (var.) ***panicularis*** O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 63 (1857)
Brasilia, Franke, HAL 89708.

Callistemon coccineus F. Muell., Fragm. 1: 13 (1858-1859)
Südaustralien, F. v. Mueller, HAL 89673.

Eucalyptus cordata Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 13 (1806)
Labillardiere, ex Herb. Willdenow, HAL 89682.

Eugenia albida Humb. et Bonpl., Pl. aequinoct. 2: 107, t. 113 (1809)
Ex Amer. meridionalis, Humboldt, ex herb. Willdenow, HAL 89640.

Eugenia bracteata Rich., Act. Soc. Hist. Nat. Paris 1: 110 (1792)
Richard, ex herb. Willdenow, HAL 89697.

Eugenia hirsuta Ruiz et Pav., apud López, An. Inst. Bot. A.J. Cavan. 15: 186 (1957) [Fl. peruv. 4: t. 417]
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herbario Lamberti, HAL 89694.

Eugenia kunthiana DC., Prodr. 3: 264 (1828)
Martii, Herb. Fl. Brasil. 1227, HAL 89782.

Eugenia rugosa Ruiz, in herb.
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herbario Lamberti, HAL 89711.

Eugenia strigipes O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 263 (1857)
Ohne Originaletikett! (Brasilia, F. Sellow?), HAL 89750 (2 Bögen).

Kunzea leptospermoides F. Muell., Nederl. Kruidk. Arch. 4: 146 (1859)
Australien, Victoria, F. v. Mueller, HAL 89671.

Melaleuca acuminata F. Muell., Fragm. 1: 15 (1858-1859)
"Austral. felix", F. v. Mueller, HAL 89687.

nstitut für Biologie, Institutsbereich Geobotanik und Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenb

Melaleuca bracteata F. Muell., Fragm. 1: 15 (1858-1859)
New South Wales, F. v. Mueller, HAL 89686.

Myrcia piauhiensis O. Berg, in Mart., Fl. Bras. 14(1): 196 (1857)
Brasilia, G. Gardner 2865, HAL 89706.
Anmerkung: Berg (l.c.) cited "Gardner 2886",

Myricaria splendens O. Berg, nom. nud. (in herb.)
Brasilia, Bahia, in sabulosis aridis, P. Salzmann, 1827-1830, HAL 060207.

Myrtus discolor HBK, Nov. gen. sp. 6: 134 (1823)
(≡ *Eugenia peruviana* Willd, in herb.)
Peru, A. v. Humboldt, ex herb. Willdenow, HAL 89613.

Myrtus tardiflora Salzm., in herb.
(= *Myrcia* sp.), Brasilia, Bahia, P. Salzmann, 1827-1830, HAL 89805.

Psidium emarginatum Ruiz et Pav., apud López, An. Inst. Bot. A.J. Cavan. 15: 191 (1957)
[Fl. Peruv. 4: t. 419]
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herb. Lamberti, HAL 89784.

Psidium lanuginosum Ruiz et Pav., apud López, An. Inst. Bot. A.J. Cavan. 15: 195 (1957)
[Fl. Peruv. 4: t. 421]
Peruvia et Chili, L.H. Ruiz, ex herb. Lamberti, HAL 89790.

Psidium poeppigianum O. Berg (in herb.),
No. 2605, HAL 89785.

Psidium ruizianum O. Berg, Linnaea 27: 365 (1856)
Peruvia, No. 142 (1716), E.F. Poeppig, HAL 89788.

Syzygium tenuifolium F. Muell., in herb.
Australia, Rockingham Bay, F. v. Mueller, HAL 89633.

Thryptomene plicata F. Muell., Fragm. 1: 11 (1858-1859)
"Austral. felix", F. v. Mueller, HAL 89689.

Tristania salicifolia Link ex Steud., Nomencl. Bot., Ed. 2, Vol. 2: 714 (1841), nom. nud. (pro syn.)
Australia, Nova Hollandia, (Fl. Novae Holl. 219, 220), F.W. Sieber, VI.-XII. 1823, HAL 89642.

Literatur:

BERG, O. 1855-1856: Revisio Myrtacearum Americae huc usque cognitorum S. Klotzschii "Flora Americae aequinoctialis" ex hibens Myrtaceas. Linnaea 27: 1-472.

BRAUN, U. 1998: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg (HAL). Teil 1: Pteridophyta und Gymnospermae. Schlechtendalia 1: 15-18.

HOFFMANN, M.H. 1998: Type specimens of the Ranunculaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (HAL). Schlechtendalia 1: 19-22.

HOFFMANN, M.H. 2000: Type specimens of the Brassicaceae in the Herbarium of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg. Schlechtendalia 4: 35-40.

MARTIUS, C.F.P. 1855-1856: Flora brasiliensis 14(1): 1-656, München, Wien, Leipzig.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Uwe Braun, Martin-Luther-Universität, FB Biologie, Institut für Geobotanik und Botanischer Garten, Neuwerk 21, D-06099 Halle/Saale, BR Deutschland
(e-mail: braun@botanik.uni-halle.de)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Schlechtendalia

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: 5

Autor(en)/Author(s): Braun Uwe

Artikel/Article: Typusmaterial des Herbariums der Martin-Luther- Universität Halle-Wittenberg (HAL) Teil 2: Myrtaceae 1-10