Ornithogalum boucheanum ASCHERS. nicht im Rumpenheimer Schloßpark

G. WITTENBERGER, Offenbach a. M.

Entgegen der Angabe in: Der Rumpenheimer Schloßpark. Hess. Flor. Brief **14** (165), 47–48, 1965, kommt *Ornithogalum boucheanum* ASCHERS. (Gartenmilchstern) nicht im Rumpenheimer Schloßpark vor. Dies ergab eine von einander unabhängige Überprüfung von Herrn N. GOTTWALD und mir im Frühjahr 1966. Die Bestimmung ergab eindeutig: *Ornithogalum nutans* L. (Nickender Milchstern).

Gleichzeitig sei es mir gestattet, noch einige Nachträge zur Florenliste des Parkes zu bringen. So erhielt ich von Herrn ROLLFINKE die freundliche Mitteilung, daß *Aesculus octandra* MARSH. (Gelbe Roßkastanie) im Gebiet des Rumpenheimer Parkes wächst. Desgleichen teilte mir Herr N. GOTTWALD den Wuchs von *Quercus robur* var. *fastigiata* DC. (Säuleneiche) mit. Außerdem sind noch folgende Pflanzenarten nachzutragen:

Corydalis cava (L.) SCHW. et K. (Hohler Lerchensporn), *Pinus strobus* L. (Weymouthskiefer), *Dactylis polygama* HORVÁTOVSZKY (Waldknäuelgras), *Allium oleraceum* L. (Gemüselauch), *Clematis vitalba* L. (Weiße Waldrebe), *Ribes alpinum* L. (Alpen-Johannisbeere), *Amelanchier canadensis* (L.) TORREY et GRAY (Kanadische Felsenbirne), *Viola odorata* L. (Märzveilchen), *Adoxa moschatellina* L. (Gemeines Moschuskraut).

*

Zur vorstehenden und der früheren Mitteilung über die Pflanzen des Rumpenheimer Parkes teilen W. LUDWIG und I. LENSKI (Marburg) folgendes mit:

Bereits 1965 haben wir *Ornithogalum nutans* zahlreich festgestellt. Daneben fand sich – selten – der Bastard O. *boucheanum* x *nutans*, der auch an anderen Stellen in Hessen vorkommt; darüber wollen wir später ausführlicher berichten. Die Parkflorula ist übrigens reicher, als aus den Listen hervorgeht. Bei kurzen Besuchen (21. 4. 1965, 27. 4. und 10. 8. 1966) notierten wir unter anderem noch folgende Arten: *Ornithogalum umbellatum, Brachypodium silvaticum, Evonymus europaeus* und *E. latifolius*.

Anhangsweise sei erwähnt, daß wir am 21. 4. 1965 und am 27. 4. 1966 im Darmstädter Herrngarten nur *Ornithogalum boucheanum* haben finden können – kein O. *nutans*, das TRENTEPOHL (Hess. Flor. Briefe **13** [152], 33-34, 1964) und ältere Floristen von dort angeben.

Zwei Kalkberge bei Fulda

F. GRÄSER, Fulda

Die beiden ersten Haltestellen an der Bahnlinie von Fulda nach Gießen, die den Vogelsberg nördlich in einem großen Bogen umgeht, sind Oberbimbach und Großenlüder. Nur durch den schmalen Erbach ist Unterbimbach von dem zuerst genannten Ort getrennt. Wenige Schritte vom Ort und vom Dorf entfernt erhebt sich der zweiköpfige, rund 270 Meter hohe Heideküppel. 376 Meter hoch ist der sich westlich von Großenlüder weit hinziehende Lan-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hessische Floristische Briefe

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: Ornithogalum boucheanum ASCHERS, nicht im Rumpenheimer Schloßpark 46