

Hessische Floristische Briefe

Verlag und Schriftleitung: Institut für Naturschutz der Hessischen Landesstelle für Naturschutz und Landschaftspflege
Darmstadt

Schriftleitungs-Ausschuß: Dr. H. Ackermann, O. Burck, Dr. W. Ludwig, B. Malende, A. Nieschalk, A. Seibig

Jahrgang 14 Brief 168 Seiten 59-62 Darmstadt 1965

Zum Vorkommen von Kreuz-Enzian (*Gentiana cruciata* L.)

im Kreise Wetzlar

K. POHL, Wetzlar

Durch Herrn Studienrat ULM darauf aufmerksam gemacht, besuchte ich gemeinsam mit Herrn Dr. G. EBERLE im Juli 1965 den uns schon durch *Gentiana ciliata* bekannten Standort bei Hermannstein, Kr. Wetzlar, wo wir ca. 20 stattliche Exemplare von *Gentiana cruciata* L. fanden. Nicht auffällig, aber doch sehr hübsch anzusehen sind die kobaltblauen, quirlig angeordneten Blüten, die in den Achseln der dunkelgrünen, glänzenden Blätter stehen.

Der zwischen Hermannstein und Blasbach sich lang hinziehende, aus kalkhaltiger Erde bestehende Berghang, an dem der Kreuzenzian noch ungestört gedeiht, gibt u. a. noch folgenden Pflanzen üppiges Wachstum. Am Tage unseres Besuches begannen zu blühen:

Dürrwurz (*Jnula conyza* DC.)
Eberwurz (*Carlina vulgaris* L.)
Stengellose Kratzdistel (*Cirsium acaule* [L.] SCOP.)
Raukenblättriges Greiskraut (*Senecio erucifolius* L.)
Odermennig (*Agrimonia eupatoria* L.)

in voller Blüte standen:

Hauhechel (*Ononis repens* L.)
Ackerglockenblume (*Campanula rapunculoides* L.)
Rundblättrige Glockenblume (*Campanula rotundifolia* L.)
Knäuelglockenblume (*Campanula glomerata* L.)
Nesselblättrige Glockenblume (*Campanula trachelium* L.)
Färberginster (*Genista tinctoria* L.)
Echtes Labkraut (*Galium verum* L.)
Große Braunelle (*Prunella grandiflora* [L.] SCHOLL)
Thymian (*Thymus serpyllum* L.)
Skabiosen-Flockenblume (*Centaurea scabiosa* L.)



Gentiana cruciata

Hermannstein bei Wetzlar

Juli 1965

Foto: E. Pohl

Wundklee (*Anthyllis vulneraria* L.)
Mehlige Königskerze (*Verbascum lychnitis* L.)
Wilde Platterbse (*Lathyrus silvestris* L.)
Sichelmöhre (*Falcaria vulgaris* BERNH.)
Steinquendel (*Calamintha acinos* [L.] CLAIRV.)
Traubengamander (*Teucrium botrys* L.)

bereits verblüht waren:

Wiesensalbei (*Salvia pratensis* L.)
Fiederzwenke (*Brachypodium pinnatum* [.] P. B.)
Rauhhaariges Veilchen (*Viola hirta* L.)
Weinrose (*Rosa rubiginosa* L.)

Jetzt, im September 1965, blüht zahlreich der Gefranste Enzian (*Gentiana ciliata* L.).

Zur Pteridophyten-Flora im unteren Lahntal und im Taunus

HEINZ und HILDEGARD KALHEBER, Kerkerbach

Im folgenden teilen wir einige Beobachtungen mit, die das Neue Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen, Teil 1 (Jahrbücher nass. Ver. Naturkunde **96**, S. 6–45, Wiesbaden 1962) ergänzen.

Equisetum telmateia EHRH. kommt noch zwischen Lorsbach und Hofheim an einem Graben vor.

Matteuccia struthiopteris (L.) TODARO ist bei Heckholzhausen an dem alten Tagebau angepflanzt worden; es geschah etwa 1925.

Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM. Eine Pflanze dieser Art wächst auf einer Halde, die beim Bau des Kerkersbacher Tunnels in dem Runkeler Waldstück „Laach“ aufgeschüttet wurde.

Asplenium adiantum-nigrum L. Die Art wächst auch im Kerkerbachtal bei Kerkerbach, Schadeck und Hofen.

Asplenium x heufleri REICHARDT. Dieser seltene Farnbastard wurde von uns in je einem Exemplar bei Runkel und an der Grenze des Gebietes bei Diez festgestellt.

Ceterach officinarum LAM. et DC. Ein Vorkommen dieser Art ist bei Steeden noch vorhanden, das größere an der Höhle Wildscheuer ist vor etwa zehn Jahren der Kalkindustrie zum Opfer gefallen.

Thelypteris robertiana (HOFFM.) SLOSSON. Das Weilburger Vorkommen an den alten Wasserbehältern ist noch vorhanden. Es ist das schönste, das wir kennen. Bis 1961 wuchs ein Exemplar der Art an der Schultreppe in Gaudernbach (Oberlahnkreis), es verschwand bei Ausbesserungsarbeiten.

Polystichum lobatum (HUDS.) CHEVALL. Bei Runkel in der „Laach“ ist ein schönes Vorkommen mit ca. 50 bis 60 Pflanzen. Bei Gräveneck wachsen einige Pflanzen in einer Schlucht, die zur Lahn führt. Ein kleines Vorkommen ist auch noch im Goldenen Grund bei Oberbrechen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Pohl Karl

Artikel/Article: [Zum Vorkommen von Kreuz-Enzian \(*Gentiana cruciata* L.\) im Kreise Wetzlar 59-61](#)