

<i>Senecio aquaticus</i> (Wasser-Greiskraut) wie vor.	+ . 1
<i>Senecio erucifolius</i> (raukenblättriges Greiskraut) einzeln- ne Stücke im Moorteil östlich des Eschenloh	+ . 1
<i>Centaurea iacea</i> (gemeine Flockenblume) in den angrenzen- den Trockenwiesen	2 . 3
<i>Centaurea scabiosa</i> (Skabiosen-Flockenblume) in der Heide	+ . 1
<i>Carduus defloratus</i> (Bergdistel) in der Heide häufig	+ . 1
<i>Cirsium rivulare</i> (Bach-Kratzdistel) in den feuchten Eschenlohwiesen	1 . 1
<i>Cirsium tuberosum</i> (knollige Kratzdistel) in der Heide	+ . 1
<i>Leontodon incanus</i> (grauer Löwenzahn) in der Heide reichl.	2 . 2
<i>Leontodon hispidus</i> (steifhaariger Löwenzahn) im SW Eschen- lohs in Wiesen nahe des Waldteils	+ . 1
<i>Hieracium pilosella</i> (kleines Habichtskraut) in der Heide reichlich	2 . 2
<i>Hieracium laevigatum</i> (glattes Habichtskraut) am Waldrund, selten.	+ . 1

69. Das "Wiedergeltlinger Wäldchen"

von Eduard Schuster, Buchloe

Etwa 2 km südöstlich des Dorfes Wiedergeltlingen bei Buchloe auf der Niederterrasse liegt eine kleine Waldinsel. Auf diesem Waldstück stehen derzeit neben den Bodenpflanzen Fichten und Föhren mit viel Jungholz und Strauchern. Es liegt links der Bundesstraße 18 und der Bahnlinie Buchloe - Memmingen innerhalb der Wiedergeltlinger Flur. Die Unterlage des Bodens besteht aus lokaler Eiszeitschotter, welchem Süßwasserkalk und Alm aufliegen - trockene Heide.

In den ersten Jahren nach 1900 gedieh hier reichlich Wacholder, dessen Büsche aber immer mehr dezimiert wurden durch Herausschneiden zum Räuchern des Fleisches. Bei manchen Besuchen des Wäldchens in den Jahren 1938 - 1948 habe ich folgende Pflanzen gefunden:

Pinus silvestris (Kiefer)

Picea abies (Fichte)

Brachypodium pinnatum (Fiederzwenke) vorherrschend

Melica nutans (nickendes Perlgras) stellenweise reichlich

Molinia coerulea (Pfeifengras) stellenweise reichlich

Koeleria pyramidata (Schillergras)
Sesleria coerulea (blaues Kopfgras) zerstreut
Carex ornithopoda (Vogelfußsegge)
Carex humilis (Erdsegge) Bresinsky!
Tofieldia calyculata (Simsenlilie)
Anthericum ramosum (ästige Graslilie) häufig
Allium suaveolens (wohlriechender Lauch) häufig
Gymnadenia conopea (Händelwurz)
Epipactis palustris (gemeine Sumpfwurz) stellenweise häufig
Listera ovata (Zweiblatt) zerstreut
Ophrys insectifera (Fliegenragwurz)
Polygonum viviparum (lebendgebärender Knöterich)
Biscutella laevigata (Brillenschötchen) einzeln, auch im angren-
 zenden Schutzstreifen der Bahnlinie Buchloe - Memmingen
Parnassia palustris (Sumpf.Herzblatt)
Anthyllis vulneraria (Wundklee) Bresinsky!
Lotus siliculosus (Spargelloohne) zerstreut und einzeln
Hippocrepis comosa (Hufeisenklee)
Chamaebuxus alpestris (buchsblättrige Kreuzblume) auf einigen
 Stellen im Wäldchen, zerstreut
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch) zerstreut
Euphorbia verrucosa (warzige Wolfsmilch) zerstreut
Rhamnus frangula (Faulbaum) zerstreut
Daphne mezereum (Seidelbast)
Peucedanum cervaria (Hirschwurz) an der nördlichen Grenze
Silau pratensis (Silau) am westlichen Waldrand
Primula farinosa (Mehlprimel) Bresinsky!
Ligustrum vulgare (Rainweide)
Gentiana verna (Frühlings-Enzian)
Gentiana acaulis ssp. *clusii* (stengelloser Enzian) im Gebiet ein-
 zeln Stücke, doch reichlich vorhanden langs des von der Bun-
 desstraße zum Wäldchen führenden ausgetrockneten Bäckleins
Teucrium montanum (Berg-Gamander) zerstreut auf lichten, gras-
 freien Stellen
Pinguicula vulgaris (blaublühendes Fettkraut) zerstreut an gras-
 freien Stellen
Globularia aphyllantes (gemeine Kugelblume) einige Stücke
Galium pumilum (Heide-Labkraut)
Galium boreale (nordisches Labkraut)
Brunella vulgaris (kleine Brunelle)
Lonicera xylostium (Heckenkirsche)
Viburnum lantana (wolliger Schneeball) Bresinsky!
Eupatorium cannabinum (Wasserröhrl.) einzelne Horste
Senecio erucifolius (raukenblättriges Greiskraut) auf angrenzen-
 den Wiesen

Buphthalmum salicifolium (Rindsauge)

Bellidiastrum michelii (Alpen-Maßliebchen) zerstreut, einige Stücke

Carlina acaulis (Wetterdistel) Bresinsky!


Carduus defloratus (Bergdistel) vereinzelt

Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart) auf den angrenzenden
Wiesen häufig

Scorzonera humilis (niedrige Schwarzwurz) in den Schutzgraben an
der nördlich vorbeiführenden Bahnlinie Buchloe - Memmingen

Im Gebiet des Wäldchens nahm schon 1948 an lichten Stellen der
Graswuchs stark zu und unterdrückte so die anderen Bodenpflanzen.

Die mit Bresinsky! gezeichneten Funde wurden von Dr. A. Bresinsky, München, beigetragen.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg](#)

Jahr/Year: 1961

Band/Volume: [012_1961](#)

Autor(en)/Author(s): Schuster Eduard

Artikel/Article: [Das "Wiedergeltinger Wäldchen". 8-10](#)