©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

Trachten (z. B. Pelzhaubentracht des Huosigaues, B. Schweizer 1928, Bayerische Kopftuchtracht [eigene Beobachtung]).

Literatur:

Bertsch, K.: Geschichte des Deutschen Waldes, Jena 1940.

Fischer, H.: Die Lebensgemeinschaft des Donauriedes bei Mertingen, in: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, Heft 1, Augsburg 1936.

Fischer, H.: Die erste tiergeographische Karte für das schwäbische Alpenvorland, in: Schwabenland, 3. Jahrg., Heft 8, Augsburg 1939.

Fischer, H.: Hypochra albipennis und Aeolopus tergestinus ponticus Karny, neu für Deutschland, in: Mitt. der D. Ent. Ges., Jg. 10, Nr. 7/8, Berlin 1941.

Fischer, H.: Die schwäbischen Tetrix-Arten, in: Bericht der Naturforschenden Gesellschaft, Bd. 1, Augsburg 1948.

Gams, H.: Verbreitung der Buche und Waldföhre in Tirol und Vorarlberg 1931/32, aus Meusel 1943.

Hoferer, R.: Die Hauslandschaften Bayerns, in: Bayer.-Südostdeutsche Hefte für Volkskunde, 15. Jg., Heft 1, München 1942.

Stepp, R.: Kulturgeographische Wandlungen auf der Iller-Lech-Platte, Berliner Geographische Arbeiten, Heft 16, Stuttgart 1937.

Troll, C.: Jungglaziale Schotterfluren im Umkreis der Deutschen Alpen. Forsch. zur Deutschen Landes- und Volkskunde, Stuttgart 1926.

Troll, W.: Die natürlichen Wälder im Gebiet des Isarvorlandgletschers. Mitt. der Geogr. Ges. München 1926.

Zehn neue Libellen für Schwaben

Von Heinz Fischer, Augsburg

A. May nennt 1860 (13. Ber. d. Naturhist. Ver. Augsburg) für die Umgebung von Dillingen an der Donau 29 Arten. A. Wiedemann fügt 1894 (31. Ber. d. Naturwiss. Ver. f. Schw. u. Nbg.) weitere 21 Arten hinzu und bringt damit die Zahl der in Schwaben festgestellten Arten auf 50. Er bestätigt 28

©Naturforsch. Ges. Augsburg; download unter www.biologiezentrum.at

der von May aufgeführten Arten, nur L. virens hat er nicht angetroffen.

1936 konnte ich zwei neue Arten melden (H. Fischer, die Lebensgemeinschaft des Donauriedes bei Mertingen).

Seitdem sind folgende Neufunde hinzugekommen:

Nr. 53: Leucorrhinia dubia, 1 ♀ leg. J. Munk, Oberstaufen, 1893; 1 ♀ leg. H. Fischer, Kematsriedmoos Oberjoch, 17. 6. 36.

Nr. 54: Leucorrhinia albifrons, 6 ♂, 1 ♀ leg. A. Laubmann, Kaufbeuren-Wertach, 11. 8. 24.

Nr. 55: Agrion mercuriale, 1 ♂, 1 ♀ leg. H. Fischer, Mindel nördl. Mindelheim, 11. 6. 35.

Nr. 56: Sympecma paedisca, 1 Stück, leg. H. Fischer, Seilachmoos bei Sulzschneid, 7. 9. 37; 16 Stück leg. H. Fischer, Korbsee, 13. 6. 43.

Nr. 57: Anax parthenope, 1 ♂ leg. W. Hösl, Kiesiger Weiher bei Wörishofen, 20. 7. 43.

Nr. 58: Nehalennia speciosa, 1 ♀ leg. H. Fischer, Elbsee, 12. 5. 46.

Nr. 59: Cordulegaster bidentatus, 1 ♀ leg. K. Grillmeier, Burgwalden, 2. 7. 46; 1 ♂ leg. H. Fischer, Illasberg, 23. 7. 46.

Nr. 60: Epitheca bimaculata, 1 Exuvie leg. B. Hagen, Elbsee, 18. 5. 47.

Nr. 61: Agrion ornatum, 25 Stück leg. Gg. Frey, Donauried bei Mertingen, 28. 6. 47.

Nr. 62: Somatochlora alpestris, 1 ♂ leg. H. Fischer, südöstl. der Mindelheimerhütte/Allgäu 1970 m, 4. 7. 47.

Ein weiterer Neufund im benachbarten Oberbayern ist Somatochlora arctica, 1 ♀ leg. H. Fischer, Wiesfilz, 26. 7. 42; 1 ♂ leg. H. Fischer, Wiesfilz, 27. 7. 46.

Besonders hervorzuheben sind zwei Funde von Leucorrhinia rubicunda: 1 ♀ Galler Filz leg. H. Fischer, 24. 6. 37; 1 ♂ Korbsee, leg. H. Fischer, 13. 6. 43.

Diese beiden Stücke wuden am 16. 10. 49 von E. Schmidt, Bonn, nachgeprüft und bestätigt, womit das von A. Wiedemann (1894, S. 68/69) erwähnte Vorkommen im Alpenvorland erneut belegt ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg

Jahr/Year: 1950

Band/Volume: 003_1950

Autor(en)/Author(s): Fischer Heinz

Artikel/Article: Zehn neue Libellen für Schwaben. 95-96