DIE SPINNER UND SCHWÄRMER DES BAMBERGER UMLANDES

von Bernhard STÖCKERT, Memmelsdorf

unter Mitarbeit von Herrn Dr. E. GARTHE, Bamberg, G. DERRA, Bamberg - W. PILOTEK, Gaustadt - R. WEIDNER, Drosendorf - A. RICHTER, Ebern - K.H. MÜLLER-KÖLLGES, Zeil - H. SEIDLEIN, Schweinfurt - und des Coburger Teams (HÖPFNER, BAUER, OTT, GICK)

Im Anschluß an die vorhergehende Veröffentlichung der Micro, Spanner und Eulen/1 berichte ich über die Spinner und Schwärmer des Bamberger Umlandes.
Im Gegensatz zu den großen, morphologisch weitgehend einheitlichen Familien der Spinner und Eulen, handelt es sich bei dieser Gruppe wie bei den Micros um ein Conglumerat verschiedenster, nicht miteinander verwandter Familien. Aus rein pratischen Gründen, aber ohne Berücksichtigung genetischer Zusammenhänge, stehen sie unter dem allgemeinen Begriff: Spinner, Schwärmer usw.

Nähere morphologische Untersuchungen in neuerer Zeit haben zu einigen Änderungen geführt/2. Die Gattung Diloba z.B., die bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu den Eulen gehörte, reiht man heute als eigene Familie bei den Spinnern ein.
Dieser Arbeit liegt die Nomenklatur und fortlaufende Nummerierung des Buches von Manfred Koch "Wir bestimmen Schmetterlinge" Band II/3 zugrunde.
Es werden alle Arten angegeben, ohne Rücksicht auf ihr Vorkommen im Gebiet. Um auch neuere Nomenklatur zu berücksichtigen, werden die entsprechenden Angaben von Forster

und Wohlfahrt/4 übernommen.
Alle Fänge und Beobachtungen (Wenn nicht anders vermerkt) stammen aus den Jahren 1950 - 1978.

Schon um 1861 wurde eine Bearbeitung der Spinner und Schwärmer des Bamberger Umlandes von Dr. FUNK vorgenommen.
Um 1960 hat WITTSTADT eine recht ausführliche Arbeit über die Schmetterlinge des Regnitztales geschrieben/5.
Die Angaben dieser beiden Sammler über seltene Falter werden unter (F) bzw. (W) übernommen.
Herr Dr. E. GARTHE veröffentlichte 1958 und 1964 "Die Nachtfalter an den Straßenbeleuchtungen des Bamberger Berggebietes" (6).
Herr STRASSBURGER schrieb über das Vorkommen des Totenkopfes und Windenschwärmers (7).
Die Abgrenzung des Gebietes erfolgt wie bei den vorhergehenden Arbeiten im Umkreis von 25 km (einzelne Angaben ausgenommen).
Da mit den Coburger Sammlern ein enges Arbeitsverhältnis besteht, und dort unseres Wissens noch keine Bearbeitung vorliegt, habe ich dieses Gebiet mit hereingenommen.
Ich werde diese Funde besonders kennzeichnen (Co).
Die Angaben von Herrn SEIDLEIN H. stammen aus der Umgebung von Schweinfurt und werden mit (S) versehen.
Der folgende Bericht wurde nur durch die gute Zusammenarbeit aller Sammelfreunde erreicht, die ihre Ergebnisse zur Verfügung stellten. Ich möchte hiermit allen danken, besonders Herrn Dr. GARTHE, der immer aufopfernd zur Seite stand.

Spezieller Teil

Zygaenidae, Blutströpfchen, Widderchen
kleine plumpe, am Tage fliegende Falter.
Sie sind auffallend widerstansfähig gegen Zyankali.

Nr.1 Aglope infausta
(369)
Südliche Art, im Gebiet noch nicht gefunden.

2 Procris pruni
(371 Rhagades pruni)
Bisher nur wenig nachgewiesen
Memmelsdorf, Burglesau (St), Oberhaid (De)
Vereinzelt (F)
Ebern (Ri)
Tambach, Weißbachgrund (Co/Eckerlein)

3 Procris globulariae
(375 Jordanita globulariae)
Verbreitet, hauptsächlich im Jura
Ludwag, Burglesau, Stübig (St, De)
Kreunzberg, Daschendorf, Drügendorf, Veilbronn (Ga)
Im Coburger Gebiet noch nicht nachgewiesen
Häufig bei Münnerstadt (S)

4 Procris statices
(378)
Verbreitet in Memmelsdorf, Strullendorf, Reckendorf,
Kreuzberg, Börstig (St), Drosendorf, Ludwag (We)
Pettstadt, Stackendorf (De)
Nördliche Haßberge (S)

Tambach, Fischbach (Co/Hö)

Nr.5 Procris geryon Hb.
(381)
Verbreitet, Kreuzberg, Ludwag, Burglesau (St)
Hallstadt, Oberhaid, Hohe Metze, Tiefenellern (Ga)

5a Procris notata
(376 Roccia Notata)
Vereinzelt Memmelsdorf, Ludwag (St)
Dörrnwasserlos, Pünzendorf (St, De)

5b Procris chloros
(375 Jordanita chloros)

5c Procris subsolana
(372 Lucasia subsolana)
1 ♂ 26.6.70 Dornig/Staffelstein (Ga)

6 Zygaena purpuralis Brünn.
(382 Mesembrynos purpuralis)
Verbreitet, Ludwag (St, De, We), Würgau, Pausdorf, Kreuzberg, Drügendorf (Ga), Stübig, Burglesau (St), Roßdach (We)
N Pünzendorf, Pettstadt (De)
Nördliche Haßberge, Hambach (S)
Tambach, Oberlauter (Co/Hö)

7 Zygaena diaphana ssp. Pimpinellae Guhn.
(393 Mesembrynos saraptensis Krul.)
Vereinzelt Burglesau (St.), Kreuzberg (Ga). Stübig (De), Johannishof (Ga. De.)
Zur Bestimmung wurden Genitalpräparate angefertigt.

8 Zygaena scabiosae Schev.
(386 Silvicola scabiosae)
Selten Bamberg-Bruderwald, Kreuzberg (Ga)

Selten Bruderwald u. Geißberge (F)
Zell/Schwf. (S)

Nr. 9 Zygaena cynarae Esp.
(389 Peucedanophile cynarae)

10 Zygaena achilleae Esp.
(390 Lictoria achilleae)
Verbreitet Kreuzberg, Memmelsdorf, Burglesau (St)
Pünzendorf, Pettstadt, Ludwag (De), Würgau, Drügendorf (Ga), Häufig auf Bergwiesen des Juras (F)
Stettfeld (S)
Oberlauter (Co/Hö)

11 Zygaena fausta L
(393 Agrumenia fausta)
Im Gebiet nicht festgestellt

12 Zygaena carniolica Scop. ssp. modesta
(Agrumenia carniolica 394)
Verbreitet Burglesau, Stübig, Ludwag (St)
Poxdorf, Roßdach, Kreuzberg, Drügendorf (Ga)
Münnerstadt (S)

13 Zygaena meliloti Esp.
(395 Thermophila meliloti)
Verbreitet Burglesau, Ludwag, Kreuzberg (St)
Hohe Metze, Poxdorf, Drügendorf (Ga), Bbg/Altenburg (De)
Staffelferg, Stadelhofen (We)
Schwebheim, Ebelsbach, Stettfeld (S)
Tambach, Oberlauter (Co/Hö)

14 Zygaena filipendulae L.
(396)

Verbreitet und Stellenweise häufig
Memmelsdorf, Herrnsdorf, Kreuzberg, Ludwag, Burglesau (St)
Poxdorf, Drügendorf, Viereth (Ga)
Münnerstadt (S)
Tambach, Oberlauter (Co/Hö)

Nr.15 Zygaena trifolii Esp.
(397) Huebneriana trifolii)
Überall vereinzelt, Wiesen am Bruderwald, Dankenfeld (Ga)
Häufig in feuchten Wiesen (F.)
Hochröhn (S)
Roßdach, Lauter (Co/Ba)

16 Zygaena lonicerae Schev.
(398 Huebneriana L.)
Verbreitet, Memmelsdorf, Burglesau, Kreuzberg (St)
Hohe Metze, Poxdorf, Drügendorf, Bbg./Bruderwald (Ga)
Pünzendorf, Kobelsdorf (De) Staffelberg (We)
m Zell/Schwf. (S)

17 Zygaena transalpina Esp.
(399 Polymorpha transalpina)
Münnerstadt (S)

18 Zygaena elegans Bgff.
(401 Polymorpha - elegans)

19 Zygaena angelicae O.
(400 Polymorpha angelicae)
Vereinzelt, Poxdorf, Tiefenellern, Drügendorf (Ga)
Pünzendorf (De), Voitmannsdorf (We)
Münnerstadt (S)
19 angelicae ssp. ratisbonensis Bgff.
a Roßdach, Pottenstein, Tiefenellern, Dörrnwasserlos,
Poxdorf, Teuchatz (Ga).

Nr. 20 Zygaena ephialtes L.
(Polymorpha ephialtes 402)
Vereinzelt, Oberhaid, Kreuzberg, Pettstadt, Streitberg (Ga), Tiefenellern, Burglesau (St) Börstig (De)
28.7.78 sehr häufig Hangerberg/Oberhaid (Ga)
Münnerstadt (S)

Syntomidae
Kleine am Tage fliegende Falter mit langen Fühlern, großen Vorder- und stark verkleinerte Hinterflügeln.

21 Syntomis Phegea L.
(312 Amata phegea)
Fehlt in unseren Gebieten

22 Dysauxes ancilla
(314)
Selten, Stettfeld (De) Ebelsbach (Ga)
Zeil (M-K)

Arctiidae: Aufteilung in 2 Gruppen:

1. Kleinbären und Flechtenbären 23 - 49
2. Bären 50 - 71

23 Nola cuculatella L.
(234)
1 Ex. Rödeltal (Co/G)
Pettstadt, Börstig, Johannishof (Ga, De) Würgau (St)

24 Roeselia togatulalis Hb.
(235)

25 Roeselia albula Schiff.
(236)

Nr. 26 Roeselia strigula Schiff.
(237)
Stettfeld, Stübig (De), Johannishof, Daschendorf (Ga)
Brudelwald, Hauptsmoor (F.)
Zell/Schwf. (S)

27 Celama cicatricalis
(238)

28 Celama confusalis Hs.
(239)
Johannishof (De, Ga), Burglesau (St), Memmelsdorf (We)
Strullendorf, Ludwag, Daschendorf, Veilbronn (Ga)
Zell (S)
Zeil (M-K)

29 Celama œntonalis Hb.
(240)
Hesselberg (Ga. De)

30 Nudaria mundana L.
(263)
An Mauern in Miersberg (Weissenfeld) (F.)

31 Comacla senex Hb.
(317)
Börstig (St, Ga, De), Hohengüßbach (De), Hesselberg,
Breitengüßbach (Ga)

32 Miltochrista miniata Forst.
(266)
Lokal bei Johannishof, Pettstadt (St, Ga, De)
Kreuzberg, Daschendorf, (Ga, De), Stübig, Hohengüß-
bach (De)
Nicht selten im Bruderwald (F.)

Häufig bei Zell (S)

Nr.33 Paidia murina Hb.
(264)

34 Philea irrorella Cl.
(318)
Verbreitet bis häufig, Burglesau (St.), Ludwag (We)
Johannishof, Kreuzberg, Daschendorf, Börstig (Ga, De)
Zeil (M-K), Schwebheim, Zell (S)
Oberlauter (Co/Hö), Fischbach, Ketschenbach (Co/Do)

35 Cybosia mesomella L.
(265)
Verbreitet bis häufig in Memmelsdorf, Johannishof,
Kreuzberg, Ludwag, Daschendorf, Börstig (Ga, De, St)
Zeil (M-K), Schwebheim, Zell (S)
Oberlauter, Fischbach, Ketschenbach (Co/Hö, Do)

36 Endrosa roscida Schiff.
(320)
Häufig in Münnerstadt (S)

37 Endrosa kuhlweini Hb.
(321)

38 Oeonistis quadra L.
(267) Lithosia quadra L.
vereinzelt Stübig (St, De)
Bamberg-Kaulberg, Börstig, Daschendorf, Johannishof (Ga)
Oberlauter (Co/Hö) Callenberg (Co/Ba)
Zell/Schweinfurt (S)

39 Lithosia deplana Esp.
(268) Eilema depressa Esp.)

Verbreitet Herrnsdorf, Pünzendorf, Würgau, Memmelsdorf, Stübig (St.
Johannishof (P, Ga, De)
Daschendorf (Ga, De)
Börstig (Ga) Schammelsdorf, Kobelsberg (De)
Zell/Schweinfurt (S)

Nr.40 Lithosia griseola Hb.
(275) Eilema griseola Hb.
Ganz selten (F)
2 ♂ Schwebheim (S)

41 Lithosia lurideola Zink.
(273) Eilema lurideola Zink.
Vereinzelt Memmelsdorf, Johannishof (St) Stübig (St, We)
Daschendorf (Ga) Pünzendorf, Kobelsberg (De)
Zeil (M-K) 1 Stck.
1 ♂ Zell/Schweinfurt (S)

42 Lithosia complana L.
(272) Eilema complana L.
Verbreitet: Memmelsdorf, Ludwag, Stübig (St, De)
Daschendorf, Johannishof (Ga, De)
Kreuzberg (Ga)
Pettstadt (Co/Ba) Weissenbrunn (Gi) Wildenheid (Do)
Probstgrund (Hö)
2 Stck. (M-K) Zeil Münnerstadt (S)

43 Lithosia unita Hb.
(269) Eilema unita Hb.
Sehr häufig Gambach/Karlstadt 10.8.73 am Licht (S)

44 Lithosia lutarella L.
(271) Eilema lutarelle L.
Vereinzelt: Tiefenellern, Burglesau (St)

Pettstadt (St, De) Voitmannsdorf (We)
Poxdorf (Ga) Johannishof, Strullendorf (Ga, De)
Sehr häufig: bei Gambach/Karlstadt am Licht
2 Stck. Zeil (M-K) Weissenbrunn (Co/Gi)

Nr.45 Lithosia pallifrons Z.
(270) Eilema pygmaeola
Vereinzelt: Memmelsdorf, Tiefenellern (St)
Pettstadt (St, Ga, De)
Stübig (De)

46 Lithosia sororcula Hufn.
(278) Systropha sororcula Hufn.
Verbreitet: Johannishof, 3 Stck. Memmelsdorf (St, Ga, De)
Scheßlitz, Veilbronn (Ga) Pünzendorf, Stettfeld (De)
nördl. Haßberge, Zell/Schweinfurt (S)
3 Stck. Zeil (M-K)

47 Pelosia muscerda
Hesselberg/Höchstadt (Ga, De)

48 Pelosia obtusa Hs.

49 Gnophria rubricollis L.
(279) Atolmis rubricollis L.
Verbreitet: Bbg./Bruderwald (De)
Memmelsdorf, Würgau, Burglesau (St)
Börstig (Ga, St)
Johannishof, Geisdorf, Veilbronn (Ga)
Zell/Schwft., Schwebheim, Hassberge (S)
Oberlauter (Co/Hö)
2 Stck. Zeil (M-K)

50 Coscinia striata L.
(280)

Vereinzelt: Pettstadt, Burglesau (St)
Börstig (Ga, De)
Lange Meile(Ga, De)
Häufig: Münnerstadt (S)

Nr.51 Coscinia cribraria L.
(281)
Vereinzelt: Strullendorf (Ga, De) Memmelsdorf (St)
Hesselberg/Höchstadt (Ga, De)
Jungenhofen (Ga Adelsdorf (De)

52 Utetheisa pulchella L.
(282)

53 Chelis maculosa Gern.
(284)

54 Phragmatobia fuliginosa L.
(286)
Häufig: Bamberg und Coburger Gebiet in 2 - 3 Generationen und Zeil (M-K) Schweinfurt

55 Eucharia casta Esp.
(287)

56 Parasemia plantaginis L.
(288)
Verbreitet: Memmelsdorf, Burglesau (St) Ludwag (We)
Mühlendorf, Gaustadt (P) Schammelsdorf (De)
Tiefenellern (Ga, St)
Dietersdorf, Oberlauter, Rottenbach Callenberg (Ott, Gi, Hö, Ba) Zell, Schwebheim/Schweinfurt

57 Spilarctia lutea Hfng.
(291) Spilosoma lubricipeda L.

Häufig: Memmelsdorf (St, We)
Börstig (Ga) Bbg./Kaulberg (Ga)
Breitengüßbach (De)
Callenberg (Ba, Ott) Wildenheid/Rödental (Gi)
Zeil (M-K) Schweinfurt/Schwebheim

Nr.58 Spilosoma menthastri Esp.
(292)
Häufig: Bamberg, Memmelsdorf, Johannishof, Daschendorf, Börstig, Kreuzberg (Ga, St, De, We)
Häufig: (Co/Eck, Ba, Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K) und Zell/Schweinfurt

59 Spilosoma urticae Esp.
(293)
Bbg./Kaulberg 10.9.56 (Ga)
Oberlauter (Hö) Rödental, Weinberg (Gi)
Coburg (Eck)

60 Arctinia caesarea Goeze
(296)
im allgemeinen selten, jedoch 12 Stck. am 19.5.1971 bei Ludwag (St, De)
Bbg./Michelsberg 2 Stck. (Ga) Stübig (De)
Sträublingshof/Staffelstein 2 Stck. (Ga)
Selten im Hauptsmoorwald (F.)
Selten im Cob.-Gebiet Oberlauter (Ba, Hö)
Rödental, Weinberg (Gi)
1 ♂ Zeil (M-K)
1 ♂ Zell und 1 ♀ Kronungen/Schweinfurt (S)

61 Diaphora mendica Cl.
(297) Cycnia mendica Cl.
Verbreitet: Memmelsdorf, Ludwag (St, De)
Bbg./Stephansberg (Ga)

Staffelbach (Ga) Unterhaid, Kobelsberg (De)
Verbreitet: Zell, Schwebheim/Schweinfurt (S)
im Coburger Gebiet (Ba, Hö, Gi,Ott)
2 Stck. Zeil (M-K)

Nr.62 Rhyparia purpurata L.
(300)
Vereinzelt: Memmelsdorf, Herrnsdorf, Burglesau (St)
Gaustadt (P)
Hallstadt, Geisdorf, Heroldsmühle (Ga)
Ludwag, Börstig, Stübig, Kobelsberg (De)
Nicht selten (F.)
Zell/Schweinfurt (S)
Vereinzelt: Cbg./Lauterberg, Staffelberg, Dieters-
dorf, Weissbachgrund, Callenberg (Ba, Eck, Ro, Ott)
2 Stck. Zeil (M-K)

63 Diacrisia sannio L.
(302)
Verbreitet: Ludwag, Burglesau, Stübig (St, De)
Veilbronn, Aufseß (Ga)
Oberlauter, Dietersdorf, Haarbrücken, Ketschenbach,
Weidach, Buchberg (Ba, Hö, Gi, Do, Ott)
Schwebheim (S)

64 Hyphoraia Aulica L.
(303)
nur in Roßdach/Bbg. (St) festgestellt
und Walberla (Forchh.) (St, De)
Callenberg (Co/Ba) Staffelberg (Co/Ott)
selten in Münnerstadt (S)

65 Pericallia matronula L.
(304)
Juni 196 Dietzhof

1936 3 F. Friesner Warte
1926 1 ♂ Giechburg
1948 u. 1957 1♂ Heiligenstadt
1954 4 F. Weihersmühle Lukasch
Hier sehr selten, einige Male bei Miersberg und Ebermannstadt (F)

Nr.66 Arctia caja L.
(305)
Verbreitet bis häufig: Memmelsdorf, Pettstadt, Stübig, Burglesau (St, De)
Johannishof, Börstig, Hallstadt, Bbg./Kaulberg (Ga, De)
Drosendorf (We)
Regelmäßig im Cob.-Gebiet gefangen (Ba, Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K) und Umgebung Schweinfurt

67 Arctia villica L.
(307)
nach dem Krieg (1945) nicht mehr gefangen.
(Schmitt) Hauptsmoorwald 1932 mehrere gesammelt
Nicht häufig, öfters bei der Wunderburg (F.)

68 Arctia hebe L.
(308) Ammobiota festiva Hufn.)
nach dem Krieg (1945) nicht mehr gefangen
Hauptsmoorwald 1932 (Schmidt)
Vereinzelt, öfters bei Miersberg (F.)
Rossach, Staffelberg (Eck)

69 Callimorpha dominula L.
(309) Panaxia dominula L.
Stellenweise häufig bei Forchheim (St, Schrüfer, Schaupp, Ga, De)
Häufig im Hauptsmoorwald (F.)
Häufig im Fischbacher Teich (Co/Ba, Gi, Hö, Do, Ott)
Ködeltal (Ga)

Nr.70 Callimorpha quadripunctaria Pd.
(310) Panaxia quadripunctaria Pd.
Würgau, Wattendorf (Ott)
Memmelsdorf, Burglesau, Weismain (St) Drosendorf (We)
Teuchatz, Börstig (Ga)
Unterhaid, Hohengüßbach, Drügendorf (De)
Zeil, Stettfeld (M-K)
Callenberg (Ott)

71 Hipocrita jacobaeae L.
(311) Thyria jacobaeae L.
Häufig: Ludwag (St, De) Burglesau (St)
Börstig (Ga, De, We)
Pettstadt, Herrnsdorf (De)
Häufig in Lauterberg, Rodach, Tambach (Ba, Hö, Gi, Ott)
Häufig in Zeil (M-K) und Hambach/Schweinfurt (S)

72 Dasychira selenitica Esp.
(245)
ca. 100 Raupen Sept./1976 bei Herrnsdorf (St)
Raupen Okt./1978 Drügendorf (Kl)
häufig in Münnerstadt und Thüngersheim/Main (S)

73 Dasychira fascelina L.
(246)
Vereinzelt: Herrnsdorf, Burglesau (St)
Raupen in Tiefenellern (Ga)
Adelsdorf (De)
(IGNG-Cob.)

74 Dasychira abietis Schiff.
(247)

75 Dasychira pudibunda L.
(248)

überall häufig auch im Coburger Gebiet
Zeil (M-K)

Nr.76 Orgyia gonostigma F.
(250)
Seltener als antiqua (F.)

77 Orgyia antiqua L.
(251) Orgyia recens Hb.
überall verbreitet Memmelsdorf, Ludwag (St)
Tiefenellern (Ga) Zeegendorf (De)
und im Coburger Gebiet und Schweinfurt

78 Orgyia ericae Germ.
(252)

79 Laelia coenosa Hb.
(254)

80 Arctornis l-nigrum
(255)
Verbreitet: Johannishof (St, Ga, De) Ludwag (St, De, We) Stübig, Würgau (St)
Kreuzberg, Daschendorf (Ga, De) Buckenhofen (Kl)
Probstgrund, Gallenberg (Co/ Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K) Zell, Schwebheim (S)

81 Stilpnotia salicis L.
(256)
Seltener als l-nigrum Memmelsdorf (St, We)
Johannishof, Börstig (Ga, De) Bbg./Michelsberg (Ga)
Hesselberg (De) Unter- u. Oberlauter, Probstgrund,
Rödental, Weinberg (Co/Hö, Ba, Gi, Ott) Zeil (M-K)
Schwebheim (S)

Nr.82 Lymantria dispar L.
(257)
Vorkommen jahrweise verschieden
1978 sehr häufig (St, Ga, De)
Probstgrund, Fischbacher Teich (Co/Hö, Gi)
Zeil (M-K) Poppenhausen (S)

83 Lymantria monacha L.
(258)
Verbreitet: Pünzendorf, Stübig, Pettstadt (St)
Johannishof, Börstig, Strullendorf (Ga, De)
Unterhaid, Kobelsberg (De)
Leutertal, Weissenbrunn, Rödental, Weinberg, Callenberg (Co/Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K) Zeil, Schwebheim Stettfeld (S)

83a eremita + f.atra
Johannishof (Ga)
Pünzendorf, Pettstadt (St, De) Stackendorf (De)

84 Ocneria detrita Esp.
(259)

85 Ocneria rubea F.
(260)

86 Porthesia similis Fuessl.
(262)
Verbreitet: Memmelsdorf (St, De) Börstig (St, Ga, De)
Bbg/Kaulberg (Ga) Johannishof, Daschendorf, Weizendorf (Ga, De)
Lautertal, Rödental, Weinberg, Wildenheid (Co/Hö, Gi, Do)
Zeil (M-K) und Schwebheim (S)

87 Euproctis chrysorrhoea L.

(261)
z.Zt. selten 1 ♂ 3.7.1968 Memmelsdorf (St)
1 F 13.7.1971 Börstig (Ga)
2 ♂ Schwebheim (S)

Nr.88 Thaumetopoea processionea L.
(329)
Kreuzberg 24.8.1961 1 ♂ (Ga)
Johannishof 4.9.1972 (Ga)
Raupen häufig zwischen Haßfurt und Schweinfurt (M-K, S)

89 Thaumetopoea pinivora Tr.
(330)

Lasiocampidae Glucken, Wollraupenspinner

90 Malacosoma neustria L.
(454)
Verbreitet bis häufig im Bbg. und Cbg. Gebiet
Zeil (M-K) jährlich an der B 26 zwischen Geldersheim und Werneck Kahlfraß an Apfelbäumen (S)

91 Malacosoma castrensis L.
(455)
Im Bbg. Gebiet häufig: Burglesau, Daschendorf, Ludwag, Stübig, Geisdorf (St, De, Ga)
Im Cbg. Gebiet selten: (Weidach/Ott)
Zeil (M-K) Haubach, Münnerstadt

92 Malacosoma franconica Esp.
(456)

93 Trichiura crataegi L.
(458)

Jahrweise verbreitet Memmelsdorf 1966-1968 (St)
Bbg./Kaulberg, Würgau, Johannishof, Veilbronn (Ga)
Bbg./Altenburg, Daschendorf, Schammelsdorf (De)
1973 in Anzahl Zeil (M-K)
In Schwebheim alle Jahre häufig

Nr.94 Poecilocampa populi L.
(460)
Verbreitet und häufig auch im Cobg. Gebiet u. Schweinfurt
1 ♀ Zeil (M-K)

95 Eriogaster rimicola Hb.
(462)
Bbg./Kaulberg, Michelsberg 1954-1956
Die Raupen nicht selten im Hain und auf der Altenburg (F.)

96 Eriogaster catax L.
(463)
Bei Miersberg, Eggolfsheim und Schlüsselau (F.)

97 Eriogaster lanestris L.
(464)
häufig Tiefenellern, Ludwag, Burglesau (St, De, Ga) und Schweinfurter Gebiet (S)
weniger im Cbg. Gebiet Probstgrund (Gi)
1 ♂ Zeil (M-K)

98 Lasiocampa quercus L.
(466)
Verbreitet bis häufig im Sandgebiet Herrnsdorf (St, De, Ga) auch im Coburger Gebiet (Ba, Hö, Gi, Do, Ott)

99 Lasiocampa trifolii Esp.

(467) Pachygastria trifolii Esp.
Häufig: Memmelsdorf, Stübig, Ludwag, Börstig (St)
Bbg./Kaulberg, Börstig, Pettstadt, Johannishof (Ga, De)
Dornig, Wildenheid, Rödental, Weissbachgrund, Probstgrund (Ott, Do, Gi, Hö, Ba)
Stettfeld (M-K) und Schweinfurter Gebiet (S)

Nr.100 Macrothylacia rubi L.
(408)
überall verbreitet u. häufig Bbg., Cbg., Zeil, Schweinfurt

101 Cosmotriche potatoria L.
(469) Philudoria potatoria L.
Verbreitet Memmelsdorf, Pünzendorf (St)
Börstig, Johannishof (Ga, De)
Stübig, Hesselberg, Daschendorf (De)
Ebersdorf (Eck) Michelau (Ott)
Stettfeld (M-K) und Schwebheim, Heidenfeld (S)

102 Selenephera lunigera Esp.
(470) Cosmotriche lunigera Esp.
Vereinzelt, Memmelsdorf, Ludwag, Würgau (St)
Staffelstein (Ga)
Callenberg, Rödental, Weinberg (Ba, Gi, Ott)

103 Epicnaptera ilicifolia L.
(471)
2 ♂ Wildenheid (Gi)

104 Epicnaptera tremulifolia Hb.
(472)
Vereinzelt Memmelsdorf (St)
Bbg./Friedrichsbrunnen (Ga)
Unterhaid (De) Raupen öfters im Michelsberger Wald

auf Eichen (F)
Probstgrund (Ba)
1 ♂ Zeil (M-K)

Nr.105 Gastropacha quercifolia L.
(473)
Jahrweise verbreitet Memmelsdorf, Stübig, Pünzendorf (St)
Bbg./Kaulberg, Bruderwald, Daschendorf, Börstig, Stübig, Johannishof (Ga)
Ludwag, Bamberg (De)
Zeil (M-K)
Neustadt (Gi, Hö)

106 Gastropacha populifolia Esp.
(474)
1 ♂ am 22.6.66 in Memmelsdorf (St)
Bbg/Nonnenbrücke am 21.6.57 (Ga)
vereinzelt (F)

107 Odonestis pruni L.
(475)
ziemlich selten (F)

108 Dendrolimus pini L.
(476)
Verbreitet bis häufig Memmelsdorf, Börstig, Stübig, Burglesau, Johannishof (Ga, St, De)
auch im Cbg. Gebiet verbreitet (Ba, Hö, Gi, De, Ott)
Münnerstadt (S)

109 Lemoniidae Herbstspinner
==========
Lemonia taraxaci Esp.
(452)

Nr.110 Lemonia dumi L.
(453)
1 ♂ am 8.10.1978 (Kl) selten Bruderwald u. Miersberg (F.)
Ebern (Ri)
Massenvorkommen 1976 bei Heubach/Schweinfurt und Münnerstadt (S)
am 18.10.1977 1 ♂ Zeil (Kuhn)
1 ♀ 7.10.76 Meilschnitz (Co/Gi)

Endromididae Scheckflügel

111 Endromis versicolora L.
(477)
Memmelsdorf (St) Bbg./Stephansberg, Distelberg, Johannishof, Burggrub (Ga)
Fischbacher Teich (Hö, Gi) Callenberg (Ott)
Zeil (M-K) u. verbreitet bei Gambach, Karlstadt, Schwebheim (S)

Drepanidae Sichelflügler

112 Drepana falcataria L.
(438)
verbreitet in 2 Generationen (St, Pi, Ga, De, We)
(Ba, Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K) Schwebheim (S)

113 Drepana curvatula Bkh.
(439)

114 Drepana harpagula Esp.
(440)

Selten Memmelsdorf, Börstig (St)
Börstig, Johannishof (Ga, De) Unterhaid (De)
4 Stck. Zeil (M-K) 1974
häufig bei Schwebheim (S)

Nr.115 Drepana lacertinaria L.
(441)
Verbreitet Memmelsdorf, Stübig, Ludwag (St) Gaustadt (P)
Pünzendorf (We)
Johannishof, Bbg./Stephansberg (Ga)
Börstig, Stackendorf (De)
Rödental, Wildenheid (Gi) Callenberg (Ott)
1 Stck. Zeil (M-K) Schwebheim (S)

116 Drepana binaria Hfn.
(442)
Verbreitet Memmelsdorf, Ludwag, Johannishof (St)
Gaustadt (P)
Bbg./Kaulberg, Börstig, Weizendorf, Veilbronn, Stettfeld, Daschendorf, Unterhaid (Ga)
Cbg./Probstgrund (Ba, Hö) Callenberg (Ott)
Zeil (M-K) Schwebheim (S)

117 Drepana cultraria F.
(443)
Verbreitet Memmelsdorf, Daschendorf, Pünzendorf, Ludwag (St, De)
Johannishof (P, Ga) Tiefenellern, Burggrub, Strullendorf (Ga)
Cbg. /Probstgrund, Hofgarten, Wildenheid (Hö, Gi, Ro)
Zell/Schweinfurt (S)

118 Cilix glaucatus Scop.
(444)
Verbreitet Memmelsdorf, Ludwag, Stübig (St)

Gaustadt (P)
Bbg./Kaulberg, Börstig (Ga)
Daschendorf, Unterhaid (De)
Cbg./Probstgrund, Rödental, Wildenheid (Hö, Gi)
Zeil (M-K) Zell/Schweinfurt

Saturniidae Nachtpfauenaugen

Nr.119 Eudia pavonia L.
(449)
verbreitet bis häufig
Memmelsdorf, Stübig, Ludwag (St) Gaustadt (P),
Drosendorf (We)
Sandhof, Kreuzberg, Burggrub (Ga)
Unter- u. Oberlauter, Neustadt, Rottenbach, Schweighof (Ba, Hö, Gi, Do)
Zeil (M-K) Schwebheim, Zell (S)

120 Aglia tau L.
(445)
Verbreitet, Memmelsdorf, Stübig, Pünzendorf (St)
Johannishof, Kreuzberg, Kübelstein (Ga)
Daschendorf, Hohengüßbach (De)
Bausenberg, Ketschenbach, Rödental, Callenberg (Ba, Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K) Schwebheim u. Zell/Schweinfurt (S)

Sphingidae Schwärmer

121 Acherontia atropos L.
(410)
Jahrweise Puppen bzw. Raupen in Kartoffelfeldern
Memmelsdorf (St) Altendorf (Straßburger)

Falter: Bbg./Kaulberg, Domberg, Gartenstadt, Birkach (Ga)
Sehr vereinzelt (F.)
Bertelsdorf, Dietersdorf, Veste-Coburg (vor 1940)
(Ba, Ro)

Nr.122 Herse convolvuli L.
(411)
Jahrweise Puppen i. Kartoffelfeldern (St, We, Straßburger)
Falter vereinzelt 2 Stck. Bamberg 1976 (St)
Bbg./Kaulberg 8 Stck. 1956 (Ga)
Herzogenreuth (De)

123 Sphinx ligustri L.
(412)
verbreitet Memmelsdorf, Stübig, Ludwag (St, De)
Pünzendorf (We) Veilbronn (Ga)
Cbg./Probstgrund (Hö) Wildenheid (Gi)
Zahlreiche Raupen in Rödental 1974 (Gi)

124 Sphinx pinastri L.
(413) Hyloicus pinastri L.
Überall verbreitet u. stellenweise häufig (St, P, Ga, De, We)
Coburg (Ba, Hö, Gi, Do, Ott)
Zeil (M-K)

125 Mimas Tiliae L.
(406)
verbreitet bis häufig
Bbg./Kaulberg, Johannishof, Veilbronn (Ga)
Memmelsdorf (St) Gaustadt (P) Stübig, Daschendorf, Strullendorf, Stettfeld (De)
Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Hofgarten (Hö) Rödental und Wildenheid (Gi)
Zeil (M-K)

Nr.126 Smerinthus ocellatus L.
(409)
verbreitet Memmelsdorf, Börstig (St)
Bamberg, Börstig, Kreuzberg (Ga)
Kobelsberg (De)
Unterleiter, Callenberg, Rödental, Wildenheid (Ba, Gi, Do, Ott)
Zeil (M-K)

127 Amorpha populi L.
(407) Laothoe populi L.
Memmelsdorf, Stübig, Pettstadt, Daschendorf (St)
Gaustadt (P) Bbg./Kaulberg, Johannishof, Veilbronn (Ga)
Pünzendorf, Börstig
Callenberg, Wildenheid, Rödental, Fischbach (Ba, Hö, Gi, Do, Ott)
Zeil (M-K)

128 Haemorrhagia tityus L.
(425)
Pünzendorf, Stübig, Burglesau (St)
Häufig auf dem Jura (F)
Ebern (Ga) Oberlauter (Hö), Weissenbrunn 29.5.-31.5.77 über 20 Stck. (Gi)

129 Haemorrhagia fuciformis L.
(426)
Zahlreiche Raupen Lange Meile (Ga)
Drügendorf, Stackendorf (De)
Häufig im Jura, hier nicht so häufig (F.)
Cbg./Probstgrund (Hö)
11.6. - 18.6.77 Weissenbrunn 11 Falter (Gi)
Zell, Gambach (S)

130 Deilephila nerii L.

(414) Daphnis nerii L.
1 ♀ 22.9.65 Bamberg, Neue Residenz

Nr.131 Proserpinus proserpina Pall.
(423)
4.5.68 2 Exemplare Johannishof (Ga)
Raupen fast jedes Jahr in mehreren Exemplaren (F.)

132 Macroglossum stellatarum L.
(424)
Jährlich v. Aug. bis Okt.
Memmelsdorf (St) Bamberg (Ga)
1 Ex. 15.6.77 Bbg. (We)
(Ba, Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K)

133 Celerio euphorbiae L.
(415)
Überall verbreitet bis Häufig (St, Ga, De)
Cbg. (Ba, Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K)

134 Celerio gallii Rott.
(418)
1 ♂ 14.8.76 Dörfleins (De)
4.8.76 Lohndorf (We)
Raupen nicht gerade selten, aber sehr vereinzelt (F.)
Cbg./Callenberg, Kögeltalsperre (Ba, Hö)
(Wildenheid (Do) Callenberg (Ott)

135 Celerio lineata
(419)

136 Pergesa elpenor L.
(420) Deilepila elpenor L.

Überall verbreitet (St, P, Ga, De)
Zeil (M-K)

Nr.137 Pergesa porcellus L.
(421) Deilephila porcellus L.
überall verbreitet bis häufig (St, P, Ga, De, We)

138 Hippotion celerio L.
(422)

Notodontidae Zahnspinner

139 Cerura bicuspis Bkh.
(332) Harpyia bicuspis
Vereinzelt
2 ♂ Memmelsdorf (St) Gaustadt (P) Buckenhofen (Kl.)
Strullendorf, Johannishof (De)
Veilbronn (Ga)
4 ♂ Rödental/Weinberg (Gi), Wildenheid (De) Callenberg (Ott)
Coburg (Ro) Kronungen/Schweinfurt (S)

140 Cerura furcula Clerk.
(333) Harpyia furcula Clerk.
Verbreitet Memmelsdorf (St)
Mönchröden (Hö) Rödental/Wernberg (Gi)
1 ♂ Zeil (M-K)

141 Cerura bifida Hb.
(334) Harpyia hermelina Goeze
Verbreitet
Memmelsdorf (St) Bbg./Kaulberg (Ga) Börstig (Ga, De)
Buckenhofen (Kle)

Cbg./Callenberg (Ba) Hofgarten (Hö) Rödental/Weinberg (Gi)
3 Stck. Zeil (M-K) Schwebheim (S)

Nr.142 Dicranura erminea Esp.
(335) Cerura erminea Esp.
vereinzelt
Memmelsdorf (St) Gaustadt (P)
Bbg./Kaulberg, Johannishof, Hauptsmoorwald (Ga)
Ludwag, Hohengüßbach (De)
Cbg./Hofgarten (Hö) Callenberg (Ott)
Schwebheim u. Zell/Schweinfurt (S)

143 Dicranura vinula L.
(336) Cerura vinula L.
verbreitet Memmelsdorf (St, We) Bbg./Kaulberg, Börstig, Kreuzberg, Veilbronn (Ga)
Ludwag, Herrnsdorf (De)
Cbg.-Neustadt (Hö)
Schwebheim, Poppenhausen (S)

144 Stauropus fagi L.
(337)
verbreitet Memmelsdorf (St) Gaustadt (P) Bbg./Kaulberg, Johannishof, Kreuzberg, Strullendorf (Ga)
Ludwag (De)
Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö) Rödental/Weinberg (Gi)
Zeil (M-K) und Zell/Schweinfurt (S)

145 Hoplitis milhauseri F.
(339) Hybocampa milhauseri F.
vereinzelt nur 1971 häufiger
Memmelsdorf, Ludwag, Johannishof (St, De) Gaustadt (P)
Bbg./Kaulberg, Johannishof, Börstig (Ga) Stettfeld (De)

Buckenhofen (Kl)
Cbg./Callenberg (Ba) Hofgarten (Hö) Rödental/Weinberg,
Weissenbrunn (Gi) Hofgarten (Ott)
Zeil (M-K) Schwebheim, Münnerstadt, Kronungen (S)

Nr.146 Gluphisia crenata Esp.
(340)
Weidach (Brü)
1 ♂ 1 ♀ Zeil (M-K)
Schwebheim, Zell nicht selten (S)

147 Drymonia querna F.
(342)
Selten
Bbg./Kaulberg, Michelsberg (Ga) (De)
Würgau, Stübig (St) (Kl)

148 Drymonia trimacula Esp.
(343)
Memmelsdorf, Pünzendorf (St, De)
Bbg./Kaulberg, Johannishof, Börstig, Veilbronn (Ga)
Ludwag, Daschendorf, Stettfeld (De)
Cbg./Probstgrund (Hö), Rödental (Gi), Wildenheid (Do)
Callenberg (Ott)
Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schwft. (S)
Stettfeld (Ga, De)

149 Drymonia chaonia Hb.
(344) Drymonia ruficornis Hufn.
Memmelsdorf, Schammelsdorf, Sassendorf (St)
Bbg./Kaulberg, Michelsberg, Börstig, Johannishof (Ga)
Hohengüßbach (De)
Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö) Rödental (Gi)
3 Stck. Zeil (M-K) Zell/Schwft. (S)

Nr.150 Pheosia tremula Cl.
(346)
Memmelsdorf (St) Gaustadt (P)
Bbg./Kaulberg, Stephansberg, Johannishof (Ga)
Ludwag, Kobelsberg, Schammelsdorf (De) Buckenhofen (Kl)
Cbg./Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö)
2 Stck. Zeil (M-K) Schwebheim (S)

151 Pheosia dictaeoides Esp.
(347) Pheosia gnoma F.
Memmelsdorf, Ludwag (St)
Bbg./Kaulberg (Ga) Strullendorf, Unterhaid (De) Viereth Steinbr. Callenberg (Ba, Ott) Probstgrund (Hö)
Wildenheid (Gi, Do)
Zeil (M-K) Schwebheim (S)

152 Notodonta dromedarius L.
(350)
verbreitet Memmelsdorf, Stübig (St) Gaustadt (P)
Daschendorf (We) Bbg./Kaulberg, Börstig, Weizendorf, Pettstadt, Roßdach (Ga, De)
Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)

153 Notodonta ziczac L.
(351)
verbreitet
Memmelsdorf (St) Gaustadt (P)
Bbg./Kaulberg, Michelsberg, Börstig, Kreuzberg, Johannishof Pettstadt (Ga, De)
auch im Cbg./Gebiet verbreitet
Zeil (M-K) Schwebheim

154 Notodonta anceps Goeze
(345) Peridea anceps
verbreitet in Bamberg und Coburger Gebiet
Zeil (M-K) Schwebheim Zell

Nr.155 Notodonta pheobe Sieb.
(348)
verbreitet in Bamberg u. Coburger Gebiet
Bbg./Kaulberg, Stephansberg, Johannishof, Veilbronn (Ga)
Memmelsdorf (St)
Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)

156 Notodonta tritophus Esp.
(349) Notodonta torva Hb.
verbreitet im Bbg. u. Cbg. Gebiet
Bbg./Kaulberg, Börstig, Johannishof (Ga)
Memmelsdorf (St, De)
Zeil (M-)) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)

157 Spatalia argentina Schiff.
(352)
Juli-Aug. ca. 10 Exemplare Buckenhofen (Kl)
Raupen jedes Jahr selten und zerstreut (F)
Unterhaid (De) Stettfeld 8 Exempl. (Ga, De)
16.6.67 Cbg./Callenberg (Ba)

158 Leucodonta bicoloria Schiff.
(353)
vereinzelt, Memmelsdorf, Ludwag (St)
Bbg./ Kaulberg, Johannishof (Ga) Stettfeld (De)
Pünzendorf, Hohengüßbach (De) Buckenhofen (Kl)
Cbg./Hofgarten (Hö, Rö) Callenberg (Ott)
häufig bei Schwebheim u. Obbach/Schweinfurt (S)

159 Ochrostigma velitaris Hfn.
(354)
1 ♂ 28.6.74 Hangerberg/Unterhaid (De)
nicht selten (F.)
1 ♂ 3.7.75 Rödental (Gi)

Nr.160 Ochrostigma melagona Bkh.
(355)
Memmelsdorf, Stübig, Ludwag, Pünzendorf (St, De)
Veilbronn, Johannishof, Roßdach (Ga)
3 Stck. Zeil (M-K)
verbreitet in Schwebheim u. Münnerstadt (S)

161 Odontosia carmelita Esp.
(356)
Memmelsdorf (St) Sandhof, Johannishof, Veilbronn (Ga)
Stackendorf, Hohengüßbach (De)
Cbg./Callenberg, Probstgrund, Rödental (Ba, Hö, Gi)
4 ♂ Schwebheim, Gambach (S)

162 Lophopteryx camelina L.
(358)
verbreitet Memmelsdorf, Pünzendorf, Stübig (St)
Bamberg, Johannishof, Börstig, Veilbronn (Ga, De)
Cbg./Probstgrund (Ba) Rodach, Callenberg (Ott)
Zeil (M-K) Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)

163 Lophopteryx cuculla Esp.
(359)
verbreitet Würgau, Pünzendorf, Ludwag, Stübig, (St,De)
Börstig (Ga) Johannishof, Stackendorf (De)
Cbg./Callenberg (Ba) Rödental (Gi)
Schwebheim, Zell/Schweinfurt (S)

164 Pterostoma palpinum L.
(360)
verbreitet Memmelsdorf, Daschendorf (St) Gaustadt (P)
Bbg./Kaulberg, Stephansberg, Sandhof, Börstig, Kreuzberg, Pettstadt (De, Ga)
Cbg./Callenberg, Probstgrund, Rödental (Ba, Hö, Gi, Ott)
Zeil (M-K) Schwebheim Zell

Nr.165 Ptilophora plumigera Esp.
(361)
verbreitet Stübig (We)
Memmelsdorf (St) Bbg./Kaulberg (Ga) Stackendorf (De)
Cbg./Probstgrund (Hö) Callenberg (Ott)
Zell/Schweinfurt alle Jahre recht häufig

166 Phalera bucephala L.
(362)
verbreitet und häufig im Bbg. u. Cbg. Gebiet (St, Ga, De)
Zeil (M-K) und Schweinfurter Gebiet

167 Pygaera anastomosis L.
(367) Clostera anastomosis L.
Johannishof, Pettstadt (G)
1 ♂ Memmelsdorf (St) 15.8.71 Altenburg, Börstig (De)
Cbg./Callenberg (Ba) Schwebheim (S)

168 Pygaera curtula L.
(365) Clostera curtula L.
verbreitet in 2 Gen. (April u. August)
im Cbg.-Gebiet in Mai - Juni (Ba, Do)
Zeil (M-K) Schwebheim, Zell (S)

169 Pygaera anachoreta F.
(366) Clostera anachoreta F.
Bamberg/Stephansberg (Ga)
Cbg./ Rödental (Gi) 1 ♀ mit Licht

170 Pygaera pigra Hufn.
(368) Clostera pigra Hufn.
Viereth/Steinbruch (Ga)
Zeil (M-K) Schwebheim (S)
1 ♂ 10.5.76 Wildenheid (Gi)

Cymatophoridae Eulenspinner

Nr. 171 Habrosyne derasa L.
(428) Habrosyne pyritoides Hufn.
Bbg./ Michelsberg, Börstig, Johannishof, Hallstadt
Veilbronn (Ga)
Würgau, Börstig, Memmelsdorf (St) Daschendorf, Hesselberg (De)
1 Stck. Stettfeld (M-K)

172 Thyatira batis L.
(429)
Bbg./Kaulberg, Johannishof (P) Börstig, Veilbronn (Ga)
Memmelsdorf, Pünzendorf (St) Daschendorf, Hesselberg (De)
1 Stck. Zeil (M-K)

173 Palimpsestis fluctuosa Hb.
(430 Tethea fluctuosa Hb.
Börstig (Ga) Dörrnwasserlos (De, St)
Schwebheim nicht selten (S)

174 Palimpsestis duplaris L.
(431) Tethea duplaris
Stübig (We)
Börstig, Johannishof (Ga, De)
Memmelsdorf, Pünzendorf, Börstig (St)
3 Stck. Zeil (M-K)
Schwebheim u. Münnerstadt je 1 ♂ (S)

175 Palimpsestis or F.
(432) Tethea or Schiff.
Gaustadt (P) Börstig, Johannishof, Bamberg/Stephansberg, Veilbronn (Ga) Memmelsdorf, Pünzendorf, Pettstadt (St) Oberhaid, Hesselberg (De)
1 ♀ Zeil (M-K) Schwebheim (S)

Nr. 176 Palimpsestis ocularis L.
(433) Thetea ocularis L.
Börstig, Johannishof, Förtschenried (Ga)
Memmelsdorf, Würgau, Ludwag, Börstig (St)
Hesselberg, Daschendorf (De)
1 ♂ Zeil (M-K)

177 Polyploca diluta F.
(434)
Bbg./Kaulberg, Johannishof (Ga)
Memmelsdorf, Würgau (St) Daschendorf (De)
häufig Zeil (M-K)

178 Polyploca flavicornis L.
(435)
Bbg./Bruderwald, Höfen (Ga) Johannishof, Daschendorf (Ga, De) Memmelsdorf (St)
Zell, Kronungen (S)

179 Polyploca ridens F.
(436)
Strullendorf, Johannishof (Ga) Stackendorf (De)
Schwebheim, Zell

180 Diloba caeruleocephala L.

Bbg./Kaulberg (Ga)
Burglesau (e.l.) Johannishof (St)
Zeil (M-K)

Limacodidae Schildmotten

181 Cochlidion limacodes Hfn.

Kreuzberg, Börstig, Johannishof, Bbg./Friedrichs-
brunn (Ga)
Memmelsdorf, Pünzendorf (St) Pettstadt, Daschendorf (De)
Drosendorf (We)
Zeil (M-K) Schebheim

Nr.182 Heterogenea asella Schiff.

Kobelsberg/Aufseß (De)

Psychidae Sackträger
=========

183 Acanthopsyche atra L.
(480)

184 Canephora unicolor Hfn.
(483)

185 Sterrhopteryx hirsutelle Hb.
(497)
Börstig, Johannishof, Veilbronn (Ga)
Börstig (St) Bruderwald, Pettstadt (De)
(Zeil (M-K) 1 ♂

186 Epichnopteryx pulla Esp.
(518)

187 Fumea casta Pall.
(541)

Thyrididae Fensterfleckchen
==========

188 Thyris fenestrelle Scop.
(478) 25.6.72 Lange Meile (De)

Aegeriidae Glasflügler

Nr.189 Aegeria apiformis Cl.
(580)
Memmelsdorf, Bbg.-Süd (St)
Bamberg (De) in manchen Jahren häufig (F)

190 Aegeria melanocephala Dalm.
(581)

191 Sphecia crabroniformis Lewin
(582)

192 Paranthrene tabaniformis Rott.
(583)

193 Bembecia hylaeiformis Lasp.
(584)
Bbg./Seelgasse (Ga)
bei Schlüsselau (F.)

194 Synanthedon scoliaeformis Bkh.
(585)

195 Synanthedon spheciformis Gern.
(586)
Bug b. Bamberg (v. 1955)

196 Synanthedon tipuliformis Cl.
(590)
die häufigste Art Anfang Juni in Johannisbeersträuchern schwärmend (F.)
1 St Zeil (M-K)

Nr.197 Synanthedon cephiformis O.
(592)

198 Synanthedon conopiformis Esp.
(593)
zerstreut und selten (F.)

199 Synanthedon vespiformis L.
(594)

200 Synanthedon myopaeformis Bkh.
(595)

201 Synanthedon culiciformis L.
(597)
selten am Abhang der Altenburg (F.)

202 Synanthedon formicaeformis Esp.
(599)

203 Dipsosphecia ichneumoniformis F.
(601)
Tütschengereuth (De) Roßdach (Ga) Oberhaid
nicht selten Altenburg u. Geissberge (F.)

204 Chamaesphecia chrysidiformis Esp.
(604)
Siehe Veröffentlichung
Atlanta (Gi)

205 Chamaesphecia empiformis Esp.
(610)
Stackendorf, Pettstadt, Wattendorf (De)
Oberhaid, Herzogenreuth (Ga) häufiger im Hauptsmoor (F.)

Nr.206 Chamaesphecia leucopsiformis
(616)

207 Chamaesphecia muscaeformis View.
(618)

Cossidae Holzbohrer

208 Cossus cossus L.
(623)
Bbg./Michelsberg, Börstig (Ga) Memmelsdorf (e.l.) (St)
3 Stck. Zeil (M-K)

209 Zeuzera pyrina L.
(627)
Bbg./Kaulberg, Börstig, Johannishof, Dörrnwasserlos (Ga)
Memmelsdorf (St, We)
1 ♂ Zeil (M-K)

210 Phragmataecia castaneae Hbn.
(628)

Hepialidae Wurzelbohrer

211 Hepialus humuli L.
(629)
Schammelsdorf (We) Veilbronn, Förtschenried (Ga)
die Raupe öfters in verschiedenen Wurzeln bei Miersberg
(F.)

212 Hepialus fusconebulosus d.G.
(631)

213 Hepialus sylvinus L.
(633)

Drosendorf, Lohndorf (We)
Bbg./Kaulberg, Börstig (Ga)
Memmelsdorf, Burglesau Würgau (St)

Nr.214 Hepialus lupulinus L.
(634)
Johannishof, Stettfeld (Ga)
Memmelsdorf, Börstig (St)

215 Hepialus hectus L.
(636)
Memmelsdorf (St) 6 Stck.
Drosendorf (We)
nicht selten im Hauptsmoor (F)

L i t e r a t u r

1.) Naturforschende Gesellschaft Bamberg

Bericht 1973 "Microlepidoptera des Bamberger Umlandes" (Dr. Erich Garthe)

Bericht 1975 "Geometriden im Bamberger Umland" (Dr. Erich Garthe)

Bericht 1976 "Noctuiden des Bamberger Umlandes" (Müller.Köllges)

2.) S.G. Kiriakoff (Familie Dilobidae) Nachrichtenblatt Münchner Entom. Nr. 19 (1970 S. 101-104)

3.) Manfred Koch "Wir bestimmen Schmetterlinge" II Schwärmer, Bären und Spinner (Radebeul 2. Auflage 1964)

4.) Forster und Wohlfahrt "Die Schmetterlinge Mitteleuropas" Band 3 Spinner und Schwärmer (Stuttgart, Franksche Verlag)

5.) Wittstadt "Die Großschmetterlinge des Regnitzgebietes" 37. Bericht der Naturf.Ges.Bbg. 1960

6.) Dr. Erich Garthe "Die Nachtfalter an Straßenbeleuchtungen des Bamberger Berggebietes

7.) XLII.Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg "Das Auftreten v. Totenkopf u. Windenschwärmer bei Altendorf/Lkr. Bbg." i.d. Jahren 1964-1967

A b k ü r z u n g e n

(Ga)	Dr. E. Garthe, Bamberg
(De)	Georg Derra, Bamberg
(P)	W. Pilotek, Bamberg/Gaustadt
(We)	R. Weidner, Memmelsdorf-Drosendorf
(Ri)	A. Richter, Ebern
(M-K)	K.H. Müller-Köllges, Zeil
(Kl)	Dr. Kleinecke, Forchheim
(S)	H. Seidlein, Schweinfurt
(St)	Bernhard Stöckert, Memmelsdorf
(Hö)	Höpfner, Coburg
(Ba)	Bauer, Coburg
(Ott)	Ott, Coburg
(Gi)	Gick, Wildenheid/Coburg
(Ro)	Roschlaub, Coburg
(Do)	Domhardt, Wildenheid/Coburg

Anschrift des Verfassers: Bernhard STÖCKERT,
8602 Memmelsdorf, Hauptstraße 46

BAMBERGER RAUM

mit Halbmesser 25 km um Bamberg



I Börstig, 4 km nördl. BA
II Strullendorf, 7 km s.
III Pettstadt, 9 km s.
IV Johannishof 8 km nw.
V Hesselberg, Weihergebiet
VI Altenburg / Bamberg
VII Daschendorf / Itz, 14 km n.
VIII Tiefenellern, 15 km o.
IX Pünzendorf, 13 km ono.
X Ludwag, 15 km ono.
XI Dörrnwasserlos, 19 km no.
XII Veilbronn, 25 km oso.
XIII Drügendorf, 19 km so.
XIV Kobelsberg, 30 km o
XV Dietzhof, 30 km so.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: 53

Autor(en)/Author(s): Stöckert Bernhard

Artikel/Article: Die Spinner und Schwärmer des Bamberger Umlandes 100-143