

Beiträge zur Kenntnis der Staphylinoiden (Kurzflügelkäfer und Kurzflüglerartige) der Umgebung Bambergs

Von Theodor Schneid

Einleitung

Die nähere Beschreibung des Gebietes, dem die Fauna der gegenwärtigen Liste entstammt, kann ich mir hier schenken, unter Verweis auf die Einleitung zu meiner Liste der Carabiden und Dytisciden im vorjährigen (XXX.) Berichte unserer Gesellschaft. Da aber nicht alle, die vielleicht gegenwärtige Liste in die Hand bekommen, auch jene besitzen werden, seien für diese hier nur kurz über das Gebiet ein paar Worte gesagt.

Das Gebiet, dem die Fauna der gegenwärtigen Liste entstammt, ist das Umland von Bamberg mit etwa einem Kreistradius von 30—40 km und läßt sich ungefähr folgendermaßen umgrenzen: Im Westen durch eine Verbindungslinie etwa der Orte Ebrach, Zeil a. M., Maroldswiesach, im Norden der Orte Seßlach, Lichtenfels, Burgkunstadt, im Osten der Orte Hollfeld, Waischenfeld, Pottenstein und im Süden der Orte Gößweinstein, Streitberg, Forchheim, Höchstadt a. A.

Geographisch handelt es sich um einen Teil des sog. Fränkischen Beckens oder der Fränkischen Stufenlandschaft. Durch die weite Main-Regnitztalung (das Urmaintal) von Lichtenfels bis Forchheim wird es in annähernd gleiche Hälften geteilt. Die westliche, geologisch vom Keuper formiert, gehört dem sog. Keuperbergland an, umfaßt den östlichen Steigerwald und die östlichen Haßberge mit deren allmählicher östlichen Abdachung zu Regnitz und Main, die östliche umfaßt vorwiegend Teile des nördlichen Frankenjura oder der Frankenalb mit deren westlichem Vorgelände, dem „Juravorland“ oder „Liasland“.

Orographisch erreicht das Gebiet in einzelnen Erhebungen im Steigerwald und den Haßbergen Höhen bis zu 480 m, im Jura bis zu 580 m, so daß sich zwischen Berg und Talsohle Höhendifferenzen von etwa 290 m (im Keuper) bis zu 340 m (im Jura) ergeben können.

Die Taleinkerbungen sind sowohl im äußeren Westen des Gebietes, im Raume des eigentlichen Steigerwaldes und der Haßberge, wie besonders im Ostteil, im Jura, relativ steil und tief und oft weithin dicht bewaldet, so daß sich daraus ein relativ reicher faunistischer Anteil an montanen Elementen durchaus erklären mag. Eigentliche Moore existieren zwar heute nicht mehr, doch fehlt es nicht an noch stark anmoorigen Resten von solchen, wie besonders im Raume des großen Bamberger Hauptmoorwaldes und südlich darüber hinaus, also etwa von Seehof bis Hirschaid, dann besonders im großen Weihergebiet im unteren Aischgrund,

etwa von Willersdorf bis Höchstädt a. A. und außerdem noch nördlich von Oberhaid. Faunenelemente von Mooren konnten sich deshalb noch wohl bis auf den heutigen Tag erhalten. Die warmen südwendigen Hänge besonders vom Maintal und vom Jura und die warmen weiten Täler von Regnitz und Main mit ihren stellenweise ausgedehnten Flugsandgebieten bieten auch wärmeliebenden (thermophilen) Elementen noch entsprechende Biotope. Für die Feuchtigkeit liebenden Staphyliniden bietet der Wasserreichtum, besonders der Keuperlandschaft und der zahlreichen Täler beste Lebensmöglichkeiten und die häufigen und regelmäßigen Überschwemmungen von Regnitz und Main wie auch ihrer Seitenwässer ebenso günstige Fangmöglichkeiten für den Entomologen.

Das Belegmaterial zur gegenwärtigen Faunenliste ist in der Hauptsache das Ergebnis eigener langjähriger Sammeltätigkeit und befindet sich in der Sammlung des Bamberger Naturalienkabinetts bei der Phil.-Theol. Hochschule. Ferner sind hier noch, soweit von hier stammend, Belege mitregistriert, die sich in einer von Oberstleutnant v. Haupt (Dresden) 1913 dem Kabinett testamentarisch überlassenen umfangreichen und schönen palaearktischen Käfersammlung vorfinden, besonders soweit es sich um von mir selbst hier bisher noch nicht festgestellte Arten handelt. Außerdem führe ich hier noch Belege aus einer weiteren im Kabinett befindlichen einstigen Privatsammlung an, aus der Sammlung des Herrn Pfarrers Glaser †, der vor der Jahrhundertwende vorwiegend um die Orte seiner Tätigkeit, Burggrub bei Heiligenstadt (nächst Streitberg) in der Fränkischen Schweiz und Teuschnitz im Frankenwalde nordöstlich Kronach gesammelt hat. Ich nehme an, daß die Patria, die der damalige Kabinettsvorstand Prof. Dr. Georg Fischer mit „Fränkische Schweiz“ oder „Frankenwald“ konserviert hat, hinreichend verlässlich ist. v. Haupt gibt für seine Fänge als Patria außer „Bamberg“ leider auch keine näheren Fangorte an. — Nun obliegt mir noch die angenehme Pflicht all den Herren zu danken, die mich bei meinen Studien durch Determination oder deren Revision stets entgegenkommendst unterstützt haben; und ich möchte nicht versäumen, besonders den Herren Hans Wendeler (Berlin, der den Großteil meiner Staphyliniden bestimmte), Max Huether (München), Hugo Schleicher (Hamburg), Dr. A. Herzer (Bad-Schwartau), Heinrich Engert (Berlin), Dr. L. Benick und Dr. Gg. Benick (Lübeck), Dr. O. Rebmann (Ansbach), auch hier an dieser Stelle noch einmal meinen verbindlichsten Dank zum Ausdruck zu bringen. Besonderen Dank schulde ich auch noch Herrn A. Horion für Angaben über die allgemeine geographische Verbreitung einzelner seltenerer Arten.

I. Silphidae, Aaskäfer

A. Silphinae

Necrophorini

Necrophorus F.

1. *Necr. interruptus* Steph., nicht selten; 3 Bamberg VI. 25; 1 Kreuzberg IX. 26; 1 Hirschaid 2. VIII. 33.
2. *Necr. investigator* Zett., ziemlich selten; 1 Strullendorf VIII. 31; 1 Etzelskirchen VIII. 31.

3. *Necr. vespilloides* Hbst., häufig; besonders in Wäldern, vielfach auch in Pilzen; 1 Zeckendorf IV. 30; 2 Hauptsmoorwald 16. VIII. 32; 1 Hallstadt 11. VIII. 37; 6 Bamberg (Sammlung von Haupt).
4. *Necr. vespillo* L., häufig; 2 Bamberg VI. 25; 3 Strullendorf IV. u. V. 30; 6 Hallstadt (Börstig) 6. V. 33 (an toter Krähe), 1 Hain V. 33; 2 Ebelsbach 10. V. 35; 5 Unterhaid 11. VIII. 37 u. anderen Orten.
5. *Necr. vestigator* Herschel; nicht häufig; 1 Treunitz, Frankenwald (S. Pfr. Glaser).

Silphini

Necrodes Leach.

1. *Necr. littoralis* L., nicht selten, wenn auch von mir erst wenig gefangen; 2 Bug VI. 25; 2 Strullendorf V. 31; 1 Unterhaid 11. VIII. 37.

Thanatophilus Samouelle (Pseudopelta Voet)

1. *Than. rugosus* L. häufig; 1 Bug V. 25; 1 Pettstadt V. 30; 2. Viereth VI. 30; 3 Bamberg (Hain) V. 30; 4 Strullendorf, V. 31; 1 Hallstadt 6. V. 33.
2. *Than. sinuatus* F. sehr häufig. 7 Pettstadt V. 30; 6 Stegaurach VI. 30; 3 Strullendorf VIII. 30; 15 Hallstadt (Börstig) 6. V. 33; 1 Kreuzberg 14. V. 33.

Occeoptoma Samouelle.

1. *Occeopt. (Pseudopelta) thoracica* L., nicht selten, besonders an Aas; 4 Bamberg V. 28; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste bei Sommerhochwasser); 3 Oberhaid 4. VI. 41; 2. Bamberg (S. v. Haupt).

Blithophaga Reitter.

1. *Blith. opaca* L., anscheinend nicht häufig, von mir wenigstens noch nicht beobachtet; Runkelrübenschädling; 1 Bamberg (S. v. Haupt); 1 Fränk. Schweiz (S. Pfr. Glaser).
2. *Blith. undata* Müll., nicht selten; gleichfalls Runkelrübenschädling. 1 Oberhaid IV. 30; 2 Strullendorf V. 31 und 25. III. 33; 1 Drügendorf VIII. 31; 1 Stettfeld 21. VI. 36; 2 Bamberg (S. v. Haupt).

Xylodrepa Thoms.

1. *Xylodr. 4-punctata* L. nicht selten; auf Gebüsch, besonders Eichengebüsch, auf schädliche Raupen Jagd machend und dadurch sehr nützlich; 3 Bug (Bruderwald) V 29; 4 Scheßlitz V. 30; 1 Kreuzberg V. 31; 2 Ebelsbach V. 31; 3 Strullendorf 9. VI. 41; 1 Staffebach 15. V. 42.

Silpha Lin.

1. *Silph. carinata* Hrbst., hier anscheinend ziemlich selten; mehr im Gebirge; 1 Friesener Warte IV. 28; 1 Drügendorf 20. IX. 32; 1 Würgau 16. V. 32; 1 Tiefenellern 20. V. 33.
2. *Silph. fristis* Illig., hier ziemlich selten; 1 Gundelsheim V. 28; 1 Pettstadt XI. 29 (Regnitzgeniste); 15 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste bei Sommerhochwasser).

3. *Silph. obscura* L., überall sehr häufig; 1 Hilkersdorf 7. VI. 33; 1 Würgau 16. V. 33; 2 Tiefenellern 20. V. 33; 2 Ebrach 14. VI. 32; 2 Drügendorf 2. X. 33; 5 Gundelsheim V. 30; 10 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste) und anderen Orten.

Ablattaria Reitter.

1. *Ablatt. laevigata* L., nur lokal und recht selten; West- und Südeuropa; in Deutschland besonders in Wärmegebieten, thermophile Art; 1 Laineck b. Bayreuth VI. 29; 1 Ebelsdorf 10 V. 35.

Phosphuga Leach. (Peltis Geoffr.)

1. *Phos. atrata* L., häufig; in Wäldern unter Laub und Rinden und besonders in Baumstrünken; 14 Staffelbach, Zeil a. Main, Pettstadt, Tiefenellern, Drügendorf III. u. V. 29 u. 30; 8 Scheßlitz (Grumbacher Holz, unter Rinden); 5 Hauptsmoorwald XII. 30; 3 Stegaurach 24. VI. 42; 4 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste).

B. Cholevinae

Ptomaphagus Illig.

1. *Ptom. varicornis* Roshr., sehr lokal und selten; 1 Bamberg (Hain) 22. XII. 43.
2. *Ptom. subvillosus* Goeze (*sericeus* Panz.); lokal und selten; 2 Staffelbach XI. 29 (Maingeniste); 2 Ebing II. 30; 1 Zapfendorf II. 30 (Maingeniste).
3. *Ptom. sericatus* Chd., lokal und selten; mehr in montanen Lagen. 3 Staffelbach XI. 29 (Maingeniste); 3 Pettstadt XI. 29; 2 Giech XI. 29 (Bachgeniste); 1 Strullendorf V. 31; 1 Staffelstein 20. IV. 33; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.

Nargus Thomson.

1. *Narg. Wilkeni* Spence, häufig; 2 Stettfeld 25. X. 37; 2 Oberhaid 4. VI. 41; 1 Ebern 10. XI. 41.
2. *Narg. brunneus* Strm., sehr lokal und selten; besonders in Südeuropa heimisch, für Deutschland mit thermophilem Charakter; 1 Ebelsbach II. 31.
3. *Narg. anisotomoides* Spence., lokal und selten; unter faulendem und schimmelndem Buchenlaub; 7 Kreuzberg I. u. II. 29; 9 Hallstadt I. 29; 2 Scheßlitz II. u. V. 30; 1 Strullendorf V. 31.

Choleva Latr.

1. *Chol. cisteloides* Fröl., nicht häufig, mehr in Gebirgslagen; fehlt in der nord-deutschen Tiefebene; 1 Strullendorf IV. 31.
2. *Chol. agilis* Illig., selten; 1 Strullendorf 6. II. 35 (unter Eichenlaub).

Sciodrepoides Hatch.

1. *Cciodr. fumatus* Spence, nicht häufig; 1 Strullendorf VI. 29; 7 Hauptsmoorwald 6. u. 30. VI. 32 (an toter Taube); 4 Oberhaid 4. VI. 41 (an totem Reh).
2. *Sciodr. Watsoni* Spence, nicht selten, an kleineren Kadavern; 5 Staffelbach II. 30 (Maingeniste); 2 Memmelsdorf I. 30; 2. Pettstadt X. 29; 2 Stegaurach V. 30; 3 Strullendorf V. 31; 3 Hauptsmoorwald 23. II. 32; 1 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43.

Catops Payk.

1. *Cat. picipes* F., selten. 1 Bamberg (Hauptsmoorwald) 23. VII. 32.
2. *Cat. fuscus* Panz., nicht selten; gerne an Rattennester gebunden, deshalb vielfach in Kellern, Vorratsräumen, Kartoffelmieten etc.; 1 Rattelsdorf 7. V. 35; 1 Scheßlitz 6. VIII. 36.
3. *Cat. grandicollis* Er., sehr lokal und selten; besonders in West- und Südeuropa heimisch; 1 Seehof IX. 29; 1 Hirschaid X. 30; 2 Hauptsmoorwald VIII. 31. u. 23. XI. 32.
4. *Cat. nigrita* Er., nicht selten; 1 Bug I. 26 (Regnitzgeniste); 1 Ebing XII. 29; 1 Seehof III. 30; 2 Stegaurach III. 31; 1 Hauptsmoorwald X. 31.
5. *Cat. nigricans* Spence, selten hier anscheinend, unter Laub; 1 Scheßlitz XI. 31.
6. *Cat. coracinus* Kelln., recht lokal und selten; 1 Hauptsmoorwald XII. 29.
7. *Cat. morio* F., hier nicht selten, mit Vorliebe in der Nähe von Gewässern; besonders in Westdeutschland verbreitet; 12 Staffelbach I. u. III. 30 (Maingeniste); 5 Pettstadt XI. 29 (Regnitzgeniste); 5 Stegaurach XI. 30; 1 Forchheim III. 30; 4 Rattelsdorf 10. XII. 34 (auf einer Kopfweide im Winterquartier).
8. *Cat. chroysomeloides* Panz., selten hier anscheinend, West- und Mitteleuropa; 1 Bischberg X. 29 (unter feuchtem Laube).
9. *Cat. tristis* Panz., nicht gerade selten; 1 Staffelbach III. 30 (Maingeniste); 1 Straßgiech XI. 29 (Bachgeniste); 20 Hauptsmoorwald XI. 31; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 31.
10. *Cat. subfuscus* Kelln. (alpinus auct.), sehr lokal und selten, 1 Bamberg (Hauptsmoorwald) XII. 29 (in alten Stöcken).

Nemadus Thoms.

1. *Nem. colonoides* Kr., sehr sporadisch und selten; im Mulm alter Eichen bei Ameisen; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.

II. Liodidae

Liodes Latr.

1. *Liod. calcarata* Er., nicht selten; 1 Bamberg (S. v. Haupt); die Arten der Gattung leben an unterirdischen Schwämmen wie Trüffeln.
2. *Liod. dubia* Kugelann, nicht selten; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Liod. badia* Strm., nicht häufig; 1 Bruckertshof V. 31; 1 Scheßlitz XII. 31.
4. *Liod. parvula* Sahlb., sehr selten; 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt, det. Reitt).

Cyrtusa Latr.

1. *Cyrt. pauxilla* Schmidt; sehr lokal und selten; 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).

Anisotoma Schmidt.

1. *Anis. humeralis* F., häufig; 2 Staffelbach III. 30 (Maingeniste).
2. *Anis. castanea* Hrbst., ziemlich selten; 1 Stegaurach XI. 29.

Amphicyllis Erichs.

1. *Amph. globus* F., selten; 1 Zentbechhofen VI. 29;
a. *ferruginea* Strm., 1 Pettstadt XI. 29 (Regnitzgeniste); 1 Bamberg (S. v. Haupt).

Agathidium Illiger.

1. *Ag. atrum* Payk., nicht häufig; 4 Hauptsmoorwald, Ludwag und Sambach IV., X. und XI. 29.
2. *Ag. seminulum* L., nicht selten; 2 Hauptsmoorwald X. 29 und I. 30; 1 Scheßlitz 6. VIII. 36.
3. *Ag. badium* Er., nicht selten; 14 Pettstadt, Staffelbach, Ebing, XI. und XII. 29 (Regnitz- und Maingeniste).
4. *Ag. laevigatum* Er., nicht selten; 9 Ebing, Memmelsdorf, Hirschaid, Hauptsmoorwald I. und XII. 29 (meist in Geniste und unter Laub).
5. *Ag. marginatum* Strm. selten; 2 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).

III. Clambidae

Clambus Fischer.

1. *Cl. minutus* Strm., nicht häufig; 3 Staffelbach III. 29 (Maingeniste).
2. *Cl. armadillo* de Geer., nicht selten; 6 Staffelbach III. 29; 2 Zeyern b. Kronach XI. 29 (Rodachgeniste).

IV. Scydmaenidae

Cephennium Müll. u. Kunze.

1. *Ceph. thoracicum* Müll., u. Kze., nicht häufig, bei Ameisen; 1 Ebelsbach II. 31.

Neuraphes Thoms.

1. *Neur. angulatus* Müll. u. Kze., ziemlich selten; 1 Ebelsbach II. 31; 1 Hirschaid IV. 31.
2. *Neur. elongatulus* Müll. u. Kze.; nicht häufig; 1 Reckendorf III. 31; 1 Stettfeld XI. 31 (unter Laub); 1 Hauptsmoorwald 22. V. 37.

Stenichnus Thoms.

1. *Sten. scutellaris* Müll., nicht selten; 1 Reckendorf III. 30; 2 Ebelsbach II. 31; 2 Hauptsmoorwald IV. 31; 2 Sambach IV. 31; 2 Zentbechhofen VI. 31 (unter nassem Laub).
2. *Sten. collaris* Müll., nicht häufig; 2 Hauptsmoorwald I. u. V. 31 (an Sumpfstellen); 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
3. *Sten. pusillus* Müll., selten; 2 Hauptsmoorwald V. 31; West- und Südeuropa, in Deutschland thermophile Art.

Euconnus Thoms.

1. *Euc. claviger* Müll., Nord- und Mitteleuropa, sehr selten; 12 Strullendorf III. u. V. 31 (bei *Formica rufa*).

2. *Euc. hirticollis* Illig., selten, an sumpfigen Orten; 1 Reckendorf III. 31; 2 Oberhaid V. 31 (Teichgeniste); 7 Rattelsdorf 10. XII. 31 (unter Laub auf einer Kopfweide im Winterquartier).
3. *Euc. pubicollis* Müll., sehr selten; 1 Zeckendorf IV. 31 (unter Baummoos), fehlt in Norddeutschland).

Scydmaenus Latr.

1. *Scyd. tarsatus* Müll., nicht selten; 1 Strullendorf V. 31; 1 Rattelsdorf 7. V. 36 (Itzgeniste bei Sommerhochwasser); 2 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Scyd. (Heterognathus) Hellwigi* Hrbst., selten; bei Lasius-Arten in morschem Holze. 1 Staffelbach II. 30; 1 Strullendorf V. 31; 1 Hirschaid 10. IV. 35; 2 Bamberg (Hain) 28. III. 48.

V. Ptiliidae

Pteryx Matth.

1. *Pter. suturalis* Heer, nicht selten; in modernem Laube. 1 Scheßlitz XI. 31 (Grumbacher Holz).

Acrotrichis Motsch.

1. *Acr. intermedia* Gillm., unter abgefallenem Laube; 1 Bamberg (S. v. Haupt).

VI. Scaphidiidae

Scaphosoma Laech.

1. *Scaph. agaricinum* L., häufig, in Schwämmen; 2 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Scaph. boleti* Panz., nicht häufig; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.

VII. Staphylinidae

A. Aleocharinae

Aleocharini

Ocalea Erichson.

1. *Ocal. badia* Er., ziemlich selten; am Ufer von Gewässern. 1 Bug III. 24; 1 Seehof XI. 25; 1 Bruckertshof II. 27; 1 Gaustadt XI. 27; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33.
2. *Ocal. rivularis* Mill., selten; meist in montanen Gegenden. 1 Seehof 14. V. 35.
3. *Ocal. picata* Steph., nicht häufig. 1 Oberhaid V. 26; 1 Hauptsmoorwald V. 27; 4 Stettfeld XII. 27; 1 Zentbechhofen V. 28; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 28.

Amarochara Thomson.

1. *Amaroch. forticornis* Boisd., sehr selten; West- u. Südeuropa; in Deutschland besonders an xerothermen Orten. 1 Stegaurach VI. 26.

Ilyobates Kraatz.

1. *Ilyob. nigricollis* Mnnh., selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt.); 1 Frankenwald (S. Pf. Glaser).

Calodera Mannerheim.

1. *Calod. rufescens* Kr., sehr selten; Mitteleuropa; in Deutschland sehr sporadisch. 1 Stegaurach V. 25.
2. *Calod. aethiops* Gravh., selten. 1 Ebelsbach XI. 29; 1 Kreuzberg XI. 31. ab. *dichroa* Reitt. 1 Hallstadt XI. 27.

Chilopora Kraatz.

1. *Chilop. longitarsis* Er., selten; West- u. Südeuropa. 1 Seehof IV. 24; 4 Hauptsmoorwald VI. 26; 5 Ebelsbach V. 25 u. 5. V. 35.

Phloeopora Erichson.

1. *Phloeop. testacea* Mnnh., nicht selten. 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
2. *Phloeop. corticalis* Gravh., selten; mehr West- u. Südeuropa; in Mitteleuropa sporadisch. 4 Kreuzberg II. 25 u. V. 28 (unter Rinden); 4 Bamberg (Hain) 23. II. 43 u. 18. XI. 40.

Tinetus Sharp.

1. *Tin. morion* Gravh., nicht häufig. 1 Ebelsbach II. 26; 1 Gaustadt V. 26.

Aleochara Gravenhorst.

1. *Aleoch. curtula* Goeze (*fuscipes* Gravh.), häufig, bes. an Aas. 3 Drügendorf X. 25; 5 Bamberg (Michelsberger Wald) V. 25; 3 Bug VI. 25; 8 Hauptsmoorwald IV. 26; 20 Stegaurach IV. 28; 20 Pettstadt V. 28; 16 Strullendorf V. 29; 18 Hallstadt (Börstig) 6. V. 33; 2 Strullendorf 21. VII. 33; 1 Tiefenellern 20. V. 33; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33; 6 Oberhaid 4. VI. 41 (an totem Reh).
2. *Aleoch. (Baryodma) intricata* Mnnh. (*bipunctata* Er.), nicht selten in Dünger. 2 Bug III. 24; 4 Strullendorf V. 24; 4 Oberhaid V. 26; 1 Pettstadt V. 27; 7 Drügendorf V. 27 u. X. 28; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33; 2 Strullendorf 21. II. 42.
3. *Aleoch. (Baryod.) morion* Gravh., nicht häufig. 1 Ebelsbach II. 26; 1 Gaustadt V. 26.
4. *Aleoch. (Euryodma) brevipennis* Gravh., nicht häufig. 1 Bug III. 24; 3 Ebing II. 25; 1 Strullendorf IV. 26; 2 Oberhaid V. 26, 4 Staffelbach III. 27.
5. *Aleoch. (Isochara) tristis* Gravh., nicht häufig. 1 Drügendorf X. 29; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 42; 1 Tiefenpözl (S. Pf. Glaser).
6. *Aleoch. (Isochara) moesta* Gravh., selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
7. *Aleoch. (Polychara) cuniculorum* Kr., sehr selten; in den Bauen erdbewohnender Säuger (wie Fuchs, Dachs, Kaninchen etc.). 1 Scheßlitz V. 29.
8. *Aleoch. (Polychara) crassicornis* Lac., nicht selten. 1 Seehof XI. 25; 1 Scheßlitz III. 26; 1 Staffelbach III. 27; 5 Strullendorf V. 27; 1 Bamberg (Altenburg) IV. 29; 1 Hallstadt 24. V. 33; 1 Ebelsbach 10. V. 35; 2 Stettfeld 12. VIII. 37; 3 Bamberg (S. v. Haupt).
9. *Aleoch. (Polych.) sparsa* Heer., nicht häufig. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) X. 24; 1 Stegaurach XI. 25; 1 Ebing II. 26; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
10. *Aleoch. (Polych.) villosa* Mnnh., selten; in Hühnerställen, Taubenschlägen u. ähnl. 1 Bamberg 25. VIII. 33.

11. *Aleoch. (Polych.) lanuginosa* Gravh., nicht häufig; mehr Gebirgstier. 1 Staffelbach III. 28; 1 Strullendorf XII. 28; 1 Zeegendorf 4. IV. 35.
12. *Aleoch. (Polych.) inconspicua* Aubé, selten. 1 Staffelbach I. 24 (Maingeniste), 1 Bamberg (S. v. Haupt).
13. *Aleoch. (Polych.) fumata* Gravh., selten. 1 Bamberg (Altenburg) V. 28.
14. *Aleoch. (Polych.) moerens* Er., selten. 14 Hirschaid VIII. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
15. *Aleoch. bilineata* Gyll., nicht selten. 1 Strullendorf 21. VI. 42 (an faulen Rüben); 1 Frankenwald (S. Pf. Glaser).
16. *Aleoch. spadicea* Er., selten; gern in Geniste von Wässern. 1 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
17. *Aleoch. (Coprochara) bipustulata* L., nicht selten. 2 Bug III. 24 u. I. 26; 2 Hallstadt I. 26 u. XI. 33; 4 Stettfeld III. u. XII. 26; 1 Reckendorf III. 26; 4 Giech XI. 26; 1 Kreuzberg II. 27; 4 Pettstadt V. 28; 3 Drügendorf X. 28; 1 Oberhaid 27. III. 33; 6 Ebrach 5. VIII. 33.

Microglotta Kraatz.

1. *Microgl. pulla* Gyll., selten; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43 (in Eichenmulm).
2. *Microgl. gentilis* Märkel, lokal u. selten; bei *Lasius fuliginosus*. 1 Bamberg (Hain) 25. III. 48 (in Eichenmulm).
3. *Microgl. marginalis* Gyll., sehr selten; bei Ameisen. 1 Staffelbach III. 25; 1 Scheßlitz III. 28; 14 Bamberg (Hain) 23. II. 43 (in Eichenmulm).

Crataraea Thomson.

1. *Cratar. suturalis* Mnnh., nicht häufig; besonders in Strohabfällen an Scheunen und Mieten etc. 1 Bamberg (Altenburg) V. 26; 1 Bamberg (S. v. Haupt).

Ocyusa Kraatz.

1. *Oc. maura* Er., nicht häufig; mehr nördl. Art. 9 Stegaurach XI. 26.
2. *Oc. incrassata* Rey., sehr selten; vorwiegend montane Art. 6 Hauptsmoorwald XI. 29; 1 Saltendorf IX. 30.

Oxypoda Mnnh.

1. *Oxyp. spectabilis* Märk., selten; mehr montane Art. 1 Scheßlitz II. 26.
2. *Oxyp. lividipennis* Mnnh., häufig. 1 Stettfeld III. 24; 9 Oberhaid V. 26; 2 Ebelsbach V. 26; 1 Hirschaid 17. V. 39.
3. *Oxyp. vittata* Märk., nicht häufig; bei Ameisen und an ausfließendem Baum-
saft. 4 Hauptsmoorwald XII. 24; 1 Kreuzberg II. 25; 20 Bamberg (Altenburg)
V. 27 (bei *Lasius niger*); 2 Bamberg (Hain) VIII. 27 u. 23. II. 43; 1 Zeyern
b. Kronach XI. 26 (Rodachgeniste).
4. *Oxyp. longipes* Rey., sehr selten; bei Ameisen; sonst meist Bewohner der
Maulwurfsnester. 1 Strullendorf 6. II. 35.
5. *Oxyp. opaca* Gravh., häufig. 3 Staffelbach III. 24; 10 Bug III. 24; 2 Scheß-
litz III. 25; 1 Zentbechhofen VI. 25; 1 Hauptsmoorwald 10. IX. 36; 4 Bam-
berg (S. v. Haupt).

6. *Oxyp. lateralis* Mnnh., sehr selten; montane (boreomontane) Art in Deutschland. 1 Hirschaid 10. IV. 35.
7. *Oxyp. umbrata* Gyll., nicht selten; unter faulenden Pflanzenstoffen. 2 Staffelbach V. 24; 1 Ebelsbach V. 25; 3 Hauptsmoorwald VI. 25; 1 Hallstadt I. 26.
8. *Oxyp. sericea* Heer., nicht selten; im Dung. 3 Staffelbach IV. 24; 2 Drügendorf V. 25.
9. *Oxyp. alternans* Grav., nicht selten; in Pilzen. 4 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 25; 1 Saltendorf IX. 26; 1 Strullendorf V. 27; 1 Stettfeld 25. X. 37; 1 Reckendorf 2. VI. 42; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
10. *Oxyp. haemorrhoea* Märk., lokal nicht selten; bei *Formica rufa*. 9 Strullendorf III. 24; 1 Hauptsmoorwald IV. 25.
11. *Oxyp. formiceticola* Märk., lokal; bei *Formica rufa*. 25 Strullendorf IV. 25.

Dexioga Thoms.

1. *Dexiog. corticina* Er., nicht häufig; unter Baumrinden. 1 Staffelbach X. 25.

Thiasophila Kraatz.

1. *Thiasoph. angulata* Er., nicht selten; bei *Formica rufa*. 15 Strullendorf III. 25 u. 28; 1 Bamberg (Altenburg) V. 26.

Dinarda Mnnh.

1. *Dinarda dentata* Gravh., nicht häufig; bei Ameisen. 3 Kastel b. Amberg (Opf.) X. 26.

Myrmedoniini

Lomechusa Gravh.

1. *Lomech. strumosa* Gravh., selten; bei *Formica*. 1 Drügendorf (Lange Meile) 2. X. 32; 1 Staffelbach 15. V. 42.

Atemeles Stephens.

1. *Atem. emarginatus* Payk., ziemlich selten; bei *Myrmica*. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) V. 24; 1 Zeckendorf IV. 27.
2. *Atem. paradoxus* Gravh., ziemlich selten; bei Ameisen. 1 Viereth IX. 28; 1 Ebelsbach V. 31.
3. *Atem. pubicollis* Bris., nicht häufig, doch von mir noch nicht gefangen. 3 Heiligenstadt (S. Pf. Glaser).

Zyras Stephens.

1. *Zyras collaris* Payk., ziemlich selten; unter Moos u. faulendem Laub. 1 Zeyern b. Kronach XI. 27 (Rodachgeniste); 1 Hauptsmoorwald XI. 27; 1 Pettstadt XI. 31; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33.

\ Myrmedonia Erichson.

1. *Myrmed. (Pella) funesta* Gravh., nicht selten; bei *Lasius*. 5 Bamberg (Hain) V. 26; 25 Bamberg (Altenburg) V. 27 (bei *Lasius niger*); 1 Staffelstein 20. IV. 33; 15 Kreuzberg 22. III. 36; 1 Oberhaid 4. VI. 42.
2. *Myrmed. (Pella) humeralis* Gravh., nicht selten; bei Ameisen. 15 Bamberg (Hain) V. 26; 20 Bamberg (Altenburg) V. 27 (bei *Lasius niger*); 2 Staffelberg 20. IV. 33; 1 Oberhaid 27. III. 33.

3. *Myrmed. (Pella) cognata* Märk., nicht häufig; bei Ameisen. 15 Bamberg (Altenburg) V. 27 u. 29; 1 Sambach IV. 27.
4. *Myrmed. (Pella) limbata* Payk., ziemlich selten; meist bei Ameisen. 1 Bamberg (Hain) V. 24; 2 Staffelbach III. 26; 1 Zapfendorf II. 27; 4 Bamberg Altenburg) V. 29; 1 Seehof IV. 31; 1 Bruckertshof IV. 31.
5. *Myrmed. lugens* Gravh., selten; bei *Lasius niger*. 2 Bamberg (Hain) V. 25; 5 Bamberg (Altenburg) V. 27.
6. *Myrmed. laticollis* Märk., nicht selten; bei *Lasius*. 30 Bamberg (Altenburg) V. 26, 27 u. 29 (bei *Lasius niger*).

Notothecta Thoms.

1. *Nototh. flavipes* Gravh., nicht selten. 6 Kreuzberg I. 26; 1 Reckendorf IV. 26; 5 Hauptsmoorwald III. 26; 12 Strullendorf III. 26 u. 29; 1 Hirschaid III. 27.
2. *Nototh. (Lyprocorrhe) anceps* Er., nicht selten; bei *Formica rufa*. 10 Strullendorf III. 25; 3 Hallstadt I. 26; 2 Kreuzberg I. 26.

Sipalia Rey.

1. *Sip. circellaris* Gravh., sehr häufig; unter Laub und Moos gemein, so daß sich das Aufzählen der Belege erübrigt.

Alaobia Thoms.

1. *Alaob. scapularis* Sahlbg., sehr selten; an Flußufern unter Laub und Moos. 1 Bamberg (S. v. Haupt).

Atheta Thoms.

1. *Ath. (Pachnida) nigella* Er., selten; in den Blattscheiden vom Rohrkolben. 1 Ebelsbach II. 29 (Maingeniste).
2. *Ath. (Alianta) incana* Er., selten; gleichfalls in den Blattscheiden vom Rohrkolben. 2 Stegaurach II. 30.
3. *Ath. (Anopleta) corvina* Thoms., nicht häufig (in Pilzen). 2 Staffelbach 22. X. 41 (det. Dr. Gg. Benick).
4. *Ath. (Plataraea) brunnea* F., nicht selten. 1 Kreuzberg 15. V. 36; 1 Stettfeld 31. V. 36; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
5. *Ath. (Amischa) analis* Gravh., sehr häufig. 1 Bug IV. 24; 6 Seehof II. 25; 1 Oberhaid III. 25; 1 Hauptsmoorwald III. 25; 10 Ebing und Zapfendorf II. 26; 2 Strullendorf IV. 26; 6 Sambach IV. 27; 8 Hirschaid IV. 27; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IV. 25; 30 Staffelbach, Bischberg, Zeyern, Ebelsbach III., IV. u. XI. 27 und von anderen Orten.
6. *Ath. (Amischa) arata* Muls., sehr selten. 1 Staffelberg b. Staffelstein 15. IV. 43 (det. Dr. Gg. Benick).
7. *Ath. (Amischa) cavifrons* Sharp., nicht häufig. 1 Gaustadt XII. 26; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27; 1 Scheßlitz IV. 29.
8. *Ath. (Amidobia) talpa* Heer., nicht selten; bei Ameisen; 2 Hirschaid III. 25; 2 Strullendorf III. 26.
9. *Ath. (Glossola) gregaria* Er., nicht selten; unter faulenden Pflanzen. 7 Seehof XI. 24 u. 30; 1 Hallstadt XI. 24; 2 Giech XI. 24; 7 Staffelbach III. 24 u. 29;

- 2 Strullendorf XII. 25; 4 Stegaurach IV. 25 u. 29; 1 Stettfeld XII. 30; 1 Ratelsdorf 10. XII. 35.
10. *Ath. (Aloconota) sulcifrons Steph.*, ziemlich selten; unter faulenden Pflanzen. 4 Stegaurach VI. 25.
11. *Ath. (Aloconota) currax Kr.*, selten; Gebirgstier; an Bach- und Flußufern. 1 Strullendorf 6. II. 35.
12. *Ath. (Dinaraea) linearis Gravh.*, nicht selten; unter Laub und Rinde. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 25; 1 Scheßlitz XII. 26; 2 Hauptsmoorwald IV. 27; 1 Kreuzberg IV. 29; 1 Oberhaid V. 30; 1 Hallstadt XI. 31; 1 Wattendorf 10. IV. 39; 3 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43.
13. *Ath. episcopalis Bernh.*, sehr selten; mitteleurop., vielleicht mehr montane Art. 1 Strullendorf 8. V. 43 (det. Dr. Gg. Benick).
14. *Ath. (Dinaraea) angustula Gyll.*, nicht selten, doch lokal. 3 Bug IV. 24 u. 27; 3 Ebing II. 25; 1 Zapfendorf II. 25; 1 Bug I. 26; 4 Zeyern b. Kronach XI. 27; 1 Kreuzberg IV. 28; 25 Staffelbach III. 29 (Geniste); 3 Pettstadt 8. V. 43.
15. *Ath. (Dinaraea) aequata Er.*, nicht selten; unter Rinde. 1 Oberhaid I. 25; 1 Gaustadt XI. 25; 1 Bug (Bruderwald) XII. 25; 9 Ebing II. 26; 6 Zapfendorf II. 26; 7 Kreuzberg II. 27; 1 Hallstadt XI. 29; 2 Scheßlitz XI. 30; 3 Bamberg (S. v. Haupt).
16. *Ath. (Microdota) amicula Steph.*, nicht häufig. 3 Bamberg (S. v. Haupt).
17. *Ath. (Microdota) inquinula Gravh.*, nicht selten; in trockenem Dung. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
18. *Ath. (Microdota) palliola Er.*, selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
19. *Ath. (Hygroecia) palustris Kiesw.*, nicht selten; an feuchten Orten. 1 Strullendorf 6. II. 35; 3 Staffelbach IV. 29.
21. *Ath. (Hygroecia) angusticollis Thoms.*, selten. 1 Strullendorf IV. 27; 1 Staffelbach IV. 29; 1 Hallstadt XI. 29; 2 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
22. *Ath. crassicornis F.*, häufig; in Pilzen. 1 Hirschaid III. 24; 1 Bamberg (Hain) V. 24; 3 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 26; 1 Stettfeld XII. 26; 2 Oberhaid V. 24; 10 Bischberg X. 30; 1 Kreuzberg II. 31; 1 Zentbechhofen V. 31.
23. *Ath. fungicola Kr.*, selten; 1 Staffelbach 22. X. 41 (det. Dr. Gg. Benick).
24. *Ath. inoptata Sharp.*, sehr selten. 14 Staffelbach 22. X. 41; 1 Ebern 10. XI. 41 (unter Rinden); 2 Bamberg (Hain) 23. II. 42; 1 Strullendorf 4. V. 43; bisher aus Deutschland erst wenig bekannte Art (det. Dr. Gg. Benick).
25. *Ath. trinotata Kr.*, nicht selten. 1 Dippach b. Eltmann 7. IV. 39.
26. *Ath. euryptera Steph.*, nicht selten; an ausfließendem Baumsaft. 2 Bamberg (S. v. Haupt); 1 Bamberg (Lager) 8. XI. 41; 5 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
27. *Ath. nigrifula Gravh.*, nicht selten. 1 Reckendorf III. 26; 1 Hirschaid VIII. 28; 8 Bischberg X. 30.
28. *Ath. sodalis Er.*, nicht selten; in Schwämmen. 2 Kreuzberg I. 28; 1 Hauptsmoorwald IV. 29; 1 Scheßlitz XI. 30; 1 Hirschaid III. 31; 1 Ebern 10. IX. 41; 3 Bamberg (Hain) 23. II. 45; 1 Bamberg (S. v. Haupt).

29. *Ath. nigricornis* Thoms., ziemlich selten. 1 Bamberg (Hain) V. 24.
30. *Ath. boletophila* Thoms., selten; in Schwämmen. 1 Bug III. 24.
31. *Ath. gagatina* Baudi., häufig; in Pilzen. 2 Seehof II. 24; 6 Staffelbach III. 24; 1 Reckendorf III. 25; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 25; 2 Strullendorf IV. 25; 1 Zeyern XI. 25; 9 Hirschaid III. u. VIII. 26; 1 Scheßlitz V. 29.
32. *Ath. oblita* Er., ziemlich selten; in Pilzen. 1 Kreuzberg I. 29; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
33. *Ath. castanoptera* Mnnh., nicht selten; unter faulenden Pflanzen und in Pilzen. 1 Bischberg X. 26; 3 Staffelbach IV. 29 u. 22. X. 41; 1 Ebern 10. XI. 41.
34. *Ath. laevicauda* Sahlbg., sehr selten; Alpen, Gebirge Böhmens und Mährens, montane, vielleicht boreomontane Art, falls aus dem Hauptsmoorwald stammend. 1 Bamberg (det. Fleischer, S. v. Haupt).
35. *Ath. (Liogluta) granigera* Kiesw., selten. 1 Oberhaid V. 26.
36. *Ath. (Liogluta) oblongiuscula* Sharp., selten. 6 Bamberg (S. v. Haupt).
37. *Ath. (Liogluta) nitidula* Kr., nicht selten. 2 Seehof II. 25; 1 Stegaurach VI. 25; 3 Hauptsmoorwald XI. 26; 2 Bruckertshof XI. 27; 1 Zeckendorf IV. 28; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
38. *Ath. (Metaxya) elongatula* Gravh., häufig; an feuchten Orten, besonders an Wasserrändern. 1 Bug III. 24; 7 Hirschaid IV. 24; 8 Zentbechhofen IV. 25 u. V. 27; 2 Reckendorf III. 25; 2 Stegaurach VI. 25; 1 Strullendorf III. 26; 7 Gaustadt V. 26; 2 Hauptsmoorwald V. 28; 5 Staffelbach, Pettstadt, Hallstadt III., IV. u. XI. 29.
39. *Ath. (Metaxya) melanocera* Thoms., selten. 1 Kreuzberg II. 29.
40. *Ath. (Datomicra) zosteræ* Thoms., nicht häufig. 1 Seehof XI. 26.
41. *Ath. celata* Er., nicht selten. 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
42. *Ath. (Chaetida) longicornis* Gravh., nicht selten. 2 Bug III. 24; 7 Oberhaid VII. 24; 3 Strullendorf III. 25; 5 Hirschaid IV. 26; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Hauptsmoorwald XI. 27; 2 Ebern 10. XI. 41.
43. *Ath. (Dimetrota) parvula* Mnnh., nicht selten. 1 Seehof XI. 25; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 26; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
44. *Ath. (Dimetrota) Rey) marcida* Er., nicht selten. 1 Reckendorf III. 25; 1 Scheßlitz II. 26; 7 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 4 Bischberg X. 29; 2 Staffelbach 22. X. 41.
45. *Ath. (Dimetrota) cadaverina* Bris., sehr selten. 1 Hauptsmoorwald (bei Geisfeld) IV. 27.
46. *Ath. (Dimetrota) putrida* Kr., sehr selten; mehr südliche Art. 1 Hauptsmoorwald XI. 29; 1 Staffelbach III. 30.
47. *Ath. (Dimetrota) atramentaria* Gyll., nicht häufig. 1 Staffelbach III. 29.
48. *Ath. (Dimetrota) picipennis* Mnnh., ziemlich selten. 1 Strullendorf IV. 28; 1 Staffelbach IV. 29.
49. *Ath. (Coprothassa) sordida* Mrsh., sehr häufig. 5 Bug IV. 24; 5 Staffelbach XI. 25; 6 Saltendorf IX. 26; 1 Gaustadt XI. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27; 2 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 28; 1 Hirschaid 10. IV. 35.

50. *Ath. livida* Er., selten; montane Art; in deutschen Mittelgebirgen. 2 Ebern 10. XI. 41 (det. Dr. Gg. Benick).
51. *Ath. (Acrotona) laticollis* Steph., ziemlich selten. 1 Würgau 10. V. 35.
52. *Ath. (Acrotona) pygmaea* Gravh., nicht häufig. 1 Hauptsmoorwald V. 29; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
53. *Ath. (Acrotona) fungi* Gravh., sehr häufig. 30 Bug, Seehof, Hauptsmoorwald, Stegaarach, Sambach, Oberhaid, Ebing, Zapfendorf, II., IV. u. XI. 25, 26; 50 Hallstadt, Bruckertshof, Zapfendorf, Kreuzberg, Scheßlitz, Zeckendorf III., IV. u. XI. 29 u. 30.
54. *Ath. (Acrotona) orbata* Er., sehr selten. 1 Bug IV. 24; 1 Scheßlitz III. 25; 1 Strullendorf III. 26; 1 Staffelbach 22. X. 41 (det. Benick).
55. *Ath. (Acrotona) orphana* Er., nicht häufig. 1 Hirschaid III. 24; 1 Strullendorf V. 25; 1 Bruckertshof V. 25; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
56. *Ath. (Acrotona) aterrima* Gravh., nicht häufig. 2 Seehof II. 24; 2 Scheßlitz II. 25; 3 Hirschaid V. 25; 2 Hallstadt I. 26; 1 Kreuzberg V. 26; 1 Friesen V. 26; 2 Oberau b. Staffelstein 1. III. 43 (det. Dr. Gg. Benick).
57. *Ath. (Acrotona) parva* Sahlb., nicht selten; in Dung. 1 Hirschaid XII. 24; 1 Ebelsbach II. 26; 1 Scheßlitz VIII. 26; 1 Kreuzberg II. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
58. *Ath. muscorum* Bris., sehr selten. 1 Scheßlitz 26. VI. 40 (det. Dr. Gg. Benick).
59. *Ath. (Acrotona) fimorum* Bris. (*fuscipes* Reitt.), sehr selten; vorwiegend West- und Südeuropa. 1 Kreuzberg XI. 29.

Gnypeta Thomson.

1. *Gnyp. carbonaria* Mnnh., nicht häufig. 1 Staffelbach III. 24; Maingeniste- 1 Strullendorf XII. 26.
2. *Gnyp. velata* Er., sehr selten; in Schlamm an Gewässern; nordeurop. Art. 1 Hauptsmoorwald IX. 29.

Ischnopoda Thoms.

1. *Ischnop. atra* Gravh., nicht häufig. 2 Staffelbach III. 25; 1 Hallstadt XI. 26; 1 Gaustadt V. 30.
2. *Ischnop. umbratica* Er., nicht selten. 1 Ebelsbach 10. V. 35.
3. *Ischnop. leucopus* Mrsh., sehr selten. 1 Staffelbach III. 29.

Falagria Mnnh.

1. *Falagr. sulcata* Payk., häufig. 3 Bug III. 24; 4 Strullendorf III. 25 u. IV. 27; 1 Scheßlitz III. 25; 2 Giech III. 26; 1 Seehof II. 27; 14 Oberhaid III. 27; 1 Saltendorf IX. 27; 10 Staffelbach IV. 29; 2 Hirschaid IV. 31.
2. *Falagr. sulcatula* Gravh., nicht häufig; unter faulenden Pflanzenstoffen. 2 Seehof II. 26; 15 Oberhaid II. 27 (unter Weidenlaub).

Falagriola Reitt.

1. *Falagriola nigra* Gravh., ziemlich selten; unter faulenden Pflanzen. 2 Strullendorf V. 26; 1 Kreuzberg XI. 26.

Cardiola Gravh.

1. *Card. obscura* Gravh., sehr gemein unter faulenden Pflanzenstoffen, so daß sich hier die Aufzählung der einzelnen Belege erübrigt.

Astilbus Steph.

1. *Astilb. canaliculatus* F., sehr häufig; nähere Fundortsangaben auch hier überflüssig.

Bolitocharini

Autalia Mnnh.

1. *Autal. impressa* Oliv., nicht häufig. 2 Hauptsmoorwald X. 28 u. XI. 31; 12 Bischberg XI. 28; 4 Hallstadt XI. 28; 3 Staffelbach 22. X. 41 (in Pilzen); 1 Bamberg (S. v. Haupt).
var. (nova) obscura Wendeler (Typus!). 1 Hallstadt XI. 28.
2. *Autal. rivularis* Gravh., ziemlich selten. 1 Drügendorf V. 28; 1 Bamberg (S. v. Haupt).

Bolitochara Mnnh.

1. *Bolitoch. lucida* Gravh., selten. 3 ♂ Hirschaid VIII. 27.
2. *Botitoch. lunulata* Payk., häufig. 1 Bug I. 26; 5 Hauptsmoorwald X. 26, II. 36 u. IX. 38; 3 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 26; 4 Staffelbach 22. X. 41.
3. *Bolitoch. bella* Märk., sehr selten; vorwiegend in West- und Südeuropa verbreitet. 1 ♂ Appendorf 25. X. 37.

Silusa Erichs.

1. *Silus. (Stenusa) rubra* Er., sehr selten. 2 Bamberg (S. v. Haupt).

Leptusa Kraatz.

1. *Leptus. fumida* Er., ziemlich selten. 1 Zeckendorf IV. 29; 3 Teuschnitz (Frankenwald, (S. Pf. Glaser).
2. *Leptus. (Pachygluta) ruficollis* Er., nicht selten; unter schimmelnden Rinden. 3 ♂ 1 ♀ Reckendorf III. 26; 1 Stegaurach II. 27; 9 Ebelsbach II. 29; 12 Ebern 10. XI. 41.

Homalota Mnnh.

1. *Homal. plana* Gyll., ziemlich selten; unter Rinde. 1 Zeyern XI. 27.

Anomognathus Gem. Har. (Thectura Thoms.).

1. *Anom. cuspidata* Er., nicht selten. 1 Kreuzberg II. 26; 1 Ebern 10. XI. 41; 1 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43; 1 Pettstadt 8. V. 43.

Gyrophæna Mnnh.

1. *Gyroph. pulchella* Heer, selten; 1 Ebern 24. VII. 41.
2. *Gyroph. affinis* Sahlbg., nicht selten; die Arten dieser Gattung leben besonders an Pilzen und Baumschwämmen. 1 Hirschaid VII. 27; 2 Strullendorf 6. II. 35.
3. *Gyroph. nana* Payk., nicht selten. 1 Berneck i. Fichtelgebirge (S. v. Haupt); 20 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43; 1 Ebern 10. XI. 41.

4. *Gyroph. laevipennis* Kr., selten. 1 Kreuzberg II. 30.
5. *Gyroph. strictula* Er., nicht selten. 8 Ebern 22. VII. 41 (det. L. Benick).

Brachida Rey.

1. *Brach. exigua* Heer., vereinzelt und sehr selten. 1 Hallstadt I. 26; 1 Staffelbach XI. 27 (det. Hüther).

Oligotini

Oligota Mnnh.

1. *Olig. atomaria* Er., sehr selten; mehr süd- und westeuropäische Art. 1 Staffelbach I. 26 (Maingeniste).

Hygronomini

Hygronoma Erichs.

1. *Hygron. dimidiata* Gravh., nicht häufig; an Wasserrändern. 1 Oberhaid V. 27; 3 Strullendorf VI. 27 u. IV. 28; 1 Willersdorf VI. 28; 1 Staffelbach III. 29; 5 Stegaurach III. 30; 7 Forchheim IV. 31.

Myllaenini

Myllaena Erichs.

1. *Myllaen. dubia* Gravh., nicht häufig. 1 Zeyern bei Kronach XI. 27; 1 Hirschaid 10. IV. 35.
2. *Myllaen. minuta* Gravh., nicht häufig. 1 Strullendorf XII. 25.
3. *Myllaen. intermedia* Er., häufig; unter nassem Laub und Moos. 1 Staffelbach I. 25; 1 Willersdorf VI. 25; 3 Stegaurach XI. 26; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 26; 3 Hauptsmoorwald V. 27; 1 Willersdorf VI. 28.

B. Phloeocharinae

Phloeocharis Mnnh.

1. *Phloeoch. subtilissima* Mnnh., nicht selten; unter Rinden. 30 Kreuzberg II. 25; 20 Ebelsbach II. 26; 15 Strullendorf III. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt); 10 Ebern 10. XI. 41; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43; 1 Staffelstein 9. III. 43.

C. Tachyporinae

Hypocypptini

Hypocypptus Mnnh.

1. *Hyp. longicornis* Payk., nicht selten. 1 Staffelbach I. 26; 4 Hauptsmoorwald I. 26; 2 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 2 Oberhaid II. 28; 1 Strullendorf I. 27; 5 Kreuzberg II. 24 u. XI. 27; 1 Scheßlitz II. 24; 3 Hallstadt XI. 25; 3 Bamberg (S. v. Haupt); 5 Reckendorf III. 26; 1 Hirschaid V. 27.

Tachyporini

Conosoma Kraatz (Conurus Steph.)

1. *Conos. bipunctatum* Gravh., ziemlich selten. 1 Kreuzberg I. 26; 3 Strullendorf V. 26 u. III. 29; 1 Scheßlitz V. 27; 1 Bamberg (Altenburg) V. 29; 1 Zeyern XI. 27.

2. *Conos. bipustulatum* Gravh., sehr selten; Mitteleuropa. 1 Zeyern b. Kronach XI. 27 (Rodachgeniste); 1 Bamberg (Altenburg) IV. 27 (vermutlich bei *Lasius niger*); 2 Strullendorf III. 29.
3. *Conos. littoreum* L., nicht häufig. 3 Hauptsmoorwald V. 28; (1 Amerbach b. Wemding i. Ries. 1. VI. 39).
4. *Conos. pubescens* Steph., häufig. 3 Bug III. 24; 10 Bamberg (Hain) V. 24 u. 23. II. 43; 3 Strullendorf V. 26; 1 Staffelbach XI. 26; 10 Scheßlitz IV. 27 u. 6. VIII. 35; 6 Hirschaid IV. u. VII. 27 u. V. 33; 2 Zeyern XI. 27.
5. *Conos. immaculatum* Steph., ziemlich selten. 1 Hauptsmoorwald XI. 26; 1 Sambach IV. 27; 1 Stettfeld XI. 27; 2 Ebelsbach II. 29.
6. *Conos. pedicularium* Gravh., nicht selten. 1 Bug III. 24; 1 Seehof XI. 26; 1 Giech XI. 26; 14 Seehof XI. 27; 1 Oberhaid II. 27; 1 Bughof I. 28; 1 Oberhaid V. 28; 1 Bamberg (Hain) 15. XII. 43.

Tachyporus Gravh.

1. *Tachyp. obtusus* L., nicht selten. 1 Bug VIII. 24; 5 Staffelbach I. 25 u. IV. 26; 1 Seehof II. 26; 1 Oberhaid II. 26; 4 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Stegaurach II. 28; 1 Gaustadt XI. 28; 1 Zeckendorf IV. 28; 3 Scheßlitz III. 29; 1 Stettfeld III. 29; 3 Hauptsmoorwald III. 29 u. II. 36.
2. *Tachyp. formosus* Matth., selten; mehr west- u. südeuropäische Art. 1 Kreuzberg II. 26; 30 Bug, Staffelbach (Maingeniste), Giech, Scheßlitz, II., III. u. XI. 26 u. 27; zumeist aus Geniste erbeutet.
3. *Tachyp. abdominalis* F., nicht häufig. 1 Bughof I. 26; 1 Oberhaid II. 27; 2 Zeckendorf IV. 27; 4 Staffelbach XI. 27; 4 Bamberg (Hain) III. 29 u. 28. III. 48; 1 Zapfendorf II. 30; 2 Strullendorf III. 31 u. 6. II. 35; 1 Rattelsdorf 10. XII. 34.
4. *Tachyp. solutus* Er., nicht häufig. 1 Seehof II. 26; 1 Stegaurach XI. 26; 1 Tiefenellern IV. 27; 2 Strullendorf V. 27; 2 Saltendorf IV. 28; 1 Hauptsmoorwald X. 28; 1 Staffelbach III. 29; 1 Appendorf 25. X. 37.
5. *Tachyp. chrysomelinus* L., sehr häufig. 6 Bug III. 24 u. I. 26; 3 Kreuzberg XI. 24; 5 Staffelbach III. 25; 4 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 25; 30 Bug, Kreuzberg Hallstadt, Ebing, Zapfendorf, Giech, Scheßlitz, Zeyern II., III. u. XI. 26 u. 27; 5 Hirschaid III. 28; 8 Strullendorf III. 28; 1 Oberhaid IV. 29.
6. *Tachyp. ruficollis* Gravh., nicht häufig; mehr Gebirgstier. 8 Kreuzberg II. u. XI. 26; 2 Hauptsmoorwald IV. 26; 1 Pettstadt IV. 27; 2 Scheßlitz V. 27; 1 Hollfeld (S. Pf. Glaser).
7. *Tachyp. atriceps* Steph., nicht selten. 1 Bug I. 24; 7 Hallstadt I. 24; 4 Kreuzberg II. 28; 3 Hauptsmoorwald XII. 25; 4 Bamberg (Michelsberger Wald) IV. u. IX. 27; 2 Ebing VI. 27; 1 Seehof II. 28; 2 Zeckendorf IV. 28; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33.
8. *Tachyp. transversalis* Gravh., nicht selten; an nassen, besonders moorigen Örtlichkeiten. 3 Bughof I. 27; 10 Seehof II. 27; 9 Sambach IV. 26; 2 Rattelsdorf III. 26; 5 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 26; 2 Strullendorf XII. 26; 12 Stegaurach II. u. XI. 27; 5 Oberhaid II. 28.
9. *Tachyp. hypnorum* F., sehr häufig. 10 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 24; 15 Staffelbach XI. 24; 4 Hauptsmoorwald III. 27; 30 Bug, Ebing, Giech, Staf-

- felbach II., III. u. XI. 26 u. 27; 5 Hirschaid III. 28; 4 Strullendorf IV. 28; 1 Tiefenellern IV. 28.
10. *Tachyp. pusillus* Gravh., nicht selten. 12 Bug I. 24 u. 26; 8 Staffelbach III. 25; 6 Reckendorf IV. 26; 30 Staffelbach, Seehof, Ebing, Zapfendorf, Giech, Zeyern, Bischberg, I., III. u. XI. 26 u. 27; 3 Hirschaid III. 27; 2 Rattelsdorf XII. 34; 1 Strullendorf II. 35.
 11. *Tachyp. macropterus* Steph., nicht häufig. 5 Staffelbach XI. 25; 2 Seehof II. 26; 2 Scheßlitz XI. 26; 1 Stettfeld XI. 27; 1 Hauptsmoorwald XI. 27; 2 Strullendorf III. 29.
 12. *Tachyp. nitidulus* F., sehr häufig. 5 Bug, Hallstadt, Hauptsmoorwald I. u. III. 24; 40 Staffelbach, Kreuzberg, Ebing, Zapfendorf, Seehof, Giech, Scheßlitz, Stegaurach I., III. u. XI. 26; 10 Strullendorf und Zeyern XI. 27.

Tachinus Grayh.

1. *Tachin. flavipes* F., nicht selten. 2 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 24; 9 Hauptsmoorwald IX. 24; 7 ♀ 1 ♂ Drügendorf X. 27; 1 Strullendorf V. 29; 9 Oberhaid 4. VI. 41 (an totem Reh); 1 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Tachin. rufipennis* Gyll., sehr selten; unter Laub oder Rinden. 1 Scheßlitz Grumbacher Holz) III. 24 (unter Rinden).
3. *Tachin. humeralis* Gravh. selten. 7 Bischberg X. 27.
4. *Tachin. bipustulatus* F., selten. 2 Bamberg (S. v. Haupt).
5. *Tachin. proximus* Kr., selten, vorwiegend montane Art. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
6. *Tachin. pallipes* Gravh., nicht häufig. 1 ♀ Viereth VI. 28; 1 Oberhaid 4. VI. 41.
7. *Tachin. rufipes* Deg., häufig. 1 Hauptsmoorwald VI. 26; 1 ♀ Oberhaid II. 26; 2 ♀ Gaustadt V. 27; 1 ♀ Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 20 Drügendorf V. 28; 1 Staffelbach VI. 28; 2 Stettfeld VI. 29; 2 Forchheim 20. VII. 42; 1 Berneck i. Fichtelgeb. (S. v. Haupt).
8. *Tachin. subterraneus* L., sehr selten. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Kreuzberg bei Hallstadt 16. IV. 39.
9. *Tachin. fimetarius* Gravh. nicht selten. 1 ♂ 1 ♀ Trebgast VI. 27; 1 Kastl b. Amberg XI. 27; 5 Bamberg (S. v. Haupt).
10. *Tachin. laticollis* F., selten. 2 Hauptsmoorwald V. 28; 1 Berneck (Fichtelgeb., S. v. Haupt).
11. *Tachin. marginellus* F., hier recht selten. 1 Bamberg (Altenburg) V. 26; 1 Ebing II. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 28.
12. *Tachin. collaris* Gravh. (*corticinus* Gravh.), häufig. 5 Bug III. 24 u. I. 26; 30 Staffelbach, Ebing, Zapfendorf, Giech, Scheßlitz II., III., IV. u. XI. 26; 2 ♂ Oberhaid II. 27; 20 Staffelbach III. 29; 2 Strullendorf II. 38; 1 Rattelsdorf XII. 35; 1 Bamberg (Hain) 15. II. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt).

Habrocerus Erichs.

1. *Habroc. capillaricornis* Gravh., nicht häufig. 3 Ebelsbach V. 28; 2 Bamberg (S. v. Haupt).

Bolitobiini

Mycetoporus Mnnh.

1. *Mycetop. splendidus* Gravh., nicht selten. 1 Bug III. 24; 4 Staffelbach XI. 25; 2 Giech XI. 26; 2 Hirschaid III. 27 u. IV. 36; 5 Oberhaid IV. 27; 1 Stegaurach VI. 27; 6 Zeyern b. Kronach XI. 27; 2 Hauptsmoorwald VI. 28 u. 36; 2 Strullendorf III. 30.
2. *Mycetop. (Ischnosoma) brunneus* Mrsh., nicht häufig. 1 Staffelbach I. 26; 1 Bamberg (Altenburg) IV. 26; 1 Pettstadt I. 27; 1 Oberhaid V. 28; 5 Strullendorf III. 30 u. 37 u. 9. II. 41; 1 Giech III. 30; 1 Hirschaid 10. IV. 35; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Mycetop. longulus* Mnnh., nicht häufig. 1 Staffelbach XI. 26; 2 Bruckertshof II. 27 u. VII. 33; 2 Oberhaid V. 28; 2 Strullendorf III. 33; 1 Rattelsdorf VI. 33; 1 Willersdorf 10. IX. 36; 1 Giech III. 31.
4. *Mycetop. punctus* Gyll., sehr selten. 1 Berneck (Fichtelgeb., S. v. Haupt).
5. *Mycetop. rufescens* Steph., sehr selten. 2 Hauptsmoorwald 3. II. 36.
6. *Mycetop. Baudueri* Rey., recht selten hier. 1 Hirschaid IV. 27; 1 Strullendorf 6. II. 35.
7. *Mycetop. splendens* Mrsh., nicht häufig. 1 Bug III. 24; 3 Staffelbach I. 25 u. III. 29; 1 Hirschaid IV. 27.
8. *Mycetop. forticornis* Fvl., selten. 1 Bug I. 26; 2 Oberhaid V. 27; 1 Hauptsmoorwald V. 27; 3 Strullendorf V. 28 u. III. 30; 1 Staffelbach III. 30.
9. *Mycetop. clavicornis* Steph., selten. 1 Bug I. 26; 1 Ebing II. 27; 1 Zeyern XI. 27; 2 Hauptsmoorwald XI. 26; 3 Sambach IV. 27; 2. Hirschaid XII. 27; 1 Hallstadt 6. XI. 33.

Bryocharis Boisd.

1. *Bryoch. analis* Payk., selten. 3 Staffelbach III. 24 u. XI. 28; 1 Bug IV. 24; 1 Bamberg (Hochschulgarten) 24. XII. 42.

Bolitobius Steph.

1. *Bolitob. lunulatus* L., häufig. 3 Scheßlitz V. 26 u. XI. 28; 1 Sambach IV. 27; 7 Hirschaid VIII. 27; 1 Pettstadt IV. 29; 7 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 29; 2 Staffelbach 22. X. 41; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Bolitob. (Lordithon) trinotatus* Er., nicht selten. 3 Scheßlitz III. 27; 1 Kreuzberg II. 28.
3. *Bolitob. (Lordithon) exoletus* Er., nicht selten. 4 Bamberg (Michelsberger Wald) X. 26 u. IX. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
4. *Bolitob. (Lordithon) thoracicus* F., nicht selten. 7 Ebrach IX. 25; 1 Hauptsmoorwald IV. 25; 1 Hallstadt I. 26; 20 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 26; 2 Kreuzberg II. 27; 12 Hirschaid VIII. 27; 3 Oberhaid V. 28; 1 Strullendorf III. 30; 4 Stettfeld 25. X. 37; 1 Ebern 10. XI. 41.
v. *biguttatus* Steph. 15 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27.

D. Staphylininae

Quediini

Euryporus Erichs.

1. *Euryp. picipes* Payk., sehr selten. 1 ♂ Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Scheßlitz XI. 28.

Acylophorus Nordmann.

1. *Acyl. Wagenschieberi* Kiesw., sehr sporadisch u. selten, auf Moorhaiden, nord- und mitteleurop. Art. 1 Frankenwald (um Teuschnitz, S. Pf. Glaser).

Heterothops Steph.

1. *Het. praeivus* Er., nicht häufig; unter dürrer Laub und Stroh. 5 Bamberg (Hain) V. 24; 1 Ebelsbach II. 27; 1 Strullendorf 6. II. 33; 1 Rattelsdorf 10. XII. 34.
2. *Het. niger* Kr., ziemlich selten; mit Vorliebe in Maulwurfsnestern. 1 Stegaurach XI. 27; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
3. *Het. dissimilis* Gravh., nicht häufig. 2 Bug III. 24; 2 ♀ 1 ♂ Bughof I. 27; 1. Bamberg (S. v. Haupt).
4. *Het. quadripunctulus* Gravh., selten; vorwiegend in West- und Südeuropa. 1 Bug III. 24; 2 Staffelbach IV. 27; 2 Zeyern XI. 27; 1 Strullendorf 6. II. 35.

Quedius Steph.

1. *Qued. (Ediquus) microps* Gravh., selten, im Mulm hohler Bäume, manchmal bei Ameisen. 1 Strullendorf III. 29.
2. *Qued. (Microsaurus) brevis* Er., nicht häufig; bei Ameisen. 2 ♀ Hauptsmoorwald XI. 27; 4 Bamberg (Altenburg bei Lasius niger) V. 28; 1 Hallstadt 6. XI. 33.
3. *Qued. (Micros.) lateralis* Gravh., sehr selten; in Pilzen. 1 Hauptsmoorwald IV. 29.
4. *Qued. (Micros.) scitus* Grav., recht selten. 1 Oberau b. Staffelstein (Auwald) 9. III. 43 (det. L. Benick).
5. *Qued. (Micros.) xanthopus* Er., ziemlich selten. 1 Bamberg (Hain) VII. 25; 1 Hauptsmoorwald XII. 25; 1 Bamberg (Altenburg) V. 27; 1 Scheßlitz V. 27; 1 Kreuzberg I. 28; 1 Kastl. b. Amberg, Oberpf., X. 27; 1 Fränk. Schweiz (S. Pf. Glaser).
6. *Qued. (Micros.) mesomelinus* Mrsh., nicht häufig; besonders in Kellern. 4 Bamberg (Hain) V. 24. u. 23. II. 43; 1 Hauptsmoorwald XII. 25; 1 Rattelsdorf 10. XII. 34 (unter Laub auf einer Kopfweide); 1 Bamberg (S. v. Haupt.); (1 Amerbach b. Wemding i. Ries. 13. X. 38; unter Fanggürteln an Obstbäumen).
7. *Qued. maurus* Sahlb., sehr selten. 1 Bamberg (Altenburg) V. 29.
8. *Qued. ochripennis* Mén., selten. 1 Ebelsbach 3. II. 37; 1 Bamberg (S. v. Haupt); (1 Amerbach b. Wemding i. Ries. 13. X. 38, unter Fanggürteln an Obstbäumen).

9. *Qued. (Micros.) fulgidus* F., selten. 1 Hallstadt XI. 27; 3 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
10. *Qued. (Quedionuchus) cinctus* Payk., nicht selten; doch erst wenig gefangen. 1 Drügendorf X. 27; 1 ♀ Stettfeld VI. 28; (3 Frankenwald um 1890, S. Pf. Glaser).
11. *Qued. punctatellus* Heer., sehr sporadisch und sehr selten, montane Art, nach Reitter vorwiegend alpin, von Gerhardt aus den mährischen und böhmischen Mittelgebirgen angegeben; 2 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
12. *Qued. laevigatus* Gyll., sehr selten, montane Art; 3 Frankenwald um Teuschnitz um 1890 (S. Pf. Glaser).
13. *Qued. fuliginosus* Gravh., häufig. 1 Ebing II. 24; 1 ♂ Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 26; 3 ♀ Willersdorf VII. 27., 1 ♂ Stettfeld XII. 27; 1 ♀ Zentbechhofen V. 27; 1 ♀ Friesen IV. 28; 3 ♀ 2 ♂ Hauptsmoorwald V. 28; 2 Oberhaid V. 28; 1 Zeyern b. Kronach XI. 28; 1 Giech III. 29; 1 Strullendorf III. 29; 2 Seehof 14. V. 35; 1 Ebrach 8. VIII. 36.
14. *Qued. picipennis* Payk. var. *molochinus* Gravh., recht selten hier. 1 Bug XII. 24; 1 ♀ 1 ♂ Strullendorf IV. u. VI. 27; 2 Forchheim 8. VIII. 42.
15. *Qued. (Quedius) unicolor* Kiesw., sehr selten, boreomontane Art. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
16. *Qued. (Sauridus) picipes* Mnnh., selten. 1 Bug I. 26; 3 Staffelbach I. 26; 1 Zapfendorf II. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27 (zumeist aus Geniste erbeutet).
17. *Qued. (Sauridus) ochropterus* Er., sehr selten; mehr Gebirgstier. 2 ♀ Oberhaid V. 28; 2 Hauptsmoorwald V. 28; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
18. *Qued. (Sauridus) umbrinus* Er., nicht häufig. 1 ♀ Stegaurach V. 27; 4 ♀ Zentbechhofen V. 27.
19. *Qued. dubius* Heer. ssp. *fimbriatus* Er., sehr lokal und selten; montane Art. 2 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
20. *Qued. (Sauridus) nigriceps* Kr., sehr selten; mehr Westeuropa. 1 Hauptsmoorwald XI. 27.
21. *Qued. (Sauridus) nemoralis* Boud. (*obliteratus* Er.), sehr selten. 4 ♀ 3 ♂ Drügendorf X. 27; 2 Stettfeld 25. I. 37.
22. *Qued. (Raphirus) cincticollis* Kr., sehr selten; montane Art. 1 Stübig VI. 29 (det. Wendeler); 1 Appendorf 28. VII. 37 (det. Engert).
23. *Qued. (Raphirus) rufipes* Gravh., sehr selten und sporadisch, mehr süd- und südwesteuropäische Art. 1 Scheßlitz (Grumbacher Holz) XI. 29.
24. *Qued. (Raphirus) paradisianus* Heer., sehr selten; Gebirgstier. 2 Hauptsmoorwald IV. 26 u. V. 28 (det. Dr. Fuchs u. Wendeler); auch aus der Rhön bekannt.
25. *Qued. (Raphirus) attenuatus* Gyll., nicht gerade selten. 1 Bug I. 26; 1 ♀ Stegaurach II. 27; 10 Staffelbach XI. 27 (Maingeniste); 15 Zeyern b. Kronach XI. 27; 2 Giech III. 29; 12 Strullendorf IV. 29 u. II. 35; 6 Rattelsdorf 27. V. 33 (Itzgeniste); 1 Dörfleins b. Hallstadt III. 35; 1 Hallstadt VI. 35.

26. *Qued. (Raphirus) fulvicollis* Steph., sehr selten; mehr Gebirgstier. 1 ♂ Oberhaid V. 28; 1 Strullendorf IV. 29.
27. *Qued. (Raphirus) boops* Gravh., häufig. 2 Ebing II. 24; 2 Bug III. 24; 9 Staffebach XI. 26 u. I. 27; 2 Zeyern b. Kronach XI. 27.; 20 Hirschaid III. 27; 7 Strullendorf XII. 27 u. IV. 28; 1 Giech XII. 27; 11 Oberhaid IV. 27 u. V. 28; 2 Hallstadt (Bürstig) XI. 33; 1 Appendorf X. 37.
28. *Qued. maurorufus* Grav., sehr selten u. sporadisch. 1 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
29. *Qued. (Raphirus) humeralis* Steph., lokal u. selten. 1 Oberhaid V. 40; 1 Oberau b. Staffelstein 9. VII. 41.

Staphylinini

Creophilus Mnnh.

1. *Creoph. maxillosus* L., häufig, an Aas. 1 Strullendorf V. 25; 1 Oberhaid V. 28; 1 Pettstadt V. 29; 10 Hauptsmoorwald IX. 29; 1 Kreuzberg VI. 32; 4 Unterhaid VIII. 37.

Emus Curtis.

1. *Emus hirtus* L., sehr selten; südl. Art; soll bei uns nach Horion nicht beständig sein, sondern jeweils aus dem Süden zuwandern. 1 Strullendorf V. 23 (an Aas); 1 Hallerndorf VI. 26; 1 Münnerstadt (Unterfr.) VIII. 26 (unter Kuhdung); 1 Strullendorf 8. V. 43, an faulen Rüben an einer Miete auf Sand.

Ontholestes Ganglb.

1. *Onthol. tessellatus* Geoffr. (*nebulosus* F.), nicht selten. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) X. 24; 1 ♂ Zeckendorf IV. 27; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Onthol. murinus* L., häufig. 2 Bamberg IX. 24; 3 Strullendorf IV. 27; 8. Hirschaid VI. 31; 1 Kreuzberg VIII. 31; 1 Scheßlitz XI. 31; 1 Drügendorf VI. 33; 4 Bamberg (S. v. Haupt).

Staphylinus Lin.

1. *Staphyl. (Trichoderma) pubescens* Deg., nicht häufig. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 24; 1 ♀ Oberhaid VII. 28; 1 ♀ Hauptsmoorwald VII. 29; 4 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Staphyl. (Parabemus) fossor* Scop., nicht häufig. 2 ♂ Friesen IV. 27; 1 ♂ Berneck i. Fichtelgeb. VI. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt); (1 Amerbach b. Wemding i. Ries X. 25).
3. *Staphyl. (Platydracus) stercorarius* Oliv., nicht selten. 2 Dörfleins VIII. 25; 1 Viereth IX. 27; 1 Sassendorf VII. 36; 1 Rattelsdorf VII. 33; 2 Hauptsmoorwald IV. 38 u. 13. IX. 38; 4 Bamberg (S. v. Haupt); (1 Amerbach b. Wemding i. Ries IX. 31).
4. *Staphyl. caesareus* Cederh., häufig. 3 Unterhaid V. 25; 1 Stübzig V. 26; 1 Gaustadt V. 27; 1 Zentbechhofen V. 27; 1 ♀ Tiefenellern IV. 28; 4 Kreuzberg V. 28 u. VII. 32; 1 ♀ Drügendorf VIII. 28; 1 Pottenstein XI. 30; 1 Unterleiterbach VI. 32; 1 Rattelsdorf VI. 33.
5. *Staphyl. parumtomentosus* Stein, ziemlich selten hier anscheinend; erst wenig gefangen. 24 Rattelsdorf 27. VI. 34 (Itzgeniste bei Sommerhochwasser).

6. *Staphyl. erythropterus* L., selten; Süd- u. Mitteleuropa; mehr montan. 3 Rattelsdorf 27. VI. 34 (Geniste der Itz bei Sommerhochwasser); 1 Berneck i. Fichtelgeb. (S. v. Haupt).
7. *Staphyl. (Pseudocypus) fuscatus* Gravh., nicht häufig. 2 ♀ Staffelbach XI. 27; 1 ♀ Zeyern b. Kronach XI. 27; 1 ♂ Ebing II. 28; 6 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste bei Sommerhochwasser).
8. *Staphyl. (Pseudocyp.) picipennis* F., nicht häufig. 1 Bamberg X. 24; 1 Drügendorf X. 27; 1 Ebelsbach V. 31; 1 ♀ Staffelbach XI. 31; 1 Drügendorf X. 32; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
9. *Staphyl. (Pseudocyp.) aeneocephalus* Deg., nicht häufig. 2 Staffelbach XII. 24 u. XI. 27; 2 ♀ Zeyern b. Kronach XI. 27 (Rodachgeniste); 1 Rattelsdorf 10. VII. 34; (1 Kastl b. Amberg X. 26).
10. *Staphyl. (Pseudocyp.) fulvipennis* Er., sehr selten; mehr montane oder boreo-montane Art. 8 Drügendorf VIII. 27 u. X. 32; 1 Pettstadt XI. 31; 1 Ebelsbach III. 36; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
11. *Staphyl. (Pseudocyp.) brunnipes* F., selten; Gebirgstier. 1 Tiefenellern IV. 28; 1 Stegaurach III. 30; 2 Drügendorf III. 31 u. X. 32; 1 Staffelberg 9. IV. 36; 1 Appendorf 25. X. 37; 5 Bamberg (S. v. Haupt); 3 Sanspareil b. Hollfeld (S. Pf. Glaser).
12. *Staphyl. (Goërius) olens* Vill., hier anscheinend selten. ab. *curtipennis* Motsch. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
14. *Staphyl. (Goërius) tenebricosus* Gravh., sehr selten; montane Art. 1 Zeegendorf 19. V. 32; 2. Hauptsmoorwald VI. 31 (det. Wendeler).
15. *Staphyl. (Goërius) similis* F., häufig. 4 Staffelbach III. 24 u. XI. 27; 2 Friesen IX. 24 u. V. 27; 2 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 24; 28 Drügendorf XI. 27; III. 31 u. X. 32; 1 ♂ 2 ♀ Zeckendorf IV. 27; 8 Hegnabrunn b. Kulmbach V. 27; 2 ♀ Staffelberg XI. 28 u. IX. 32; 1 Stettfeld IV. 30; 1 Kreuzberg 27. VII. 32; 1 Zeegendorf III. 35; 1 Ebelsbach III. 35; 1 Eltmann VI. 35; 1 Hohenpözl VII. 35; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
17. *Staphyl. macrocephalus* Grav., sehr sporadisch u. selten, montane Art der mährischen, böhmischen, aber auch deutschen Mittelgebirge; 2 Frankenwald um Teuschnitz um 1890 (S. Pf. Glaser).
18. *Staphyl. alpestris* Er., nach Reitter alpin, nach Gerhardt aber auch in den böhmischen und mährischen Mittelgebirgen, bis 1300 m dort allerdings sehr selten; 2 Frankenwald (S. Pf. Glaser; das Vorkommen im Frankenwalde wäre aber wohl möglich).
19. *Staphyl. (Ocypus) globulifer* Geoffr., selten. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 24; 1 Zeil a. M. IX. 26; 1 Tiefenellern V. 33; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33; 1 Schmölz b. Kronach 6. VIII. 36; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
20. *Staphyl. (Ocypus) compressus* Mrsh. (*fulvipes* Motsch.), sehr selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt); 6 Fränkische Schweiz um 1890 (S. Pf. Glaser).
21. *Staphyl. (Tasgius) pedator* Grav., sehr selten, in Süd- u. Mitteldeutschland, hier wahrscheinlich thermophile Art, 1 Bamberg (S. v. Haupt).

22. *Staphyl. (Tasgius) ater* Grav., sehr selten; mehr südeuropäische Art. 1 Ratelsdorf 27. VI. 33 (Geniste def Itz bei Sommerhochwasser).
23. *Staphyl. flavopunctatus* Latr., Südeuropa und südliches Mitteleuropa bis Elsaß und Wien; Reitter gibt Hamburg an. 2 Hollfeld (ob. Wiesenttal, Fränk. Schweiz) um 1890 (S. Pf. Glaser).

Actobius Fauv.

1. *Actob. cinerascens* Gravh. nicht gerade selten; an Wasserrändern. 6 Stegaurach XI. 26 u. III. u. XI. 31; 1 Staffebach I. 29; 3 Hauptsmoorwald VIII. 31; 1 Pottenstein XI. 31; 3 Dörfleins b. Hallstadt 8. V. 32.

Neobisnius Ganglb.

1. *Neob. procerulus* Grav., nicht selten, doch von mir noch nicht gefangen. 1 Teuschnitz (Frankenwald, S. Pf. Glaser).

Philonthus Curtis.

1. *Phil. splendens* F., selten. 4 Bamberg (S. v. Haupt); von mir noch nicht gefangen; 3 Frankenwald, Sammlung Pfarrer Glaser.
2. *Phil. intermedius* Boisd., selten. 1 ♂ 2 ♀ Viereth VI. 28.
3. *Phil. laminatus* Creutz., nicht häufig. 1 ♀ Bughof VIII. 26; 1 ♂ Stettfeld VII. 27.
Phil. montivagus Heer. 2 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser), sehr selten, montane Art der Beskiden, Sudeten u. Riesengeb.)
4. *Phil. laevicollis* Boisd., selten, Gebirgstier. 1 Kreuzberg (Landsweide am Semberg) I. 27 (det. Wendeler); 4 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser); 1 Bamberg, Dr. Funk leg. (im Deutsch. Entom. Inst. Berlin-Dahlem nach Mitt. Horions).
5. *Phil. politus* L. (*aeneus* Rossi), häufig. 10 Hauptsmoorwald IX. 24; 2 Kreuzberg II. 26; 1 Pettstadt V. 27; 1 ♀ Stegaurach VI. 27; 1 ♀ Bruckertshof VI. 27; 8 Strullendorf V. 29; 2 Bischberg X. 29; 1 Hallstadt 24. V. 33; 7 Oberhaid 4. VI. 41; 4 Forchheim 29. VII. 42.
6. *Phil. atratus* Gravh., nicht selten. 1 Bayreuth V. 25; 3 Gaustadt V. 26; 1 Stegaurach V. 27; 2 Bamberg (Michelsberger Wald) XII. 27; 1 Willersdorf VII. 28; 1 Bughof VIII. 28; 30 Pettstadt V. 29; 2 Ebelsbach VIII. 29; 3 Staffelfeld VIII. 29.
7. *Phil. nitidus* F., sehr selten. 2 ♂ Stettfeld VI. 29; 1 ♂ Stübzig VI. 29; 1 Bruckertshof 7. VII. 33; 1 Ziegelanger bei Zeil a. M. 10. VI. 40; 1 Hirschaid 5. VIII. 40.
8. *Phil. carbonarius* Gyll., nicht selten. 1 Willersdorf VII. 27; 1 Strullendorf IX. 27; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 23; 1 Steinbach bei Zeil a. M. 31. VII. 42.
9. *Phil. temporalis* Rey., sehr selten; montane Art, 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 24; 1 Tiefenpözl um 1890 (S. Pf. Glaser).
10. *Phil. umbratilis* Gravh., nicht häufig. 1 Kreuzberg 2. V. 33.

11. *Phil. fimetarius* Gravh., ziemlich häufig. 1 ♀ Hirschaid V. 27; 2 ♀ 2 ♂ Saltendorf IX. 28; 1 ♀ Pettstadt V. 28; 1 ♀ Hauptsmoorwald VI. 28; 1 Giech III. 29; 1 Bamberg (Altenburg) V. 29.
12. *Phil. decorus* Gravh., nicht selten. 5 Bug III. 25; 2 ♂ 2 ♀ Hauptsmoorwald VI. 28; 1 ♀ Oberhaid V. 28; 1 Bamberg (Hain) I. 29; 1 ♂ Hirschaid IX. 30.
13. *Phil. sordidus* Gravh., nicht häufig. 1 Bug III. 24.
14. *Phil. fuscipennis* Mnnh., nicht selten. 5 Staffelbach III. 24 u. 29; 5 Hauptsmoorwald III. 25 u. II. 33; 15 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 27 u. XI. 28; 1 Reckendorf III. 27; 1 Sambach IV. 27; 4 Kreuzberg II. 28; 2 Rattelsdorf VI. 33; 2 Appendorf 28. X. 37; 1 Oberhaid 4. VI. 37; 1 Kümmerseuth 27. VI. 37; 1 Stettfeld 28. X. 37.
15. *Phil. Mannerheimi* Fauv., nicht selten. 4 Hauptsmoorwald I. 24 u. XI. 26; 2 Reckendorf III. 26; 2 Sambach IV. 27; 1 Zentbechhofen V. 27; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 ♂ Friesen IV. 28; 1 ♀ Hauptsmoorwald V. 28; 1 ♀ Zeckendorf IV. 28; 1 ♂ Drügendorf V. 27; 1 Strullendorf III. 29; 2 Rattelsdorf VI. 33; 1 Hirschaid IV. 33.
16. *Phil. varius* Gyll., häufig. 2 Kreuzberg II. 26; 1 ♀ 1 ♂ Zeckendorf IV. 27; 2 ♀ 1 ♂ Sambach IV. 27; 1 ♂ Viereth VI. 27; 1 ♀ Friesen IV. 27; 1 ♀ Strullendorf VIII. 27; 40 Staffelbach, Ebing, Zapfendorf, Giech, Zeyern b. Kronach II., IV. u. XI. 27 u. 28; 8 Rattelsdorf 27. VI. 33; 2 Appendorf X. 37.
ab. bimaculatus Gravh. 1 Ebing II. 27.
17. *Phil. frigidus* Kies., sehr sporadisch u. selten; montane Art. 2 Oberhaid 4. VI. 41; 1 Tiefenpözl (Fränk. Schweiz) um 1890 u. 3 Teuschnitz i. Frankensteinwald (S. Pf. Glaser).
18. *Phil. lepidus* Gravh., ziemlich selten. 8 Staffelbach III. u. XI. 27 u. III. 29; 1 Bug III. 25; 3 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 25; 1 Gundelsheim IV. 26; 1 ♀ Strullendorf IV. 28; (1 Kastl b. Amberg, Opf., X. 26).
19. *Phil. nitidulus* Gravh., sehr selten. 3 ♀ 4 ♂ Strullendorf V. 28 u. IV. 29; 1 Hallstadt (Börstig) 3. V. 33; 1 Bamberg (S. v. Haupt, um 1900).
20. *Phil. albipes* Gravh., selten. 7 Bug III. 24; 2 Hallstadt IX. 27; 1 Zeyern XI. 26 (Rodachgeniste); 1 Oberhaid V. 29.
21. *Phil. immundus* Gyll., nicht selten. 5 Staffelbach XI. 25 u. IV. 27; 1 Ebing II. 26; 1 Seehof II. 26; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XII. 27; 1 ♀ Friesen IV. 27; 1 ♂ Strullendorf IV. 28; 3 Hallstadt (Börstig) XI. 33; 1 Forchheim 22. VI. 42.
22. *Phil. debilis* Gravh., nicht selten. 12 Bug III. 24; 1 Zapfendorf II. 26; 2 ♂ Zeckendorf IV. 27; 1 Giech IV. 27; 1 Staffelbach III. 27; 4 Hirschaid 10. IV. 33.
23. *Phil. sanguinolentus* Gravh., selten. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 24; 3 ♀ Oberhaid V., VI. 27 u. 1. VI. 41; 1 ♀ Staffelbach VI. 27; 1 Ebern 10. IX. 41; 1 Gaustadt V. 30; 1 Bruckertshof 20. IV. 43.
24. *Phil. coruscus* Gravh., selten. 1 Kreuzberg II. 26; 1 ♂ Saltendorf IX. 27; 1 Stettfeld 12. VII. 37; 1 Hirschaid 5. VIII. 40; 1 Hallstadt (Börstig) 4. VII. 41.
25. *Phil. ebeninus* Gravh., nicht häufig. 1 ♀ Drügendorf X. 27; 1 ♀ Pettstadt V. 28; 1 Giech XI. 29; 1 Staffelbach III. 30.

- 25a. *Phil. rectangulus* Shp., sehr lokal und sehr selten. 1 Strullendorf 9. VII. 41. Das Vorkommen dieser Rarität ist sehr interessant und bemerkenswert. Bis vor kurzer Zeit nur aus Japan bekannt, wurde sie 1927 für Europa zuerst von Gridelli in Italien und dann seit 1930 für Deutschland von verschiedenen Forschern aus einer Reihe von Gebieten nachgewiesen, so im Rheingebiet an 5 Orten, dann bei Goslar im Harz, von der Mark Brandenburg. Aus Bayern liegen nun auch bereits 3 Funde vor, einer von Starnberg (Stöcklein leg.), der 2. ist der gegenwärtige von Strullendorf und vor kurzem (1948) stellte die Art laut briefl. Mitteilung Dr. O. Rebmann bei Ansbach fest.
26. *Phil. concinnus* Gravh., nicht selten. 4 Staffelbach XI. 25 u. 26; 3 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 26; 1 Hirschaid IV. 33; (2 Amerbach b. Wemding i. Ries VIII. 26).
ab. ochropus Gravh. 2 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 25.
27. *Phil. corvinus* Er., sehr selten; Moortier. 1 ♀ Oberhaid V. 27; 3 Bamberg (S. v. Haupt, um 1900).
28. *Phil. quisquiliarius* Gyll., selten. 2 Gaustadt V. 27; 1 Ebing XI. 27; 25 Staffelbach III. 29 (Maingeniste); 1 Zapfendorf II. 29; 1 Hirschaid 10. IV. 33.
var. inquinatus Steph. 2 Staffelbach III. 29.
29. *Phil. rufimanus* Er., sehr selten; thermophile südliche Art. 2 Bamberg, Funk leg., Coll. Schilsky im Zoolog. Mus. Berlin (nach Mitt. Horions).
30. *Phil. ventralis* Gravh., nicht häufig. 1 Bug I. 26; 1 Ebing II. 26; 1 Giech XI. 26; 1 Bamberg (Altenburg) IV. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27; 2 ♀ Gaustadt XI. 27; 2 Staffelbach III. 29; 1 Strullendorf III. 29; 1 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
31. *Phil. cruentatus* Gmel., nicht häufig. 1 ♀ Strullendorf IV. 27; 1 ♂ Hauptsmoorwald V. 28.
32. *Phil. varians* Payk., nicht selten. 1 Hauptsmoorwald XII. 26; 1 ♂ Pettstadt V. 27; 1 ♂ Staffelbach VI. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27; 1 Strullendorf V. 29; 1 Giech III. 30.
33. *Phil. jurgans* Tottenham, sehr selten. 1 ♂ Oberhaid II. 27; 1 ♀ Seehof II. 27 (det. Wendeler).
34. *Phil. agilis* Gravh., selten. 3 Staffelbach XI. 25 u. 26; 2 Ebing II. 26; 1 Scheßlitz III. 29.
35. *Phil. virgo* Gravh., sehr lokal u. selten. 1 ♂ Gaustadt V. 27; 1 ♀ Stegaurach V. 27; 1 ♂ Hauptsmoorwald V. 28 (det. Wendeler); mehr südeurop. Art.
36. *Phil. nigrita* Gravh., selten. 1 Bamberg um 1890 (S. Pf. Glaser).
37. *Phil. fumarius* Gravh., ziemlich selten. 1 Bug IV. 25; 1 ♀ 1 ♂ Oberhaid V. 27; 1 ♂ Stegaurach V. 27; 1 ♀ Ebelsbach V. 28; 1 Staffelbach III. 29; 1 Bamberg (Altenburg) IV. 29; 1 Dörfleins b. Hallstadt III. 33; 1 Bamberg (Hain) II. 37.
38. *Phil. micans* Gravh., nicht selten; an Wasserrändern. 50 Stegaurach, Gaustadt, Oberhaid, Reckendorf IV., V. u. XI. 26; 30 Staffelbach, Pettstadt, Zeckendorf, Friesen, Ebing II., III. u. VI. 27 (meist Fluß- u. Bachgeniste); 5 Rattelsdorf 27. VI. 33.

39. *Phil. fulvipes* F., nicht selten; besonders an Wasserrändern. 1 Gaustadt XI. 26; 2 ♀ Oberhaid V. 27; 1 Willersdorf VI. 28; 8 Staffelbach I. u. III. 29; 1 Rattelsdorf VI. 33.
40. *Phil. puella* Nordm., sehr vereinzelt u. selten. 1 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
41. *Phil. punctus* Gravh., nicht häufig. 1 Kreuzberg II. 26; 1 ♀ Stegaurach V. 27; 1 ♀ Pettstadt V. 28; 1 Staffelbach III. 29; 1 Rattelsdorf V. 33.
42. *Phil. tennis* F., nicht häufig. 4 Bamberg (S. v. Haupt).
43. *Phil. (Rabigus) pullus* Nordm., sehr selten; vielfach thermophil; West- und Mitteldeutschland, fehlt in Norddeutschland. 1 Staffelbach I. 29 (Maingeniste).
44. *Phil. (Gabrius) vernalis* Gravh., ziemlich selten. 1 Staffelbach XI. 25; 1 ♀ Hirschaid IV. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27; 1 Bug I. 26; 1 Bamberg (Altenburg) V. 27; 1 Ebing XI. 27; 2 Giech XI. 27.
45. *Phil. (Gabrius) splendidulus* Gravh., nicht selten; unter Rinden. 8 Kreuzberg XI. 25, IV. 26 u. II. 29; 4 Scheßlitz V. 25 u. XI. 29; 1 Hauptsmoorwald V. 25; 1 Bamberg (Hain) V. 26; 1 Oberhaid II. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27; 1 Hallstadt XI. 28; 1 Strullendorf III. 30.
46. *Phil. astutus* Er., sehr selten. 1 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
47. *Phil. thermarum* Aubé., sehr vereinzelt und selten; gern in Gewächshäusern und Lohbeeten. 1 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).
48. *Phil. (Gabrius) nigrutilus* Gravh., sehr häufig; heute in mehrere Arten aufgespalten. 10 Ebing II. 26; 10 Zapfendorf II. 26; 10 Stettfeld III. 26; 30 Reckendorf, Gaustadt, Bamberg (Michelsberger Wald), Stegaurach, Strullendorf, Hirschaid, Oberhaid III., IV. u. XI. 27; 20 Pettstadt V. 28; 30 Zeyern b. Kronach, Staffelbach, Bug II. u. III. 29; 2 Rattelsdorf V. 33.
f. subnigrutilus Reitt. 1 Staffelbach III. 27.
49. *Phil. (Gabrius) trossulus* Nordm., sehr selten. 1 Hallstadt (Börstig) 3. V. 33; 1 Unterhaid 16. IV. 39.
50. *Phil. exiguus* Nordm., selten. 2 Staffelbach I. 29 u. III. 30 (Maingeniste); 1 Frankenwald um 1890 (S. Pf. Glaser).

Othiini

Othius Steph.

1. *Oth. punctulatus* Gze., unter Laub. 3 Reckendorf III. 26; 1 Pettstadt IV. 26; 1 Hirschaid V. 26; 10 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 4 Hauptsmoorwald XII. 27; 6 Stettfeld XII. 27; 1 Zeckendorf IV. 28; 2 Oberhaid V. 28; 3 Scheßlitz III. 29; 1 Seehof III. 30.
2. *Oth. melanocephalus* Gravh., sehr selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Oth. myrmecophilus* Kiesw., hier nicht selten. 7 Hirschaid IX. 25 u. III. 26; 2 Reckendorf III. 26; 6 Oberhaid XII. 26; 15 Bamberg (Michelsberger Wald) XII. 26; 1 Zeckendorf IV. 27; 1 Friesen IV. 27; 5 Strullendorf XII. 27; 6 Scheßlitz XI. 28 u. 31; 10 Hauptsmoorwald I. u. X. 31; 1 Drügendorf X. 30; 2 Appendorf X. 37; 4 Ebern 10. XI. 42.

Baptolinus Kraatz.

1. *Baptol. affinis* Payk., nicht selten; unter Rinden. 7 Hauptsmoorwald IV. 24; 8 Scheßlitz III. 25 u. 29, XI. 31; 2 ♀ 2 ♂ Oberhaid V. 27; 1 Strullendorf V. 29; 1 Ebrach VIII. 36; 1 Hirschaid VIII. 36; 1 Ebern 10. XI. 41.

Xantholinini

Leptacinus Erichs.

1. *Leptac. batychrus* Gyll., selten. 2 Strullendorf III. 29.
2. *Leptac. formicetorum* Märk., nicht häufig. 5 Hauptsmoorwald III. 26 (bei *Formica rufa*).

Xantholinus Serv.

1. *Xanthol. (Gyrophypus) punctulatus* Payk., nicht selten. 2 Bug III. 24; 2 Ebing II. 26; 2 Scheßlitz II. 26; 15 Staffelbach XI. 26; 6 Giech XI. 27; 5 Hauptsmoorwald IX. 27; 2 Pettstadt V. 28; 4 Saltendorf IX. 28; 1 Zeyern b. Kronach XI. 28; 1 Bamberg (Hain) 10. XI. 43.
ab. Thomsoni Schwarz. 1 Zapfendorf II. 26.
2. *Xanthol. (Gyrophyp.) atratus* Heer., selten. 1 Staffelbach III. 29; 1 Bamberg (Altenburg) IV. 29.
3. *Xanthol. (Gyrophyp.) angustatus* Steph., nicht selten. 1 Bug III. 24; 2 Bruckertshof II. 27; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 27; 1 Friesen V. 28; 1 Saltendorf IX. 29; Staffelbach III. 30; 2 Hirschaid 10. IV. 35.
4. *Xanthol. (Metacyclinus) glaber* Nordm., selten und anscheinend recht lokal. 3 Bamberg (Hain) V. 37 u. 25. III. 48.
5. *Xantholinus linearis* Oliv., häufig. 15 Bug III. 24; 12 Ebing II. 26; 3 Zapfendorf III. 26; 2 Hallstadt III. 26; 1 Friesen IV. 27; 30 Staffelbach, Strullendorf, Giech, Scheßlitz XI. 27 u. 28; 3 Hauptsmoorwald V. 28; 1 Zeckendorf V. 28; 2 Stettfeld V. 28; 2 Oberhaid V. 28; 1 Ebrach VIII. 36.
6. *Xanthol. longiventris* Heer., nicht häufig. 8 Staffelbach III. 26 u. 27; 1 Zapfendorf III. 26; 1 Giech XI. 27; 2 Kreuzberg II. 28; 1 Rattelsdorf XII. 34; 1 Strullendorf II. 35.
7. *Xanthol. laevigatus* Jacobson (*distans* Rey. bei Reitt.), selten. 5 Staffelbach XI. 26 u. III. 27 (Maingeniste); 2 Scheßlitz III. 28; 1 Kreuzberg I. 29; 1 Hauptsmoorwald I. 29; 4 Frankenwald um Teuschnitz (S. Pf. Glaser).
8. *Xanthol. tricolor* F., selten. 1 Arnstein VII. 26; 5 Strullendorf I. 29; 1 Ebrach VIII. 36; (1 Amerbach b. Wemding i. Ries VIII. 37).
9. *Xanthol. (Nudobius) lentus* Gravh., selten. 1 Teuschnitz, Frankenwald (S. Pf. Glaser), mehr montane Art.

E. Paederinae

Cryptobium Mannh.

1. *Cryptob. fracticorne* Payk., hier nicht selten. 1 Bug I. 26; 1 Gaustadt V. 26; 1 Hallstadt I. 26; 1 Sambach IV. 26; 1 Willersdorf VI. 27; 12 Hauptsmoorwald XI. 27 u. X. 28; 2 Stettfeld XI. 27; 5 Oberhaid V. 28 u. VIII. 30; 3 Zeyern b. Kronach XI. 27; 5 Staffelbach III. 29 u. XI. 30; 1 Stegaurach XI. 31; 1 Forchheim III. 32; 3 Rattelsdorf V. 35; 1 Bamberg (Hain) 22. XII. 40.

Doliceon Laparte.

1. *Dolic. biguttulus* Boisd., sehr lokal und selten. 1 Teuschnitz, Frankenwald (S. Pf. Glaser).

Achenium Curtis.

1. *Achen. depressum* Gravh., sehr selten. 1 Staffelbach I. 29 (Maingeniste); 1 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Achen. humile* Nicol., sehr selten. 1 Bamberg um 1890 (S. Pf. Glaser).

Lathrobium Gravh.

1. *Lathrob. (Lobrathium) multipunctatum* Gravh., selten. 1 ♂ Friesen IV. 27; 1 ♂ Scheßlitz III. 29; 3 Strullendorf 6. II. 35; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33; 1 Zeegendorf 20. III. 35.
2. *Lathrob. (Tetartopeus) quadratum* Payk., nicht häufig. 2 Hallstadt I. 26 u. XI. 27; 5 ♂ 4 ♀ Staffelbach IX. 26; 2 Reckendorf III. 27; 2 Oberhaid V. 27; 1 Gaustadt V. 27; 1 Zentbechhofen VI. 27; 1 ♀ Kreuzberg XI. 28; 1 Dörfleins b. Hallstadt III. 33.
3. *Lathrob. (Tetartopeus) terminatum* Gravh., nicht selten. 6 Gaustadt V. 26; 12 Stegaurach V. 26; 2 Zentbechhofen V. 26; 1 Ebing V. 26; 2 ♀ 1 ♂ Oberhaid V. 27; 4 Willersdorf IV. 27; 2 ♀ Hauptsmoorwald V. 28; 1 ♀ Saltendorf IX. 28; 1 Bamberg (Altenburg) V. 29; 1 Hallstadt XI. 29; 1 Seehof V. 35.
4. *Lathrob. (Tetartopeus) gracile* Hampe, sehr selten; Moortier. 1 ♂ Oberhaid V. 27.
5. *Lathrob. fulvipenne* Gravh., nicht selten. 3 Zapfendorf II. 25 u. II. 29; 1 Scheßlitz III. 25; 1 Hauptsmoorwald XII. 25; 1 ♂ Reckendorf III. 26; 1 ♀ Stegaurach IV. 27; 1 Zapfendorf IV. 27; 2 ♀ 1 ♂ Staffelbach III. 29.
var. *Letzneri* Gerh. 1 Bug IV. 25; 1 Zapfendorf II. 26; 2 ♂ Staffelbach III. 29; 1 ♀ Bamberg (Altenburg) V. 29; 1 Oberhaid III. 33; 1 Rattelsdorf V. 35.
6. *Lathrob. laevipenne* Heer., sehr selten. 1 ♀ 1 ♂ Hauptsmoorwald V. 28.
7. *Lathrob. castaneipenne* Kolen., sehr selten; mehr südeuropäische Art. 1 ♀ Strullendorf V. 28; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Geniste der Itz bei Sommerhochwasser); 1 Dörfleins b. Hallstadt 28. III. 33.
8. *Lathrob. elongatum* L., selten. 1 Bug I. 26; 1 Staffelbach I. 26; (1 Amerbach i. Ries 1. VI. 39).
9. *Lathrob. geminum* Kr., nicht selten. 16 Staffelbach III. 24; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 24; 2 ♂ Reckendorf III. 26; 4 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste); 2 Oberhaid 27. III. 34; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
10. *Lathrob. brunnipes* F., nicht häufig. 1 Bug III. 24; 1 Staffelbach III. 24; 4 Hauptsmoorwald IX. 24 u. V. 28; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) X. 25; 2 ♀ 1 ♂ Zentbechhofen VI. 26; 2 ♂ Strullendorf IV. 28; 1 ♂ Oberhaid V. 28; 2 ♂ Scheßlitz V. 29; 1 Ebelsbach IV. 35; 1 Seehof V. 35.
11. *Lathrob. fovulum* Steph., selten. 1 Ebing II. 24; 2 Staffelbach III. 24; 1 Strullendorf III. 25.
12. *Lathrob. longulum* Gravh., nicht selten. 7 Bug III. 24 u. I. 26; 1 Bamberg (Hain) IV. 24; 2 Staffelbach IV. 24; 1 Ebing II. 26; 1 Seehof II. 26; 1 ♂ 1 ♀

Sambach IV. 26; 1 ♀ Gaustadt V. 26; 1 ♀ 2 ♂ Oberhaid V. 26 u. 27; 1 ♀ Stegaurach V. 26; 3 Bruckertshof II. 27; 3 Scheßlitz III. 29; 4 Giech III. 29; 1 Hallstadt XI. 28; 2 Rattelsdorf XII. 34.

var. *longipenne* Fairm., sehr selten. 2 Oberhaid V. 31.

13. *Lathrob. pallidum* Nordm., sehr selten. 1 Scheßlitz V. 29.

14. *Lathrob. filiforme* Gravh., selten; mehr Gebirgstier. 10 Staffelbach III. 24 (Maingeniste); 1 Rattelsdorf 7. V. 35 (Geniste der Itz bei Sommerhochwasser); 1 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43 (Auwald).

Domene Fauvel.

1. *Dom. scabricollis* Er., selten; Gebirgstier. 2 ♂ Hauptsmoorwald V. 28; 1 Viereth IX. 30.

Medon Stephens.

1. *Med. bicolor* Oliv., sehr selten; West- u. Mitteleuropa. 1 Staffelbach IV. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27 (Rodachgeniste); 2 Strullendorf IV. 28; 1 Staffelberg IV. 31.

2. *Med. melanocephalus* F., nicht selten. 6 Ebing II. 24 u. VIII. 31; 2 Zapfendorf III. 24; 3 Bug III. 24; 5 Kreuzberg II. 25; 1 Bamberg (Hain) IV. 25; 2 Seehof II. 26; 1 Stegaurach XI. 26; 5 Ludwag VIII. 31; 1 Staffelbach XI. 31; 3 Pottenstein XI. 31; 1 Strullendorf II. 35; 4 Bamberg (S. v. Haupt); 1 Oberhaid I. 26.

3. *Med. obscurellus* Er., sehr vereinzelt und selten. 2 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).

Lithocharis Lacord.

1. *Lithoch. ochracea* Er., sehr selten. 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).

Scopaeus Erichs.

1. *Scop. laevigatus* Gyll., nicht häufig. 4 Staffelbach III. 24 u. 29; 4 Stegaurach V. 26; 1 Gaustadt V. 26.

2. *Scop. (Polyodontus) cognatus* Rey., nicht häufig. 1 Oberhaid IV. 26; 1 Sambach IV. 26.

3. *Scop. (Polyodont.) sulcicollis* Steph.
var. *intermedius* Rey., ziemlich selten. 1 ♀ Staffelbach IV. 28; 1 ♂ Strullendorf IV. 28.

Stiliclus Latr.

1. *Stilic. angustatus* Geoffr., sehr selten; an Wasserrändern. 1 Staffelbach XII. 25; 1 Pottenstein XI. 31; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste bei Sommerhochwasser).

2. *Stilic. subtilis* Er., nicht gerade selten. 1 Giech III. 27 u. XI. 29; 1 Ebing II. 27; 1 Staffelbach III. 27; 1 Zeyern b. Kronach III. 29; 1 ♂ Hegnabrunn b. Kulmbach V. 28; 2 Viereth IX. 30; 1 Stettfeld IX. 30; 1 Forchheim III. 30; 3 Scheßlitz III. 30; 1 Bruckertshof IV. 30; 1 Kreuzberg V. 32; 1 Stegaurach XI. 32.

3. *Stilic. rufipes* Germ., nicht häufig. 1 Stettfeld II. 26; 3 Ebing II. 26 u. XII. 29; 1 Scheßlitz XI. 29; 3 Viereth VI. 30; 1 Hallstadt (Börstig) VI. 33; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
4. *Stilic. similis* Er., ziemlich selten. 5 Staffelbach XI. 24 u. III. 27; 2 Ebing II. 26; 6 Scheßlitz III. 26 u. XI. 27; 2 Oberhaid II. 26; 2 Stettfeld XII. 26 u. IX. 31; 1 Zeyern XI. 27; 1 Giech XI. 27; 1 Pottenstein XI. 31.
5. *Stilic. orbiculatus* Payk., häufig. 3 Bug III. 24; 1 Seehof III. 24; 10 Reckendorf III. 26; 1 Stegaurach IV. 26; 2 Strullendorf IV. 26; 4 Drügendorf X. 26; 40 Hirschaid, Pettstadt, Bug, Hauptsmoorwald III., IV., VIII. u. XI. 29 u. 30; 1 Berneck, Fichtelgebirge (S. v. Haupt).
6. *Stilic. Erichsoni* Fauv., sehr selten. 2 Oberhaid II. 26; 2 Seehof II. 26; 3 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Drügendorf X. 28.

Astenus Stephens.

1. *Ast. (Astenognathus) filiformis* Latr., nicht selten. 2 Bug III. 24; 1 Staffelbach XI. 25; 2 Gaustadt I. 26; 3 Strullendorf III. 26 u. IV. 29; 2 Seehof II. 27; 5 Bruckertshof III. 27; 9 Stettfeld XII. 27; 1 Kreuzberg II. 28; 1 Pottenstein XI. 31; 1 Hirschaid III. 31; 2 Hauptsmoorwald II. 31; 1 Strullendorf III. 35; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
ab. humeralis Gredl. 1 Stettfeld II. 26.
2. *Ast. (Astenogn.) pulchellus* Er., sehr lokal und selten. 1 Stettfeld a. M. 25. X. 37.
3. *Ast. angustatus* Payk., nicht selten. 4 Bug III. 24; 2 Staffelbach III. 25; 3 Kreuzberg II. 26 u. XI. 28; 7 Strullendorf III. 26 u. XII. 31; 2 Bamberg (Altenburg) IV. 26; 3 Seehof II. 27; 2 Oberhaid III. 27; 15 Stettfeld XII. 27; 4 Scheßlitz XI. 28; 8 Hauptsmoorwald XI. 31; 1 Pottenstein XI. 31; 2 Zeegen-dorf IV. 33; 1 Ebelsbach III. 36; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
4. *Ast. neglectus* Märk., sehr selten. 1 Kreuzberg II. 29; 1 ♂ Stettfeld IX. 31; 3 Strullendorf 29. III. 33.

Paederus Gravh.

1. *Paed. brevipennis* Lac., sehr selten. 1 Kreuzberg II. 27; 1 ♂ Stettfeld IX. 31 (unter Laub); 1 Staffelbach 15. V. 43.
2. *Paed. litoralis* Gravh., sehr häufig. 10 Bug III. 24; 3 Staffelbach XII. 25; 2 Bughof I. 26; 2 Seehof II. 26; 2 Oberhaid II. 26; 6 Hirschaid VII. 26; 2 Drügendorf X. 26; 8 Stettfeld XII. 26 u. IX. 31; 1 Scheßlitz XII. 26; 2 ♀ 2 ♂ Friesen IV. 27; 2 Zentbechhofen IV. 28; 2 Pottenstein XI. 31; 7 Forchheim IV. 31; 2 Strullendorf VI. 31; 25 Rattelsdorf V. u. VI. 32 u. 35.
3. *Paed. riparius* L., nicht häufig. 25 Stegaurach XI. 27 u. IV. 21 u. 31 (Teich-rand); 11 Forchheim IV. 31 u. 23. VII. 43; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
4. *Paed. caligatus* Er., sehr selten; West- u. Mitteleuropa. 1 Hirschaid 29. VII. 32 (unter faulenden Pflanzen).
5. *Paed. fuscipes* Curt., nicht selten. 3 Strullendorf VII. 27; 2 Gosberg b. Forchheim III. 31; 3 Hirschaid III. 32; 1 Strullendorf II. 35.
6. *Paed. limnophilus* Er., sehr sporadisch u. selten. 1 Forchheim 23. VII. 42.

F. Steninae

Stenus Latr.

1. *Sten. biguttatus* L., häufig. 2 Seehof XI. 24; 1 Bug I. 26; 2 Ebing II. 26; 20 Scheßlitz III. 25; 4 Staffelbach I. 25 u. III. 29; 1 Bruckertshof III. 27; 1 Gaustadt V. 27; 3 Stettfeld VII. 27; 7 Strullendorf IV. 27 u. II. 35; 4 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Rattelsdorf XII. 34; 1 Berneck i. Fichtelgebirge (S. v. Haupt).
2. *Sten. bipunctatus* Er., nicht häufig. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Sten. longipes* Heer., sehr selten. 1 ♂ Strullendorf VI. 27; 2 ♀ Stegaurach VI. 28.
4. *Sten. bimaculatus* Gyll., nicht selten. 2 Bug III. 24 u. I. 26; 4 Staffelbach I. 25; 3 Scheßlitz XI. 26; 2 ♂ Seehof II. 27; 1 ♂ 2 ♀ Stettfeld XII. 27; 5 ♀ Zentbechhofen V. 27; 1 ♀ Hauptsmoorwald V. 28; 4 Rattelsdorf 10. XII. 34; 1 Oberhaid 2. IX. 40.
5. *Sten. fossulatus*, Er., selten. 1 ♀ Oberhaid IV. 28; 1 Scheßlitz V. 28; 1 ♂ Strullendorf V. 28; 1 ♀ Hauptsmoorwald V. 28; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
6. *Sten. aterrimus* Er., nicht häufig; bei *Formica rufa*. 1 Strullendorf III. 29; 1 Hallstadt 6. XI. 33.
7. *Sten. boops* Gravh., nicht häufig. 4 Oberhaid V. 27; 2 Gaustadt V. u. XII. 27; 1 Ebing V. 28; 3 Willersdorf VI. 27; 2 Stegaurach XI. 27; 1 Strullendorf XII. 27; 1 ♂ Staffelbach IV. 28; 2 ♂ Saltendorf VII. u. IX. 28.
8. *Sten. Juno* F., häufig. 30 Staffelbach I. u. III. 25 u. III. 29 (Maingeniste); 6 Bug I. 26; 1 Strullendorf IV. 26; 1 Scheßlitz XI. 26; 1 Oberhaid II. 27; 1 Seehof II. 27; 1 ♀ Zentbechhofen V. 28; 10 Stettfeld XII. 27; 1 Hauptsmoorwald V. 28; 6 Rattelsdorf 10. XII. 34.
9. *Sten. ater* Mmh., häufig. 20 Staffelbach I. u. II. 25 u. 27 (Maingeniste); 1 Seehof XI. 25; 1 Stettfeld III. 26; 1 Scheßlitz XI. 26; 2 Reckendorf III. 27; 25 Stegaurach XI. 27 (Teichrand); 6 Gaustadt V. 28; 2 Oberhaid V. 28; 3 Strullendorf IV. 29; 1 Bruckertshof VIII. 29; 1 Kreuzberg II. 30.
10. *Sten. clavicornis* Scop., häufig. 15 Bug I. 26; 25 Staffelbach I. 26 u. XI. 29; 10 Ebing II. 26; 3 Strullendorf III. 27; 30 Seehof, Oberhaid, Stegaurach, Strullendorf, Reckendorf I., II., III. u. XI. 27; 20 Hirschaid, Zentbechhofen V., VI. u. XI. 28; 3 Kreuzberg II. 29; 2 Staffelberg III. 29; 4 Bamberg (Altenburg) IV. 29.
11. *Sten. Rogeri* Kr., sehr selten u. sporadisch. 3 Hauptsmoorwald V. 28.
12. *Sten. providus* Er., nicht selten. 4 Ebing XI. 25; 2 Bug I. 26; 15 Staffelbach I. 26 u. III. 27; 10 Scheßlitz I. 26; 3 ♀ Gaustadt V. 27; 1 ♀ 1 ♂ Stegaurach V. 27; 2 ♀ Oberhaid IV. 27; 2 ♀ 1 ♂ Zentbechhofen VI. 27; 1 Zeyern b. Kronach XI. 27; 1 Stübzig VI. 29; 4 Rattelsdorf XI. 34; 1 Strullendorf II. 35; 2 Oberau b. Staffelstein 10. VIII. 42.
13. *Sten. silvester* Er., sehr lokal und selten. 6 Strullendorf 6. II. 35; 4 Rattelsdorf 10. XII. 35 (auf einer Kopfweide im Winterquartier); 1 Staffelbach XI. 29.
14. *Sten. (Nestus) incanus* Er., sehr selten. 1 Staffelbach III. 29 (Maingeniste).

15. *Sten. (Nestus) pusillus* Er., nicht selten. 3 Bug I. 26; 2 Ebing II. 26; 6 Staffelfbach I. u. XI. 26; 1 Hauptsmoorwald IV. 26; 1 Zentbechhofen VI. 27; 1 Willersdorf VI. 27; 10 Stegaurach XI. 27; 5 Strullendorf XII. 27; 1 Pettstadt IV. 27; 1 Zeckendorf IV. 28; 1 Rattelsdorf 10. XII. 35.
16. *Sten. (Nestus) nanus* Steph., nicht häufig. 1 Staffelfbach I. 25; 1 Bug I. 26; 1 Scheßlitz XI. 25; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 28; 10 Zeyern XI. 29.
17. *Sten. (Nestus) carbonarius* Gyll., selten. 4 Hallstadt I. 27; 1 Kreuzberg II. 28; 1 Hauptsmoorwald XII. 28.
18. *Sten. (Nestus) humilis* Er., ziemlich selten. 5 Hirschaid IV. 27; 1 Stettfeld XII. 27; 1 Kreuzberg XI. 28; 4 Strullendorf II. 35; 1 Hirschaid IV. 35; 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43; 1 Staffelstein 9. III. 43 (det. Dr. L. Benick).
19. *Sten. (Nestus) circularis* Gravh., nicht häufig. 1 Reckendorf III. 26; 1 Stegaurach XI. 27; 1 Dörfleins b. Hallstadt III. 33; 12 Rattelsdorf 10. XII. 34; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
20. *Sten. (Nestus) palposus* Zettst., sehr selten. 1 ♀ Oberhaid V. 28.
21. *Sten. (Nestus) ruralis* Er., sehr selten. 1 ♀ Strullendorf XII. 37.
22. *Sten. (Nestus) buphthalmus* Gravh., nicht selten. 20 Staffelfbach XI. 25 u. III. 29 (Maingeniste); 1 Oberhaid X. 34; 2 Rattelsdorf XII. 34.
23. *Sten. (Nestus) melanopus* Mrsh., sehr selten. 1 ♀ Hirschaid XII. 28.
24. *Sten. (Nestus) melanarius* Steph., ziemlich selten. 5 Hallstadt I. 27; 1 ♀ Oberhaid 27; 5 ♀ Staffelfbach IV. 28; 2 ♀ Strullendorf IV. 28; 1 Rattelsdorf 10. XII. 34.
25. *Sten. (Nestus) atratulus* Er., selten. 4 Staffelfbach III. 25 u. 27; 1 ♂ Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 ♀ Oberhaid V. 28; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
26. *Sten. declaratus* Er. (*simillimus*), selten. 3 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43 (det. Dr. L. Benick).
27. *Sten. (Nestus) canaliculatus* Gyll., nicht häufig. 1 Bug I. 26; 10 Staffelfbach I. 26; 1 Scheßlitz III. 27; 1 Seehof II. 27; 4 ♀ Strullendorf IV. 27; 1 ♀ Hirschaid V. 27; 1 ♀ Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 ♂ Sambach IV. 28; 1 ♀ Stegaurach V. 28.
28. *Sten. (Nestus) morio* Gravh., selten. 1 ♀ Gaustadt V. 28; 1 Hallstadt I. 29; 4 Staffelfbach III. 29 (Maingeniste).
29. *Sten. (Nestus) vafells* Er., lokal und selten. 13 Hallstadt I. 27; 1 Kreuzberg II. 27; 1 Strullendorf IV. 28.
30. *Sten. (Nestus) cautus* Kr., sehr selten. 1 Hallstadt I. 28; 1 Hirschaid I. 30.
31. *Sten. (Nestus) fuscipes* Gravh. 1 Bug I. 26; 9 Staffelfbach I. 26 u. XI. 27 (Maingeniste); 25 Stegaurach XI. 27; 3 Seehof II. 28; 1 Strullendorf IX. 28.
32. *Sten. (Nestus) Argus* Gravh., selten und nur lokal in Anzahl. 7 Staffelfbach I. 26 u. IV. 27; 1 ♀ Hirschaid IV. 26; 1 Willersdorf VI. 26; 30 Stegaurach XI. 27; 1 Stettfeld XII. 27; 2 ♀ Hallstadt I. 28; 25 Rattelsdorf 10. XII. 34 (unter Laub u. Moos auf Kopfweiden); 1 Ebelsbach 10. V. 35; 1 Bamberg (S. v. Haupt).

33. *Sten. (Hemistenus) pubescens* Steph., ziemlich selten. 9 Staffelbach I. 26 u. III. 27; 1 Ebing V. 27; 1 Hauptsmoorwald V. 27; 1 Zentbechhofen V. 27; 1 Oberhaid V. 28; 1 Stegaurach XI. 28; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
34. *Sten. (Hemisten.) binotatus* Ljung., nicht selten. 2 Bug III. 24; 2. Seehof IV. 24; 8. Strullendorf IV. 25; 1 Hauptsmoorwald V. 25; 12 Staffelbach III. 25 u. 29; 1 Bamberg (S. v. H.).
35. *Sten. (Hemisten.) pallitarsis* Steph., nicht selten. 3 Bug III. 24 u. I. 26; 10 Staffelbach I. 26 u. III. 29; 1 Strullendorf III. 26; 7 Oberhaid II. u. V. 27; 3 Stegaurach XI. 28; 1 ♀ Willersdorf VI. 28.
36. *Sten. (Hemisten.) picipennis* Er., sehr selten. 3 Rattelsdorf 10. XII. 34 (unter Moos auf Kopfweiden im Winterquartier).
37. *Sten. (Hemist.) bifoveolatus* Gyll., sehr selten. 5 ♀ 1 ♂ Zentbechhofen V. 27; 1 ♂ Oberhaid V. 28; 2 Bamberg (S. v. H.).
38. *Sten. (Hemistenus) flavipes* Steph., selten. 1 Forchheim 13. VII. 40; 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).
39. *Sten. (Parastenus) palustris* Er., sehr selten. 1 ♀ Strullendorf IV. 28.
40. *Sten. (Parasten.) impressus* Grm., selten; mehr Gebirgstier. 1 Staffelbach I. 25 (Maingeniste); 1 Scheßlitz XI. 26; 1 Rattelsdorf 10. XII. 34; 1 Ebern 24. VI. 41; 1 Seehof 8. X. 41; 2 Hallstadt XI. 30.
41. *Sten. (Parasten.) geniculatus* Gravh., ziemlich selten. 6 ♀ Strullendorf IV. u. XI. 26; 1 ♂ Sambach IV. 26; 1 ♀ Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 27; 1 ♀ Stegaurach V. 28; 1 ♀ Hirschaid V. 29.
42. *Sten. (Parasten.) Erichsoni* Rye., nicht selten. 9 Seehof XI. 24; 6 Scheßlitz III. u. XI. 25; 2 Ebing XI. 25; 6 Strullendorf III. 26 u. II. 35; 1 ♂ Seehof I. 27; 5 ♀ 2 ♂ Stettfeld XI. 27; 1 Gaustadt XI. 27; 1 ♀ Drügendorf X. 27; 4 Hallstadt I. 28; 3 Ebelsbach II. 29 u. V. 35; 2 Hirschaid IV. 35.
43. *Sten. (Parasten.) pallipes* Gravh., ziemlich selten. 1 Seehof II. 27; 2 Oberhaid II. 27; 2 Hauptsmoorwald XI. 27; 3 Hirschaid IV. 28; 5 Kreuzberg II. 29; 2 Rattelsdorf 10. XII. 34; 1 Hirschaid 17. V. 39; 2 Bamberg (S. v. H.).
44. *Sten. (Tesus) opticus* Gravh., sehr selten. 1 Seehof II. 27; 1 Hallstadt I. 28; 1 Strullendorf IV. 28; 3 Staffelbach XI. 28; 3 Stegaurach XI. 30.
45. *Sten. (Tesus) crassus* Steph., sehr selten. 1 ♀ Oberhaid V. 31.
46. *Sten. (Tesus) nigrutilus* Gyll., sehr selten. 1 Ebing XI. 25; 1 Seehof II. 26; 1 Stegaurach XI. 27; 1 Hauptsmoorwald I. 28; 1 Willersdorf VI. 28; 1 Staffelbach XI. 29; 1 Strullendorf II. 37.
47. *Sten. (Tesus) brunnipes* Steph., ziemlich häufig. 5 Bug I. 26; 10 Staffelbach I. 26 u. III. 27; 1 Zapfendorf II. 26; 1 Seehof II. 26; 1 Scheßlitz III. 27; 10 Strullendorf IX. 27 u. II. 35; 1 Kreuzberg II. 29; 2 Rattelsdorf 10. XII. 34; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
48. *Sten. (Hypostenus) latifrons* Er., lokal u. selten. 1 Hauptsmoorwald V. 27; 1 Zentbechhofen VI. 27; 30 Stegaurach V. 28; 2 Schwabthäl 10. IV. 39.
49. *Sten. (Hyposten.) fulvicornis* Steph., selten. 1 Staffelbach XI. 28 (Maingeniste).

50. *Sten. (Hyposten.) tarsalis* Ljung., häufig. 7 Bug I. 26 u. VIII. 28; 5 Seehof II. 26; 6 Oberhaid II. 26 u. IV. 28; 5 Staffelbach I. u. III. 36; 10 Strullendorf XII. 27 u. II. 35; 3 Reckendorf III. 28; 2 Hirschaid XII. 28; 3 Zentbechhofen V. 28; 4 Bamberg (Michelsberger Wald) XII. 28; 7 Rattelsdorf XII. 34; 4 Bamberg (S. v. H.).
51. *Sten. (Hyposten.) similis* Hrbst., nicht selten. 1 ♀ Reckendorf III. 26; 1 ♀ Ebelsbach V. 27; 1 Schößlitz VII. 28; 1 Bamberg (Altenburg) V. 29; 1 Staffelbach V. 29; 1 Kreuzberg V. 29; 3 Rattelsdorf XII. 34; 1 Strullendorf II. 35; 1 Zapfendorf 12. VIII. 39; 1 Ebern 24. VII. 41.
52. *Sten. (Hyposten.) cicindeloides* Schall., nicht selten. 2 Bug I. 26; 20 Staffelbach I. 26 u. XI. 27 (aus Maingeniste); 5 Oberhaid IV. u. V. 27; 1 Hirschaid IV. 27; 7 Stegaurach XI. 27; 2 Stettfeld XII. 27; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Rattelsdorf V. 35; 4 Bamberg (S. v. Haupt); 2 Oberhaid 2. IX. 40.
53. *Sten. (Hyposten.) solutus* Er., sehr lokal u. selten. 1 ♀ Stegaurach VI. 28.
54. *Sten. longitarsus* Thoms., sehr lokal und selten. 1 Staffelbach XI. 29 (L. Benick).
55. *Sten. flavipalpis* Thoms., sehr lokal und selten. 1 Zeyern (L. Benick).

G. Oxyporinae

Oxyporus Fbr.

1. *Oxpor. rufus* L., nicht selten, in Pilzen. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) VIII. 25; 2 Hirschaid IV. 27; 1 Strullendorf VI. 31; 1 Unterhaid VI. 33; 1 Bruckertshof VI. 34; 1 Ebing VII. 36.

H. Oxytelinae

Bledius Mnnh.

1. *Bled. tricornis* Hrbst., sehr selten. 1 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste b. Sommerhochwasser, det. Engert).
2. *Bled. (Blediodes) opacus* Block., nicht häufig. 8 Staffelbach III., IV. 26 u. XI. 35; 4 Pettstadt V. 28; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Bled. (Blediodes) fracticornis* Payk., nicht selten, wenn auch von mir bisher selten beobachtet. 1 Staffelbach IV. 28.
4. *Bled. (Blediodes) atricapillus* Grm., nicht häufig. 1 Bamberg (S. v. Haupt).

Platystethus Mnnh.

1. *Platyst. arenarius* Geoffr., nicht selten, im Dung. 1 Drügendorf X. 27; 1 Pettstadt V. 28; 8 Staffelbach III. 29; 1 Rattelsdorf V. 35; 8 Strullendorf 8. V. 43; 4 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Platyst. cornutus* Gravh., häufig; unter faulenden Pflanzen. 6 Staffelbach III. 26; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Platyst. alutaceus* Thoms., nicht häufig. 1 Staffelbach III. 26 (Maingeniste).

Haploderus Steph.

1. *Haplod. caelatus* Gravh., ziemlich häufig. 10 Staffebach XI. 25 u. III. 26 u. 29 (Maingeniste); 1 Oberhaid III. 26; 1 Scheßlitz III. 26; 1 Hauptsmoorwald IV. 26; 2 Willersdorf VI. 27; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 4 ♀ Strullendorf IX. 28 u. 2. V. 43; 1 Bamberg (S. v. Haupt); 1. Berneck (S. v. Haupt).
2. *Haplod. caesus* Er., sehr selten; mehr osteuropäische Art. 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).

Oxytelus Gravh.

1. *Oxyt. rugosus* F., an nassen Orten gemein, daher Aufzählung der Belege überflüssig.
2. *Oxyt. insecatus* Gravh., selten. 4 Staffebach III. 25 u. 27; 1 Hauptsmoorwald V. 26; 1 Strullendorf IV. 28.
3. *Oxytel. (Caccoporus) piceus* L., nicht selten, von mir aber noch nicht gefangen. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
4. *Oxytel. (Epomotylus) sculptus* Gravh., nicht häufig, wenigstens von mir wenig / gefangen. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) X. 25.
5. *Oxytel. (Anotylus) fulvipes* Er., ziemlich selten. 8 Zapfendorf V. 26; 2 Seehof 14. V. 35.
6. *Oxytel. (Anotylus) inustus* Gravh., lokal und im ganzen selten; mehr West- und Südeuropa. 9 Scheßlitz V. 25; 3 Strullendorf V. 25; 1 Stübig VI. 26; 2 Zentbechhofen VI. 27; 8 Drügendorf V. 28.
7. *Oxytel. (Anotylus) sculpturatus* Gravh., häufig. 1 Stübig VI. 26; 1 Reckendorf III. 26; 18 Drügendorf X. 27; 1 Seehof XI. 27; 1 Friesen IV. 28; 1 Pettstadt V. 28; 1 Staffebach V. 29.
8. *Oxytel. (Anotylus) nitidulus* Gravh., nicht selten. 3 Hirschaid IV. 26; 1 Oberhaid IV. 27; 1 Pettstadt V. 28; 1 Bamberg (Altenburg) IV. 29; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
9. *Oxytel. (Anotylus) complanatus* Er., nicht selten, wenn auch von mir selber nicht gefangen. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
10. *Oxytel. (Anotylus) tetracarinatus* Block., sehr häufig. 2 Hirschaid IV. 25; 12 Sambach IV. 26; 1 Stegaurach VI. 26; 8 Staffebach IV. 28; 3 Pettstadt IV. 28; 6 Scheßlitz III. 29 u. 24. VI. 49; 2 Drügendorf V. 29; 3 Bamberg (S. v. Haupt).

Trogophloeus Mannh.

1. *Trogophl. (Carpalimus) arcuatus* Steph., selten. 1 Staffebach XI. 25; 1 Strullendorf 6. II. 35.
2. *Trogophl. bilineatus* Steph., häufig. 2 Bug I. 26; 2 Stegaurach II. 26; 1 Oberhaid II. 26; 1 Zentbechhofen I. 26; 30 Staffebach IV. 27 u. III. 29; 7 Pettstadt V. 27; 1 Hauptsmoorwald V. 28; 1 Ebelsbach XI. 29; 1 Hirschaid VI. 30; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Trogophl. rivularis* Motsch., nicht selten. 2 Staffebach III. 25 u. 27; 3 Pettstadt V. 28.

4. *Trogophl. (Boopinus) obesus* Kiesw., sehr selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
5. *Trogophl. (Taenosoma) elongatulus* Er., nicht selten. 1 Stegaurach XI. 27; 1 Zeckendorf IV. 28; 2 Hauptsmoorwald V. 28.
6. *Trogophl. (Taenos.) corticinus* Gravh., häufig. 6 Kreuzberg I. 26; 15 Staffebach IV. 27; 1 Pettstadt V. 28; 40 Hirschaid, Strullendorf, Bug, Giech, Zapfendorf, Zeyern b. Kronach II., III., u. XI. 27 u. 28; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
7. *Trogophl. (Taenos.) impressus* Boisd., sehr selten. 3 Stegaurach II. 27; 20 Staffebach III. 29 (Maingeniste).
8. *Trogophl. (Taenos.) gracilis* Mnnh., sehr selten. 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).

Coprophilus Latr.

1. *Coproph. striatulus* F., nicht häufig. 1 Scheßlitz III. 29; 1 Bamberg (Altenburg) IV. 29.

I. Omalinae

Coryphium Steph.

1. *Coryph. angusticollis* Steph., sehr selten; Gebirgstier; große Seltenheit! 1 Hallstadt (Landsweide am Semberg) XI. 25; 1 Hauptsmoorwald XI. 29.

Anthophagus Gravh.

1. *Anthoph. bicornis* Block., selten; Gebirgstier. 1 Stübzig VI. 29; 1 Appendorf 25. X. 37 (det. Engert).
2. *Anthoph. alpinus* F., sehr selten; Gebirgstier; boreomontane Art. 1 ♀ 1 ♂ Drügendorf V. 28 (det. Wendeler).
3. *Anthoph. (Phaganthus) caraboides* L., nicht selten. 1 Wattendorf VI. 27; 2 Hirschaid 29. VIII. 32; (1 Kastl b. Amberg, Opf., X. 27); 1 Staffebach 5. VII. 41; 8 Oberau b. Staffelsstein 2. VI. u. 10. VIII. 42.
4. *Anthoph. abbreviatus* F., mehr montane Art. 1 Zapfendorf 24. VI. 39.

Lesteva Latr.

1. *Lest. pubescens* Mnnh., sehr selten; vorwiegend im Gebirge. 1 Giech XI. 25 (Bachgeniste).
2. *Lest. longelytrata* Gze., sehr häufig. 10 Stübzig VI. 26 u. 29; 3 Oberhaid V. 26; 5 Zentbehhofen V. 27; 1 Stegaurach VI. 27; 1 Wattendorf VI. 27; 12. Hauptsmoorwald V. 28; 3 Ebelsbach V. 25; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) V. 29; 3 Seehof V. 35; 2 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Lest. punctata* Er., selten. 1 Stübzig VI. 26; 1 Hauptsmoorwald VIII. 31.

Orochares Kraatz.

1. *Oroch. angustata* Er., sehr selten. 1 Giech XI. 25; 1 Bamberg (S. v. Haupt); Herbst- und Wintertier.

Acidota Steph.

1. *Acid. cruentata* Mnnh., sehr lokal und selten. 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XI. 27; 1 Scheßlitz (Grumbacher Holz) XI. 31 unter Rinden; 1 Hauptsmoorwald 23. XI. 32.

Olophrum Erichs.

1. *Olophr. piceum* Mnnh., ziemlich selten. 5 Strullendorf III. u. IX. 27; 6 Hauptsmoorwald V. u. X. 28 u. X. 31; 2 Oberhaid V. 31; 1 Saltendorf IX. 31.

Arpedium Erichs.

1. *Arped. quadrum* Gravh., sehr selten. 6 Forchheim IV. 27. u. III. 31.

Lathrimaeum Erichs.

1. *Lathrim. atrocephalum* Gyll., nicht selten. 2 Bug I. 26; 9 Hallstadt XI. 26; 2 Zeyern XI. 26; 1 Giech XI. 26; 2 Gaustadt V. 27; 5 Stegaurach V. 27; 4 Hauptsmoorwald VI. 27; 2 Stettfeld XII. 27; 4 Bamberg (Michelsberger Wald) XII. 27; 5 Oberhaid V. 28; 3 Ebelsbach XI. 29; 1 Zeckendorf IV. 28; 3 Pettstadt XI. 31.
2. *Lathrim. melanocephalum* Illig., selten. 1 Staffelbach 22. X. 41.
1 Ebing II. 26; 2 Seehof XI. 26; 20 Hirschaid, Sambach, Pettstadt, Oberhaid, Reckendorf II., III., IV. u. XI. 29 — 31.
3. *Lathrim. unicolor* Mrsh., selten und mehr lokal. 1 Reckendorf III. 26; 1 Zentbechhofen V. 26; 1 Giech XI. 26; 1 Sambach IV. 27; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) XII. 27; 1 Viereth IX. 31; 3 Hauptsmoorwald X. 31; 1 Kreuzberg V. 32; 1 Bamberg (S. v. H.).

Phloeostiba Thoms.

1. *Phloeost. plana* Payk., ziemlich selten. 2 Bamberg (Hain) 23. III. 43.

Xylodromus Heer.

1. *Xylodrom. depressus* Gravh., selten. 2 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Xylodrom. concinnus* Mrsh., nicht selten, von mir aber doch noch nicht gefangen. 1 Berneck (Fichtelgeb.); 2 Bamberg (S. v. Haupt); gern unter Stroh in Scheunen.

Omalium Gravh.

1. *Omal. rivulare* Payk., sehr häufig; unter faulenden Pflanzen. 6 Bamberg (Hain) V. 27; 20 Strullendorf V. 27; 15 Bischberg X. 27; 50 Pettstadt, Oberhaid, Hallstadt, Scheßlitz, Giech, Hauptsmoorwald, Ebelsbach u. a. O. IV., V. u. XI. 28 u. 29.
2. *Omal. oxyacanthae* Gravh., selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt); 1 Berneck i. Fichtelgeb. (S. v. Haupt).
3. *Omal. caesum* Gravh., nicht selten; unter naßem Laube. 1 Seehof II. 26; 1 Scheßlitz V. 26; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) V. 26; 1 Zentbechhofen VI. 27; 1 Stegaurach VI. 27; 1 Gaustadt XI. 27; 1 Zeyern XI. 27; 4 Oberhaid V. 28; 2 Kreuzberg XI. 29; 3 Strullendorf II. 35; 2 Bamberg (Hain) II. 37 u. 20. II. 43.

Phyllodrepa Rey.

1. *Phyllodr. floralis* Payk., nicht selten. 1 Bruckertshof V. 26; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Phyllodr. nigra* Gravh., sehr selten. 1 Bamberg (Hain) 23. II. 43.
var. *translucida* Kr. 1 Schwabthal 10. IV. 39.
3. *Phyllodr. ioptera* Steph., lokal nicht selten. 12 Bamberg (Hain) 23. II. 43 (unter Baumrinden, det. L. Benick).

Anthobium Steph.

1. *Anthob. (Eusphalerum) abdominale* Gravh., selten; vorwiegend im Gebirge. 1 Oberhaid V. 26; 1 Kreuzberg V. 27; 1 ♂ Drügendorf V. 28; 1 Ebermannstadt IV. 36; 1 Tiefenellern V. 36.
2. *Anthob. (Eusphal.) primulae* Steph., hier selten anscheinend. 1 Scheßlitz VI. 25; 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).
3. *Anthob. (Eusphal.) atrum* Heer., sehr lokal und selten. 1 Friesen V. 26; 2 ♀ 1 ♂ Hauptsmoorwald V. 27.
4. *Anthob. (Eusphal.) ophtalmicum* Payk., selten; mehr im Gebirge. 3 Stübig VI. 26; 1 Kreuzberg VII. 27; 6 Staffelberg 2. III. 41; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
5. *Anthob. (Eusphal.) florale* Panz., nicht selten. 4 Friesen IV. 26; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
6. *Anthob. (Eusphal.) minutum* F., ziemlich häufig. 9 Kreuzberg V. u. VI. 25; 1 Strullendorf VI. 26; 6 ♀ 5 ♂ Oberhaid V. 25; 1 ♀ 7 ♂ Stegaurach VI. 27; 4 ♀ 2 ♂ Hauptsmoorwald V. 27 u. 30; 1 ♀ Zentbechhofen VI. 27; 7 ♀ Trebgast VI. 28; 2 ♂ 3 ♀ Behringsmühl VI. 28.
7. *Anthob. (Eusphal.) torquatum* Mrsh., lokal u. selten. 12 Bug (Bruderwald) V. u. VI. 26; 1 Kreuzberg VI. 26; 2 Stübig VI. 26; 1 Oberhaid V. 27.
8. *Anthob. (Eusphal.) sorbi* Gyll., selten. 1 ♂ Kreuzberg V. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
9. *Anthob. (Eusphal.) rectangulum* Fauv., sehr selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt).
10. *Anthob. longipenne* Er., selten; meist im Gebirge. 1 Bamberg (S. v. Haupt).

K. Proteininae

Metopsia Wollaston.

1. *Metops. (Phloeobium) clypeata* Müll., sehr selten, unter Laub u. Moos. 2 Ebelsbach 5. V. 35 u. 15. IV. 36; 5 Stettfeld 25. X. 37 (det. Engert).

Megarthus Steph.

1. *Megr. affinis* Mill., ziemlich selten. 1 Bamberg (Altenburg) V. 27; 2 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43 (unter faulenden Pflanzen).

Proteinus Latr.

1. *Protein. ovalis* Steph., sehr lokal u. selten; west- u. südeurop. Art. 1 Bischberg X. 31; 1 Staffelbach 22. X. 41.
2. *Protein. brachypterus* F., häufig. 1 Friesen IV. 26; 20 Bischberg X. 26; 10 Hallstadt XI. 26; 1 Strullendorf III. 27; 3 Hauptsmoorwald V. 27 u. XI. 31; 1 Oberhaid V. 28; 2 Staffelbach III. 29 u. 22. X. 41.
3. *Protein. macropterus* Cyll., nicht selten. 1 Staffelbach III. 29.

VIII. Micropeplidae

Micropeplus Latr.

1. *Micropepl. porcatus* F., nicht häufig. 3 Staffelbach III. 24; 1 Kreuzberg V. 25; 3 Oberhaid V. 27; 1 Hauptsmoorwald V. 27; 1 Bamberg (S. v. Haupt); 1 Berneck i. Fichtelgeb. (S. v. Haupt).

IX. Pselaphidae

A. Pselaphinae

Euplectus Leach.

1. *Eupl. Duponti* Aubé., selten. 1 Hallstadt I. 29.
2. *Eupl. piceus* Motsch., sehr selten. 3 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Eupl. signatus* Rchenb., selten. 4 Bamberg (S. v. Haupt).
4. *Eupl. sanguineus* Denny, nicht selten. 2 Teuschnitz (Frankenwald, S. Pfr. Glaser).
5. *Eupl. Karsteni* Reichb., nicht selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt, det. Reitt.); 1 Teuschnitz (Frankenwald, S. Pfr. Glaser).
6. *Eupl. nanus* Reichb., sehr selten; 2 Bamberg (Hain) 23. II. 48 (im Mulm alter Eichen).

Batrisesodes Reitter.

1. *Batr. venustus* Reichb., nicht häufig; 2 Staffelbach II. 29 (Maingeniste).

Bryaxis Leach.

1. *Bryax. sanguinea* Reichb., nicht selten. 1 Bug b. Bbg. III. 24, 1 Ebing II. 24; 1 Staffelbach I. 25; 1 Pettstadt XI. 29 (Flußgeniste).
2. *Bryax. longicornis* Leach., nicht selten. 25 Staffelbach, Oberhaid, Strullendorf, Stegaurach, Willersdorf, Rattelsdorf III., IV und XII. 29 u. 30 (an Wasserrändern).

Brachygluta Thoms.

1. *Brach. fossulata* Reichb., häufig. 8 Staffelbach I. 26; 5 Kreuzberg II. 26; 4 Seehof XI. 26; 4 Strullendorf III. 27; 10 Scheßlitz XI. 27; 9 Ebing II. 28; 6 Bamberg (Hain) 23. II. 43 und von vielen anderen Orten.
2. *Brach. haematica* Reichb., nicht selten. 1 Bug I. 26; 1 Memmelsdorf I. 29; 1 Stegaurach III. 30; 1 Oberhaid V. 31; 1 Zentbechhofen VI. 31 (meist Geniste an Wasserrändern); 13 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43.

Reichenbachia Leach.

1. *Reichenb. juncorum* Leach., nicht selten. 1 Bamberg (Michaelsberger Wald) X. 29; 1 Oberhaid V. 31.
2. *Reichenb. impressa* Panz., ziemlich selten. 1 Strullendorf XI. 29; 4 Stegaurach III. 30, 1 Bamberg (S. v. Haupt).
3. *Reichenb. antennata* Aubé., sehr sporadisch und selten. West- und Südeuropa; für Deutschland thermophile Art; 2 Bruckertshof IV. 31; 1 Bamberg (S. v. Haupt) um 1890.

Bythinus Leach.

1. *Byth. puncticollis* Denny, recht selten, Gebirgstier; 1 Strullendorf III. 26; 1 Staffelberg IV. 31; 2 Zentbechhofen V. 31; 1 Rattelsdorf 10. XII. 34 (im Winterquartier auf einer Kopfweide).

2. *Byth. validus* Aubé, sehr lokal und selten, 3 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43 (Auwald).
3. *Byth. bulbifer* Reichb., häufig. 3 Hauptsmoorwald b. Bamberg V. 21; 1 Memmelsdorf I. 30; 3 Oberhaid V. 30; 2 Zentbechhofen VI. 31; 1 Rattelsdorf 10. XII. 34.
4. *Byth. clavivornis* Panz., sehr lokal und selten; 1 Ebing II. 26.
5. *Byth. Curtisi* Denny., nicht häufig. 3 Bamberg (Hain) IV. 28 u. 23. II. 43.
6. *Byth. Burelli* Denny, selten. 1 Oberau b. Staffelstein 9. III. 43.

Tychus Leach.

1. *Tych. niger* Payk., an sumpfigen Orten unter abgefallenem Laub; 1 Bug, I. 26;

Pselaphaulax Reitt.

1. *Psel. dresdensis* Hrbst., recht lokal und selten. 1 Staffebach III. 28.

Pselaphus Hrbst.

1. *Psel. Heisei* Hrbst, häufig; an sumpfigen Orten unter abgefallenem Laub. 1 Bug I. 26; 2 Kreuzberg II. 26; 1 Zapfendorf II. 26; 20 Hauptsmoorwald, Oberhaid, Hirschaid, Kreuzberg, Ebing, Zeckendorf II., III. u. XII. 29 u. 30.

Tyrus Aubé.

1. *Tyr. mucronatus* Panz., selten; in Baummulm. 1 Teuschnitz im Frankenwald (S. Pfr. Glaser).

B. Clavigerinae

Claviger Preyssl.

1. *Claviger testaceus* Preyssl., nicht häufig. 2 Kreuzberg 8. V. 36 (bei *Lasius flavus*).
2. *Claviger longicornis* Müll., selten; bei Ameisen. 1 Teuschnitz im Frankenwald (S. Pfr. Glaser).

X. Histeridae

Onthophilus Leach.

1. *Onthoph. striatus* Forst. (*sulcatus* Oliv.), nicht selten. 1 Hallstadt (Börstig) IX. 28; 1 Drügendorf X. 29; 1 Bruckertshof VII. 30.

Abraeus Leach.

1. *Abr. globosus* Hoffm., nicht selten. 4 Bamberg (Hain) XII. 31 (im Mulm alter Eichen bei *Lasius*).

Acritus Leconte.

1. *Acrit. nigricornis* Hoffm. (*seminulum* Küst.). 1 Bamberg (S. v. Haupt).

Gnathonecus Duval.

1. *Gnath. rotundatus* Kugelann., selten. 1 Pettstadt XI. 29 (unter Regnitzgeniste); 1 Hauptsmoorwald 16. VI. 32; 1 Bamberg (Hain) 28. III. 48 (im Mulm alter Eichen).

Saprinus Erichson.

1. *Sapr. semistriatus* Scriba, häufig. 5 Bug VI. 25; 3 Viereth VI. 28; 6 Strullendorf VII. 29; 4 Hauptsmoorwald VIII. 30; 10 Hallstadt 6. V. 33; 5 Bruckertshof 17. VI. 33; 10 Stettfeld 12. VIII. 37; 2 Kreuzberg 6. VIII. 40.
2. *Sapr. rugifer* Payk., sehr selten; mehr nord- und osteuropäische Art. 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt, det. Bickhardt).
3. *Sapr. lautus* Er., sehr selten. 1 Bamberg (S. v. Haupt, det. Reitt.).
4. *Sapr. aeneus* F., nicht selten. 20 Oberhaid V. 29; 1 Stegaurach V. 30; 1 Bruckertshof 17. VI. 33.
5. *Sapr. rugifrons* Payk., selten. 2 Strullendorf 21. VI. 43.

Dendrophilus Leach.

1. *Dendr. punctatus* Hrbst., ziemlich selten. 2 Bamberg (Hain) V. 26; 6 Bamberg (Altenburg) V. 28, bei *Lasius fuliginosus*; 2 Strullendorf V. 30 u. 17. VI. 41; 1 Bamberg (Hain) 28. III. 48; 1 Bamberg (S. v. Haupt); 1 Berneck i. Fichtelgebirge (S. v. Haupt).
2. *Dendr. pygmaeus* L., selten. 1 Bamberg (Hain) V. 26.

Micromatus Lew.

1. *Micr. flavicornis* Hrbst., nicht selten: 4 Bamberg (Hain), in Baumschwämmen, 23. II. 43.

Platysoma Leach.

1. *Platys. compressum* Hrbst., nicht selten. 1 Kreuzberg II. 30; 1 Bug (Bruderwald) 1. IV. 38.

Hister L.

1. *Hist. quadrimaculatus* L., nicht selten. 2 Staffelbach IV. 30; 5 Unterhaid V. 30; 1 Strullendorf V. 30; 2 Zeil a. Main V. 31 u. 8. V. 33; 7 Kreuzberg 2. VI. 32 u. 2. V. 33; 1 Hirschaid 6. V. 33; 1 Eltmann 10. V. 35; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
2. *Hist. unicolor* L., nicht selten; gern unter faulenden Pflanzen. 1 Oberhaid V. 29; 1 Bamberg (Michelsberger Wald) IX. 29; 11 Hauptsmoorwald (Kunigundenruh) VIII. 31; 6 Hauptsmoorwald 16. VI. 32; 1 Bruckertshof 17. VI. 33; 2 Stettfeld 3. VI. 41; 2 Pautzfeld 21. VI. 41; 10 Oberau b. Staffelstein 10. VIII. 42.
3. *Hist. striola* Sahlbg., nicht häufig. 15 Hauptsmoorwald V. 30 u. 16. VI. 32; 2 Strullendorf VIII. 31 u. 8. VI. 43; 1 Hirschaid 18. VI. 32; 2 Oberhaid 4. VI. 41.
4. *Hist. cadaverinus* Hoffm., nicht selten. 4 Strullendorf VIII. 30 u. 6. VII. 33; 1 Drügendorf X. 30; 3 Hallstadt 6. V. 33; 1 Pautzfeld 21. VI. 40; 1 Bamberg (S. v. Haupt).
5. *Hist. helluo* Er., sehr selten. 1 Bamberg (Hauptsmoorwald) 10. VII. 36 (auf Erle); 1 Oberhaid 20. VI. 35 (auf Erle). Die Art ersteigt Erlen und stellt dort den Larven des Erlenblattkäfers (*Agelastica alni*) nach.

6. *Hist. quadrinotatus* Scrib., nicht selten. 5 Staffelbach V. u. VI. 29 u. 30; 1 Drügendorf V. 30; 6 Ebelsbach V. 31 u. 2. V. 41; 2 Viereth VI. 31; 1 Unterschleichach 10. V. 32; 1 Dörfleins b. Hallstadt 28. III. 33; 1 Reckendorf 12. VI. 40; 10 Oberhaid 4. VI. 40; 8 Hallstadt (Börstig) 4. VI. 41.
7. *Hist. funestus* Er., hier anscheinend nicht selten. 1 Drügendorf V. 29; 1 Pettstadt XI. 29; 8 Hirschaid VI. u. VIII. 29; 5 Strullendorf IV. 29 u. 8. V. 42; 20 Hauptsmoorwald (Kunigundenruh) VIII. 31 (unter faulenden Pflanzen); 4 Hauptsmoorwald 16. VI. 32; 5 Bruckertshof 7. VII. 33 u. 4. VI. 41; 4 Staffelbach 5. VII. u. 4. IX. 41.
8. *Hist. fimetarius* Hbst., nicht häufig. 1 Unterhaid V. 31.
9. *Hist. stercorarius* Hoffm., nicht selten. 4 Staffelbach III. 30; 2 Bruckertshof V. 31; 2 Hirschaid VII. 31 u. 8. VI. 32; 20 Hauptsmoorwald (Kunigundenruh) VIII. 31 (unter faulenden Pflanzen); 1 Rattelsdorf 27. VI. 32; 1 Bug (Bruderwald) 1. IV. 36; 1 Ehrenbürg b. Forchheim 17. VI. 36; 3 Ebelsbach 15. IV. 36; 1 Ebern 10. XI. 41.
10. *Hist. marginatus* Er., sehr selten; unter Laub und faulenden Pflanzenstoffen. 1 Friesener Warte IV. 29; 1 Geisfeld IV. 30; 1 Hallstadt (Börstig) 4. VI. 41.
11. *Hist. ruficornis* Grimm., selten; im Mulm alter Bäume; gerne in Gesellschaft von *Lasius niger*. 2 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).
12. *Hist. purpurascens* Hrbst., nicht selten. 7 Staffelbach XI. 29 (Maingeniste); 1 Pettstadt XI. 29 (Regnitzgeniste); 2 Memmelsdorf I. u. IV. 30; 4 Hegnabrunn b. Neuenmarkt V. 30; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33 (Itzgeniste bei Sommerhochwasser).
ab. niger Schmidt. 1 Hegnabrunn b. Neuenmarkt (Kulmbach) V. 30.
13. *Hist. ventralis* Mrs., selten. 2 Strullendorf V. 30 u. 9. VII. 32 (an Aas); 1 Bamberg um 1900 (S. v. Haupt).
14. *Hist. neglectus* Germ., ziemlich selten. 1 Pettstadt XI. 31 (Regnitzgeniste); 30 Rattelsdorf 27. VI. 33 (im Geniste der Itz bei Sommerhochwasser).
15. *Hist. carbonarius* Illig., häufig. 2 Staffelbach III. 30 (Maingeniste); 2 Oberhaid V. 30; 1 Saltendorf b. Höchststadt a. Aisch IX. 30; 3 Strullendorf VIII. 31; 5 Hirschaid 8. VI. 32; 8 Hallstadt (Börstig) 24. V. 33.
16. *Hist. bimaculatus* L., selten hier anscheinend. 1 Strullendorf 8. V. 43 (an einer faulen Rübe auf Sand).
17. *Hist. (Atholus) corvinus* Germ., nicht selten. 20 Hirschaid VIII. 30 u. 6. VIII. 32 (unter faulenden Pflanzenstoffen); 4 Strullendorf VIII. 30 u. 8. V. 43; 3 Hauptsmoorwald (Kunigundenruh) VIII. 30; 2 Bug VIII. 30; 1 Scheßlitz II. 31; 2 Unterhaid 21. V. 33; 1 Rattelsdorf 27. VI. 33; 2 Staffelbach 16. VII. 43.

Eine recht erhebliche Anzahl der vorgeführten Arten an Staphylinoiden gilt bisher als selten oder sehr selten in der deutschen Fauna, so daß mit deren Feststellung hier im Gebiete manch bemerkenswerter Beitrag zur Kenntnis der fränkischen Coleopterenfauna geleistet sein mag.

Die bemerkenswerteren Erscheinungen seien vielleicht hier doch noch der rascheren und leichteren Übersicht wegen und um Sammler in Nachbargebieten auf sie aufmerksam zu machen kurz zusammenfassend registriert, in der Reihenfolge der Familien und Gattungen:

Silphidae: *Ablattaria laevigata* L., *Catops grandicollis* Er., *coracinus* Kelln., *subfuscus* Kelln., *Nargus brunneus* Strm., *Nemadus colonoides* Kr.

Liodidae: *Liodes parvula* Sahlb., *Cyrtusa pauxilla* Schmidt.

Scydmaenidae: *Stenichnus pusillus* Müll., *Euconnus claviger* Müll., *pubicollis* Müll., *Scydmaenus Hellwigi* Hrbst.

Staphylinidae: *Ocalea rivularis* Mill., *Amarochara forticornis* Boisd., *Calodera rufescens* Kr., *Chilopra longitarsis* Er., *Aleochara cuniculorum* Kr., *inconspicua* Aubé, *spadicea* Er., *Microglotta marginalis* Gyll., *gentilis* Märk., *Ozyusa incrassata* Rey., *Oxyptoda lateralis* Mnnh., *longipes* Rey., *Alaobia scapularis* Sahlb., *Atheta nigella* Er., *incana* Er., *inoptata* Shb., *arata* Muls., *episcopalis* Brnh., *laevicauda* Shlb., *palleola* Er., *cadaverina* Bris., *fimorum* Bris., *muscorum* Bris., *arata* Muls., *putrida* Kr., *livida* Er., *orbata* Er., *Gnypeta velata* Er., *Ischnopoda leucopus* Mrsh., *Bolitochara bella* Märk., *Brachida exigua* Heer, *Oligota atomaria* Er., *Conosoma bipustulatum* Gerh., *Tachyporus formosus* Matth., *Tachinus rufipennis* Gyll., *subterraneus* L., *humeralis* Grav., *proximus* Kr., *Myceporus punctus* Gyll., *rufescens* Steph., *forticornis* Fvl., *Euryporus picipes* Payk., *Acylophorus Wagenschieberi* Kiesw., *Quedius lateralis* Grav., *scitus* Grav., *maurus* Sahlb., *ochropterus* Er., *unicolor* Kiesw., *punctatellus* Er., *laevigatus* Gyll., *dubius* Heer ssp. *fimbriatus* Er., *maurorufus* Grav., *picipes* Mnnh., *nigriceps* Kr., *memoralis* Boud., *cincticollis* Kr., *rufipes* Grav., *paradisianus* Heer, *fullvicollis* Steph., *Emus hirtus* L., *Staphylinus flavopunctatus* Latr., *tenebricosus* Grav., *compressus* Mrsh., *macrocephalus* Grav., *alpestris* Er., *pedator* Grav., *Philonthus nitidus* F., *montivagus* Heer, *laevicollis* Boisd., *temporalis* Rey., *frigidus* Kiesw., *nitidulus* Grav., *corvinus* Er., *rufimanus* Er., *jurgans* Tottenham, *virgo* Grav., *puella* Nordm., *pullus* Nordm., *thermarum* Aubé, *astutus* Er., *trossulus* Nordm., *rectangulus* Shp., *exiguus* Nordm., *Othius melanocephalus* Grav., *Xantholinus atratus* Heer, *glaber* Nordm., *lentus* Grav., *Doliceon biguttulus* Boisd., *Achenium humile* Nicol., *depressum* Grav., *Lathrobium gracile* Hampe, *laevipenne* Heer, *castaneipenne* Kolen, *pallidum* Nordm., *Medon bicolor* Oliv., *obscorellus* Er., *Lithocharis ochracea* Er., *Stilicus angustatus* Geoffr., *subtilis* Er., *Erichsoni* Faur., *Astenus pulchellus* Er., *neglectus* Märk., *Paederus brevipennis* Lac., *caligatus* Er., *limnophilus* Er., *Stenus longipes* Heer, *Rogeri* Kr., *silvester* Er., *incanus* Er., *palposus* Er., *ruralis* Er., *melanopus* Mrsh., *atratus* Er., *declaratus* Er., *vafellus* Er., *cautus* Kr., *picipennis* Er., *palustris* Er., *nigritulus* Gyll., *solutus* Er., *Trogophloeus obesus* Kiesw., *impressus* Boisd., *gracilis* Mnnh., *Bledius tricornis* Hrbst., *Haploderus caesus* Er., *Coryphium angusticollis* Steph., *Anthophagus alpinus* F., *Lesteva pubescens* Mnnh., *Orochares angustata* Er., *Acidota cruentata* Mnnh., *Arpedium quadrum* Grav., *Phyllodrepa nigra* Grav., *Anthobium atrum* Er., *sorbi* Gyll., *rectangulum* Faur., *longipenne* Er., *Metopsia clypeata* Müll., *Proteinus ovalis* Steph.

Pselaphidae: *Euplectus piceus* Motsch., *nanus* Rchb., *Reichenbachia antennata* Aubé, *Bythinus clavicornis* Panz., *puncticollis* Denny, *validus* Aubé, *Tyrus mucronatus* Panz.

Clavigeridae: *Claviger longicornis* Müll.

Histeridae: *Saprinus rugifer* Payk., *lautus* Er., *Hister helluo* Er., *marginatus* Er., *ruficornis* Grimm.

Die hier vorgetragene Liste der mehr selteneren Erscheinungen in der hiesigen Staphylinoidenfauna dürfte auch eine gewisse Anzahl von sog. transgredierenden Arten aufweisen, d. h. von Arten, deren Hauptverbreitungsgebiet in einer der benachbarten tiergeographischen Zonen und außerhalb der deutschen Landesgrenzen, im Westen, Süden, Osten oder Norden gelegen ist und die als mehr oder minder fremde Faunenelemente in unser Gebiet nur noch gleichsam einstrahlen und dann hier auch vielfach die Grenze ihrer Verbreitung finden.

Meist handelt es sich bei diesen transgredierenden Arten um seltenere Erscheinungen mit meist starker örtlicher Beschränkung ihres Vorkommens und nur gelegentlich stärkerem Anschwellen ihrer Häufigkeit, je nach den jeweiligen (periodisch) wechselnden klimatischen Verhältnissen.

Eine größere Anzahl von Arten unseres Untersuchungsgebietes scheint in ihrer Hauptverbreitung mehr der westeuropäischen (atlantischen), resp. südwesteuropäischen Fauna anzugehören. Recht merklich zurück treten daneben solche mit mehr südlicher (mediterraner) und solche mit mehr östlicher oder südöstlicher (pontischer) Verbreitung. Einer wieder entschieden größeren Anzahl von Arten kommt montaner oder boreomontaner Charakter zu (mehr nordische Arten, Gebirgstiere, Moortiere).

Die Zahl dieser letzteren Arten hätte sich vielleicht durch eingehendere faunistische Erfassung der eigentlichen Gebirgslagen unseres Gebietes und noch mehr der Nachbargebiete, des eigentlichen Steigerwaldes, der Haßberge und der Fränkischen Schweiz, sowie besonders des benachbarten Frankenwaldes und des Fichtelgebirges wohl noch merklich mehren lassen.

Die einzelnen Arten heute schon mit Sicherheit ihren Faunengebieten zuzuschreiben, ist wohl noch schwer und vielleicht verfrüht, aber über eine gewisse Anzahl von Arten reichen unsere heutigen Kenntnisse doch schon zu einem gewissen, wenn auch noch mehr provisorischen Urteile aus, das vielleicht in folgender Zusammenstellung seinen Ausdruck finden mag.

I. Arten mit mehr westeuropäischer (atlantischer) oder südwesteuropäischer Verbreitung.

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Catops grandicollis</i> Er. | 10. <i>Tachyporus formosus</i> Matth. |
| 2. <i>Ablattaria laevigata</i> F. | 11. <i>Heterothops quadripunctulus</i> Grav. |
| 3. <i>Stenichnus pusillus</i> Müll. | 12. <i>Quedius nigriceps</i> Kr. |
| 4. <i>Chilopora longitarsis</i> Er. | 13. <i>Philonthus pullus</i> Nordm. |
| 5. <i>Amarochara forticornis</i> Boisd. | 14. <i>Paederus caligatus</i> Er. |
| 6. <i>Phloeopora corticalis</i> Grav. | 15. <i>Oxytelus inustus</i> Grav. |
| 7. <i>Atheta fimorum</i> Boisd. | 16. <i>Proteinus ovalis</i> Steph. |
| 8. <i>Bolitochara bella</i> Märk. | 17. <i>Reichenbachia antennata</i> Aubé. |
| 9. <i>Oligota atomaria</i> Er. | |

II. Mehr südeuropäische (mediterrane Arten).

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Nargus brunneus</i> Strm. | 7. — <i>pedator</i> Grav. |
| 2. <i>Atheta putrida</i> Kr. | 8. — <i>ater</i> Grav. |
| 3. <i>Brachida exigua</i> Heer | 9. — <i>flavopunctatus</i> Latr. |
| 4. <i>Emus hirtus</i> L. | 10. <i>Philonthus rufimanus</i> Er. |
| 5. <i>Quedius rufipes</i> Grav. | 11. — <i>virgo</i> Grav. |
| 6. <i>Staphylinus erythropterus</i> L. | 12. <i>Lathrobium castaneipenne</i> Kolem. |

III. Mehr ost- resp. südosteuropäische Arten.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. <i>Coryphium angusticolle</i> Steph. | 3. <i>Tachyporus abdominalis</i> F. |
| 2. <i>Haplodenus caesus</i> Er. | 4. <i>Saprinus rugifer</i> Payk. |

IV. Mehr montane und boreomontane Arten.

- | | |
|---|--|
| 1. <i>Choleva cisteloides</i> Fröl. | 22. — <i>brunnipes</i> F. |
| 2. <i>Ptomaphagus sericatus</i> Chd. | 23. — <i>tenebricosus</i> Grav. |
| 3. <i>Ocyusa incrassata</i> Rey. | 24. — <i>macrocephalus</i> Grav. |
| 4. — <i>maura</i> Er. | 25. <i>Philonthus montivagus</i> Heer |
| 5. <i>Oxyptoda lateralis</i> Mannh. | 26. — <i>laevicollis</i> Boisd. |
| 6. — <i>spectabilis</i> Märk. | 27. — <i>temporalis</i> Rey. |
| 7. <i>Atheta laevicauda</i> Sahlb. | 28. — <i>frigidus</i> Kiesw. |
| 8. — <i>currax</i> Kr. | 29. — <i>corvinus</i> Er. (Moortier) |
| 9. — <i>livida</i> Er. | 30. <i>Xantholinus lentus</i> Grav. |
| 10. — <i>episcopalis</i> Bernh. | 31. <i>Lathrobium gracile</i> Hampe (Moortier) |
| 11. <i>Gnypeta velata</i> Er. (nordeurop.) | 32. — <i>filiforme</i> Grav. |
| 12. <i>Ancylophorus Wagenschieberi</i> Kiesw. | 33. <i>Domene scabricollis</i> Er. |
| 13. <i>Quedius ochropterus</i> Er. | 34. <i>Coryphium angusticolle</i> Steph. |
| 14. — <i>unicolor</i> Kiesw. | 35. <i>Stenus impressus</i> Germ. |
| 15. — <i>cincticollis</i> Kr. | 36. <i>Anthrophagus bicornis</i> Block. |
| 16. — <i>paradisianus</i> Heer | 37. — <i>alpinus</i> F. (boreomont.) |
| 17. — <i>dubius</i> Heer ssp. | 38. — <i>abbreviatus</i> F. |
| 18. — <i>punctatellus</i> Heer | 39. <i>Anthobium longipenne</i> Er. |
| 19. — <i>fulvicollis</i> Steph. | 40. — <i>rectangulum</i> Fauv. |
| 20. — <i>laevigatus</i> Gyll. | 41. <i>Bythinus puncticollis</i> Denny. |
| 21. <i>Staphylinus fulvipennis</i> Er. | |

LITERATUR

1. Rosenhauer, Dr. Wilh. Gottl., Die Lauf- und Schwimmkäfer Erlangens. Erlangen 1842.
2. Krefß, Ignaz, Die Käfer des Steigerwaldes. Ein Beitrag zur entomolog. Fauna Frankens. Dritter Jahresber. Naturf. Ges. Bamberg 1856.
3. Krauß, H., Beiträge zur Koleopterenfauna der Fränkischen Schweiz. Sonderabdruck aus dem Entomolog. Jahrbuch von Dr. O. Krancher 1905.
4. Dorn, R., Leipzig. Entomologisches aus der Umgebung von Kronach, mit besonderer Berücksichtigung der Coleopteren. „Entomolog. Blätter“. Schwabach 1907.
5. Enslin, Dr. E., Pflanzenwelt und Tierleben der Frankenalb (aus Göhrings Führer durch die Fränkische Schweiz und ihre Vorberge. Erlangen.)
6. Schneid, Dr. Th., Die Laufkäfer (Carabidae) und Schwimmkäfer (Dytiscidae) der Umgebung Bamberg's. XXX. Bericht der Naturf. Ges. Bamberg 1947.
7. Reitter, Edm., Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches, (5 Bände) Stuttgart 1908—1916.
8. Horion, Adolf, Nachtrag zur Fauna Germanica, Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter, Krefeld 1935.
9. Horion, Adolf, Faunistik der deutschen Käfer. Bd. I. Krefeld 1941.
10. Winkler, A., Catalogus Coleopterarum regionis palaearcticae. Wien 1924—1932.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1948

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Schneid Theodor

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Staphylinoiden \(Kurzflügelkäfer und Kurzflüglerartige\) der Umgebung Bambergs 133-178](#)