

Medicinische Statistik der Stadt Bamberg für die Jahre 1892 bis 1895.

Von
Medicinalrath Dr. Roth.



I. Stand der Bevölkerung.


Auf Grund der Volkszählung vom 1. December 1890 und unter Berücksichtigung der im Jahresfünft 1886—1890 eingetretenen Vermehrung der Bevölkerung liess sich die Bevölkerungszahl berechnen für Ende

1892	auf 18730 Personen männl. Geschlechts,		
	" 18801	" weibl.	" 37531 zusammen
1893	" 19288	" männl.	"
	" 19151	" weibl.	" 38239 "
1894	" 19746	" männl.	"
	" 19501	" weibl.	" 39247 "

Die Volkszählung vom 2. December 1895 ergab eine Bevölkerung von

19321	Personen männlichen Geschlechts	= 49,6%
19628	" weiblichen	" = 50,3%
38949	Personen zusammen.	

Gegen den Stand der Bevölkerung vom 1. December 1890 ergibt sich eine Mehrung von



1607 Personen männlichen Geschlechts	= 9,07%
1527 " weiblichen "	= 8,4 %
3134 Personen	= 8,07%

Diese Mehrung ist erheblich geringer, wie jene vom Jahrfünft 1886—1890, in welchem dieselbe betragen hatte

2544 Personen männlichen Geschlechts	= 16,6%
1750 " weiblichen "	= 10,6%
4292 Personen	= 13,6%

Wie schon in dem vorhergehenden Berichte bemerkt wurde, hatte die starke Bevölkerungsmehrung dieses Jahrfünfts ihren Hauptgrund in der starken Vermehrung der Garnison; dass neben diesem Grunde auch noch andere Momente wirksam gewesen sind, lehrt der Umstand, dass im Jahrfünft 1891—1895 auch die Mehrung der weiblichen Bevölkerung nicht unbedeutend hinter dem Jahrfünft 1885—1890 zurückgeblieben ist.

Aus der geringeren Bevölkerungszunahme im Jahrfünft 1891—1895 erklärt sich auch der Umstand, dass die bei der Volkszählung vom 2. December 1895 gefundene Bevölkerungszahl hinter der berechneten zurückgeblieben ist.

Auf das einzelne Jahr des Jahrfünfts 1891—1895 trifft eine Mehrung von

321,4 Personen männlichen Geschlechts
305,4 " weiblichen "
626,8 Personen.

Unter Zugrundlegung dieser Zahlen lässt sich nachträglich die Zahl der Bevölkerung für die Jahre 1891 bis 1894 also berechnen:

1891: 18035 Pers. männl., 18406 weibl. Geschl., 36441 zusammen
1892: 18356 " " 18711 " " 37067 "
1893: 18677 " " 19016 " " 37693 "
1894: 18998 " " 19321 " " 38316 "

Die Verhältnisszahlen der männlichen zur weiblichen Bevölkerung haben sich im letzten Jahrfünft noch mehr zu Gunsten der männlichen verschoben;

Dasselbe war:

im Jahrfünft 1886—1890:	49,6% zu 50,3%
" " 1881—1885:	49,4% " 50,6%
" " 1881—1885:	47,8% " 52,2%

II. Bewegung der Bevölkerung.

1. Geburten.

Ueber die in den Jahren 1892—1895 erfolgten Geburten giebt nachfolgende Uebersicht Aufschluss:

	1892	1893	1894	1895
Gesamtzahl der Geburten	1111	1117	1116	1167
% der Bevölkerung . . .	2,99	2,96	2,91	2,99
hierunter Knaben . . .	565	558	581	607
" Mädchen . . .	546	559	535	560
Lebend geborene . . .	1079	1091	1091	1136
hierunter Knaben . . .	549	545	566	587
" Mädchen . . .	530	546	525	549
" Eheliche . . .	893	884	894	923
" Uneheliche . . .	186	207	197	213
Todtgeborene . . .	32	26	25	31
hierunter Knaben . . .	16	13	15	20
" Mädchen . . .	16	13	10	11
" Eheliche . . .	27	22	20	26
" Uneheliche . . .	5	4	5	5
Ehelich Geborene . . .	920	906	914	949
hierunter Knaben . . .	473	455	479	489
" Mädchen . . .	447	451	435	460
Unehelich Geborene . . .	191	211	202	218
hierunter Knaben . . .	92	103	102	118
" Mädchen . . .	99	108	100	100
Zwillingsgeburten . . .	20	11	12	10
% der Geburten . . .	1,8	0,9	1,8	0,8

Auf die Bevölkerung kommen:

	1892	1893	1894	1895
Knaben % . . .	1,5	1,4	1,5	1,5
Mädchen % . . .	1,4	1,4	1,3	1,4

Auf die männl. Bevölk. kommen:

Knaben % . . .	3,03	2,9	3,05	3,1
----------------	------	-----	------	-----

Auf die weibl. Bevölk. kommen:

Mädchen % . . .	2,9	2,9	2,7	2,8
-----------------	-----	-----	-----	-----

Auf 100 Mädchen kommen Knaben	103,4	99,8	108,5	108,3
-------------------------------	-------	------	-------	-------

Auf die Geburten treffen:

Lebendgeborene % . . .	97,02	97,6	97,7	97,3
Todtgeborene % . . .	2,88	2,3	2,2	2,6

Auf die Bevölkerung treffen:	1892	1893	1894	1895
Lebendgeborene ‰	29,1	28,9	28,4	29,1
Todtgeborene ‰	0,8	0,7	0,6	0,8

Auf die Geburten treffen:				
ehelich Geborene ‰	82,8	81,1	81,9	81,3
unehelich Geborene ‰	17,1	18,8	19,1	18,6

Auf die Bevölkerung treffen:				
ehelich Geborene ‰ ₀₀	24,8	24,3	23,8	24,3
unehelich Geborene ‰ ₀₀	5,1	5,5	5,2	5,6

Von den Todtgeborenen sind:				
ehelich	%	.	.	84,3 80,7 80,0 83,8
unehelich	%	.	.	15,6 19,3 20,0 16,1

Auf die ehelich Geb. kommen				
ehelich Todtgeborene ‰	2,9	2,3	2,1	2,7

Auf die unehelich Geb. kommen:					
ehelich Todtgeborene ‰	2,6	2,3	2,4	2,1	

Auf 100 ehelich Geb. kommen:

ehelich geborene Knaben	51,4	50,2	52,4	51,5
-----------------------------------	------	------	------	------

„ „ Mädchen 48,5 49,8 47,5 48,4
Auf 100 unehel. Geb. kommen:

unehelich geborene Knaben	48,1	48,8	50,4	54,1
„ „ Mädchen	51,8	51,2	49,5	45,8

Die zeitliche Vertheilung der Todtgeborenen ist folgende:

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Anzahl	10	16	17	19	28	25	22	20	17	15	12	10

1892	7	2	6	2	3	4	1	2	1	—	2	2
1893	3	2	3	—	—	3	2	4	2	2	1	4

1894	2	1	1	4	2	1	1	3	2	4	2	2
1895	1	2	2	4	5	2	3	1	1	4	3	3

2. Sterblichkeit.

Gestorben sind (mit Ausschluss der Todtgeborenen):

	1892	1893	1894	1895
...	...	...	...	...

Personen männlichen Geschlechts . . .	369	386	389	364
---------------------------------------	-----	-----	-----	-----

„ weiblichen „ . . 427 401 401 404

zusammen	796	787	790	768
--------------------	-----	-----	-----	-----

% der Bevölkerung	21,4	20,8	20,6	19,7
-----------------------------	------	------	------	------

Mittel der Jahre 1890—1894: 1885—1889:

22,6	23,3
------	------

Die Verteilung der Gestorbenen auf die einzelnen Lebensabschnitte ist in 3 Tabellen dargestellt.

Lebensabschnitte ist in der Tabelle I verzeichnet.

Tabelle 1.
Todesfälle nach Lebensabschnitten in den Jahren 1892 — 1895.

Lebensjahr	1892						1893						1894						1895					
	Männlich	Weiblich	Zusammen	% der Todesfälle	$\frac{1}{1000}$ der Bevölkerung	% der in der Alterskl. lebend.	Männlich	Weiblich	Zusammen	% der Todesfälle	$\frac{1}{1000}$ der Bevölkerung	% der in der Alterskl. lebend.	Männlich	Weiblich	Zusammen	% der Todesfälle	$\frac{1}{1000}$ der Bevölkerung	% der in der Alterskl. lebend.	Männlich	Weiblich	Zusammen	% der Todesfälle	$\frac{1}{1000}$ der Bevölkerung	% der in der Alterskl. lebend.
1	119	97	215	26,0	5,8		111	88	199	24,4	5,2		113	98	211	25,8	5,5		119	115	234	29,3	6,01	
2	24	23	47	5,7	1,2	9,3	15	21	36	4,4	0,9	8,7	14	36	50	6,1	1,3	10,1	16	23	39	4,8	1,002	9,6
3 — 5	19	20	39	4,7	1,05		15	17	32	3,9	0,8		28	21	49	6,01	1,2		12	10	22	2,7	0,5	
6 — 10	9	10	19	2,3	0,5	0,6	8	6	14	1,7	0,3	0,4	6	10	16	1,9	0,4	0,5	4	6	10	1,2	0,2	0,3
11 — 15	4	2	6	0,7	0,1	0,1	6	2	8	0,9	0,2	0,2	2	6	8	0,9	0,2	0,2	6	6	12	1,5	0,3	0,3
16 — 20	5	7	12	1,5	0,3	0,3	11	10	21	2,5	0,5	0,5	10	7	17	2,08	0,4	0,4	12	12	24	3,007	0,6	0,7
21 — 30	30	24	54	6,5	1,4	0,8	21	25	46	5,6	1,2	0,7	26	14	40	4,8	1,04	0,6	21	23	44	5,5	1,1	0,6
31 — 40	18	25	43	5,2	1,1	1,07	29	20	49	6,2	1,2	1,2	21	22	43	5,2	1,1	1,07	19	22	41	5,1	1,05	1,02
41 — 50	22	30	52	6,3	1,4	1,4	31	34	65	7,9	1,7	1,8	34	32	66	8,09	1,7	1,9	28	29	57	7,1	1,4	1,6
51 — 60	32	39	71	8,6	1,9	2,7	42	44	86	10,5	2,2	3,3	35	30	65	7,9	1,6	2,5	27	31	58	7,2	1,4	2,2
61 — 70	41	53	94	11,4	2,5	5,7	44	64	108	13,2	2,8	6,6	52	51	103	12,6	2,6	6,2	51	44	95	11,9	2,4	5,8
71 — 80	35	63	98	11,8	2,6	12,4	38	52	90	11,07	2,3	11,4	34	52	86	10,5	2,2	10,9	37	59	96	12,03	2,4	12,1
über 80	11	34	45	5,4	1,2	29,4	14	18	32	3,9	0,8	20,9	14	22	36	4,4	0,9	23,5	12	24	36	4,5	0,9	23,5

Bezüglich der Jahreszeit vertheilen sich die Todesfälle in folgender Weise:

Tabelle 2. Todesfälle nach der Jahreszeit in den Jahren 1892—1895.

M o n a t	1892:		1893:		1894:		1895:	
	Todesfälle	% aller Todesfälle	Todesfälle	% aller Todesfälle	Todesfälle	% aller Todesfälle	Todesfälle	% aller Todesfälle
Januar . . .	85	10,6	64	8,1	78	9,08	69	8,9
Februar . . .	83	10,4	63	8,005	62	7,9	53	6,9
März . . .	85	10,6	71	9,02	77	9,7	94	12,2
April . . .	59	7,4	59	7,4	59	7,4	72	9,3
Mai . . .	66	8,2	69	8,7	61	7,7	70	9,01
Juni . . .	37	4,6	67	8,5	76	9,6	75	9,7
Juli . . .	47	5,9	87	11,05	70	8,8	77	10,02
August . . .	92	11,5	84	10,6	59	7,4	45	5,8
September . .	61	7,6	64	8,1	55	6,9	65	8,4
Oktober . . .	63	7,9	45	5,7	54	6,8	51	6,6
November . .	57	7,1	43	5,4	68	8,6	40	5,1
December . .	61	7,6	71	9,02	71	8,9	57	7,4

Die Vertheilung der Todesfälle auf die einzelnen Monate ist in den vier Berichtsjahren eine sehr verschiedene.

Im Jahre:

1892 fällt das Maximum in den Aug., das Minimum in den Juni

1893 " " " " " Juli, " " " " Nov.

1894 " " " " " Jan., " " " " Okt.

1895 " " " " " März, " " " " Nov.

Im Mittel von 1880—1889

fiel das Maximum in den April, das Minimum in den November.

Im Mittel der Jahre 1890—1894

fiel das Maximum in den December, das Minimum in den Okt.

Die Differenz zwischen Maximum und Minimum beträgt im Jahre: 1892: 6,9%, 1893: 5,6%, 1894: 3,0%, 1895: 5,6%, im Mittel der Jahre 1890—1894: 2,5%, 1885—1889: 5,1%.

Die Monate ordnen sich, in Bezug auf das Belegtsein mit Todesfällen, aufsteigend, in folgender Art:

im Mittel von					
1892	1893	1894	1895	1890—1894	1880—1889
Juni	Nov.	Oktober	Nov.	Oktober	Nov.
Juli	Oktober	Sept.	August	Sept.	Sept.
Nov.	April	August	Oktober	Juni	Oktober

im Mittel von					
1892	1893	1894	1895	1890—1894	1880—1889
April	Februar	April	Februar	Mai	August
Sept.	Januar	Mai	Decemb.	Juli	Juni
Dec.	Sept.	Februar	Sept.	April	Juli
Oktober	Juni	Nov.	Januar	Nov.	Januar
Mai	Mai	Juli	Mai	August	Februar
Februar	März	Dec.	April	Dec.	Dec.
Januar	Dec.	Juni	Juni	Februar	März
März	August	März	Juli	März	Mai
August	Juli	Januar	März	Januar	April

Die Vertheilung der Todesfälle auf beide Jahrhälften ist folgende:

1892		1893		1894		1895		im Mittel von	
Todesf.	%	Todesf.	%	Todesf.	%	Todesf.	%	1880-89	1890-95
I. Sem. 415	52,1	393	49,9	413	52,2	433	54,9	52,2	53,3
II. Sem. 381	47,8	394	50,1	377	47,7	355	45,0	47,7	45,2

Betrachtet man die Sterblichkeit nach den Jahreszeiten, [wobei December, Januar, Februar als Winter, März, April, Mai als Frühling, Juni, Juli, August als Sommer, September, Oktober, November als Herbst gerechnet werden], so ergeben sich folgende Verhältnisse:

1892		1893		1894		1895		im Mittel von	
Todesf.	%	Todesf.	%	Todesf.	%	Todesf.	%	1890-94	1880-85
Winter 229	28,7	198	25,1	211	26,7	179	23,3	27,6	25,6
Frühling 210	26,3	199	25,2	197	24,9	236	30,7	25,5	28,5
Sommer 176	20,8	238	30,2	205	25,9	197	25,6	23,6	23,3
Herbst 181	22,7	152	19,3	177	22,4	156	20,3	22,4	21,1

In keinem der Berichtsjahre besteht eine Uebereinstimmung mit dem Typus, welcher aus dem 10jährigen Mittel von 1880—1889 hervorgeht. Die grösste Uebereinstimmung herrscht noch in der Erscheinung, dass im Herbst die Sterblichkeit am geringsten, oder wenigstens nahezu am geringsten ist.

Die Differenz zwischen dem am stärksten befallenen Winter und dem am geringsten befallenen Sommer beträgt im Jahre 1892: 7,9 %; die Differenz zwischen dem am stärksten befallenen Sommer und dem am geringsten befallenen Herbst im Jahre 1893 beträgt: 10,9 %; die Differenz zwischen dem am stärksten befallenen Winter und dem am geringsten be-

fallenen Herbst im Jahre 1894 beträgt: 4,3 ‰; die Differenz zwischen dem am stärksten befallenen Frühling und dem am geringsten befallenen Herbst im Jahre 1895 beträgt 10,4 ‰.

Die Differenz zwischen dem am stärksten befallenen Winter und dem am geringsten befallenen Herbst beträgt im Mittel der Jahre 1890—1894: 5,2 ‰.

Die Differenz zwischen den am stärksten und den am geringsten befallenen folgenden Jahreszeiten beträgt:

1892 Winter—Sommer 7,9 ‰

1893 Sommer—Herbst 10,9 ‰

1894 Winter—Herbst 4,3 ‰

1895 Frühling—Herbst 10,4 ‰

im Mittel 1890—94 Winter—Herbst 5,2 ‰

Sterblichkeit nach Todesursachen.

Die nachfolgende Tabelle III verzeichnet die Todesursachen in ihren Verhältnissen zur Zahl der Todesfälle und zur Zahl der Bevölkerung.

Tabelle 3.

Todesursache	1892			1893			1894			1895		
	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung
I. Entwicklungs-Krankheiten.												
Bildungsfehler	4	0,5	0,1	2	0,2	0,05	—	—	—	2	0,2	0,05
Lebensschwäche	34	4,2	0,9	34	4,3	0,9	35	4,4	0,9	51	6,6	1,3
Abzehrung der Kinder	10	1,2	0,2	10	1,2	0,2	19	2,4	0,4	17	2,2	0,4
Schwangerschafts-, Geburts- u. Wochenbetts-Anomalien	2	0,2	0,05	2	0,2	0,05	1	0,1	0,02	3	0,3	0,07
Altersschwäche	18	2,2	0,4	22	2,7	0,5	18	2,2	0,4	19	2,4	0,4
II. Infektions- u. allgem. Krankheiten.												
Scharlach	3	3,03	0,08	19	2,4	0,5	2	0,2	0,05	—	—	—
Masern	2	0,2	0,05	—	—	—	30	3,7	0,7	2	0,2	0,05
Rose	2	0,2	0,05	4	0,5	0,1	3	0,3	0,07	4	0,5	0,1
Diphtherie	32	4,02	0,8	13	1,6	0,3	21	2,6	0,5	11	1,4	0,2
Kindbettfieber	3	0,3	0,08	5	0,6	0,1	4	0,5	0,1	5	0,6	0,1
Pyämie, Septicaemie u. Wundinfektions-Krankheiten	4	0,5	0,1	6	0,7	0,1	3	0,3	0,07	3	0,3	0,07
Abdominaltyphus	2	0,2	0,05	9	1,1	0,2	4	0,5	0,1	5	0,6	0,1
Brechdurchfall	62	7,7	1,6	50	6,3	1,3	39	4,9	1,01	36	4,6	0,9
Ruhr	1	0,1	0,02	—	—	—	1	0,1	0,02	—	—	—
Influenza	38	4,7	1,02	21	2,6	0,5	7	0,8	0,1	16	2,08	0,4
Keuchhusten	21	2,6	0,5	7	0,8	0,1	10	1,2	0,2	20	2,6	0,5
Syphilis	3	0,3	0,08	3	0,3	0,07	3	0,3	0,07	3	0,3	0,07
Tuberculose	138	17,3	3,7	156	19,8	4,1	143	18,0	3,7	141	18,2	3,6

Todesursache	1892			1893			1894			1895		
	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung
Scrofulose	2	0,2	0,05	2	0,2	0,05	4	0,5	0,1	3	0,3	0,07
Perniciöse Anaemie	1	0,1	0,02	—	—	—	—	—	—	3	0,3	0,07
Akuter Gelenkrheumatismus . .	1	0,1	0,02	6	0,7	0,1	1	0,1	0,02	3	0,3	0,07
Gicht	3	0,3	0,08	1	0,1	0,02	1	0,1	0,02	1	0,1	0,02
Zuckerharnruhr	8	1,006	0,2	2	0,2	0,05	5	0,6	0,1	3	0,3	0,07
Gut- u. bösart. Neubildungen	40	5,03	1,07	36	4,5	0,9	44	5,5	1,1	50	6,5	1,2
Chronischer Alcoholismus . . .	1	0,1	0,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Lokalisierte Krankheiten.												
a) Krankheiten d. Nervensystems.												
Geisteskrankheiten	3	0,3	0,08	2	0,2	0,05	6	0,7	0,1	8	1,04	0,2
Gehirn- u. Gehirnhautkrankg	38	4,7	1,02	36	4,5	0,9	45	5,6	1,1	41	5,3	0,1
Gehirnschlagfluss	24	3,02	0,6	22	2,7	0,5	24	3,03	0,6	26	3,3	0,6
Rückenmarkskrankheiten . . .	3	0,3	0,08	3	0,3	0,07	3	0,3	0,07	9	1,1	0,2
Epilepsie	2	0,2	0,05	2	0,2	0,05	3	0,3	0,07	1	0,1	0,02
Trismus und Tetanus	3	0,3	0,08	3	0,3	0,07	3	0,3	0,07	7	0,9	0,1
b) Krankheiten der Athmungsorgane.												
Entzündungen d. Nase, d. Kehlkopfes, der Bronchien	27	3,3	0,7	23	2,9	0,6	17	2,1	0,4	20	2,6	0,5
Croupöse Lungenentzündung	47	5,9	1,2	53	6,7	1,4	38	4,8	0,9	32	4,1	0,8
Andere Entzündungen d. Lunge und des Rippenfells	27	3,3	0,7	21	2,6	0,5	23	2,9	0,6	35	4,5	0,8
Andere Erkrankungen der Athmungsorgane	8	1,006	0,2	19	2,4	0,5	17	2,1	0,4	18	2,3	0,4
c) Krankheiten der Circulationsorgane.												
Herz- und Herzbeutel-Erkrank.	47	5,9	1,2	49	5,9	1,2	66	8,3	1,7	52	6,7	1,3
Krankheiten der Gefäße	5	0,6	0,1	9	1,1	0,2	2	0,2	0,05	4	0,5	0,1
d) Krankheiten des Verdauungsapparates.												
Erkrankungen des Mundes, Rachens, der Speiseröhre, des Magens	—	—	—	4	0,5	0,1	5	0,6	0,1	5	0,6	0,1
Erkrankungen des Darmes . . .	5	0,6	0,1	11	1,3	0,2	9	1,1	0,2	8	1,04	0,2
Darmkatarrh der Kinder	36	4,5	0,9	23	3,5	0,7	19	2,4	0,4	30	3,9	0,6
Eingeweide-Brüche	3	0,3	0,08	5	0,6	0,1	4	0,5	0,1	1	0,1	0,02
Krankheiten der Leber	8	1,006	0,2	3	0,3	0,07	8	1,01	0,2	4	0,5	0,1
Krankheiten des Bauchfelles . .	5	0,6	0,1	3	0,3	0,07	2	0,2	0,05	2	0,2	0,05
e) Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane.												
Nierenkrankheiten	24	3,02	0,6	30	3,8	0,7	27	3,4	0,7	19	2,4	0,4
Krankheiten der Blase u. Harnröhre	2	0,2	0,05	2	0,2	0,05	4	0,5	0,1	3	0,3	0,07
Krankh. d. Geschlechtsorgane .	—	—	—	—	—	—	5	0,6	0,1	2	0,2	0,05

Todesursache	1892			1893			1894			1895		
	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung
f) Krankheiten der Muskeln, Knochen, Gelenke	16	2,0	0,4	11	1,3	0,2	15	1,8	0,3	10	1,3	0,2
g) Krankheiten der äus. Bedeckungen	4	0,5	0,1	6	0,7	0,1	12	1,5	0,3	6	0,7	0,1
IV. Sonstige Todesarten.												
Knochenbrüche, Wunden, Quetschungen, Zerreibungen und Blutungen	2	0,2	0,05	2	0,2	0,05	3	0,3	0,07	—	—	—
Unglücksfälle	9	1,1	0,2	8	1,01	0,2	13	1,6	0,3	13	1,5	0,3
Tod durch fremde Hand . .	—	—	—	1	0,1	0,02	3	0,3	0,07	1	0,1	0,02
Selbstmord	6	0,7	0,1	6	0,7	0,1	10	1,2	0,2	6	0,7	0,1
V. Unbestimmte Todesursachen.	6	0,6	0,1	6	0,7	0,1	4	0,4	0,1	1	0,1	0,02
Todesursachen nicht ermittelt	9	1,1	0,2	9	1,1	0,2						

In den 5 Hauptgruppen vertheilen sich die Fälle in folgender Weise:

Tabelle 3.

Todesursache	1892			1893			1894			1895		
	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung	Zahl der Todesfälle	% der Gesamtsterblichkeit	% der Bevölkerung
I. Entwicklungs-Krankheiten . . .	68	8,5	1,6	70	8,8	1,7	73	9,2	1,7	92	11,9	2,2
II. Infections- u. allgem. Krankheiten	367	46,1	9,5	340	43,07	8,2	325	41,1	8,03	312	40,6	6,5
III. Lokalisierte Krankheiten.												
a. Krankheiten des Nervensystems	73	9,1	1,9	68	8,6	1,6	84	10,6	2,01	92	11,9	1,2
b. Krankheiten d. Athmungsorgane	109	13,5	2,8	116	14,7	3,0	95	12,02	2,3	105	13,5	2,5
c. Krankheit. d. Circulationsorgane	52	6,5	1,3	58	7,3	1,4	68	8,6	1,7	36	7,2	1,4
d. Krankheiten des Verdauungsapparates	57	7,1	1,3	54	6,8	1,2	47	5,9	1,05	59	6,5	1,1
e. Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane	26	3,2	0,6	32	4,06	0,7	36	4,5	0,9	24	3,1	0,5
f. Krankheiten der Muskeln, Knochen, Gelenke	16	2,01	0,4	11	1,3	0,2	15	1,8	0,3	10	1,3	0,2
g. Krankheiten der äusseren Bedeckungen	4	0,5	0,1	6	0,7	0,1	12	1,5	0,3	6	0,7	0,1
IV. Sonstige Todesursachen . . .	18	2,2	0,3	17	2,1	0,3	31	3,9	0,6	20	2,6	0,4
V. Unbestimmte Todesursachen . .	6	0,7	0,1	15	1,9	0,3	4	0,5	0,1	1	0,1	0,02

Bezüglich der wichtigeren und häufigeren Todesursachen sollen noch folgende Einzelheiten hervorzuheben sein:

An Lebensschwäche starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	21 = 61,7 %	19 = 55,8 %	18 = 51,4 %	25 = 49,1 %
Weibl. „	13 = 38,2 „	15 = 44,2 „	17 = 48,6 „	26 = 50,9 „
Ehel. Abstamg.	31 = 91,1 „	28 = 82,3 „	30 = 85,7 „	39 = 76,4 „
Unehel. Abst.	3 = 0,9 „	6 = 19,7 „	5 = 14,3 „	12 = 23,5 „
Zusammen	34 = 3,1 %	34 = 3,1 %	35 = 3,2 %	41 = 3,6 %

An Abzehrung der Kinder im 1. Lebensjahre starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	5 = 50 %	6 = 60 %	11 = 57,8 %	7 = 41,1 %
Weibl. „	5 = 50 „	4 = 40 „	8 = 42,2 „	10 = 58,9 „
Ehel. Abstg.	10 = 100 „	7 = 70 „	13 = 68,4 „	13 = 76,4 „
Unehel. Abstg. —	—	3 = 30 „	6 = 31,6 „	4 = 23,6 „

	1892	1893	1894	1895
Es starben im				
1. Lebensmonat:	1 = 10 %	1 = 10 %	3 = 15,7 %	6 = 35,2 %
2.—3. „	5 = 50 „	4 = 40 „	8 = 42,1 „	3 = 17,6 „
4.—6. „	1 = 10 „	4 = 40 „	5 = 26,3 „	4 = 23,5 „
7.—12. „	3 = 30 „	1 = 10 „	3 = 15,7 „	4 = 23,5 „

An Altersschwäche starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	4 = 22,2 %	10 = 45,4 %	11 = 57,8 %	1 = 5,2 %
Weibl. „	14 = 77,7 „	12 = 54,5 „	8 = 42,2 „	18 = 94,7 „

Es starben im

	1892	1893	1894	1895
Lebensj.	% der in der Altersklasse Lebenden.	% der in der Altersklasse Lebenden.	% der in der Altersklasse Lebenden.	% der in der Altersklasse Lebenden.
61.—70.	1 = 5,5 = 0,6	1 = 4,5 = 0,6		2 = 10,5 = 0,1
71.—80.	5 = 27,7 = 0,6	7 = 31,8 = 0,8	7 = 38,9 = 0,8	8 = 42,1 = 0,1
d. Jahren				
über 80	12 = 68,8 = 7,7	14 = 62,6 = 9,1	11 = 61,1 = 7,1	9 = 47,3 = 5,8

An Scharlach starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	1 = 33,3 %	11 = 57,8 %	—	—
Weibl. „	2 = 66,6 „	8 = 42,1 „	2 = 100,0 %	—

Es starben im

	1892	1893	1894	1895
2. Lebensj.	—	3 = 15,7 %	—	—
3.—5.	1 = 33,3 %	6 = 31,5 "	1 = 50,0 %	—
6.—10.	—	7 = 36,8 "	1 = 50,0 "	—
11.—15.	2 = 66,6 "	2 = 10,5 "	—	—
21.—30.	—	1 = 5,2 "	—	—

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jahr 1892	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
" 1893	2	—	1	1	3	1	5	6	—	—	—	—
" 1894	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—

Bezüglich der Oertlichkeit kommen auf den

	1892	1893	1894
I. Stadtdistrikt	—	6	—
II. "	3	5	1
III. "	—	1	1
IV. "	—	7	—

An Masern starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	1 = 50 %	—	15 = 50 %	2 = 100 %
Weibl. "	1 = 50 "	—	15 = 50 "	—

Es starben im

1. Lebensj.	1 = 50,0 %	—	11 = 36,6 %	1 = 50,0 %
2. "	—	—	9 = 30,0 "	1 = 50,0 "
3.—5.	1 = 50,0 "	—	10 = 33,3 "	—

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jahr 1892	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
" 1894	—	—	—	1	—	—	3	2	3	9	11	1
" 1895	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Bezüglich der Oertlichkeit kommen auf den

	1892	1894	1895
I. Stadtdistrikt	—	3	—
II. "	2	14	2
III. "	—	11	—
IV. "	—	3	—

An Diphterie starben

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	15 = 46,8 %	11 = 84,6 %	11 = 52,3 %	8 = 72,7 %
Weibl. "	17 = 53,1 "	2 = 15,4 "	10 = 47,7 "	3 = 27,2 "

Es starben im

Lebensj.	1892	1893	1894	1895
	%	%	%	%
1	—	—	3 = 14,2	3 = 27,2
2	7 = 21,8	4 = 30,7	5 = 23,8	3 = 27,2
3—5	16 = 50,0	8 = 61,5	11 = 52,3	3 = 27,2
6—10	9 = 28,1	—	2 = 9,5	1 = 9,9
16—20	—	—	—	—
21—30	—	—	—	—
31—40	—	1 = 7,6	—	1 = 9,9

Bezüglich der Jahreszeit vertheilen sich die Fälle auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jahr 1892	7	5	9	1	1	2	2	—	1	2	2	—
" 1893	1	1	1	1	4	—	1	1	—	—	1	2
" 1894	1	2	1	2	2	—	3	1	3	2	3	1
" 1895	4	1	2	—	—	1	1	1	—	—	—	1

Auf die einzelnen Jahreszeiten ergibt sich folgende

Vertheilung:	1892	1893	1894	1895
	%	%	%	%
Winter (XII. I. II.)	12 = 37,5	6 = 46,1	4 = 19,4	5 = 45,4
Frühling (III. IV. V.)	11 = 34,3	6 = 46,1	5 = 24,8	3 = 27,2
Sommer (VI. VII. VIII.)	4 = 12,5	2 = 15,3	4 = 19,4	3 = 27,2
Herbst (IX. X. XI.)	5 = 15,6	1 = 7,6	8 = 38,09	—

Bezüglich der Oertlichkeit, kommen auf den

	1892	1893	1894	1895
	% der Distrikts-Bevölkerung.	% der Distrikts-Bevölkerung.	% der Distrikts-Bevölkerung.	% der Distrikts-Bevölkerung.
I. Stadtdistr.	8 Fälle = 0,8	3 Fälle = 0,3	3 Fälle = 0,3	1 Fälle = 0,9
II. "	8 " = 0,64	" = 0,299	" = 0,6	5 " = 0,3
III. "	2 " = 0,32	" = 0,3	2 " = 0,3	1 " = 0,1
IV. "	11 " = 1,54	" = 0,5	5 " = 0,7	4 " = 0,7
Ortsfremd	3 " —	—	—	—

An Rose starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	1 = 50,0 %	1 = 25,0 %	2 = 66,6 %	—
Weibl. "	1 = 50,0 "	3 = 75,0 "	1 = 33,3 "	4 = 100,0 %

Es starben in den

Lebensj.	1892	1893	1894	1895
1.	—	1 = 25,0 %	2 = 66,6 %	1 = 25,0 %
16.—20.	—	1 = 25,0 "	—	—
21.—30.	1 = 50,0 "	1 = 25,0 "	1 = 33,3 "	1 = 25,0 "
31.—40.	1 = 50,0 "	—	—	1 = 25,0 "
41.—50.	—	1 = 25,0 "	—	—
den Jahren über 80	—	—	—	1 = 25,0 "

Bezüglich der Jahreszeit vertheilen sich die Fälle auf die Monate

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1892	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
1893	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1
1894	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—
1895	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—

Bezüglich der Oertlichkeit, kommen auf den

	1892	1893	1894	1895
I. Stadtdistrikt	—	—	—	—
II. "	1	3	1	2
III. "	—	1	1	—
IV. "	1	—	1	2

An Abdominaltyphus starben

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	2 = 100 %	4 = 44,4 %	1 = 25,0 %	5 = 100 %
Weibl. "	—	5 = 55,5 "	3 = 75,0 "	—

Es starben in den

Lebensj.	1892	1893	1894	1895
16.—20.	—	1 = 11,1 %	1 = 25,0 %	—
21.—30.	—	5 = 55,5 "	—	—
31.—40.	2 = 100,0 %	—	1 = 25,0 "	2 = 40,0 %
41.—50.	—	1 = 11,1 "	2 = 50,0 "	—
51.—60.	—	2 = 22,2 "	—	—
61.—70.	—	—	—	2 = 40,0 "
71.—80.	—	—	—	1 = 20,0 "
den Jahren über 80	—	—	—	—

Bezüglich der Jahreszeit treffen auf die Monate:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1893	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	—	2
1894	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
1895	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3

Bezüglich der Oertlichkeit treffen auf den

	1892	1893	1894	1895
	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.
I. Stadtdistrikt	—	1 = 0,1	—	—
II. "	1 = 0,7	2 = 0,1	—	2 = 9,1
III. "	—	—	1 = 0,1	—
IV. "	1 = 0,1	6 = 0,8	3 = 0,4	3 = 0,5

An Kindbettfieber starben im

Lebensj.	1892	1893	1894	1895
16.—20.	—	—	—	1 = 20,0 %
21.—30.	2 = 66,6 %	3 = 60,0 %	1 = 25,0 %	1 = 20,0 "
31.—40.	1 = 33,3 "	1 = 20,0 "	3 = 75,0 "	—
41.—50.	—	1 = 20,0 "	—	3 = 60,0 "

Bezüglich der Jahreszeit treffen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
1893	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1894	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—
1895	1	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—

An epidemischer Genickstarre starben

	1892	1893
Männlichen Geschlechts	1 = 50,0 %	—
Weiblichen	—	1 = 50,0 "

Es starben im

3.—5. Lebensjahre	1 = 50 %
6.—10. "	1 = 50 %

Die Fälle kamen im Februar und Juli vor, beide im III. Stadtdistrikt.

An Brechdurchfall starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	34 = 54,8 %	27 = 54,0 %	24 = 61,5 %	22 = 61,1 %
Weibl. "	28 = 45,1 "	23 = 46,0 "	15 = 38,5 "	14 = 38,9 "

Es starben im Lebensmonat

1.	11 = 17,7 %	5 = 10,0 %	4 = 10,2 %	7 = 19,4 %
2.—3.	15 = 24,1 "	14 = 28,0 "	6 = 15,3 "	11 = 30,5 "
4.—6.	16 = 25,8 "	10 = 20,0 "	10 = 25,6 "	10 = 27,7 "
7.—12.	12 = 19,3 "	12 = 24,0 "	11 = 28,2 "	5 = 13,8 "
Lbsj.	1. 54 = 86,9 "	41 = 82,0 "	31 = 79,3 "	33 = 91,4 "

	1892	1893	1893	1895
Lbsj. 2.	4 = 6,4 ‰	5 = 10,0 ‰	2 = 5,7 ‰	2 = 5,4 ‰
3.—5.	—	1 = 2,0 ‰	1 = 2,5 ‰	—
6.—10.	1 = 1,6 ‰	1 = 2,0 ‰	—	—
41.—50.	—	—	1 = 2,5 ‰	—
51.—60.	1 = 1,6 ‰	1 = 2,0 ‰	1 = 2,5 ‰	—
61.—70.	1 = 1,6 ‰	1 = 2,0 ‰	2 = 5,1 ‰	—
71.—80.	1 = 1,6 ‰	—	1 = 2,5 ‰	1 = 2,7 ‰

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	2	—	1	—	5	6	4	31	10	3	—	—
1893	—	1	2	2	1	7	9	13	7	8	—	—
1894	1	—	2	—	3	8	6	10	5	3	1	—
1895	—	1	1	—	3	3	10	8	4	5	1	—

Bezüglich der Oertlichkeit treffen auf den

	1892	1893	1894	1895
I. Stadtdistr.	6 = 0,6 ‰ % der Distr.-Bevölkerung.	10 = 0,4 ‰ % der Distr.-Bevölkerung.	3 = 0,3 ‰ % der Distr.-Bevölkerung.	4 = 0,3 ‰ % der Distr.-Bevölkerung.
II. „	37 = 2,7 ‰	41 = 3,4 ‰	23 = 1,7 ‰	18 = 1,1 ‰
III. „	7 = 1,2 ‰	2 = 0,3 ‰	6 = 1,5 ‰	6 = 0,7 ‰
IV. „	12 = 1,7 ‰	3 = 0,4 ‰	7 = 1,1 ‰	8 = 1,5 ‰

An Ruhr starb im Jahr 1892 eine Person weiblichen Geschlechtes von VII Lebensdecennien.

An Influenza starben

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	42 = 16,0 ‰	5 = 23,8 ‰	—	9 = 56,2 ‰
Weibl. „	22 = 57,8 ‰	16 = 76,2 ‰	7 = 100,0 ‰	7 = 43,8 ‰

Es starben im Lebensjahre

	1892	1893	1894	1895
	% der in der Altkl. Leb.	% der in der Altkl. Leb.	% der in der Altkl. Leb.	% der in der Altkl. Leb.
1.	1 = 2,7	—	1 = 14,2	2 = 12,5
2.	1 = 2,7	1 = 4,7	—	—
3.—5.	1 = 2,7	—	—	—
6.—10.	1 = 2,7 = 0,3	—	—	1 = 6,2 = 0,3
11.—15.	1 = 2,7 = 0,3	—	—	—
16.—20.	—	—	—	1 = 6,2 = 0,02
31.—40.	2 = 5,2 = 0,4	1 = 4,7 = 0,2	—	—
41.—50.	3 = 7,1 = 0,8	3 = 14,2 = 0,8	—	—
51.—60.	2 = 5,2 = 0,7	8 = 38,9 = 0,3	1 = 14,2 = 0,3	5 = 31,2 = 0,1
61.—70.	8 = 21,5 = 0,4	6 = 28,5 = 0,3	2 = 28,5 = 0,1	4 = 25,0 = 0,2
71.—80.	14 = 36,8 = 1,7	2 = 9,5 = 0,2	1 = 14,2 = 0,17	1 = 6,2 = 0,1
die Jahre				
über 80	4 = 10,5 = 2,6	—	2 = 28,5 = 1,3	2 = 12,5 = 1,3

Bezüglich der Jahreszeit treffen auf die Monate:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	11	19	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1893	—	1	—	—	—	—	4	—	2	—	4	10
1894	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1895	—	1	10	2	1	1	—	—	—	—	1	—

Bezüglich der Oertlichkeit treffen auf den

	1892	1893	1894	1895
	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.
I. Stadtdistrikt	11 = 1,1	10 = 1,02	2 = 0,2	4 = 0,3
II. „	7 = 0,5	7 = 0,5	3 = 0,2	6 = 0,3
III. „	6 = 1,05	3 = 0,5	2 = 0,1	4 = 0,5
IV. „	14 = 2,02	1 = 0,1	—	2 = 0,3

An Keuchhusten starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	10 = 47,6 ‰	4 = 57,1 ‰	4 = 40,0 ‰	6 = 30,0 ‰
Weibl. „	11 = 52,3 ‰	3 = 42,9 ‰	6 = 60,0 ‰	14 = 70,0 ‰

Es standen im

	1892	1893	1894	1895
1. Lebensj.	9 = 42,8 ‰	3 = 42,8 ‰	8 = 80,0 ‰	11 = 55,0 ‰
2. „	10 = 47,6 ‰	2 = 28,5 ‰	2 = 20,0 ‰	8 = 40,0 ‰
3.—5. „	2 = 9,6 ‰	2 = 28,5 ‰	—	1 = 5,0 ‰

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	2	1	—	2	—	—	3	4	5	1	1	2
1893	1	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1
1894	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—	2	2
1895	1	—	2	4	1	5	2	2	1	—	—	2

Bezüglich der Oertlichkeit treffen auf den

	1892	1893	1894	1895
	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.	% der Distr.-Bevölkerung.
I. Stadtdistrikt	2 = 0,2	2 = 0,2	5 = 0,5	1 = 0,09
II. „	5 = 0,3	3 = 0,2	4 = 0,2	7 = 0,4
III. „	4 = 0,7	1 = 0,1	6 = 1,05	2 = 0,2
IV. „	10 = 1,4	1 = 0,1	5 = 0,7	—

An Tuberculose (akuter und chronischer), ohne Unterschied des Organs, starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	70 = 50,7%	71 = 45,5%	83 = 58,05%	66 = 46,8%
Weibl. „	68 = 49,2 „	85 = 54,4 „	60 = 41,9 „	75 = 53,1 „

Es starben im Lebensjahre

	1892	1893	1894	1895
	% der in der Alterskl. Leb.	% der in der Alterskl. Leb.	% der in der Alterskl. Leb.	% der in der Alterskl. Leb.
1. 8=5,7	13=8,3	7=4,8	17=12,05	
2. 6=4,3	5=5,8	8=5,1	5=5,5	7=7,1
3.—5. 4=2,8	3=1,9	10=6,9	—	—
6.—10. 5=3,6	1=1,7	3=1,9	1=0,2	8=5,5
11.—15. 2=1,4	0=0,6	3=1,9	0=0,9	4=2,7
16.—20. 5=3,6	1=1,4	12=7,6	3=3,4	8=5,3
21.—30. 32=23,1	5=0,7	18=11,5	2=2,8	21=14,6
31.—40. 17=12,3	4=4,2	31=19,8	7=7,7	25=17,4
41.—50. 19=13,7	5=5,4	24=15,3	6=6,9	22=15,3
51.—60. 20=14,4	7=7,7	16=10,2	7=7,7	13=9,09
61.—70. 16=11,5	9=9,7	15=9,5	9=9,1	13=9,09
71.—80. 4=2,8	5=5,08	9=5,7	11=11,4	7=4,8
die Jahre	—	—	—	—
über 80	—	1=0,6	6=6,5	—

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	14	11	12	12	13	6	10	12	10	13	9	16
1893	13	20	17	17	14	12	8	15	14	9	5	12
1894	17	15	18	15	13	12	11	6	7	10	9	6
1895	15	11	19	18	20	8	12	8	15	6	5	4

Bezüglich der Oertlichkeit kommen auf den

	1892	1893	1894	1895
	% der Distr.- Bevölkerung	% der Distr.- Bevölkerung	% der Distr.- Bevölkerung	% der Distr.- Bevölkerung
I. Stadtdistrikt	17 = 1,7	41 = 4,2	38 = 3,9	29 = 2,8
II. „	58 = 4,3	51 = 3,7	50 = 3,7	54 = 3,3
III. „	20 = 3,5	29 = 5,1	24 = 4,2	21 = 2,7
IV. „	35 = 5,06	26 = 3,7	22 = 3,1	34 = 6,4
Ortsfremd	8	—	3	3
ohne Wohnung	—	—	—	1

An (gut- und bösartigen) Neubildungen starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	10=25,0%	11=30,5%	18=40,9%	21=42,0%
Weibl. „	30=75,0 „	25=69,5 „	26=59,1 „	29=58,0 „

Es standen im:

Lebensj.	1892	1893	1894	1895
3.—5.	—	—	—	1 = 2,0 %
21.—30.	—	1 = 2,7 %	—	1 = 2,0 „
31.—40.	—	3 = 8,3 „	2 = 4,5 %	1 = 2,0 „
41.—50.	7 = 17,5 %	4 = 11,1 „	4 = 9,09 „	10 = 20,0 „
51.—60.	14 = 35,0 „	12 = 33,3 „	9 = 20,4 „	8 = 16,0 „
61.—70.	7 = 17,5 „	10 = 27,7 „	16 = 36,3 „	11 = 22,0 „
71.—80.	8 = 20,0 „	5 = 13,8 „	10 = 22,7 „	16 = 32,0 „
die Jahre	—	—	—	—
über 80	4 = 10,0 „	1 = 2,7 „	3 = 6,8 „	2 = 4,0 „

An Gehirn- und Gehirnhauterkrankungen starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	19=50,0%	22=61,1%	21=46,6%	18=43,9%
Weibl. „	19=50,0 „	14=38,9 „	24=53,3 „	23=56,09 „

Es standen im Lebensjahre

	1892	1893	1894	1895
1. 8 = 21,05 %	13 = 36,1 %	12 = 29,2 %	20 = 44,4 %	
2. 1 = 2,6 „	1 = 2,7 „	2 = 4,8 „	2 = 4,4 „	
3.—5. 1 = 2,6 „	2 = 5,5 „	4 = 9,7 „	2 = 4,4 „	
6.—10. —	—	3 = 7,3 „	1 = 2,2 „	
11.—15. —	—	—	1 = 2,2 „	
16.—20. 1 = 2,6 „	2 = 5,5 „	1 = 2,4 „	—	
21.—30. 2 = 5,2 „	2 = 5,5 „	—	—	
31.—40. —	—	1 = 2,4 „	—	
41.—50. 3 = 7,8 „	3 = 8,3 „	—	2 = 4,4 „	
51.—60. 4 = 10,5 „	3 = 8,3 „	2 = 4,8 „	5 = 11,1 „	
61.—70. 6 = 15,7 „	3 = 8,3 „	6 = 14,6 „	5 = 11,1 „	
71.—80. 10 = 26,3 „	7 = 19,4 „	6 = 14,6 „	3 = 6,6 „	
die Jahre	—	—	—	—
über 80	2 = 5,2 „	—	4 = 9,7 „	4 = 8,8 „

An Hirnschlag starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	13=54,1%	13=59,09%	13=54,1%	12=46,1%
Weibl. „	11=45,8 „	9=40,9 „	11=45,8 „	14=53,9 „

Es standen im Lebensjahr

	1892	1893	1894	1895
16.—20.	1 = 4,1 ‰	—	1 = 4,1 ‰	1 = 3,8 ‰
41.—50.	1 = 4,1 ‰	—	—	—
51.—60.	2 = 8,3 ‰	3 = 13,6 ‰	3 = 12,5 ‰	3 = 11,5 ‰
61.—70.	4 = 16,6 ‰	6 = 27,2 ‰	10 = 41,6 ‰	9 = 34,6 ‰
71.—80.	10 = 41,6 ‰	9 = 40,9 ‰	9 = 37,5 ‰	10 = 38,4 ‰
d. Jahr.				
über 80	6 = 25,0 ‰	4 = 18,1 ‰	1 = 4,1 ‰	3 = 11,5 ‰

Bezüglich der Jahreszeit treffen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	1	2	5	—	1	2	2	3	1	4	3	—
1893	—	5	1	3	3	—	1	1	1	1	1	5
1894	6	4	2	1	2	4	1	1	2	—	1	—
1895	4	3	2	—	3	2	2	—	1	2	3	4

An Rückenmarkskrankheiten starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	3 = 100,0 ‰	1 = 33,3 ‰	1 = 33,3 ‰	4 = 44,4 ‰
Weibl.	—	2 = 66,6 ‰	2 = 66,6 ‰	5 = 55,5 ‰

Es starben im Lebensjahre

	1892	1893	1894	1895
31.—40.	—	1 = 33,3 ‰	—	1 = 11,1 ‰
41.—50.	1 = 33,3 ‰	1 = 33,3 ‰	—	1 = 11,1 ‰
51.—60.	—	1 = 33,3 ‰	—	2 = 22,2 ‰
61.—70.	—	—	2 = 66,6 ‰	3 = 33,3 ‰
71.—80.	1 = 33,3 ‰	—	1 = 33,3 ‰	2 = 22,2 ‰
d. Jahr.				
über 80	1 = 33,3 ‰	—	—	—

An Entzündungen der Nase, des Kehlkopfes, der Bronchien (incl. Croup) starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	12 = 44,4 ‰	18 = 78,2 ‰	13 = 76,4 ‰	12 = 60,0 ‰
Weibl.	15 = 55,5 ‰	5 = 21,8 ‰	4 = 23,5 ‰	8 = 40,0 ‰

Es starben im Lebensjahre

	1892	1893	1894	1895
	‰ der Alterskl. Leb.	‰ der Alterskl. Leb.	‰ der Alterskl. Leb.	‰ der Alterskl. Leb.
1.	17 = 62,9	12 = 51,9	15 = 88,2	10 = 50,0
2.	1 = 3,7	1 = 4,3	1 = 5,8	3 = 15,0
3.—5.	—	2 = 8,6	—	1 = 5,0
41.—50.	—	1 = 4,3 = 0,2	—	1 = 5,0 = 0,2
51.—60.	—	—	—	1 = 5,0 = 0,3
61.—70.	3 = 11,1 = 1,3	1 = 4,3 = 0,6	—	1 = 5,0 = 0,6
71.—80.	3 = 11,1 = 1,3	5 = 21,7 = 6,3	1 = 5,8 = 1,2	2 = 10,0 = 2,5
d. Jahre				
über 80	3 = 11,1 = 1,3	—	—	1 = 5,0 = 6,5

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	5	3	6	2	—	1	2	1	1	1	—	5
1893	3	2	2	1	1	—	2	1	2	2	3	4
1894	4	1	3	2	—	—	—	2	—	1	1	3
1895	—	—	8	1	—	3	4	—	1	—	—	3

Es treffen auf den

	Winter (XII. I. II.)	Frühling (III. IV. V.)	Sommer (VI. VII. VIII.)	Herbst (IX. X. XI.)
1892	13 = 48,1 ‰	8 = 29,6 ‰	4 = 14,8 ‰	2 = 7,4 ‰
1893	9 = 29,1 ‰	4 = 17,3 ‰	3 = 13,04 ‰	7 = 30,4 ‰
1894	8 = 47,05 ‰	5 = 29,4 ‰	2 = 11,7 ‰	2 = 11,7 ‰
1895	3 = 15,0 ‰	9 = 45,0 ‰	7 = 35,0 ‰	1 = 5,0 ‰

Es treffen auf das

	I. Halbjahr	II. Halbjahr
1892	17 = 62,9 ‰	10 = 37,0 ‰
1893	9 = 39,1 ‰	14 = 60,8 ‰
1894	10 = 58,8 ‰	7 = 41,1 ‰
1895	12 = 60,0 ‰	8 = 40,0 ‰

An croupöser Lungenentzündung starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	17 = 36,1 ‰	22 = 41,6 ‰	16 = 42,1 ‰	17 = 53,1 ‰
Weibl.	30 = 63,8 ‰	31 = 58,3 ‰	22 = 57,8 ‰	15 = 46,8 ‰

Es starben im Lebensjahre

	1892	1893	1894	1895
	‰ der Alterskl. Leb.	‰ der Alterskl. Leb.	‰ der Alterskl. Leb.	‰ der Alterskl. Leb.
1.	5 = 10,5	10 = 17,8	5 = 13,1	5 = 15,6
2.	6 = 12,7	2 = 3,7	5 = 13,1	4 = 9,3
3.—5.	—	—	3 = 7,8	—
16.—20.	—	—	3 = 7,8 = 0,8	1 = 3,1 = 0,2
21.—30.	3 = 6,3 = 0,4	2 = 3,7 = 0,3	2 = 5,2 = 0,3	1 = 3,1 = 0,1
31.—40.	2 = 4,2 = 0,4	2 = 3,7 = 0,4	—	1 = 3,1 = 0,2
41.—50.	5 = 10,5 = 1,4	6 = 11,3 = 1,7	5 = 13,1 = 1,4	3 = 9,3 = 0,8
51.—60.	3 = 6,3 = 1,1	9 = 16,9 = 3,4	2 = 5,2 = 0,7	3 = 9,3 = 1,1
51.—70.	9 = 19,1 = 5,5	11 = 20,7 = 6,7	7 = 18,4 = 4,2	6 = 18,7 = 3,6
71.—80.	10 = 21,2 = 12,7	5 = 9,4 = 6,3	4 = 10,5 = 5,08	7 = 21,8 = 8,8
d. Jahre				
über 80	4 = 8,5 = 26,1	6 = 11,3 = 39,2	2 = 5,2 = 13,07	2 = 6,2 = 13,07

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	3	6	2	6	8	1	—	3	3	2	5	8
1893	3	2	3	10	7	8	4	5	—	2	3	6
1894	4	4	7	7	3	3	2	2	1	2	—	3
1895	2	2	1	2	3	5	2	2	2	3	—	8

Es treffen auf den

	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
	XII. I. II.	III. IV. V.	VI. VII. VIII.	IX. X. XI.
1892	17 = 36,1 %	16 = 34,04 %	4 = 8,5 %	10 = 21,2 %
1893	11 = 20,7 „	20 = 37,7 „	17 = 32,07 „	5 = 9,4 „
1894	11 = 28,9 „	17 = 44,7 „	7 = 18,4 „	3 = 7,8 „
1895	12 = 37,4 „	6 = 18,7 „	9 = 28,1 „	5 = 15,6 „

Es treffen auf das

	I. Halbjahr	II. Halbjahr
1892	26 = 55,3 %	21 = 44,6 %
1893	33 = 62,2 „	20 = 37,7 „
1894	28 = 73,6 „	10 = 26,3 „
1895	15 = 46,8 „	17 = 53,1 „

An anderen Entzündungen der Lunge und des Rippenfelles starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	14 = 51,8 %	7 = 33,3 %	10 = 43,4 %	20 = 57,1 %
Weibl. „	13 = 48,1 „	14 = 66,6 „	13 = 56,5 „	15 = 42,8 „

Es standen im Lebensjahr

	1892	1893	1894	1895
	% der in der Alterskl. Leb.	% der in der Alterskl. Leb.	% der in der Alterskl. Leb.	% der in der Alterskl. Leb.
1. 12=44,4	6=28,5	10=43,4	15=42,6	
2. 5=18,5	4=19,04	4=17,3	3= 8,5	6=5
3.—5. 3=11,1	1=4,7	2= 8,6	2= 5,7	
6.—10. 1= 3,7 = 0,3	—	—	1= 2,8 = 0,3	
31.—40. —	—	—	1= 2,8 = 0,2	
41.—50. —	—	1= 4,3 = 0,2	—	
51.—60. 2= 7,4 = 0,7	—	—	2= 5,7 = 0,7	
61.—70. 1= 3,7 = 0,6	3=14,2 = 1,7	—	3= 8,5 = 1,8	
71.—80. 1= 3,7 = 1,2	5=23,8 = 6,3	5=21,7 = 6,3	5=14,2 = 6,3	
d. Jahre				
über 80	2=7,4 = 13,07	2= 9,5 = 13,07	1= 4,3	3=8,5 = 19,6

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	2	4	2	—	3	1	3	3	—	3	4	2
1893	5	1	1	3	1	—	1	2	—	—	6	1
1894	1	2	15	1	4	5	3	1	—	3	—	—
1895	4	—	5	2	1	2	—	3	—	1	1	4

Es treffen auf den

	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
	(XII. I. II.)	(III. IV. V.)	(VI. VII. VIII.)	(IX. X. XI.)
1892	8 = 29,6 %	5 = 18,5 %	7 = 25,9 %	7 = 25,9 %
1893	7 = 33,3 „	5 = 23,8 „	3 = 14,2 „	6 = 28,5 „
1894	3 = 8,3 „	20 = 55,5 „	9 = 25,0 „	3 = 8,3 „
1895	8 = 24,7 „	8 = 24,7 „	5 = 21,7 „	2 = 8,6 „

Es treffen auf das

	I. Halbjahr	II. Halbjahr
1892	12 = 44,4 %	15 = 55,5 %
1893	11 = 52,3 „	10 = 47,6 „
1894	28 = 80,0 „	7 = 20,0 „
1895	14 = 60,8 „	9 = 39,1 „

An anderen Erkrankungen der Athmungsorgane starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	4 = 50,0 %	11 = 57,8 %	12 = 70,5 %	10 = 55,5 %
Weibl. „	4 = 50,0 „	8 = 42,2 „	5 = 29,4 „	8 = 44,4 „

Es standen im Lebensjahr

	1892	1893	1894	1895
	%	%	%	%
1. —	1 = 5,2 %	—	—	—
11.—15. —	—	1 = 5,8 %	—	—
21.—30. 1 = 12,5 %	—	1 = 5,8 „	—	—
31.—40. —	—	2 = 11,7 „	2 = 11,1 %	—
41.—50. 1 = 12,5 „	2 = 10,5 „	—	—	—
51.—60. 1 = 12,5 „	2 = 10,5 „	6 = 35,2 „	1 = 5,5 „	—
61.—70. 2 = 25,0 „	10 = 52,6 „	2 = 11,7 „	9 = 50,0 „	—
71.—80. 1 = 12,5 „	4 = 21,05 „	4 = 23,5 „	5 = 27,7 „	—
d. Jahre				
über 80	1 = 12,5 „	—	1 = 5,8 „	1 = 5,5 „

Bezüglich der Jahreszeit treffen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	1	1	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
1893	2	1	1	1	2	1	3	6	—	1	1	—
1894	2	—	—	—	1	3	3	—	4	—	2	2
1895	—	3	3	1	1	3	3	—	—	1	1	2

An Krankheiten des Herzens und der Gefäße starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	20=38,4 ‰	27=46,5 ‰	25=36,7 ‰	16=28,5 ‰
Weibl. "	32=61,5 ‰	31=52,4 ‰	43=63,2 ‰	40=71,4 ‰

Es starben im Lebensjahr

	1892	1893	1894	1895
	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$
1.	1=1,9=0,3	—	1=1,4=0,9	—
2.	—	—	2=2,9=0,6	—
11.—15.	—	—	—	—
16.—20.	—	1=1,7=0,2	1=1,4=0,2	1=1,7=0,2
21.—30.	2=3,8=0,3	1=1,7=0,1	3=4,4=0,1	1=1,7=0,1
31.—40.	3=5,7=0,7	2=3,4=0,4	1=1,4=0,2	2=3,4=0,4
41.—50.	3=5,7=0,8	6=10,3=1,7	9=13,2=2,5	6=10,3=1,7
51.—60.	5=9,6=1,9	17=29,3=6,6	10=14,7=3,8	9=16,07=3,4
61.—70.	20=38,4=12,2	14=24,1=8,5	22=32,3=13,4	16=28,2=9,7
71.—80.	14=26,9=17,7	15=25,8=19,07	14=20,6=17,7	17=30,1=21,6
d. Jahre über 80	4=7,6=26,1	2=3,4=13,07	3=4,4=19,06	4=7,1=26,1

Bezüglich der Jahreszeit treffen auf die Monate:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	6	5	4	6	6	2	3	5	5	3	4	3
1893	5	3	10	3	7	1	8	4	6	1	1	9
1894	8	8	4	6	9	8	5	4	5	2	—	9
1895	8	3	2	5	2	6	5	2	4	6	6	7

An Darmkatarrh der Kinder starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	20=55,50 ‰	13=46,5 ‰	7=36,9 ‰	12=40,0 ‰
Weibl. "	16=44,4 ‰	15=53,4 ‰	12=63,1 ‰	18=60,0 ‰

Es standen im

	1892	1893	1894	1895
	$\frac{\text{‰ der Lebend. Geborenen}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der Lebend. Geborenen}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der Lebend. Geborenen}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der Lebend. Geborenen}}{\text{‰}}$
Lebsmon.				
1.	8=22,2=0,7	8=28,5=0,7	2=10,5=0,1	5=16,6=0,4
2.—3.	15=41,6=1,3	12=42,8=1,09	4=21,05=0,3	13=43,3=1,1
4.—6.	11=30,5=1,01	5=17,8=0,4	8=42,1=0,7	6=20,0=0,5
7.—12.	1=2,7=0,09	3=10,7=0,2	1=5,2=0,09	4=13,3=0,3
1. Lebsj.	35=97,0=3,0	28=2,3	15=69,85=1,1	28=93,2=2,3
2. "	1=2,7	—	4=21,05	2=6,6

-Die Abstammung war

	1892	1893	1894	1895
ehelich bei	29=80,5 ‰	24=85,7 ‰	16=84,2 ‰	23=70,6 ‰
unehelich bei	7=19,5 ‰	4=14,8 ‰	3=15,8 ‰	7=23,3 ‰

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	—	1	1	—	4	2	3	7	9	5	2	2
1893	2	1	2	2	—	2	8	5	1	2	—	3
1894	—	—	—	1	—	4	2	7	1	—	2	2
1895	—	1	—	—	1	1	7	7	8	3	1	1

Es kommen auf den

	Winter (XII I II)	Frühling (III IV V)	Sommer (VI VII VIII)	Herbst (IX X XI)
1892	3=8,3 ‰	5=13,8 ‰	12=33,3 ‰	16=44,4 ‰
1893	6=21,4 ‰	4=14,3 ‰	15=53,5 ‰	3=10,7 ‰
1894	2=10,5 ‰	1=5,2 ‰	13=68,4 ‰	3=15,7 ‰
1895	2=6,6 ‰	1=3,3 ‰	15=50,0 ‰	12=40,0 ‰

Bezüglich der Oertlichkeit kommen auf den

	1892	1893	1894	1895
	$\frac{\text{‰ der Distr. Bevölkerung.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der Distr. Bevölkerung.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der Distr. Bevölkerung.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der Distr. Bevölkerung.}}{\text{‰}}$
I. Stadtdistrikt	—	3=0,2	3=0,3	3=0,2
II. "	26=1,9	15=1,1	14=1,03	13=0,8
III. "	4=0,7	7=1,02	1=0,1	9=1,1
IV. "	6=0,8	3=0,4	1=0,1	5=0,9

An Erkrankungen der Harnorgane starben:

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	15=57,6 ‰	16=50,0 ‰	21=67,7 ‰	11=50,0 ‰
Weibl. "	11=42,3 ‰	16=50,0 ‰	10=32,2 ‰	11=50,0 ‰

Es standen im Lebensjahr

	1892	1893	1894	1895
	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$	$\frac{\text{‰ der in der Alterskl. Leb.}}{\text{‰}}$
1.	—	—	1=3,2	—
3.—5.	3=11,5=0,9	1=3,1=0,3	2=6,4=0,9	2=9,09=0,6
6.—10.	—	—	1=3,2=0,3	—
11.—15.	—	—	—	1=4,5=0,3
16.—20.	—	1=3,1=0,2	—	—
21.—30.	3=11,5=0,4	—	1=3,2=0,1	—
31.—40.	3=11,5=0,7	2=6,2=0,4	1=3,2=0,2	3=13,6=0,7
41.—50.	2=7,6=0,5	4=12,4=1,1	10=32,2=2,8	4=18,1=1,1
51.—60.	8=30,7=3,1	5=15,6=1,9	3=9,6=1,1	1=4,5=0,3
61.—70.	4=15,3=2,4	12=37,5=7,3	6=19,3=3,6	6=27,2=3,6
71.—80.	3=11,5=3,8	7=21,8=8,8	5=16,1=6,3	4=18,1=5,08
d. Jahre über 80	—	—	1=3,2=6,5	1=4,5=6,5

An Unglücksfällen starben

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	7=77,7 %	7=87,5 %	11=84,6 %	3=23,07 %
Weibl. „	2=22,2 „	1=12,5 „	2=15,3 „	10=76,9 „

Es starben im Lebensjahre

	1892	1893	1894	1895
	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$
1. 1=11,1	1=12,5	—	1=7,6	—
2. —	—	—	—	—
3.—5. 1=11,1	2=25,0	—	—	—
6.—10. —	1=12,5 =0,3	—	1=7,6 =0,3	—
11.—15. 1=11,1 =0,3	—	—	2=15,3 =0,6	—
16.—20. 2=22,2 =0,5	—	—	2=15,3 =0,5	—
21.—30. 1=11,1 =0,1	3=37,5 =0,4	5=38,4 =0,7	2=15,3 =0,3	—
31.—40. —	—	1=7,6 =0,2	11=7,6 =0,2	—
41.—50. 1=11,1 =0,2	—	1=7,6 =0,2	1=7,6 =0,2	—
51.—60. —	—	2=15,3 =0,7	—	—
61.—70. —	—	2=15,3 =1,2	2=15,3 =1,2	—
71.—80. 2=22,2 =2,5	1=12,5 =1,2	1=7,6 =1,2	1=7,6 =1,2	—
d. Jahr. über 80 —	—	1=7,6 =6,5	—	—

Bezüglich der Jahreszeit kommen auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	1	—	—	1	1	1	—	2	—	1	1	1
1893	1	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2
1894	3	3	2	—	1	1	1	1	1	—	—	—
1895	1	2	—	1	1	1	1	1	2	2	—	1

Die Art der Verunglückung war

	1892	1893	1894	1895
Erstickung	2	—	—	—
Ueberfahren	1	1	4	1
Sturz	3	3	5	5
Ertrinken	2	1	1	3
Erschlagen	1	—	1	3
Vergiftung	—	1	1	1
Verbrühung	—	1	—	—
Erdrücken	—	—	1	—

Tod durch fremde Hand erlitten

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	1=100,0 %	1=100,0 %	1=30,3 %	1=100,0 %
Weibl. „	—	—	2=66,6 „	—

Es standen im

	1892	1893	1894	1895
1 Lebensjahre	—	—	3	—
16.—20. „	—	—	—	1
21.—30. „	—	1	—	—
31.—40. „	1	—	—	—

Die Todesart war Erstechen 3mal

Erdröseln 1 „

Ersticken 1 „

Durch Selbstmord endeten ihr Leben

	1892	1893	1894	1895
Männl. Geschl.	5=83,3 %	4=66,6 %	8=80,0 %	6=100,0 %
Weibl. „	1=16,6 „	2=33,3 „	2=20,0 „	—

Es standen im

	1892	1893	1894	1895
	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$	$\frac{‰}{\text{in der Alterskl. Leb.}}$
Lebensjahr	1=16,6 =0,2	—	—	1=16,6 =0,2
16.—20.	1=16,6 =0,1	1=16,6 =0,1	1=10,0 =0,1	2=33,3 =0,3
21.—30.	—	1=16,6 =0,2	1=10,0 =0,2	—
31.—40.	1=16,6 =0,2	2=33,3 =0,5	4=40,0 =1,1	2=33,3 =0,5
41.—50.	1=16,6 =0,3	2=33,3 =0,7	3=30,0 =1,1	1=16,6 =0,3
51.—60.	2=33,3 =1,2	—	—	—
61.—70.	—	—	1=10,0 =1,2	—
71.—80.	—	—	—	—

Bezüglich des Jahreszeit kommen auf die Monate:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	2
1893	1	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	1
1794	2	—	1	1	1	—	1	—	1	1	1	1
1895	1	—	—	1	—	—	2	1	—	1	—	—

Nach dem Familienstande waren die Selbstmörder:

	ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden
1892	3	2	1	—
1893	1	4	1	—
1894	2	5	3	—
1895	3	2	1	—

Die Confession war: katholisch protestantisch mosaisch

	katholisch	protestantisch	mosaisch
1892	6=100,0 %	—	—
1893	4=66,6 „	1=16,6 %	1=16,6 %
1894	5=50,0 „	5=50,0 „	—
1895	4=66,6 „	2=33,3 „	—

Die Art des Selbstmordes war:

	1892	1893	1894	1895
Ertrinken	5	—	3	—
Erhängen	1	2	3	2
Abstürzen	—	1	—	—
Eröffnen der Ader	—	1	—	—
Erschiessen	—	1	3	2
Durchschneiden des Halses	—	1	—	—
Ueberfahren lassen	—	—	1	1
Vergiften	—	—	—	1

Als Motive des Selbstmordes sind angegeben:

	1892	1893	1894	1895
Moralische Verkommenheit	1	—	—	1
Geistesstörung	1	5	3	2
Unheilbare Erkrankung	1	—	2	—
Unerträglicher Schmerz	1	—	—	—
Betrunkenheit	—	—	1	—
Betrügerischer Bankerott	—	1	—	—
Furcht vor Strafe	—	—	2	—
Schulden	—	—	—	1
Unbekannt	2	—	2	2

Sterblichkeit an akuten Infectiouskrankheiten.

Die Zahl der an akuten Infectiouskrankheiten (croupöse Lungenentzündung, akuten Gelenkrheumatismus und Influenza ausgenommen) betrug:

	1892	1893	1894	1895
	der Todesfälle.	der Todesfälle.	der Todesfälle.	der Todesfälle.
hievon	66=8,2	57=7,2	76=9,6	49=6,3
männl. Geschl.	30=45,5 %	31=54,3 %	33=43,4 %	22=44,8 %
weibl. „	36=54,5 „	26=45,7 „	43=56,5 „	27=55,1 „

Es kommen sonach auf 10 000 Einwohner:

1892	1893	1894	1895	im Mittel von 1890—1894
17,8	15,1	19,8	12,5	31,1

Die Zahl der an akuten Infectiouskrankheiten erfolgten Todesfälle war in den 4 Berichtsjahren eine sehr mässige; vergleichsweise sei bemerkt, dass im Mittel der Jahre 1885—1889

diese Zahl 24,7 ‰ aller Todesfälle betragen hatte, und dass in den Jahren 1890 und 1891 auf 10 000 Einwohner 62,5 und 40,6 Todesfälle an Infectiouskrankheiten gekommen waren.

Kindersterblichkeit

(Sterblichkeit der Kinder im 1. Lebensjahre)

Im 1. Lebensjahre sind (mit Ausschluss der Todgeborenen) verstorben:

	1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—94
Absolute Zahlen	216	199	211	224	212,4
‰ der Todesfälle (mit Ausschluss der Todgeb.)	27,1	25,2	26,7	29,1	25,3
‰ der Bevölkerung	5,8	5,2	5,5	5,7	5,7
‰ der Lebendgeborenen	20,01	18,1	19,3	19,7	19,9

Bezüglich des Geschlechtes ergeben sich folgende Verhältnisse:

	1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—1894
	‰	‰	‰	‰	‰
Knaben	119=55,09	111=55,7	113=53,5	119=53,1	118,6=55,3
Mädchen	97=44,9	88=44,3	98=46,4	105=46,8	91,8=44,6

Auf die lebend geborenen Knaben kommen im 1. Lebensjahre gestorbene Knaben:

	1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—1894
	119=21,6 %	111=20,3 %	113=19,9 %	119=20,2 %	21,6 %

Auf die lebend geborenen Mädchen kommen im 1. Lebensjahre gestorbene Mädchen

	1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—1894
	97=18,3 %	108=19,7 %	98=18,6 %	105=19,1 %	18,9 %

Auf die Lebendgeborenen beiderlei Geschlechts kommen im 1. Lebensjahre gestorbene

	1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—1894
	‰	‰	‰	‰	‰
Knaben	119=11,02	111=10,1	113=10,3	119=10,4	11,0 %
Mädchen	97=8,9	88=8,06	98=8,9	105=9,2	8,8 „

Bezüglich der Abstammung ergeben sich folgende Verhältnisse

	1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—1894
	‰	‰	‰	‰	‰
Ehelich	183=84,6	158=79,4	162=76,7	172=76,7	172,8=80,5 %
Unelich	33=15,4	41=20,6	49=23,3	52=23,2	41,4=19,4 „

Auf die ehelich Lebendgeborenen kommen im 1. Lebensjahre verstorbene Eheliche:

1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—1894
183=0,4 %	158=17,8 %	162=18,1 %	172=18,6 %	19,5 %

Auf die unehelich Lebendgeborenen kommen im 1. Lebensjahre verstorbene Uneheliche:

1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—1894
33=17,7 %	41=19,8 %	49=24,8 %	52=24,4 %	21,8 %

Die Vertheilung der Kindersterblichkeit auf die einzelnen Monatsgruppen des 1. Lebensjahres ist aus nebenstehender Tabelle 4 ersichtlich.

Die Betrachtung dieser Tabelle lehrt, dass in den 4 Berichtsjahren die Sterblichkeit im 1. Lebensmonat am höchsten ist. Ebenso verhält sich die Sterblichkeit im Mittel des Jahrfünfts 1890—1894; anders war das im Jahrfünft 1885—1889. In diesem überwog die Sterblichkeit des 7.—12. Monats. Dieselbe Erscheinung zeigte sich noch im Jahre 1890; im Jahre 1891 fiel die höchste Sterblichkeit in den 4.—6. Monat.

Im Mittel des Jahrfünfts 1885—1889 überwog in allen Monatsgruppen die Sterblichkeit des männlichen Geschlechtes im Mittel des Jahrfünfts 1890—1894 bleibt das nur für die Gruppen des 1. und des 2. und 3. Lebensmonats der Fall, während in jenen des 4.—6. und des 7.—12. Monats die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts überwiegt. Innerhalb der einzelnen Berichtsjahre schwankten diese Verhältnisse sehr; die stärkere Belastung des männlichen Geschlechtes zeigt sich überwiegend, aber doch nicht constant; selbst im 1. Lebensmonat überwiegt einmal — im Jahre 1895 — die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechtes.

Bezüglich der Abstammung, zeigt sich in den 4 Berichtsjahren ein Ueberwiegen der Sterblichkeit der unehelichen Kinder constant nur im 1. Lebensmonat; so auch im Mittel der Jahre 1890—1894. In den übrigen Monatsgruppen fällt die schwerere Belastung bald den Ehelichen, bald den Unehelichen zu.

Tabelle 4. Vertheilung der Kindersterblichkeit auf die einzelnen Monatsgruppen des 1. Lebensjahres.

1892:						1893:						1894:						1895:						Mittel der Jahre 1890—1894																				
männlich			weiblich			ehelich			unehelich			zusammen			männlich			weiblich			ehelich			unehelich			zusammen			männlich			weiblich			ehelich			unehelich			zusammen		
a) in absoluten Zahlen:												b) in % der im 1. Lebensjahre Verstorbenen:												c) in % der Lebendgeborenen:																				
1 Lebensmonat	45	28	60	13	73	38	27	49	16	65	40	29	51	18	69	40	43	61	22	83	32,6	27,2	28,4	37,2	30,2	27,2	28,4	37,2	30,2	27,2	28,4	37,2	30,2	27,2	28,4	37,2	30,2							
2.—3. "	34	20	48	6	54	32	16	39	9	48	20	19	30	9	39	18	22	27	13	40	24,1	18,1	22,8	19,2	21,5	18,1	22,8	19,2	21,5	18,1	22,8	19,2	21,5	18,1	22,8	19,2	21,5							
4.—6. "	21	23	35	9	44	43	19	25	7	32	27	22	38	11	49	22	18	33	7	40	19,6	23,8	21,1	23,7	21,5	17,8	19,6	23,8	21,1	23,7	21,5	17,8	19,6	23,8	21,1	23,7	21,5							
7.—12. "	19	26	40	5	45	28	26	45	9	54	26	28	43	11	54	39	22	51	10	61	23,3	30,5	28,2	19,5	26,5	23,3	30,5	28,2	19,5	26,5	23,3	30,5	28,2	19,5	26,5									
zusam. 1 Jahr	119	97	183	33	216	111	88	158	41	199	113	98	162	49	211	119	105	72	52	224	99,6	99,6	99,7	99,6	99,7	99,6	99,6	99,7	99,6	99,6	99,7	99,6	99,7	99,6	99,7	99,6	99,7							
1 Lebensmonat	37,8	28,8	32,7	39,3	33,7	34,2	30,6	31,01	39,01	32,6	35,3	29,5	31,4	36,7	32,7	33,6	40,8	35,4	42,3	37,05	32,6	27,2	28,4	37,2	30,2	27,2	28,4	37,2	30,2	27,2	28,4	37,2	30,2	27,2	28,4	37,2	30,2							
2.—3. "	28,5	20,6	26,2	18,1	25,0	28,8	18,2	24,6	21,9	24,1	17,6	19,4	18,5	18,3	18,4	15,1	20,8	15,7	25,0	17,8	24,1	18,1	22,8	19,2	21,5	18,1	22,8	19,2	21,5	18,1	22,8	19,2	21,5	18,1	22,8	19,2	21,5							
4.—6. "	17,6	23,7	19,1	27,2	20,3	11,7	21,6	15,8	17,07	16,08	23,8	22,4	23,5	22,4	23,2	18,4	17,1	19,1	13,4	7	40	19,6	23,8	21,1	23,7	21,5	17,8	19,6	23,8	21,1	23,7	21,5	17,8	19,6	23,8	21,1	23,7	21,5						
7.—12. "	15,9	26,8	21,8	15,1	20,8	25,2	29,5	28,4	21,9	27,1	23,0	28,5	26,5	22,4	25,5	32,7	20,8	29,6	19,2	27,2	23,3	30,5	28,2	19,5	26,5	23,3	30,5	28,2	19,5	26,5	23,3	30,5	28,2	19,5	26,5									
zusam. 1 Jahr	99,8	99,9	99,8	99,7	99,8	99,9	99,9	99,8	99,8	99,8	99,7	99,8	99,9	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,6	99,6	99,7	99,6	99,7	99,6	99,6	99,7	99,6	99,6	99,7	99,6	99,7	99,6	99,7								
1 Lebensmonat	8,1	5,2	6,7	6,9	6,7	6,9	4,8	5,5	7,7	5,9	7,06	5,5	5,7	9,1	6,3	6,8	7,8	6,4	10,09	7,3	7,05	4,8	5,5	5,5	7,8	5,9	4,8	5,5	7,8	5,9	4,8	5,5	7,8	5,9	4,8	5,5	7,8	5,9						
2.—3. "	6,1	3,7	5,3	3,2	5,0	5,8	2,8	4,4	4,3	4,3	3,5	3,6	3,3	4,5	3,5	3,06	4,0	2,8	5,9	3,5	5,2	3,2	4,2	4,1	4,2	3,2	4,2	4,1	4,2	3,2	4,2	4,1	4,2	3,2	4,2	4,1	4,2							
4.—6. "	3,8	4,3	3,9	4,8	4,07	2,3	3,4	2,8	3,3	2,9	4,7	4,1	4,2	5,5	4,4	3,7	3,2	3,4	3,1	3,5	4,2	5,3	4,0	3,9	4,2	5,3	4,0	3,9	4,2	5,3	4,0	3,9	4,2	5,3	4,0	3,9	4,2							
7.—12. "	3,4	4,9	4,4	2,6	4,1	5,1	4,6	5,09	4,3	4,9	4,5	5,3	4,8	5,5	4,9	6,6	4,0	5,3	4,5	5,3	5,1	5,6	5,5	4,7	5,3	5,6	5,5	4,7	5,3	5,1	5,6	5,5	4,7	5,3	5,1	5,6	5,5	4,7	5,3					
zusam. 1 Jahr	21,4	18,1	20,3	17,5	20,01	24,9	15,6	17,6	19,6	18,0	19,8	18,5	18,0	24,6	19,1	20,1	18,1	17,9	24,4	19,6	21,5	18,9	19,2	20,5	19,6	18,9	19,2	20,5	19,6	18,9	19,2	20,5	19,6	18,9	19,2	20,5	19,6	18,9	19,2	20,5	19,6			

Bezüglich der Jahreszeit, vertheilen sich die Todesfälle des 1. Lebensjahres auf die Monate

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1892 Absolute Zahlen	19	14	15	10	16	11	13	48	21	24	11	14
1892 %	8,7	6,4	6,9	4,6	7,4	5,09	6,01	22,2	9,7	11,1	5,09	6,4
1893 Absolute Zahlen	16	13	17	14	10	19	28	28	20	12	7	15
1893 %	8,04	6,5	8,5	7,03	5,02	9,5	14,02	14,02	10,05	6,03	3,5	7,5
1894 Absolute Zahlen	20	14	17	16	14	16	13	32	14	13	23	19
1894 %	9,4	6,6	8,05	7,5	6,6	7,5	6,1	15,1	6,6	6,1	10,9	9,004
1895 Absolute Zahlen	13	14	27	18	19	16	26	27	26	16	8	14
1895 %	5,8	6,2	12,05	8,03	8,4	7,1	11,6	12,05	11,6	7,1	3,5	6,2
i. Mittel d. Jahre 1890—94 %	8,002	7,0	4,7	7,09	6,8	7,7	8,9	13,07	9,3	8,2	7,0	8,2

Die höchste Sterblichkeit fällt in den Berichtsjahren regelmässig in den August; dieselbe Höhe wird aber im Jahre 1893 auch im Juli, im Jahre 1895 auch im März erreicht.

Die niederste Sterblichkeit zeigt sich im

Jahre 1892 im April	
" 1893 " November	
" 1894 " Juli und October	
" 1895 " November.	

Im Mittel der Jahre 1890—94 fällt die höchste Sterblichkeit in den August, die geringste in den Mai.

Die Differenz zwischen Minimum und Maximum beträgt

im Jahre 1892: 17,6 ‰	
" 1893: 11,2 "	
" 1894: 9,0 "	
" 1895: 8,5 "	

im Mittel der Jahre

1890—1894 6,2 "

Es kommen auf den

	Winter (XII I II)	Frühling (III IV V)	Sommer (VI VII VIII)	Herbst (IX X XI)
1892	47=21,5 ‰	41=18,9 ‰	72=33,3 ‰	56=25,8 ‰
1893	44=22,0 "	41=20,5 "	75=37,5 "	39=19,6 "
1894	41=18,2 "	64=28,5 "	69=30,7 "	50=22,2 "
1895	63=29,8 "	47=22,2 "	61=28,9 "	50=23,6 "
im Mittel d. Jahre				
1890—94	24,1 ‰	21,2 ‰	29,6 ‰	24,5 ‰

Die Kindersterblichkeit ist sonach fast in allen Berichtsjahren am höchsten im Sommer; nur im Jahre 1895 wird die Sterblichkeit des Sommers um ein Geringes von jener des Winters übertroffen.

Es treffen auf das

	I. Halbjahr	II. Halbjahr
1892	85 = 39,0 ‰	131 = 60,5 ‰
1893	89 = 44,5 "	110 = 55,1 "
1894	97 = 45,6 "	114 = 53,8 "
1895	107 = 47,5 "	117 = 52,0 "
im Mittel d. Jahre 1890—1894	44,8 "	54,6 "

Die Todesursachen der im 1. Lebensjahre Verstorbenen sind in umstehender Tabelle 5 dargestellt.

Sterblichkeit nach der Oertlichkeit.

Die allgemeine Sterblichkeit stellt sich bezüglich der Oertlichkeit in folgender Weise dar:

	1892	1893	1894	1895	1890—94
	Todesfälle.	Todesfälle.	Todesfälle.	Todesfälle.	Todesfälle.
I. Stadtdistrikt	141	166	157	138	146
II. "	301	286	286	271	286
III. "	85	107	123	122	109
IV. "	160	129	126	146	130
Krankenhaus	97	86	85	82	88
Entbindungsanstalt	13	11	9	13	11
Irrenanstalt	4	8	7	11	8
Haus d. Unheilbaren	16	14	10	7	12
Ausserhalb einer Wohnung starben	11	6	12	9	10

Die Kindersterblichkeit stellt sich in folgender Weise dar:

	1892	1893	1894	1895	1890—94
I. Stadtdistrikt	26	31	26	23	26
II. "	124	110	117	116	117
III. "	22	27	32	37	29
IV. "	38	27	36	48	35

Die geringe Sterblichkeit — sowohl die allgemeine wie jene des 1. Lebensjahres — im ersten Stadtdistrikte hat sich wieder in allen Berichtsjahren, sowie im Mittel der Jahre 1890 bis 1894 als constant erwiesen. Die Sterblichkeit in den übrigen Distrikten ist bezüglich ihrer Höhe in den verschiedenen Jahren

Tabelle 5.

Kindersterblichkeit.

	1892:					
	männlich	weiblich	ehelich	unehelich	zusammen	% der Todesf. des 1. Lebensj.
Angeborene Bildungsfehler	3	1	4	—	40,3	1,8
Angeborene Lebensschwäche	21	13	31	3	343,1	15,8
Atrophie der Kinder	5	5	10	—	100,9	4,6
Masern	1	—	—	1	10,09	0,4
Rose	—	—	—	—	—	—
Dyphtherie	—	—	—	—	—	—
Pyämie, Septicaemie u. andere Wundinfektionen	—	2	2	—	20,1	0,9
Brechdurchfall	28	26	44	10	545,0	25,1
Influenza	1	—	1	—	10,09	0,4
Keuchhusten	5	4	8	1	90,8	4,1
Syphilis	1	2	1	2	30,2	1,3
Tuberculose der Lungen	4	4	8	—	80,7	3,7
„ der anderen Organe	—	—	—	—	—	—
Scrofulose	—	2	2	—	20,1	0,9
Gehirn- und Gehirnhauterkrankungen	4	4	7	1	80,7	3,7
Trismus und Tetanus	1	2	3	—	30,2	1,3
Entzündungen der Nase, des Kehlkopfes, der Luft- röhre, der Bronchien	8	9	13	4	171,5	7,9
Croupöse Lungenentzündung	4	1	5	—	50,4	2,3
Anderer Entzündungen der Lunge und des Rippen- felles	7	5	10	2	121,1	5,5
Anderer Erkrankungen der Athmungsorgane	—	—	—	—	—	—
Herz- und Herzbeutelkrankungen	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen der Gefäße	1	—	1	—	10,09	0,4
Erkrankungen des Mundes, Rachens, der Speise- röhre, des Magens	—	—	—	—	—	—
Erkrankungen des Darmes	—	—	—	—	—	—
Darmkatarrh	20	15	28	7	353,2	16,2
Krankheiten der Leber	1	—	1	—	10,09	0,4
Nierenkrankheiten	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Geschlechtsorgane	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Muskeln, Knochen und Gelenke	2	—	1	1	20,1	0,9
Krankheiten der äusseren Bedeckungen	—	2	2	—	20,1	0,9
Unglücksfall	1	—	1	—	10,09	0,4
Tod durch fremde Hand	—	—	—	—	—	—
Unbestimmte Todesursache	1	—	1	—	10,09	0,4
Todesursache nicht ermittelt	—	—	—	—	—	—

Todesursachen.

1893:						1894:						1895:					
männlich	weiblich	ehelich	unehelich	zusammen	% der Todesf. des 1. Lebensj.	männlich	weiblich	ehelich	unehelich	zusammen	% der Todesf. des 1. Lebensj.	männlich	weiblich	ehelich	unehelich	zusammen	% der Todesf. des 1. Lebensj.
—	2	2	—	20,1	1,005	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	20,1	0,8
19	15	28	6	343,1	17,08	18	17	30	5	353,2	16,5	25	26	39	12	514,4	22,7
6	4	7	3	100,9	5,02	11	8	13	6	191,7	8,004	7	10	13	4	171,4	7,5
—	—	—	—	—	—	6	5	9	2	11,008	5,2	1	—	1	—	10,08	0,4
—	1	1	—	10,09	0,5	1	1	—	2	20,1	0,9	—	1	1	—	10,08	0,4
—	—	—	—	—	—	2	1	3	—	30,2	1,4	1	2	2	1	30,2	1,3
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10,09	0,4	—	1	1	—	10,08	0,4
25	16	30	11	413,7	20,6	19	12	23	8	312,8	14,6	21	12	18	15	332,9	14,7
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10,09	0,4	2	—	2	—	20,1	0,8
3	—	2	1	30,2	1,5	4	4	8	—	80,7	3,7	5	6	11	—	110,9	4,9
1	—	—	1	10,09	0,5	1	2	2	1	30,2	1,4	1	—	1	—	10,08	0,4
1	2	2	1	30,2	1,5	3	1	2	2	40,3	1,8	7	3	9	1	100,8	4,4
4	6	8	2	100,9	15,0	2	1	3	—	30,2	1,4	6	1	7	—	70,6	3,1
1	—	1	—	10,09	0,5	—	2	2	—	20,1	0,9	1	—	—	1	10,08	0,4
10	3	10	3	131,1	6,5	12	8	14	6	201,8	9,4	6	6	7	—	70,6	3,1
—	2	—	2	20,1	1,005	—	3	2	1	30,2	1,4	2	4	5	1	60,5	2,6
9	3	9	3	121,09	6,03	12	3	11	4	151,3	7,1	7	3	10	—	100,8	4,4
4	6	10	—	100,9	5,0	3	2	4	1	50,4	2,3	1	4	3	2	50,4	2,2
2	4	5	1	60,5	3,01	5	5	8	2	100,9	4,7	9	6	13	2	151,3	6,6
—	1	1	—	10,09	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10,09	0,4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	1	10,09	0,5	1	2	3	—	30,2	1,4	2	—	2	—	20,1	0,8
1	—	1	—	10,09	0,5	—	1	1	—	10,09	0,4	1	—	1	—	10,08	0,4
13	15	24	4	282,5	14,07	6	9	12	3	151,3	7,1	10	18	21	7	282,4	12,5
1	—	1	—	10,09	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	10,09	0,4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10,09	0,4	—	—	—	—	—	—
1	3	4	—	40,3	2,01	—	1	1	—	10,09	0,4	—	—	—	—	—	—
3	2	5	—	50,4	2,5	4	4	6	2	80,7	3,7	1	2	3	—	30,2	1,3
1	—	1	—	10,09	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	30,2	1,4	—	—	—	—	—	—
1	1	1	1	20,1	1,0	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	10,08	0,4
5	1	5	1	60,5	3,01	1	—	—	1	10,09	0,4	—	—	—	—	—	—

wechselnd. Die Sterblichkeit im zweiten Distrikt ist zwar in den Jahren 1892 und 1893 höher als in den übrigen Distrikten, doch ist sie nicht mehr so überwiegend ungünstig, wie sie in früheren Jahren gewesen ist. Wie schon im letzten Bericht hervorgehoben ist, ist diese Besserung der Sterblichkeitsverhältnisse durch die starke Erweiterung dieses Distrikts durch neue Strassen, durch das Verschwinden alter schlechter Häuser und durch die rasche Zunahme an vorwiegend städtischer Bevölkerung, sowie durch die Anhäufung von Soldaten, deren Altersklasse die geringste Sterblichkeit aufweist, veranlasst. Was aber in letzterer Beziehung dem II. Stadtdistrikt zu Gute kommt, gereicht dem IV. Distrikte zum Schaden. Die dort liegende alte grosse Dominikanerkaserne ist nahezu geleert, damit die Bevölkerungsziffer dieses Distrikts vermindert und die Sterblichkeitsziffer erhöht worden.

Während, wie oben gezeigt worden ist, die allgemeine Sterblichkeitsziffer des II. Stadtdistrikts gegen frühere Zeiten, sich nicht unerheblich gebessert hat, ist dies mit der Ziffer der Kindersterblichkeit nicht der Fall. Fast in allen Berichtsjahren, mit Ausnahme des Jahres 1895, ist die Kindersterblichkeit im II. Distrikt bei weitem am höchsten; die erwähnte Ausnahme des Jahres 1895, in welchem der IV. Stadtdistrict als der stärksten belastete erscheint, ist wohl durch die erwähnte plötzliche Abnahme der Distriktsbevölkerung zu erklären.

Was die Sterblichkeit auf den verschiedenen Formationen des Bodens betrifft, so ist zu erwähnen, dass
 75,5 ‰ der Bevölkerung auf dem Alluvialgebiete der Regnitz,
 22,2 ‰ „ „ auf dem Keupergebiete der Anhöhen
 des linken Regnitzufers,
 2,2 ‰ „ „ auf dem Grenzgebiete zwischen Alluvium und Keuper wohnen.

Die Sterblichkeit war:

	1892	1893	1894	1895	Mittel d. J. 1890—94
	‰ der Distr.- Bevölkerung.	‰ der Distr.- Bevölkerung.	‰ der Distr.- Bevölkerung.	‰ der Distr.- Bevölkerung.	‰ der Distr.- Bevölkerung.
auf dem Gebiete des Gesamttalluviums	18,3	18,4	18,4	17,6	28,8
des Gesamtkeupers	22,6	21,7	22,3	22,6	22,4
auf dem Grenzgebiete	12,7	21,3	22,7	26,9	21,5
auf dem Lias	7,6	—	—	—	1,5

Als allgemeine Schlussfolgerungen gehen aus den vorhergehenden Erörterungen über die Bewegung der Bevölkerung in den Jahren 1892—1895 folgende Sätze hervor:

I. Die Geburtenziffer ist in allen Jahren eine niedrige. Sie liegt nur im Jahre 1892 mit 30,7 ‰ etwas über der unteren Grenze des Normalen (30—40 ‰). In den Jahren 1893, 1894, 1895 liegt sie mit 29,01 ‰, 28,4 und 29,9 ‰ unterhalb der unteren Grenze.

II. In Bezug auf das Geschlecht zeigt sich in allen Jahren der normale Knabenüberschuss bei den Geburten.

III. Die Ziffer der Todtgeborenen liegt in allen Jahren unterhalb der unteren Grenze des Normalen (3—4 ‰ der Geborenen.)

IV. Die Todtgeburten der Jahre 1892 und 1893 vertheilten sich gleichmässig auf beide Geschlechter; in den Jahren 1894 und 1895 überwiegt das männliche Geschlecht.

V. Die Sterblichkeitsziffer im Jahre

1892: 21,4

1893: 20,8

1894: 20,6

1895: 19,7 ‰

der Bevölkerung zeigt einen fortschreitenden Abfall und war im letzten Berichtsjahre günstiger, denn je. Sie ist in den Berichtsjahren niedriger, wie im Mittel der Jahre 1890—1894: 22,6 und namentlich geringer wie im Mittel 1885—1889: 23,3 ‰.

VI. Die Kindersterblichkeit (Sterblichkeit der Kinder des

1. Lebensjahres mit Ausschluss der Todtgeborenen):

im Jahre 1892: 20,01

„ „ 1893: 18,1

„ „ 1894: 19,3

„ „ 1895: 19,7 ‰

der Lebendgeborenen ist in allen Jahren eine günstige, günstiger als im Mittel der Jahre 1885—1889: 21,9 ‰; im Wesentlichen gleich dem Mittel der Jahre 1890—1894: 19,9 ‰.

VII. Die in der Regel höhere Sterblichkeit der Knaben des 1. Lebensjahres ist in allen Berichtsjahren vorhanden.

VIII. In Bezug auf die Abstammung überwiegt nur im Jahre 1892 die Sterblichkeit der ehelich, in den anderen Jahren jene der unehelich Geborenen. Letzteres ist auch der Fall im Mittel der Jahre 1890—1894.

IX. Die Sterblichkeit an akuten Infektionskrankheiten ist in den Berichtsjahren geringer, als sie beobachtet worden ist; die trotzdem noch sehr hohe Ziffer des Mittels der Jahre 1890—1895: 31,1 auf 10 000 der Bevölkerung erklärt sich aus den besonders hohen Zahlen der Jahre 1890 und 1891.

Die Ziffern der Todesfälle an entzündlichen Erkrankungen der Athmungsorgane 1892: 2,6 ‰ der Bevölkerung

1893: 2,5 „ „ „

1894: 1,9 „ „ „

1895: 2,1 „ „ „

sind in den beiden ersten Berichtsjahren weniger günstig, wie jene des Mittels der Jahre 1885—1889: 2,2 und gleichen jener des Mittels der Jahre 1890—1894: 2,5. Die beiden letzten Berichtsjahre zeigen wieder günstigere Zahlen.

Die Ziffern der Todesfälle an Tuberculose ohne Unterschied des Organes, im Jahre 1892: 3,7 ‰ der Bevölkerung

1893: 4,1 „ „ „

1894: 3,7 „ „ „

1895: 3,6 „ „ „

im Mittel der Jahre 1890—1894: 4,04 „ „ „
sind günstiger wie jene des Mittels der Jahre 1885—1889:
4,9 ‰.



Berichtigung.

Durch unliebsame, dem Verfasser nicht zur Last fallende Fehler in der Zusammenstellung der Ergebnisse der Volkszählung nach Distrikten sind in den Zahlen des Jahres 1895 einige Fehler entstanden, welche der Richtigstellung bedürfen.

Seite	13	6. Zeile	von unten	lies	0,5	statt	0,7
„	16	20.	„	oben	„	1,07	„ 0,7
„	„	21.	„	„	„	1,09	„ 1,5
„	17	12.	„	„	„	0,7	„ 0,5
„	„	13.	„	„	„	0,2	„ 0,3
„	„	2.	„	unten	„	0,3	„ 0,2
„	18	3.	„	„	„	4,6	„ 6,4
„	„	4.	„	„	„	3,7	„ 2,7
„	25	23.	„	oben	„	1,6	„ 1,1
„	„	24.	„	„	„	0,6	„ 0,9
„	33	6.	„	unten	„	6,5	„ 9,08
„	„	7.	„	„	„	6,6	„ 4,8
„	„	17.	„	„	„	19,9	„ 27,6
„	„	18.	„	„	„	21,7	„ 15,9

„ 36 19. bis 24. Zeile von oben. Der Satz hat zu lauten:

In allen Berichtsjahren ist die Kindersterblichkeit im II. Distrikte bei weitem am höchsten.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Roth Friedrich

Artikel/Article: [Medicinische Statistik der Stadt Bamberg für die Jahre 1892 und 1895 1-38](#)