

Nachtrag zur Flora Bamberg's

von
Dr. Funk.

Da ich seit dem Erscheinen unseres vorigen Berichtes leider nur wenig Gelegenheit hatte, grössere Excursionen vorzunehmen, so blieb die Ausbeute an für unsere Flora neuen Arten sehr klein und den grösseren Theil verdanken wir dem Scharfblicke einiger anderen Mitglieder unseres Vereines, so noch eine Reihe Arten des Steigerwaldes von Herrn Landarzt Kress, mehrere Interessante Herrn Pfarrcuratus Weissenfeld in Niedermiersberg. Auch Herr Professor Schnizlein gab Andeutungen, nach denen ich *Dianthus caesius*, *Euphrasia lutea* und *Lithospermum purpureo-caeruleum* an den betreffenden Stellen auffand. Von einer Zahl Arten wurden neue Standorte aufgefunden.

Die neu hinzugekommenen Arten sind:

Fumaria parviflora Lam. Hier und da an Schutthaufen in Nähe der Eisenbahngebäude, sowie an Acker-rändern daselbst.

Dianthus caesius L. An Felsen bei Streitberg.

Hypericum quadrangulare L. Ist hier nicht selten an denselben Orten, wie *H. tetrapterum* Fr. und wurde nur früher anzuführen vergessen.

Cerinthe minor L. Wurde schon mehrere Jahre von Herrn Pfarrcuratus Weissenfeld an verschiedenen Orten auf den trockenen Abhängen oberhalb Russenbach unweit Miersberg gefunden und zwar weit entfernt vom bebauten Lande.

Lithospermum purpureo-caeruleum L. Im lichten niederen Walde bei Gasseldorf an den Abhängen des Hammerstamms.

Euphrasia lutea L. Sehr selten an trockenen grasigen Bergabhängen bei Streitberg und Muggendorf.

Orobanche ramosa L. Wächst in den Jahren, in welchen Hanf auf den Feldern um Niedermiersberg gebaut, so häufig auf diesem, dass es als belästigendes Unkraut angesehen wird. (Weissenfeld.)

Pyrola chlorantha Sw. Wurde im Hauptmoore gegen Memmelsdorf von Herrn Professor Hoffmann aufgefunden.

Cuscuta Epiliman Weihe. Auch in Lein-Feldern zwischen Bug und Pettstadt.

Galeopsis versicolor Curt. In Gräben am Wege nach Pöldorf und am Aufseeshöfchen.

Pinguicula vulgaris L. Steigerwald. (Kress.)

Lychnachia nemorum L. Steigerwald. (Kress.)

Primula farinosa L. Steigerwald. (Kress.)

Spiranthes autumnalis Rich. Steigerwald (Kress) und an feuchten Abhängen zwischen Niedermiersberg und Russenbach. (Weissenfeld.)

Setaria verticillata Beauv. Selten auf sandigen Aeckern am Canale zwischen Bug und Strullendorf.

Lycopodium Chamacyparissias Al. Braun. Bei Gräfenneuses im Steigerwalde. (Kress.)

Betrichium matricariofolium A. Braun. Bei Ebersbrunn im Steigerwalde, sehr selten. (Kress.)

Blechnum Spicant. Rth. Bei Ebrach und Koppenwind im Steigerwalde. (Kress.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg](#)

Jahr/Year: 1856

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Funk M.

Artikel/Article: [Nachtrag zur Flora Bamberg. 48](#)