© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

Verzeichnis

der

in unmittelbarer Nähe und im grösseren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken.

Mitgetheilt vom Lehrer Cl. Gehrs in Hannover.

(Anordnung u. Namen sind der Excursions-Mollusken-Fauna von S. Clessin entnommen.)

I. Classe. Gasteropoda.

I. Familie. Arionidae.

1. Genus Arion, Fèrussac.

1. *Arion empiricorum*, Fèr.
Gemein in allen Wäldern; in unmittelbarer Nähe nur die schwarze Form, sowohl auf Kalk-, wie auf Moor- und Sandboden. Im J. 1882 sah man in der Eilenriede auffallend viele grosse dunkelbraune Exemplare.
2. *Arion subfuscus*, Draparnaud.
Nicht selten in unsern Laubwäldern; in der Eilenriede häufig bei Heiligers Brunnen.
3. *Arion hortensis*, Fèr.
Gemein auf schwerem Boden, sowohl in der Ebene wie auf den Bergen.

2. Genus Amalia, Moq. Tand.

4. *Amalia marginata*, Drap.
Bisher nur im Sauparke gefunden, wo sich das Tier unter Steinen oder Laub sehr verborgen hält.

3. Genus Limax, Müller.

5. *Limax cinereo-niger*, Wolf.
In der Eilenriede, wie in den Wäldern der ganzen Umgegend nicht selten. In der Klosterforst und am Saupark kommen grau und schwarz gestreifte Exemplare nicht selten vor.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

6. *Limax cinereus*, Lister.
In den Kellern der Stadt, in den Gärten und auf den Kirchhöfen häufig zu finden.
7. *Limax variegatus*, Drap.
Kommt nur in Kellern vor.
8. *Limax tenellus*, Nilson.
Bisher nur im Sauparke gefunden. Die kleine Schnecke hält sich meist verborgen und ist deshalb wohl anderwärts übersehen worden.
9. *Limax agrestis*, Linné.
Ein gemeines Thier, welches in Gärten und auf Feldern oft grossen Schaden verursacht.
10. *Limax laevis*, Müller.
Im Hemminger Holze und am Schnellen Graben gefunden.
11. *Limax arborum*, Bouch.
In der Eilenriede und den Laubwäldern häufig.

II. Familie. Testacellidae.

4. Genus Daudebardia, Hartmann.

12. *Daudebardia rufa*, Fèr.
Am Kahnstein bei Salzhemmendorf; am Klüt b. Hameln (Dieckhoff).

III. Familie. Helicidae.

I. Subfamilie. Vitrininae.

5. Genus Vitrina, Drap.

13. *Vitrina pellucida*, Müller.
In v. Alten's Garten an d. Mauer; im Georgengarten, bei Misburg; Breite Wiese, Kirchröderturm, Bettenser Garten. Häufig.
14. *Vitrina diaphana*, Drap.
Am Leineufer und im Hemminger Holze häufig.

II. Subfamilie. Hyalininae.

6. Genus Hyalina, Fèr.

15. *Hyalina cellaria*, Müller.
Eilenriede, Masch, Georgengarten, Welfengarten, Bettenser Garten; nicht selten in den übrigen Laubwäldern.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

16. *Hyalina nitidula*, Drap.
Georgengarten, Welfengarten, Kahnstein, Saupark, Ith, Misburg. Nicht selten.

17. *Hyalina alliaria*, Miller.
Am Kahnstein häufig, am Ith, Saupark, Deister, im Georgengarten.

18. *Hyalina pura*, Alder.
Einmal an der Deisterpforte gefunden.
var. viridula, Menke.
Häufig am Kahnstein und Ith.

19. *Hyalina radiatula*, Gray.
Auf feuchten Wiesen und in Laubwäldern nicht selten.
var. petronella, Charpentier u. Pfeiffer.
Am Saupark u. auf den Saalewiesen bei Salzhemmendorf.

20. *Hyalina crystallina*, Müller.
In Laubwäldern u. auf feuchten Wiesen häufig.
var. subterranea, Bourguignat.
Am Hohnstein.

21. *Hyalina fulva*, Müller.
Auf Wiesen, unter Büschen und Hecken nicht selten.

7. Genus Zonitoides, Lehmann.

22. *Zonitoides nitida*, Müller.
Im Grase feuchter Wiesen, an Flussufern häufig.

III. Subfamilie. Helicinae.

8. Genus Helix, Linné.

23. *Patula rotundata*, Müller.
Gemein an Mauern u. unter Steinen in den Wäldern.

24. *Patula pygmaea*, Drap.
Auf Wiesen u. in Wäldern nicht selten.

25. *Acanthinula aculeata*, Müller.
Vereinzelt in den Laubwäldern, in der Eilenriede beim Kirchröder Turm nicht selten.

26. *Vallonia pulchella*, Müller.
Gemein unter Gras u. Moos.

27. *Vallonia costata*, Müller.
An denselben Orten, aber sparsamer.

28. *Trigonostoma obvoluta*, Müller.
Unter Steinen in den Laubwaldungen des Deisters, Süntels, Iths, Sauparks nicht selten.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

var. dentata.
Leere weisse Gehäuse auf der breiten Wiese.

29. *Triodopsis personata.* Lamarck.
Hohnstein, Saupark, Kahnstein, Klüt.

30. *Petasia bidens*, Chemnitz.
Bei Misburg.

31. *Fruticicola hispida*, Linné.
Gem. an feuchten Orten, gern auf Brennesseln.

32. *Fruticicola strigella*, Drap.
Zwischen Misburg u. Anderten (Dieckhoff).

33. *Fruticicola fruticum*, Müller.
Georgengarten, Misburg, Saupark, Bettenser Garten, Kirchhöfe. Nicht selten.

34. *Fruticicola incarnata*, Müller.
Gem. in Laubwäldern.

35. *Chilotrema lapicida*, Linné.
Bei Heiligers Brunnen, Misburg, an den Bergen häufig.

36. *Xerophila ericetorum*, Müller.
Ahlem, Misburg, Bettenser Garten, Salzhemmendorf.

37. *Arionta arbustorum*, Linné.
Gem. auf den Kirchhöfen und in den Laubwäldern.

38. *Tachea hortensis*, Müller.
An Hecken u. Büschen gem.

var. fusco-labiata, Kreglinger.
Eilenriede.

var. trochoidea, Clessin.
Am Bettenser Garten.

Von den durch Ausbleiben u. Zusammenfliessen entstehenden Bändervariationen habe ich hier folgende beobachtet:

1. 12345
2. $\overset{\frown}{1}2345$
3. $1\overset{\frown}{2}345$
4. $\overset{\frown}{1}2345$
5. $\overset{\frown}{1}2\overset{\frown}{3}45$
6. $\overset{\frown}{12345}$
7. 12340
8. 10345
9. 10305
10. 00000
11. $\overset{\frown}{1}2045$
12. $123\overset{\frown}{4}45$

39. *Tachea nemoralis*, Linné.
An ähnlichen Orten, aber viel häufiger.

©Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

var. conoidea, Clessin.
Am Kahnstein.

An Bändervariationen beobachtet:

1.	12345	18.	10305
2.	$\overset{\frown}{1}2345$	19.	00345
3.	$1\overset{\frown}{2}345$	20.	00045
4.	$12\overset{\frown}{3}45$ (Dieckhoff)	21.	00300
5.	$123\overset{\frown}{4}5$	22.	00000
6.	$\overset{\frown}{1}23\overset{\frown}{4}5$	23.	$0\overset{\frown}{2}345$
7.	$\overset{\frown}{1}2345$	24.	$0234\overset{\frown}{5}$
8.	$1\overset{\frown}{2}3\overset{\frown}{4}5$	25.	$00\overset{\frown}{3}45$
9.	$1\overset{\frown}{2}345$	26.	$00\overset{\frown}{3}4\overset{\frown}{5}$
10.	$\overset{\frown}{1}2345$ (Dieckhoff)	27.	$0\overset{\frown}{2}300$
11.	$\overset{\frown}{1}23\overset{\frown}{4}5$	28.	$00\overset{\frown}{3}45$
12.	$1\overset{\frown}{2}345$	29.	$0\overset{\frown}{2}345$
13.	$\overset{\frown}{12345}$	30.	$1\overset{\frown}{2}33\overset{\frown}{4}5$
14.	12340 (Dieckhoff)	31.	123345
15.	12300 (Dieckhoff)	32.	123445
16.	10345	33.	$1\overset{\frown}{2}344\overset{\frown}{5}$
17.	02345		

40. *Helicogena pomatia*, Linné.
Misburg, Kronsberg, auf allen Kalkbergen.

IV. Subfamilie. Pupinae.

9. Genus Buliminus, Ehrenberg.

41. *Napaeus montanus*, Drap.
Saupark, Ith, Kahnstein, Deister, Süntel.

42. *Napaeus obscurus*, Müller.
Heiligers Brunnen, in allen Laubwäldern nicht selten.

10. Genus Cochlicopa, Risso.

43. *Cochlicopa lubrica*, Müller.
Gemein auf feuchten Wiesen, unter Büschen und Steinen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

44. *Azeca Menkeana*, C Pfeiffer.
Kahnstein, Ith, Saupark, auf der Masch angeschwemmt.

45. *Acicula acicula*, Müller.
Auf der Masch angeschwemmt, lebend unter den Büschen der wilden Rosen beim Bett. Garten, im Hemm. Holze, beim Tiergarten.

11. Genus Pupa, Drap.

46. *Pupa secale*, Drap.
Hohenstein, Kahnstein, Ith, Saupark, häufig.

47. *Pupa muscorum*, Linné.
Gemein in Wäldern und auf Wiesen.
var. elongata, Clessin.
Breite Wiese.

48. *Pupa minutissima*, Hartmann.
In Anschwemmungen auf der Masch; selten.

49. *Pupa inornata*, Michaud.
Daselbst; aber selten.

50. *Pupa pygmaea*, Drap.
Saupark, Lind. Berg, Br. Wiese, Süntel, Ith, Kahnstein. Nicht selten.

51. *Pupa antivertigo*, Drap.
Auf sumpfigen Wiesen.

52. *Pupa pusilla*, Müller.
Kahnstein, bei der Holzmühle am Saupark.

53. *Pupa angustior*, Jeffreys.
Br. Wiese, Masch.

12. Genus Balea, Brideaux.

54. *Balea perversa*, Linné.
An alten Mauern in Salzhemmendorf.

13. Genus Clausilia, Drap.

55. *Clausilia laminata*, Montagu.
Gem. in Laubwäldern.

56. *Clausilia ventricosa*, Drap.
Daselbst nicht selten; in der Eilenriede b. Heil. Brunnen.

57. *Clausilia plicatula*, Drap.
An den Kalkbergen häufig.

58. *Clausilia dubia*, Drap.
Kahnstein, Saupark.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

59. *Clausilia nigricans*, Pulteney.
In der Eilenriede und den übrigen Laubwäldern in den verschiedensten Formen. Gemein.

60. *Clausilia parvula*, Studer.
An den Kalkbergen häufig.

61. *Clausilia biplicata*, Montagu.
Daselbst gemein.

62. *Clausilia plicata*, Drap.
Daselbst nicht selten.

V. Subfamilie. Succinidae.

14. Genus Succinea.

63. *Succinea putris*, Linné.
Gem. an Ufern u. feuchten Orten.

64. *Succinea Pfeifferi*, Rossmässler.
Breite Wiese, Misburg, Salzhemmendorf.

65. *Succinea oblonga*, Drap.
Vereinzelt in v. Alten Garten, am Saupark, Kahnstein, Hohnstein, Ith, auf d. Masch.

IV. Familie. Auriculidae.

15. Genus Carychium.

66. *Carychium minimum*, Müller.
An feuchten Orten gem.

V. Familie. Cyclostomacea.

16. Genus Acme, Hartmann.

67. *Acme polita*, Hartmann.
Am Kahnstein, selten.

VI. Familie. Valvatidae.

17. Genus Valvata, Müller.

68. *Valvata piscinalis*, Müller.
Leine, Georgengarten, Welfengarten.

69. *Valvata cristata*, Müller.
Masch, Georgengarten, Welfengarten, Eilenriede.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

VII. Familie. Paludinidae.

18. Genus Vivipara, Lamarck.

70. *Vivipara vera*, v. Frauenfeld.
Georgengarten, breite Wiese, Langenhagen (Dieckhoff).

71. *Vivipara fasciata*, Müller.
Aller.

VIII. Familie. Rissoidae.

19. Genus Bythinia Gray.

72. *Bythinia tentaculata*, L.
Gem. in Gräben u. Teichen.

73. *Bythinia ventricosa*, Gray.
Georgengarten.

IX. Familie. Neritinidae.

20. Genus Neritina, Lamarck.

74. *Neritina fluviatilis*, Linné.
Leine, häufig.

X. Familie. Limnaeidae.

21. Genus Limnaea, Lamarck.

75. *Limnaea stagnalis*, Linné.
In Gräben u. Teichen gem.

var. vulgaris, West.
Kleine Gräben der Masch, Eilenriede.

var. producta, Colb.
Breite Wiese.

var. angulata, Clessin.
Bult, Masch.

var. colpodia, Bourg.
Daselbst.

76. *Limnaea auricularia*, Linné.
Georgengarten, Rickl. Bach, Tönjesberg. Nicht selten.

77. *Limnaea ovata*, Drap.
Gem. in Gräben.

78. *Limnaea palustris*, Müller.
Daselbst gem.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

var. corvus, Gmelin.
Am westl. Rande d. Bult.

var. turricula, Held.
Breite Wiese.

var. fusca, C. Pfeiffer.
Masch.

var. septentrionalis,
Eilenriede.

79. *Limnaea glabra*, Müller.
Bei Buchholz, am Rande des Warmbüchener Moores.

80. *Limnaea truncatula*, Müller.
Nicht selten in kleinen Gewässern.

var. maxima, Colb.
Bei Anderten.

var. ventricosa, Moq. Tand.
Bei Buchholz, Barksen.

81. *Limnaea peregra*, Müller.
Am Rande des Warmbüch. Moores.

22. Genus Amphipeplea, Nilson.

82. *Amphipeplea glutinosa*, Müller.
Sehr selten. 2 Exempl. von der Masch.

23. Genus Physa, Drap.

83. *Physa fontinalis*, L.
Gem. in Gräben auf der Masch, u. den übrigen Wiesen.

24. Genus Aplexa, Flemming.

84. *Aplexa hypnorum*, L.
Wiesengräben, nicht selten.

25. Genus Planorbis.

85. *Planorbis corneus*, L.
Gem. in Gräben, Sümpfen u. Teichen.

86. *Planorbis marginatus*, Drap.
Daselbst.

var. submarginatus, Jan in Porro.
In der Fösse häufig.

87. *Planorbis carinatus*, Müller.
In Teichen u. Gräben.

88. *Planorbis vortex*, L.
Gem. in stehenden Gewässern.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

89. *Planorbis contortus*, L.
Desgl.

90. *Planorbis albus*, Müller.
In Teichen und Sümpfen gem.

91. *Planorbis crista*, L.
In stehenden Gewässern nicht selten.
var. nautileus, L.
Georgengarten.
var. cristatus, Drap.
Bult, an der Fösse.

92. *Planorbis complanatus*, L.
In Gräben und Teichen. Häufig in Pfützen an der Saale bei Salzhemmendorf.

93. *Planorbis Clessini*, Westerlund.
In einem Graben bei der Burg häufig.

94. *Planorbis nitidus*, Müller.
Graben am Polygon, Bult, Masch, Kirchröder Turm, schöne Exempl. auf dem Warmbüch. Moore.

26. Genus Ancylus, Geoffroy.

95. *Ancylus fluviatilis*, Müller.
Leine, Rickl. Bach, Haller.

27. Genus Acroloxus, Beck.

96. *Acroloxus lacustris*, L.
In Gräben häufig.

II. Classe. Bivalvae.

I. Familie. Unionidae.

28. Genus Anodonta, Cuvier.

97. *Anodonta mutabilis*, Clessin.
var. cellensis, Schröter.
Georgengarten.
var. piscinalis, Nils.
In Teichen bei Lehrte.
var. anatina, L.
Rickl. Bach, Leine, Teich bei der Holzmühle.

98. *Anodonta complanata*, Ziegler.
In der Leine.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;www.zobodat.at

29. Genus Unio, Philippson.

99. *Unio pictorum*, L.
Leine, Rickl. Bach, Haller.
var. limosus, Nilson.
Georgengarten.

100. *Unio batavus*, Lamarck.
Häufig in der Leine.
var. crassus, Retz.
Daselbst.

II. Familie. Cycladidae.

30. Genus Sphaerium, Scopoli.

101. *Sphaerium corneum*, L.
Gem. in Gräben u. Teichen.
var. nucleus, Studer.
Daselbst. Hin u. wieder.

102. *Sphaerium duplicatum*, Clessin.
Daselbst. Nicht selten.

31. Genus Calyculina, Clessin.

103. *Calyculina lacustris*, Müller.
Breite Wiese, Masch, Georgeng., Rickl. Beke, Ahlemer Steinbrüche.
var. Steinii, A. Schmidt.
Georgengarten; sparsam.

32. Genus Pisidium, C. Pfeiffer.

104. *Pisidium amnicum*, Müller.
In der Leine.

105. *Pisidium supinum*, A. Schmidt.
Rickl. Bach, Haller.

106. *Pisidium fossarinum*, Clessin.
Gem. in Gräben.

107. *Pisidium milium*, Held.
Br. Wiese, Georgeng., Ilepol, Bischofshole.

108. *Pisidium Scholtzii*, Clessin.
In einem Graben b. Bischofshole.

109. *Pisidium obtusale*, C. Pfeiffer.
In einem Sumpfe an der Fösse.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover

Jahr/Year: 1880-1882

Band/Volume: 31-32

Autor(en)/Author(s): Gehrs Clemens

Artikel/Article: Verzeichnis der in unmittelbarer Nähe und im grösseren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken 33-43