Rudolf Dehner
Wolfgang Dornberger

## Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) bei Niederstetten

Am 31.8.1981 gegen 16 Uhr wurde im Rahmen einer regelmäßigen Vogelberingung bei Niederstetten (49.25 NO 9.54 E) in einem Acker-Hecken-aufgelassenen Weinberg-Gelände eine diesjährige S p e r b e r g r a s m ü c k e gefangen, beringt, vermessen und freigelassen.

Im Vergleich mit den gleichzeitig gefangenen Garten-, Mönch- und Dorngrasmücken (S.borin, S. atricapilla und S. communis), der mitgeführten Bestimmungsliteratur (Svensson:Indenfication Guide to European Passerines, Stockholm 1975) und den biometrischen Meßdaten, Flügellänge 86,0 mm, Flügelspitzenlänge 22,4 mm, Schwanzlänge 70,0 mm und Gewicht 23,0 gr., Augenfarbe graubraun und die Unterschwanzdecken zeigten eine angedeutete Wellung, fiel uns die Artbestimmung leicht.

Nach HÖLZINGER, KNÖTZSCH, KROYMANN, WESTERMANN (Anz.orn.Ges. Bayern 9, 1970, Sonderheft), Informationsbrief Avifauna Baden-Württemberg und Rundschreiben Vogelwarte Radolfzell ist die Sperbergrasmücke in Baden-Württemberg als unregelmäßiger Durchzügler (in den letzten dreißig Jahren 14 Nachweise aus den Monaten April (2), Mai (1), August (10) und September (1) einzustufen.

In der Bundesrepublik Deutschland gehört die Sperbergrasmücke zu den vom Aussterben bedrohten Vogelarten (Dtsch.Sekt.Int.Rat.Vogelschutz 1976). Sie gilt als europäisch-turkestanischer Faunentyp mit einer zentralpalearktischen Gesamtverbreitung (VOOUS 1962, Die Vogelwelt Europas und ihre Verbreitung. Hamburg und Berlin). Ihr Vorkommen im norddeutschen Raum ist ausgesprochen lokal (NEUSCHULZ,J.Orn. 122,1981: 221-257).

Nach Auswertung von Ringfunden gibt ZINK (Der Zug der europäischen Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel, 1973, 1.Lief.Möggingen) eine Herbstzugrichtung nach SE bis SSE an um in die Winterquartiere nach Ostafrika zu gelangen.

Anschriften der Verfasser:
Rudolf Dehner, Schöntaler Berg 10, 6994 Niederstetten
Wolfgang Dornberger, Rathausgasse 8, 6994 Niederstetten

Nachtrag: Am 10.9.81 konnten wir im selben Geländekomplex aus ca. 2 mtr. Distanz ein adultes 1Männchen der Sperbergrasmücke beobachten.

Wolfgang Dornberger und Egbert Schmid

## Ornithologischer Sammelbericht Altkreis Bad Mergentheim (Zeitabschnitt 1980 - 31. 8. 1981)

Mit dem vorliegenden Sammelbericht soll der aktiven Gruppe von Ornithologen im gesamten Main-Tauber-Kreis die Möglichkeit zur jährlichen Veröffentlichung von Beobachtungen ge-

geben werden. Erwünscht sind nicht nur "Seltenheitsbeobachtungen") sondern auch Daten von verbreiteten Vogelarten, z.B. in Form von Kartierungen auf Probeflächen oder Bestandserfassungen im Rahmen von Stellungsnahmen zu Naturschutzproblemen.

Einsendeschluß für die SB-Beobachtungen ist jeweils der 31.8. Die Beobachtungen bitte unter Angabe des Datums, Status und Beobachtungsort an:

Egbert Schmid
Kieselallee 17
6993 Creglingen.

Bei der Auflistung der Arten bitten wir um Beachtung der systematischen Reihenfolge.

Den folgenden Mitarbeitern sei für ihre Beiträge zu diesem SB herzlich gedankt:
R. Betz (Be.), Dr.H. Brehm (Br.), R. Dehner (R.De.), S. Dehner (S.De.),H. Diemer (Di.), W. Dornberger (Do.), E. Dod (Dod), Gubitz,Lauer, Lorenz, Link, Mies, K. Oed (Od.), Pfannkuch, Panzner (Pa.), E. Schmid (Sch.), Weidmann (We.), G. Wolf (Wo.), Zeller.

Beobachtungen:

H a u b e n t a u c h e r (Podiceps cristatus)
Auf dem Weiher bei Blumweiler am 14.5.81 1 Ex. (R.De.).

Z w e r g t a u c h e r (Podiceps ruficollis)
2 Ex. am 24.4.81 auf dem Reuttalsee (R.De.), 1 Ex. am 20.1. bei Igersheim an der Tauber (Sch), 25.3.80 2 Ex. bei Elpersheim (Sch.), 15.3.81 2 Ex. am Nassauersee (Sch.), am 30.12.80 8 Ex. bei Elpersheim (Sch.,Od.).

G r a u r e i h e r (Ardea cinerea)
Ganzjährig an der Tauber und ihren Nebenbächen, 25.7.81 4 Ex. am Reuttalsee (R.De.,Do.), 19.8.81 4 Ex. am Blumweilerweiher (R.De.), 1980 eine Brutkolonie im oberen Taubertal 8-10 BP, 1980 Brutversuch eines BP am Münstersee, 1981 eine Brutkolonie im oberen Taubertal 18-20 BP (Sch.Do.).

H ö c k e r s c h w a n (Cygnus olor)
1980 und 1981 je ein BP in Creglingen (Sch.).

S t o c k e n t e (Anas platyrhynchos)
0,1 mit 5 pulli am 2.5.81 Vorbach bei Vorbachzimmern (R.De.,Do.), am 26.2.81 0,1 brütend bei Finsterlohr (Sch.), am 12.1.81 ca. 150 Ex. an der Tauber bei Creglingen (Sch.).

K n ä c k e n t e (Anas querquedula)
am 29.3.81 3,0 am Reuttalsee (R.de.,Do.).

T a f e l e n t e (Aythya ferina)
am 9.3.1980 1,0 am Münster See (Pa.,Sch.).

S p e r b e r (Accipiter nisus)
1981 Gemeindegebiet Niederstetten 3-5 BP (R.De.,Do.), 1980 und 1981 je ein BP bei

Niedersteinach (Sch.), 1981 1 BP bei Archshofen (Sch.).

H a b i c h t (Accipiter gentilis)
Gemeindegebiet Niederstetten 1981 1 BP mit 2 flüggen Juv. (R.De.,Do.), 1 BP ohne Bruterfolg 1981 bei Creglingen (Sch.).

R o t m i l a n (Milvus milvus)
Bei Oberstetten 1981 1 BP mit 3 flüggen Juv. (Do.), 28.2.81 Erstbeobachtung Raum Niederstetten (R.De.,Do.), 27.8.81 20 Ex. bei Finsterlohr (Br.), 27.2.81 Erstbeobachtung Raum Creglingen (Be.), 1981 je eine Brut bei Creglingen, Münster, Archshofen, Bad Mergentheim (Od.,Pa.,Sch.).

S c h w a r z m i l a n (Milvus migrans)
Gemeindegebiet Niederstetten 1 BP (R.De.,Do.) am 6.6.81 1 Ex. bei Archshofen (Pa.,Sch.), 28.8.81 1 Ex. bei Niedersteinach (Sch.)

W e s p e n b u s s a r d (Pernis apivorus)
Gemeindegebiet Niederstetten 1981 1 erfolgreiches BP (R.De.,Do.).

R o h r w e i h e (Circus aeruginosus)

Am 23.3.80 1,0 bei Niederstetten (R.De.,Do.),30.3.80 1,0 bei Ebertsbronn (R.De.), vom 10.5.80 - 30.5.80 1,1 im Oberen Taubertal (Sch.Od.).,8.3.81 0,1 im Oberen Taubertal Pa.,Sch.).

K o r n w e i h e (Circus cyaneus)
Am 13.4.80 1,0 Hollenbach-Herbsthausen (R.De.,We.), 27.3.81 bei Niederstetten (R.De.,Do.).

F i s c h a d l e r (Pandion haliaetus)
5.4.81 zw.Rinderfeld und Wildentierbach 1 Ex. (R.De.), am 4.4.81 1 Ex. auf der Feldfläche zw. Großharbach und Equarhofen.(Sch.-Pa.)

B a u m f a l k e (Falco subbuteo)
Gemeindegebiet Niederstetten 1981 1 BP mit 1 flüggen Juv. (R.De.,S.De.,Do.)

W a n d e r f a l k e (Falco peregrinus)
Am 6.3.81 bei MGH 1 Ex. (Sch.).

M e r l i n (Falco columbarius)
am 23.10.81 1 Ex. Flugplatz Niederstetten (R.De.)

T u r m f a l k e (Falco tinnunculus)
1981 im Raum Niederstetten 2 BP. mit einmal 3 flüggen Juv. und einmal 4 flüggen Juv. (R.De.,S.De.,Do.), Laudenbach 1 BP mit 4 flüggen Juv. (Sch.)

R e b h u h n (Perdix Perdix)
Am 29.9.80 1 singendes Ex. bei Dreischwingen (Do.) ,8.1.81 8 Ex. bei Niederstetten (Do.) August 1981 Niederstetten-Flugplatz eine Kette mit mind. 7 Ex. (R.De.,Do.,Dod.), 21 Ex. bei Laudenbach 30.12.80, am 31.8.81 eine Kette mit 9 Ex. bei Wachbach (Sch.).

W a c h t e l (Coturnix coturnix)
1981 im Gemeindegebiet Niederstetten 7 singende Ex. (R.De.,S.De.,Do.), 15.8.81 1 singendes Ex. bei Craintal (Sch.,Ni.), am 27.8.81 1 singendes Ex. bei Lohrhof (Sch.)

F a s a n (Phasianus colchicus)
Am 4.5.81 ein Gelege mit 20 angebrüteten Eiern ausgemäht (R.De.), August 1981 0,1 mit 7 flüggen Juv. bei Wermutshausen (R.De.) und am 18.8.81 0,1 mit 7 flüggen juv. bei Niederstetten (Do.).

T e i c h h u h n (Gallinula chloropus)
1981 1 BP am Reutalsee(R.De.,Do.), Mai 1980 zwischen Frauental und Steinachmündung 9 BP (Sch.,Zo.),Juni 1981 zwischen Tauberzell und Creglingen 14 BP,zwischen Creglingen und Landesgrenze 3 BP (Sch.)

B l ä ß h u h n (Fulica atra)
Am 20.1.80 bei Igersheim 17 Ex. (Sch.) und 4.1.81 25 Ex. Tauber bei Creglingen (Sch.).

K i e b i t z (Vanellus vanellus)
Spärlicher Brutvogel auf den landwirtschaftlich genutzten Hochflächen im Gemeindegebiet Creglingen und Niederstetten (R.De.,Do.,Sch.), am 7.6.81 ein Trupp mit ca. 40 Ex. bei Rinderfeld (Do.) und am 21.9.80 bei Niedersteinach ca. 100 Ex. (Sch.,Od.).

G o l d r e g e n p f e i f e r (Pluvialis apricaria)
Am 30.3.80 unter Kiebitzen 7 Ex. bei Ebertsbronn (R.De.,Do.).

W a l d s c h n e p f e (Scolopax rusticola)
Im Gemeindegebiet Niederstetten 1981 Brutvogel in mind. drei Waldgebieten (R.De.,S.De.Do.) und am 17.5.80 ein Nestfund bei Lichtel (Sch.)

B r a c h v o g e l (Numenius arquata)
Am 19.8.81 1 Ex. in den Wiesen bei Blumweiler (R.De.).

G r ü n s c h e n k e l (Tringa nebularia)
Am 5.8.80 16 Ex. am Nassauer See (Sch.).

F l u ß u f e r l ä u f e r (Actitis hypoleucos)
Am 14.7.81 1 Ex. am Reutalsee (R.De.,Do.), 5.8.80 3 Ex. Nassauer See (Sch.) 28.8.81 bei Creglingen 1 Ex. und 31.8.81 1 Ex. bei Creglingen (Sch.)

K n u t t (Calidris canutus)
Am 27.8.81 1 Totfund bei Lohrhof (Zeller,Sch.,Do.).

L a c h m ö w e (Larus ridibundus)
31 Ex. am 25.7.81 Flugplatz Niederstetten-Wildentierbach (R.De.,Do.).

H o h l t a u b e (Columba oenas)
Im Gemeindegebiet Niederstetten 1981 Brutvogel in mind. zwei Waldungen (R.De.,Do.), Gemeindegebiet Bad Mergentheim in zwei Waldungen mind. 6 BP. 1980 u.1981 (Wo.,Od.,Sch.), Münster 2 BP (Sch.), 1981 Schön 1 BP (Sch.).

R i n g e l t a u b e (Columba palumbus)
Am 22.3.80 bei Reinsbronn 10-15 000 Ex. (Sch.,Pa.).

T u r t e l t a u b e (Streptopelia turtur)
1981 1 BP mit flüggen Jungvögeln bei Wermutshausen (R.De.,Do.) am 9.5.81 4 Ex. bei Niederstetten (R.De.,Do.), 1.7.81 2 Ex. Niederrimbach (Sch.),26.6.81 1 Ex. bei Reinsbronn (Sch.) und 1981 2 BP bei Igersheim (Sch.).

T ü r k e n t a u b e (Streptopelia decaocto)
1980 in Ebertsbronn kein Brutnachweis (R.De.,Do.)

S c h l e i e r e u l e (Tyto alba)
1981 vier Erstbruten im Gemeindegebiet Niederstetten, 3x5 flügge juv. und 1x6 flügge juv. (R.De.,S.De.,Do.), 14.12.80 1 Ex. in Schäftersheim (Klein).

W a l d k a u z (Strix aluco)
Am 5.4.81 1 BP mit 5 juv. in der Kirche Lichtel (R.De.,S.De.), 1 BP mit 2 juv. Kirche Creglingen (Sch.), 1 BP mit 3 juv. Niedersteinach (Sch.) und 1 BP Creglingen mit 3 juv. (Sch.).

S t e i n k a u z (Athene noctua)
Am 6.2.81 bei Reinsbronn 1 Ex., am 4.4.81 1 Ex. Ketterberg (Pfannkuch),

W a l d o h r e u l e (Asio otus)
1981 im Gemeindegebiet Niederstetten 4 BP (R.De.,S.De.,Do.). 1981 im Gemeindegebiet Creglingen 1 BP (Sch.,Latus).

M a u e r s e g l e r (Apus apus)
24.4.81 Erstbeobachtung Raum Creglingen (Sch. und im Juni 1981 27 BP im Stadtgebiet Creglingen, 7 BP in Craintal und 14 BP in Archshofen (Sch.)

E i s v o g e l (Alcedo atthis)
1981 im Altkreis Bad Mergentheim 5 BP (R.De.,Dol,He.,Schl,Pa.,Be.,Di.,).

B l a u r a c k e (Coracias garrulus)
Am 23.5.81 1 Ex. bei Leuzendorf-Gemmhagen (Br.) und vom 15.5.-25.5.81 1 Ex. bei Creglingen (Sch.,Link).

W i e d e h o p f (Upupa epops)
1 Ex. am 25.4.81 bei Schön (Br.), 8.5.81 1 Ex. bei Untereichenrot (Br.),9.8.80 1 Ex. bei Schön (Be.), 1981 1 BP bei Freudenbach (Sch.)

G r ü n s p e c h t (Picus viridis)
1980 zwischen Klingen und Bieberehren 6 BP (Sch.).

G r a u s p e c h t (Picus canus)
1981 im Gemeindegebiet Niederstetten mind. 9 BP (R.De.,Do.), 1981 1 BP bei Archshofen und 1 BP bei Münster (Sch.,Pa.).

S c h w a r z s p e c h t (Dryocopus martius)
1981 1 BP im "Stockholz"zwischen Ermers- und Sichertshausen (S.De.,Do.) 1981 im Gemeindegebiet Creglingen 9-12 BP (Sch.,Be.,Pa.).

1 BP 1980 bei Bad Mergentheim (Od.,Pa.,Sch.) und 1 BP bei Laudenbach (Di.,Sch.).

M i t t e l s p e c h t (Dendrocopos medius)
Im Gemeindegebiet Niederstetten mind. 8 BP, am 2.5.81 Brutbeginn bei einem BP (R.De.,Do.) 1.5.81 2 Ex. bei Freudenbach (Be.).

K l e i n s p e c h t (Dendrocopos minor)
Am 12.4.81 1 Ex. bei Finsterlohr (Br.), 13.5.81 1 Ex. bei Igersheim (Sch.,Pr.,Wo.), 18.5.81 1 Ex. bei Bad Mergentheim (Sch.).

W e n d e h a l s (Iynix torquilla)
1981 Fuchshof bis Burg Brauneck 3 BP (Sch.).

H e i d e l l e r c h e (Lullula arborea)
Am 1.10.80 14 Ex. bei Dunzendorf (Do.), 25.2.81 2 Ex. Flugplatz Niederstetten (R.De.), 31.8.81 2 Ex. bei Niederstetten (R.De.,Do.).

H a u b e n l e r c h e (Galerida cristata)
1981 2 BP in Bad Mergentheim (Sch.Lorenz).

U f e r s c h w a l b e (Riparia riparia)
Am 25.7.81 unter Mehl- und Rauchschwalben 2 Ex. Reutalsee (R.De.,Do).

M e h l s c h w a l b e (Delichon Urbica)
Zählreihe in Edelfingen 1979 110 BP, 1980 = 137 BP, 1981 = 140 BP (Mies).

R a u c h s c h w a l b e (Hirundo Rustica)
Zählreihe in Edelfingen 1979 = 70 BP, 1980 = 78 BP, 1981 = 78 BP (Mies).

S c h a f s t e l z e (Motacilla flava)
Brutvogel im Gebiet Niederstetten-Adolzhausen und Rinderfeld-Dunzendorf (R.De.,Do.), 1981 1 BP bei Schön, 2 BP zw. Streichental und Münster (Sch.).

G e b i r g s s t e l z e (Motacilla cinerea)
1980 zwischen Creglingen und Bieberehren 14 Paare (Sch.).

B a u m p i e p e r (Anthus trivialis)
1981 auf einer 1 qkm Fläche 9 singende Männchen (Do.).

W i e s e n p i e p e r (Anthus pratensis)
Vom 31.12.80 bis 8.1.81 1 Ex. in Quellwiesen bei Niederstetten (Do.).

R o t r ü c k e n w ü r g e r (Lanius collurio)
1980 Steinachtal zw. Equarhofen-Steinachmündung 27 BP und 1981 14 BP (Sch.),Creglingen-Tauberzell 1980 39 BP, 1981 47 BP (Sch.), Creglingen-Bieberehren 1980 7 BP, 1981 3 BP (Sch.). Zählungen nur in den südexponierten Hanglagen.

R o t k o p f w ü r g e r (Lanius senator)
1981 1 BP im Raum Rinderfeld-Dunzendorf(Do.),1981 1 BP Raum Frauental-Equarhofen (Sch., Pa.).

R a u b w ü r g e r (Lanius excubitor)
1981 1 BP Laudenbach-Ebertsbronn (Do.), 1 BP Oberrimbach-Spielbach (Do.), am 8.8.81 1 Ex. beim Rehhof (R.De.), Winter 1980/81 1 Ex. bei Niederstetten (R.De.,Do.), 10.2.80 2 Ex. bei Equarhofen (Sch.Od.), 30.12.80 1 Ex. bei Equarhofen (Sch.)

W a s s e r a m s e l (Cinculus cinculus)
1981 im oberen Taubertal 8-9 Paare, Vorbachtal 10-12 Paare, Rindbach 1 BP, Apfelbach 1 BP, Wachbach 2 BP, Ebertsbronner Bach 1 BP und Aschbach 1 BP (R.De.,Do.,Sch.,Pa.,Be.).

H e c k e n b r a u n e l l e (Prunella modularis)
1 Ex. beringt am 6.12.80 Niederstetten (R.De.,Do.) und 1981 auf einer 1 qkm Probefläche 16 singende Männchen (Do.).

F e l d s c h w i r l (Locustella naevice)
1981 auf einer Probefläche (ca. 1 qkm) bei Niederstetten in aufgelassenen Weinbergen 10 singende und futtertragende Altvögel (R.De.,Do.),1980 Niedersteinach (2,3 qkm) 16 singende Männchen (Sch.)

S u m p f r o h r s ä n g e r (Acrocephalus palustris)
1981 bei Niederstetten drei Nestfunde in der Kombination Raps-Brennessel und am 4.8.81 fast flügge Juv. (R.De.,Do.), 1981 20x30 m Probefläche mit Brennesseln 4 singende Männchen, drei Nestfunde (Sch.).

D r o s s e l r o h r s ä n g e r (Acrocephalus arundinaceus)
Am 17.4.81 1 Ex. singende M.- Nassauer See (Sch.).

G e l b spö t t e r (Hippolais icterina)
1981 je 1 singendes Ex. bei Niederstetten, Blumweiler, Ebertsbronn, Bad Mergentheim, Finsterlohr, Equarhofen und Creglingen (R.De.,Do.,Sch.,Pa.).

G a r t e n g r a s m ü c k e (Sylvia borin)
1981 auf einer 1 qkm Probefläche 8 singende Männchen (Do.).

M ö n c h s g r a s m ü c k e (Sylvia atricapilla)
1981 auf einer 1 qkm Probefläche 13 singende Männchen (Do.), 1981 Vergleich zw. einer flurbereinigten Hangfläche und nichtflurber. Hangfläche jeweils 1 qkm=Verhältnis 3:9 singende Männchen (Sch.Pa.).

S p e r b e r g r a s m ü c k e (Sylvia nisoria)
Am 31.8.81 1 dj.Ex. bei Niederstetten beringt (R.De.,Do.).

F i t i s (Phylloscopus trochilus)
1981 auf einer 1 qkm Probefläche 20 singende Männchen (Do.).

Z i l p z a l p (Phylloscopus collybita)
1981 auf einer 1 qkm Probefläche 17 singende Männchen(Do.).

N a c h t i g a l l (Luscinia megarhynchos)
1980 zwischen Fuchshof und Burg Brauneck 9 singende Männchen (Sch.)Raum Archshofen-

Craintal nur entlang der Tauber 7 singende Männchen und ein Nestfund mit sechs Eiern am 29.7.80 (Sch.).

B l a u k e h l c h e n (Luscinia svecica)
Am 9.4.81 1,0 am Nassauer See und 11.4.81 3,1 Ex. Nassauer See (Sch.)

R o t k e h l c h e n (Erithacus rubecula)
1981 auf einer Probefläche von 1 qkm 13 singende Männchen (Do.)

G a r t e n r o t s c h w a n z (Phoenicurus phoenicurus)
1980 auf einer 250x100m Probefläche im Streuobst 7 singende Männchen, vier Nestfunde mit insgesamt 12 ausgeflogenen juv. (Sch.)

B r a u n k e h l c h e n (Saxicola rubetra)
1980 2 BP zwischen Laudenbach und Haagen (Sch.,Od.) und 1981 1 BP bei Schäftersheim (Sch.) und 1 BP bei Nassau (Sch.).

S t e i n s c h m ä t z e r (Oenanthe oenanthe)
1981 je 1 BP Flugplatz Niederstetten und bei Ebertsbronn (R.De.,Do.), 1 BP bei Haagen 1 BP bei Schön, 1 BP bei Creglingen, 1 BP bei Niedersteinach (Sch.).

R i n g d r o s s e l (Turdus torquatus)
1 Paar am 1.5.80 beob. bei Neunkirchen (Gubitz)

S c h w a n z m e i s e (Aegithalos caudatus)
Am 27.3.81 Nestbau bei Niederstetten und Ebertsbronn (R.De.,Do.),12.9.80 unter acht Vögeln eine weißköpfige bei Creglingen (Sch.).

H a u b e n m e i s e (Parus cristatus)
1980 2 BP Klosterwald bei Creglingen, beide Bruten in Kunsthöhlen (1x7,1x9 Eier) (Sch.).

W e i d e n m e i s e (Parus montanus)
1981 2 singende Männchen bei Heimberg (Do.).

T a n n e n m e i s e (Parus ater)
Am 28.3.81 starker Heimzug mit Trupps bis zu 20 Vögeln bei Niederstetten (R.De.).

G r a u a m m e r (Emberiza calandra)
1981 1 singende bei Rinderfeld, 3 singende Niederstetten-Adolzhausen, 1 singende Oberrimbach-Spielbach (R.De.,Do.), 1 singende bei Finsterlohr und 1 singende bei Burgstall, 2 singende bei Schonach (Sch.)

G o l d a m m e r (Emberiza citrinella)
15.3.81 Nestbau bei Niederstetten (R.De.,Do.), 6.12.80 bei Niederstetten 250-280 Ex.(Do.)

R o h r a m m e r (Emberiza schoeniclus)
Am 15.3.81 2 Ex. Nassauer See (Sch.)

O r t o l a n (Emberiza hortulana)
1981 1 BP bei Freudenbach (Sch.)

B u c h f i n k (Fringilla coelebs)
1981 auf einer 1 qkm Probefläche 24 singende Männchen (Do.)

G r ü n l i n g (Carduelis chloris)
In Niederstetten eine Brut mit fünf juv. in einem Hänflingsnest, aus welchem 6 juv. ausgeflogen sind. Das Hänflingsnest wurde ohne Veränderung vom Grünfink übernommen.(R.De.) (Do.).

S t i e g l i t z (Carduelis carduelis)

16.3.80 250-300 Ex.Ruderalfläche bei Creglingen (Sch.) und am 8.1.81 4 Ex. bei Niederstetten.(Do.).

E r l e n z e i s i g (Spinus spinus)
Am 8.6.81 bei Rinderfeld 1 BP mit flüggen juv. (R.De.,Do.).

F i c h t e n k r e u z s c h n a b e l (Loxia curvirostra)
Am 23.11.80 7 Ex. bei Rinderfeld (R.De.,Do.) am 15.3.81 1 BP mit drei flüggen Juv. bei Rinderfeld (R.De.,Do.), am 5.4.81 1 BP mit flüggen Juv. bei Heiberg (R.De.) 2.6.81 6 Ex. bei Niederstetten-Wildentierbach (R.De.,Do.), 8.6.81 16 Ex. bei Rinderfeld (R.De. Do.) und am 5.4.81 1 BP mit flüggen Juv. bei Dreischwingen-Eichholz (R.De.,Do.).

K e r n b e i ß e r (Coccothraustes coccothraustes)
Am 28.3.81 15 Ex. bei Heimberg (Do.)

P i r o l (Oriolus oriolus)
1980 zw. Bieberehren und Creglingen 5 singende und zw. Steinachmündung und Niedersteinach 4 singende (Niedersteinach-Equarhofen) 3 singende (Sch.).

D o h l e (Corvus monedula)
2 Ex. am 29.9.80 in Niederstetten (Do.), 1980 und 1981 Brutkolonien Bad Mergentheim ca. 15-20 BP, Weikersheim 10-15 BP (Sch.),Wo.,Od.,Pe.,Pa.,Pr.,Di.).

S a a t k r ä h e (Corvus frugilegus)
Winter 1980/81 in Creglingen Schlafplatz 1000-1500 Ex. vergesellschaftet mit Rabenkrähen.

Anschriften der Verfasser: Wolfgang Dornberger, Rathausgasse 8, 6994 Niederstetten
Egbert Schmid, Kieselallee 17, 6993 Creglingen

Dr. Otto Bayer

## Die Steppenheide im Taubergrund
## Einige bemerkenswerte Steppenheidepflanzen

Der Begriff "Steppenheide" wurde von dem Geographen Robert Gradmann geprägt. Dem äußeren Erscheinungsbild nach ist die Steppenheide eine Trockenpflanzengemeinschaft von xerophytischen (an Trockenheit gewohnten) Gräsern und Stauden, die auch von einzelnen Bäumen und Sträuchern durchsetzt sein und in einen lichten Steppenheidewald übergehen kann. Die Charakterpflanzen dieser Pflanzengesellschaft haben ihre Heimat in den Steppen Ungarns, Südrußlands oder in den trockenen Räumen des Mittelmeers. In einer nacheiszeitlichen Wärmezeit (vor ca. 10 000 Jahren) versteppten große Teile Mitteleuropas. Der

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang, Schmid Egbert

Artikel/Article: Ornithologischer Sammelbericht Altkreis Bad Mergentheim (Zeitabschnitt 1980 - 31. 8.1981) 16-24