

Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide

Beiheft Nr. 3 (März 2006)

aus der Regionalstelle 8 für die floristische Kartierung Niedersachsens

Hrsg.: Dr. Thomas Kaiser, Landschaftsarchitekt, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel, Tel. 05145/2575, Fax 05145/280864

Thomas Kaiser

Naturkundliche Bibliografie, Folge 11

Naturkundliche Bibliografie, Folge 11

Thomas Kaiser

Um allen Kartierenden und Kartierern einen Überblick über die naturkundliche Erforschung des Bereiches der Regionalstelle 8 zu geben, sollen an dieser Stelle Veröffentlichungen sowie unveröffentlichte Manuskripte, Diplom- und Projektarbeiten mit Bezug zu diesem Raum zusammengestellt werden. Für Hinweise auf weitere Arbeiten wäre der Verfasser sehr dankbar.

Die Folge 11 der Naturkundlichen Bibliografie schließt an die im Heft 12 der Floristischen Notizen 2004 veröffentlichte Zusammenstellung der in den Jahren 2001 bis 2002 erschienenen Arbeiten an.

2000 (Nachträge)

- LUDWIG, S., SODEIKAT, G., STRAUSS, E. (2000): Vegetation of a Black Grouse Habitat on a firing Range in Lower Saxony (Germany). - *Cahiers d'Ethologie* **20** (2-4): 455-460.
- SODEIKAT, G., POHLMAYER, K. (2000): Große Verluste durch den Fuchs bei der Auswilderung von Birkhühnern (*Tetrao tetrix* L.) im NSG Großes Moor, Landkreis Gifhorn/Niedersachsen. – Birkhuhnschutz aktuell **1**: 113-121; Dresden.
- STRAUSS, E., SODEIKAT, G., HEMMER, C., RHEIN, U. (2000): Erfassung und Bewertung von Birkhuhnlebensräumen mittels Fernerkundung. - Birkhuhnschutz aktuell **1**: 122-123; Dresden.
- SODEIKAT, G., POHLMAYER, K., GRÜNTJENS, T. (2000): Telemetrische Untersuchungen zur Raumnutzung von Birkhähnen auf dem Schießplatz Rheinmetall im östlichen Niedersachsen – Erste Ergebnisse einer laufenden Studie. - Birkhuhnschutz aktuell **1**: 124-127; Dresden.

2003

- ALTMÜLLER, R. (2003): Die Flussperlmuschel auf dem Erfolgspfad. - *Natur und Landschaft* **78** (5): 180; Stuttgart.
- BEZIRKSREGIERUNG BRAUNSCHWEIG (2003): Forstlicher Rahmenplan Großraum Braunschweig. - Schriftenreihe Waldentwicklung in Niedersachsen **11**: 167 S. + Karten; Wolfenbüttel.
- BRANDT, T. (2003): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Uhus (*Bubo bubo*) in Niedersachsen: Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2002. - *Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen* **35** (1): 39-54; Goslar.
- BROOCKS, C. (2003): Der Kiebitz (*Vanellus vanellus* L.) - auch auf trockenen Äckern erfolgreich? - *Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. 10*: 49-64; Soltau.
- BÜHRING, E., ORTMANN, M., THIESS, A. (2003): Das Naturschutzprojekt Meißendorfer Teiche / Bannetzer Moor. - Broschüre, Landkreis Celle, 16 S.; Celle.
- CLAUSNITZER, H.-J. (2003): Wie effektiv sind Naturschutzgebiete? Untersuchung am Beispiel der Libellen (Odonata) im Landkreis Celle (Niedersachsen). - *Braunschweiger Naturkundliche Schriften* **6** (4): 789-798; Braunschweig.
- CLAUSNITZER, H.-J., BÜHRING, E., LANGBEHN, H., ORTMANN, M., RUFERT, G., THIESS, A. (2004): Die Entwicklung des Naturschutzgroßprojekts „Meißendorfer Teiche/Bannetzer Moor“ (Landkreis Celle, Niedersachsen) seit 1979. - *Natur und Landschaft* **79** (6): 249-256; Stuttgart.
- DAVID, A. (2003): Birkwild im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide - Das Prinzip Hoffnung. - *Wild und Hund* **9/2003**: 32-33.
- DELFS, J. (2003): Hut und Weide in der Heide. - *Forst und Holz* **58** (23/24): 707-712; Alfeld.
- FAASCH, H. (2003): Gewässergütebericht Fuhse-Wietze 2003. - *NLWK-Schriftenreihe* **9**: 175 S.; Braunschweig.

- FALK, K. (2003): Pflanzenverfügbarkeit von Nährstoffen in Podsol-Böden nach kontrolliertem Brand (NSG Lüneburger Heide). - Diplomarbeit, Institut für Ökologie und Umweltchemie, Universität Lüneburg, 87 + 18 S.; Lüneburg.
- FEDER, J. (2003a): Die Dichtblütige Kresse (*Lepidium densiflorum* SCHRAD.) im Landkreis Gifhorn wiedergefunden. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **11**: 7-9; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2003b): Bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Raum Dorfmark - Soltau - Hodenhagen - Schwarmstedt. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **11**: 18-34; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2003c): Über in Niedersachsen und Bremen sich ausbreitende Pflanzenarten. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **56** (3): 193-211; Peine.
- FEDER, J. (2003d): Zur Verbreitung von *Tragopogon dubius* Scop. in Niedersachsen und Bremen (Nordwest-Deutschland). - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (4): 775-788; Braunschweig.
- FEDER, J. (2003e): Zur früheren und heutigen Verbreitung von *Potentilla sterilis* (L.) Garcke (Erdbeer-Fingerkraut) im niedersächsischen Tiefland und im Land Bremen. - Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen **45** (2): 355-362; Bremen.
- GARVE, E. (2003a): Zwei Äcker voller *Ammi*. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **11**: 2-6; Beedenbostel.
- GARVE, E. (2003b): Kartiertreffen zur Erforschung der Flora Niedersachsens 1993-2003. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **23** (1): 61-68; Hildesheim.
- GARVE, E. (2003c): Bestandssituation von Halophyten an salzhaltigen Rückstandshalten der Kaliindustrie (Kalihalden) in Thüringen. - Haussknechtia **9**: 157-185; Jena.
- GARVE, E. (2003d): Pflanzenartenschutz in historischen Gärten und Parkanlagen. - in Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.): Gartendenkmalpflege und Naturschutz. - S. 41-50; Hannover.
- GRÖLL, W. (2003): Der Wacholder - ein Grundelement unseres Heide-Bildes. - Naturschutz- und Naturparke **188**: 17-21; Niederhaverbeck.
- HANSTEIN, U. (2003): Nutzung, Vernichtung und Schutz des Wacholders vor 100 Jahren. - Naturschutz- und Naturparke **188**: 12-16; Niederhaverbeck.
- HELLBERG, T., SCHMIDT, F.-U. (2003): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingb. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **10**: 1-40; Soltau.
- KAISER, T. (2003a): Nachträge zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **11**: 13-18; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2003b): Der Keulenbärlapp kehrt zurück. - Naturschutz- und Naturparke **188**: 24; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2003c): Zur Aussagekraft von Bestandsdaten für die Pflege- und Entwicklungsplanung am Beispiel des Niedersächsischen Drömlings. - Angewandte Landschaftsökologie **59**: 150 S.; Bonn - Bad Godesberg.
- KAISER, T., MERTENS, D.: (2003): Die Entwicklung der ehemaligen Roten Flächen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ neun Jahre nach Einstellung des militärischen Übungsbetriebes. - Jahrbuch 2004 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 186-194; Soltau.
- KAISER, T., ZACHARIAS, D. (2003): PNV-Karten für Niedersachsen auf Basis der BÜK 50 - Arbeitshilfe zur Erstellung aktueller Karten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation anhand der Bodenkundlichen Übersichtskarte 1:50.000. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **23** (1): 1-60; Hildesheim.
- KALIES, M., SCHOLLE, D., KAULE, G. (2003): Flächenanalyse zur Einrichtung großflächiger extensiver Weidesysteme in Deutschland. - Natur und Landschaft **78** (3): 100-108; Stuttgart.
- KALLEN, H.W., KALLEN, C., SACKWITZ, P., ØLLGAARD, H. (2003): Die Gattung *Taraxacum* WIGGERS (Asteraceae) in Norddeutschland - 1. Teil: Die Sektionen *Naevoza*, *Celtica*, *Erythrosperma* und *Obliqua*. - Botanischer Rundbrief für Mecklenburg-Vorpommern **37**: 5-89; Neubrandenburg.
- KEIENBURG, T., TESKE, A. (2003): Mit Liebe zum Detail - Kleinräumige Landschaftsentwicklung in der Lüneburger Heide. - Mitteilungen aus der NNA **14** (1): 33-35; Schneverdingen.

- KIRCHBERGER, U. (2003): Hoffen auf das Birkhuhn - Moor-Renaturierung des NABU in Gifhorn. - Naturschutz heute **35** (4): 20-21; Bonn.
- KOWARIK, I. (2003): Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. - 380 S.; Stuttgart.
- LANGBEHN, H. (2003): Erstnachweis von *Clathrus archeri* im Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **11**: 34; Beedenbostel.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2003): Neues aus der Flora des Landkreises Celle 2002. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **11**: 9-12; Beedenbostel.
- LOBENSTEIN, U. (2003): Die Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsens. - 50 S. + Anhang, Hannover.
- MERTENS, D., WÜBBENHORST, J. (2003): Ein extrem trockener Sommer - Schäden für die Heide? - Naturschutz- und Naturparke **191**: 20-24; Bispingen.
- MOCKENHAUPT, M. (2003): Den Schnucken auf der Spur. - Mitteilungen aus der NNA **14** (1): 32; Schneverdingen.
- MÖLLER, R.W.L.E., POLSTER, B. (2003): Celle - Das Stadtbuch. - 272 S.; Bonn.
- PANKOKE, K., REINKEN, P., NACHREINER, M. (2003): Sandmagerrasen Camp Reinsehen. - Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz & Stadt Schneverdingen, Broschüre, 10 S.; Schneverdingen.
- PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E., SSYMANK, A. (2003): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **69** (1): 743 S.; Bonn – Bad Godesberg.
- PRÜTER, J., WÜBBENHORST, J., JANSSEN, J., WILDE, P. (2003): Frischer Wind in alter Heide. - Jahrbuch 2004 Landkreis Soltau-Fallingbostal, S. 32-40; Soltau.
- REICHELT, B. (2003): Der Kolkrabe hat Zukunft. - Naturschutz- und Naturparke **188**: 21-23; Niederhaverbeck.
- REUSCH, H. (2003): Erfolgskontrollen an ökologisch begründeten Ausbaumaßnahmen in Fließgewässern des Niedersächsischen Tieflandes. - Wasser - Abwasser **144** (12): 812-824.
- SCHMIDT, F.-U. (2003): Erfassung von Rauch- und Mehlschwalben im Rahmen einer Schüler-Facharbeit (Gymnasium Soltau). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostal **10**: 103-113; Soltau.
- STEINBORN, W. (2003): Zur Kulturgeschichte des Waldes in der Lüneburger Heide. - Jahrbuch 2004 Landkreis Soltau-Fallingbostal, S. 170-183; Soltau.
- STRASBURGER, K., SCHMIDT, F.-U. (2003): Der Weißstorch im Kkr. SFA (Teil II). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostal **10**: 65-102; Soltau.
- STUKE, J.-H. (2003): Die Stratiomyidae und Xylomyidae (Diptera) Niedersachsens und Bremens. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (4): 831-856; Braunschweig.
- THEUNERT, R. (2003a): Atlas zur Verbreitung der Wildbienen (Hym.: Apidae) in Niedersachsen und Bremen (1973 - 2002). - Ökologieconsult-Schriften **5**: 24-334; Hohenhameln.
- THEUNERT, R. (2003b): Hervorhebenswerte Stechimmenfunde aus dem östlichen Niedersachsen (Hymenoptera). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **58** (4): 239-242; Peine.
- VÖLKER, M. (2003): Anmerkungen zum Rastverhalten vom Kranich *Grus grus* L. im Südteil des Landkreises Soltau-Fallingbostal 1999 - 2002. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostal **10**: 41-48; Soltau.
- WICKE, G. (2003): Blühende Heiden - ProLand macht es möglich. - Mitteilungen aus der NNA **14** (1): 36-37; Schneverdingen.
- WÖLKERLING, H. (2003): Die Carabidae und Buprestidae (Coleoptera) Mitteleuropas des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **6** (4): 857-873; Braunschweig.
- WÜBBENHORST, J., SÜDBECK, P. (2003): Woodpeckers as indicators for sustainable forestry? First results of a study from Lower Saxony. - In: PECHACEK, P., D'OLEIRE-OLTMANN, W. (Hrsg.): International Woodpecker Symposium. Nationalpark Berchtesgaden. - Forschungsberichte **48**: 179-192; Berchtesgaden.

2004

- ALBERS, S. (2004): Natur- und Artenschutz an den Gebäuden des Verein Naturschutzpark e.V. - Naaturschutz- und Naturparke **195**: 32-35; Bispingen.
- ANONYMUS (2004): Kraniche in der Heide. - Naturschutz- und Naturparke **192**: 43-44; Bispingen.
- BLÜML, V. (2004): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) in Niedersachsen: Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2003. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **36** (2): 131-162; Goslar.
- BORGGRÄFE, K. (2004): Perspektiven der Grünlandrestitution bei extensiver landwirtschaftlicher Nutzung – Zeitliche und ökonomische Komponenten. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **78**: 519-526; Bonn – Bad Godesberg.
- BRANDT, T., SCHÄFER, F. (2004): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Schwarzmilans *Milvus migrans migrans* in Niedersachsen: Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2003. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **36** (1): 1-17; Goslar.
- BURANDT, S., FINGER, K., FRENZ, K., HECK, A., MALY, L.-H., PRENGER-BERNINGHOFF, K. (2004): Konzepte zur Neuabgrenzung und Ausweitung des Naturparks Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 105-119; Lüneburg.
- CLAUSNITZER, H.-J. (2004): Die Entwicklung zweier Laubfrosch-Populationen bei unterschiedlichen Bedingungen. - Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement **5**: 63-71; Bielefeld.
- DRACHENFELS, O.V., GARVE, E., GERKEN, R., TÄUBER, T. (2004): Unerwartet neu: *Cyperus michelianus* (L.) LINK in Niedersachsen. - Floristische Rundbriefe **38** (1/2): 7-13; Bochum.
- EHRHARDT, W. (2004): Massenvermehrung und Kahlfraß in Eichenkulturen durch *Arctia caja* (LINNAEUS, 1758) in Niedersachsen im Jahre 2003 (Lepidoptera: Arctiidae). - Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, Neue Folge **25** (3): 149-151; Frankfurt.
- EIKHORST, W. (2004): Bestand und Verbreitung des Tüpfelsumpfhuhns (*Porzana porzana*) in Niedersachsen und Bremen - Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2002. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **36** (1): 19-34; Goslar.
- FALK, K. (2004): Einfluss des kontrollierten Brennens auf pflanzenverfügbare Nährstoffe in Sandheiden des Naturschutzgebiets Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 93-104; Lüneburg.
- FALK, K., HÄRDTLE, W., MOHAMED, A. (2004): Auswirkungen des kontrollierten Brennens auf die pflanzenverfügbaren Nährstoffe in Podsol-Böden (NSG „Lüneburger Heide“). - NNA-Berichte **17** (2): 108-111; Schneverdingen.
- FEDER, J. (2004a): Die wild wachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Soltau-Fallingb. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **12**: 2-20; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2004b): Die Saum-Segge (*Carex hostiana* DC.) 2003 erstmals im Landkreis Soltau-Fallingb. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **12**: 21-22; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2004c): Der Zerbrechliche Blasenfarn *Cystopteris fragilis* (L.) BERNH. im niedersächsischen Tiefland und im Land Bremen. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **57** (2): 63-67; Peine.
- FEDER, J. (2004d): Zur Verbreitung vom Braunstieligen Streifenfarn (*Asplenium trichomanes* L.) im niedersächsischen Tiefland und im Land Bremen. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **57** (3): 85-97; Peine.
- FOTTNER, S., NIEMEYER, T., SIEBER, M., HÄRDTLE, W. (2004a): Einfluss der Beweidung auf die Nährstoffdynamik von Sandheiden. - NNA-Berichte **17** (2): 80-91; Schneverdingen.
- FOTTNER, S., NIEMEYER, T., SIEBER, M., HÄRDTLE, W. (2004b): Zur kurzfristigen Vegetationsentwicklung auf Pflegeflächen in Sand- und Moorheiden. - NNA-Berichte **17** (2): 126-136; Schneverdingen.
- FOTTNER, S., NIEMEYER, T., SIEBER, M., HÄRDTLE, W. (2004c): Auswirkungen unterschiedlicher Pflegemaßnahmen auf die Stoffdynamik in Heideökosystemen in Nordwestdeutschland. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **78**: 183-199; Bonn – Bad Godesberg.

- GARVE, E., HARTMANN, G. (2004): 20. Niedersächsisches Botanikertreffen - 18. Mai 2003. - NNA-Mitteilungen **15** (1): 15-17; Schneverdingen.
- GLASER, F.F., HAUKE, U. (2004): Historisch alte Waldstandorte und Hudewälder in Deutschland. – Angewandte Landschaftsökologie **61**: 193 S.; Bonn – Bad Godesberg.
- GEHRMANN, L. (2004): Die Jagd als Teil des Naturschutzes in der Lüneburger Heide. - Naturschutz- und Naturparke **192**: 34-40; Bisingen.
- GERKEN, R. (2004): Nachträge zur Flora des Landkreises Gifhorn. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **12**: 26-29; Beedenbostel.
- GERLAND, K. (2004): Empfehlungen zur Heidepflege durch Feuer, abgeleitet aus Untersuchungen zur Besiedlung von Brandflächen durch Spinnen. – Diplomarbeit, Fachhochschule Lippe und Höxter, 113 S.; Höxter.
- GÖTTSCHE, H. (2004): Schmetterlings-Refugien am Elbe-Seitenkanal im Vergleich zu anderen Biotopen des Landkreises Uelzen – Eine Feldstudie zur Dokumentation der Lepidopteren-Fauna. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 149-164; Lüneburg.
- GRÜNTJENS, T. (2004): Die Situation des Birkwildes (*Tetrao tetrix*) im Revier der Forstverwaltung Rheinmetall in Unterlüß.- Birkhuhnschutz heute **2**: 119-120; Rietschen.
- HANSTEIN, U. (2004a): Zum früheren Vorkommen des Uhus (*Bubo bubo*) in der Lüneburger Heide. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **36** (1): 88; Goslar.
- HANSTEIN, U. (2004b): Der Stühbusch in der historischen Heidelandschaft – Zur Landschaftsgeschichte des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide und seiner näheren Umgebung. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 9-34; Lüneburg.
- HÄRDTLE, W. (2004): Zur Nährstoff- und Vegetationsdynamik von Heideökosystemen - Grundlagen und Forschungskonzeption. - NNA-Berichte **17** (2): 62-64; Schneverdingen.
- HÄRDTLE, W., FOTTNER, S., NIEMEYER, T., SIEBER, M., MOHAMED, A. (2004): Nährelementaustausch aus Heideökosystemen durch verschiedene Pflegeverfahren - eine integrierende Betrachtung. - NNA-Berichte **17** (2): 123-125; Schneverdingen.
- HARTIG, H. (2004): Vom Wasser und vom Papier – Spitzentechnik einer Papierfabrik in Produktion und Abwasserreinigung. – Umweltreport 2004/05: 40-41; Leipzig.
- HEIDEBROEK, P., MÜSSIG, K. (2004): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet „Breites Moor“. - Diplomarbeit, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz, Universität Hannover, 148 S. + 11 Karten; Hannover.
- HELLBERG, T., HEYDE, L.V.D. (2004): Das Brutvorkommen der Schellente *Bucephala clangula* im Naturraum Lüneburger Heide. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **36** (2): 111-120; Goslar.
- JIRJAHN, B. (2004): Einfluss der Heide-Pflegemaßnahmen Brand und Mahd auf die Ernährungssituation von Besenheide *Calluna vulgaris* und Drahtschmiele *Deschampsia flexuosa* im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 83-91; Lüneburg.
- JIRJAHN, B., HÄRDTLE, W., MOHAMED, A. (2004): Auswirkungen von Brand und Mahd auf die Ernährungssituation von *Calluna vulgaris* und *Deschampsia flexuosa* in Heideökosystemen. - NNA-Berichte **17** (2): 112-114; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2004a): Die kooperative Pflege- und Entwicklungsplanung als Mittel zur Akzeptanzförderung am Beispiel des Niedersächsischen Drömlings. - Natur und Landschaft **79** (3): 124-129; Stuttgart.
- KAISER, T. (2004b): Naturkundliche Bibliographie, Folge 10. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **12**: 29-33; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2004c): Auswirkungen von Heidepflegeverfahren auf umweltrelevante Schutzgüter. - NNA-Berichte **17** (2): 198-212; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2004d): Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften in Nordwestdeutschland – Operationalisierung der Forschungsergebnisse für die naturschutzfachliche Planung. NNA-Berichte **17** (2): 213-221; Schneverdingen.

- KAISER, T. (2004e): Rolf Müller zum Gedenken (1913 – 2004). – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 247-249; Lüneburg.
- KAISER, T., KEIENBURG, T. (2004): Untersuchungen zum Flächenpotenzial kulturbedingter magerer Offenlandbiotope im niedersächsischen Tiefland. – NNA-Berichte **17** (2): 27-33; Schneverdingen.
- KAISER, T., SPELLMANN, H., ZACHARIAS, D. (2004): Erstinventur der Flora ausgewählter Gebiete der nordöstlichen Lüneburger Heide für die Indikation einer nachhaltigen Forstwirtschaft. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 35-62; Lüneburg.
- KAISER, T., STUBBE, A. (2004): Mittelfristige Vegetationsentwicklung auf Pflegeflächen in Sandheiden des Naturschutzgebietes „Lüneburger Heide“. – NNA-Berichte **17** (2): 137-144; Schneverdingen.
- KEIENBURG, T., PRÜTER, J. (2004): Conservation and Management of Central European Lowland Heathlands. Case study: Lüneburger Heide nature reserve, North-West Germany. – Mitteilungen aus der NNA **15** (Sonderheft 1): 64 S.; Schneverdingen.
- KEIENBURG, T., PRÜTER, J., HÄRDTLE, W., KAISER, T., KOOPMANN, A., MELBER, A., NIEMEYER, F., SCHALTEGGER, S. (2004): Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften in Nordwestdeutschland - Zusammenfassende Aspekte eines Verbundforschungsvorhabens. – NNA-Berichte **17** (2): 3-12; Schneverdingen.
- KIFFE, K. (2004a): Nachweise neuer und bemerkenswerter *Carex*-Hybriden in Deutschland. – Floristische Rundbriefe **38** (1/2): 51-63; Bochum.
- KIFFE, K. (2004b): An example of a rare and little noticed intersectional *Carex* hybrid in Germany: *Carex pseudocyperus* L. x *C. rostrata* STOKES (= *Carex* x *justi-schmidtii* JUNGE). – Drosera 2004 (1/2): 37-42; Oldenburg.
- KLEIN, A., SANDKÜHLER, K. (2004): Verbreitung, Bestandsentwicklung und Habitatwahl der Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* in Niedersachsen. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **36** (1): 53-68; Goslar.
- KOOPMANN, A. (2004): Döhler Herde wieder als Stammherde anerkannt. – Naturschutz- und Naturparke **192**: 45-46; Bispingen.
- KOOPMANN, A., MERTENS, D., BRENNEN, H., ENGLERT, U. (2004): Offenlandmanagement im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ - Erfahrungen aus Sicht des Vereins Naturschutzpark. – NNA-Berichte **17** (2): 44-61; Schneverdingen.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2004): Neues aus der Flora des Landkreises Celle 2003. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **12**: 23-26; Beedenbostel.
- LUDWIG, S., SODEIKAT, G., STRAUSS, E. (2004): Vegetation, Strukturvielfalt und Nahrungsangebot - Habitatwahl besonderer Birkhühner (*Tetrao tetrix*) auf dem Schießplatz Rheinmetall. – Birkhuhnschutz heute **2**: 134-143; Rietschen.
- MOCKENHAUPT, M. (2004): Beobachtungen zur Schafbeweidung im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 63-71; Lüneburg.
- MOCKENHAUPT, M., KEIENBURG, T. (2004): Ansätze zur Untersuchung des Einflusses der Hütenschaft auf die Stickstoffbilanz der Heiden im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – NNA-Berichte **17** (2): 116-122; Schneverdingen.
- MOHTS, H., SCHUMACHER, D. (2004): Über fossile Perlen aus marinen Sedimenten des Miozän und des Maastricht sowie Süßwasserperlen aus der Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 231-238; Lüneburg.
- MÜLLER, J., SCHALTEGGER, S. (2004): Sozioökonomische Analyse des Heidemanagements in Nordwestdeutschland - Wirtschaftlichkeit, Kosten-Wirksamkeitsverhältnisse und Akzeptanz. – NNA-Berichte **17** (2): 183-197; Schneverdingen.
- NIEDER, R., BRINKMANN, S., KÖSTER, W., WACHTER, H., ISERMANN, K. (2004): Stickstoff-Mobilisierung in Humusaufgaben norddeutscher Kiefernforste. – Wasserwirtschaft 11/2004: 29-33.
- NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KÜSTENSCHUTZ, BETRIEBSSTELLE VERDEN (2004): Gewässergütebericht 2004 - Chemische Gewässergüte 1992 - 2003. – NLWK-Schriftenreihe **10**: 43 S. + Daten-CD; Verden.

- NIEMEYER, T., FOTTNER, S., MOHAMED, A., SIEBER, M., HÄRDTLE, W. (2004): Einfluss kontrollierten Brennens auf die Nährstoffdynamik von Sand- und Moorheiden. - NNA-Berichte **17** (2): 65-79; Schneverdingen.
- PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BLESS, R., BOYE, P., SCHRÖDER, E., SSYMANK, A. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **69** (2): 693 S.; Bonn – Bad Godesberg.
- PODLOUCKY, R. (2004): Verbreitung und Bestandssituation der Kreuzotter (*Vipera berus*) in Niedersachsen unter Berücksichtigung von Bremen und dem südlichen Hamburg. – Mertensiella **15**: 36-47; Rheinbach.
- PRÜTER, J. (2004a): Die Heidelandschaften des atlantischen Europa. - NNA-Mitteilungen **15** (1): 24-25; Schneverdingen.
- PRÜTER, J. (2004b): Schutz und Erhaltung der Heide - Aktuelle Ansätze aus europäischer Perspektive. - NNA-Berichte **17** (2): 22-26; Schneverdingen.
- PRÜTER, J., LÜTKEPOHL, M., WÜBBENHORST, J. (2004): Untersuchungen zur Bestandsentwicklung ausgewählter Brutvogelarten im NSG „Lüneburger Heide“ als Beitrag zur Entwicklungskontrolle im Heidemanagement. - NNA-Berichte **17** (2): 165-175; Schneverdingen.
- PRÜTER, J., WÜBBENHORST, J. (2004): Zur Situation des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 73-82; Lüneburg.
- PRÜTER, J., WÜBBENHORST, J., JANSSEN, J., WILDE, P. (2004): Frischer Wind in alter Heide. - NNA-Mitteilungen **15** (1): 26-29; Schneverdingen.
- PRÜTER, J., WÜBBENHORST, J., SÜDBECK, P. (2004): Niedersachsens Verantwortung für die Erhaltung des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) im mitteleuropäischen Tiefland. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **36** (2): 121-130; Goslar.
- RABE, G., KÖPSELL, R. (2004): Forstliche Öffentlichkeitsarbeit mittels Attraktionen. - Forst und Holz **59** (5): 215-218; Alfeld.
- REUSCH, H., BELLSTEDT, R., BRINKMANN, R., HEISS, R. (2004): Regionale Ergänzungen zur Stelmücken-Fauna Deutschlands in verschiedenen Bundesländern (Diptera: Limoniidae et Pediciidae). - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (1): 109-121; Braunschweig.
- ROHDE, J. (2004): Brutvogel-Bestandsaufnahme Ise-Projekt bei Wahrenholz (TK 3429/2) 1995 bis 2003. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **57** (2): 54-62; Peine.
- RÖHRS, H.J. (2004): Dr.h.c. Alfred Toepfer – 30 Jahre Wirken für den Verein Naturschutzpark. – Mitteilungen aus der NNA **15** (Sonderheft 2): 11-13; Schneverdingen.
- SANDKÜHLER, K. (2004): Naturschutzgroßprojekt Niedersächsischer Drömling, Teilprojekt Niedersachsen. - Natur und Landschaft **79** (9/10): 416-422; Stuttgart.
- SCHMIDT, G. (2004): Auffallende Spinnen des Melbecker Hang-Quellmoores (Arachnida: Araneae). – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 137-148; Lüneburg.
- SCHMIDT, L., MELBER, A. (2004): Einfluss des Heidemanagements auf die Wirbellosenfauna in Sand- und Moorheiden Nordwestdeutschlands. - NNA-Berichte **17** (2): 145-164; Schneverdingen.
- SCHWAKE, I. (2004): Untersuchungen zur Stechimmenfauna (Hymenoptera: Aculeata) auf den ehemaligen Panzerübungsflächen im NSG „Lüneburger Heide“. - Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien im Land Niedersachsen. Erstellt an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Institut für Zoologie. 113 S. + Anhänge; Hannover. [unveröffentlicht]
- SIEBER, M., FOTTNER, S., NIEMEYER, T., HÄRDTLE, W. (2004): Einfluss maschineller Pflegeverfahren auf die Nährstoffdynamik von Sandheiden. - NNA-Berichte **17** (2): 92-107; Schneverdingen.
- SODEIKAT, G., GRÜNTJENS, T., POHLMAYER, K. (2004): Telemetrische Untersuchungen an Birkhühnern (*Tetrao tetrix*) auf dem Schießplatz Rheinmetall im östlichen Niedersachsen. - Birkhuhnschutz heute **2**: 121-133; Rietschen.

- STAHL, T. (2004): Kanutourismus und Naturschutz in Niedersachsen - Gestaltungs- und Lenkungsmaßnahmen für einen naturverträglichen Kanutourismus am Beispiel der Ilmenau. - Diplomarbeit, Universität Lüneburg, Studiengang Umweltwissenschaften, 137 S.; Lüneburg.
- STUKE, J.-H. (2004a): Die Bibionidae und Pleciidae (Diptera: Nematocera) Niedersachsens und Bremens. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (1): 123-136; Braunschweig.
- STUKE, J.-H. (2004b): Die Coenomyidae, Xylophagidae und Scenopinidae (Diptera) Niedersachsens und Bremens. - Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (1): 137-142; Braunschweig.
- WANNENWISCH, F. (2004): Auswirkungen von Kleinwasserkraftanlagen auf die ökologische Durchgängigkeit in Fließgewässern des Niedersächsischen Tieflandes. - Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg **43**: 189-206; Lüneburg.
- WEHDE, V. (2004): Jugendwaldeinsätze als Mittel zur forstlichen Öffentlichkeitsarbeit. - Forst und Holz **59** (5): 223-226; Alfeld.
- WICKE, G. (2004): Förderung von Magerrasen durch das Kooperationsprogramm Biotoppflege in Niedersachsen. - Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein und Hamburg **32**: 32-37; Kiel.
- WORMANNS, S. (2004a): Das Beweidungsprojekt mit Rindern und Pferden im Radenbachtal. - Naturschutz- und Naturparke **192**: 29-34; Bispingen.
- WORMANNS, S. (2004b): Feuer in der Heide. - Naturschutz- und Naturparke **192**: 40-42; Bispingen.
- WORMANNS, S. (2004c): Positive Entwicklung bei den Rindern und Pferden im Radenbachtal. - Naturschutz- und Naturparke **194**: 26-29; Bispingen.
- WÜBBENHORST, J., PRÜTER, J. (2004): Das NSG Lüneburger Heide als Europäisches Vogelschutzgebiet. - NNA-Mitteilungen **15** (1): 30-32; Schneverdingen.
- WÜBBENHORST, J., PRÜTER, J., SÜDBECK, P. (2004): Zur aktuellen Entwicklung der Birkhuhnbestände in der Lüneburger Heide. - Birkhuhnschutz heute **2**: 144-147; Rietschen.

2005

- ALBERS, S. (2005): Rauch- und Mehlschwalben – eine aktuelle Bilanz. - Naturschutz- und Naturparke **196**: 45-46; Bispingen.
- ALTMÜLLER, R. (2005): Erfolgskontrollen im Naturschutzgroßprojekt „Lutter“ unter besonderer Berücksichtigung der Flussperlmuschel und einiger Fischarten. - Naturschutz und Biologische Vielfalt **22**: 115-135; Bonn.
- ANONYMUS (2005): Die Geschichte des Camp Reinsehlen. - Mitteilungen aus der NNA **16** (1): 15-17; Schneverdingen.
- BLOCK, P. (2005): Kranichzug über dem Landkreis Uelzen von 1967 bis 1999, im Vergleich mit 2003 und 2004 und in Bezug auf Windkraftanlagen. - Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **1**: 91-100; Uelzen.
- BLÜML, V., MÜLLER, S., SCHÖNHEIM, A. (2005): Verbreitung gefährdeter Gefäßpflanzen an der Ilmenau mit Nebenbächen. - Drosera **2005** (1): 47-715; Oldenburg.
- BLÜML, V., RÖHRS, U. (2005): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl der Heidelerche (*Lullula arborea*) in Niedersachsen: Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2004. - Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **37** (1): 31-58; Goslar.
- BODE, W. (1913 [Nachdruck 2005]): Pastor Boden zur Sumpf- und Teichschildkröte 1913 in der Lüneburger Heide. - Naturschutz- und Naturparke **196**: 31-32; Bispingen.
- BÜLTMANN, H. (2005): Strategien und Artenreichtum von Erdflechten in Sandtrockenrasen. - Tuexenia **25**: 425-443; Göttingen.
- BURKART, W. (2005): Beobachtungen zur Libellen-Fauna der Böhme (Lkr. Soltau-Fallingb.ostel). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb.ostel **11/12**: 21-48; Soltau.
- CLAUSNITZER, C., CLAUSNITZER, H.-J. (2005): Die Auswirkung der Heidepflege auf das Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Heideschrecke (*Gampsocleis glabra*, Herbst 1786) in Norddeutschland. - Articulata **20** (1): 23-35; Erlangen.

- CONERS, H., LEUSCHNER, C. (2005): In situ measurement of fine root water absorption in three temperate tree species – Temporal variability and control by soil and atmospheric factors. – *Basic and Applied Ecology* **6** (4): 395-405; Jena.
- DEGEN, A., AUMÜLLER, R., GRUBER, D., HEINZE, G.-M., KRÜGER, T., ROTZOLL, G. (2005): Seltene Vogelarten in Niedersachsen und Bremen. 1. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN). – *Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen* **37** (1): Goslar.
- FEDER, J. (2005a): Wiederfund der gefährdeten Waldpflanzen Steinbeere (*Rubus saxatilis*) und Wald-Labkraut (*Galium sylvaticum*) im Landkreis Soltau-Fallingb. – *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **13**: 6-9; Beedenb. b.
- FEDER, J. (2005b): Floristische Erst- und Wiederfunde sowie Bestätigungen im Landkreis Gifhorn 2004. – *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **13**: 20-29; Beedenb. b.
- GARVE, E., GERKEN, R. (2005): *Epipactis microphylla* außerhalb des geschlossenen Verbreitungsgebiets in der südlichen Lüneburger Heide (Niedersachsen). – *Berichte des Arbeitskreises Heimische Orchideen* **22** (1): 95-101; Friedberg.
- GREGOR, T. (2005): *Galeopsis ladanum* in Deutschland. Eine oft verkannte Sippe – oder: Wie gut sind unsere floristischen Kartierungen? – *Tuexenia* **25**: 285-305; Göttingen.
- GREIN, G. (2005): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Heuschrecken mit Gesamtartenverzeichnis. – *Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen* **25** (1): 1-20; Hannover.
- HABERMANN, M., ELSNER, G., HURLING, R., KRÜGER, F. (2005): Waldschutzsituation 2004/2005 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. – *Forst und Holz* **60** (5): 212-215; Alfeld.
- HABERMANN, M., TRUCHSESS, A. (2005): Buchen- und Eichenstubben als Bruthabitat des Sägehörnigen Werftkäfers (*Hylecoetus dermestoides* L.) im niedersächsischen Flachland. – *Forst und Holz* **60** (4): 1500-154; Alfeld.
- HALLMANN, J., MERTENS, D. (2005): 14 Jahre Naturschutzgroßprojekt. – *Naturschutz und Naturparke* **198**: 22-27; Bisingen.
- HELLBERG, T., SCHMIDT, F.-U. (2005): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingb. 2003/2004. – *Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb.* **11/12**: 105-167; Soltau.
- HELMREICH, C., THEUNERT, R. (2005): Hervorhebenswerte Stechimmenfunde aus dem östlichen Niedersachsen (*Hymenoptera*), Folge II. – *Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens* **58** (1): 2-6; Peine.
- HOPPE, A. (2005): Das Reinhold-Tüxen-Archiv am Institut für Geobotanik der Universität Hannover – Digitale Erfassung der Vegetationsaufnahmen. – *Tuexenia* **25**: 463-474; Göttingen.
- KAISER, T. (2005a): Wasserrahmenrichtlinie und Natura 2000 – Zielfindung am Beispiel des Oberlaufes der Wümme. – *NNA-Berichte* **18** (1): 71-77; Schneverdingen.
- KAISER, T. (2005b): Rolf Müller (†) zum Gedenken. – *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **13**: 33-34; Beedenb. b.
- KAISER, T. (2005c): Floristische und vegetationskundliche Erfolgskontrollen auf den Sandheiden und Magerrasen im Projektgebiet „Lüneburger Heide“. – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* **22**: 23-34; Bonn.
- KAISER, T., KEIENBURG, T., PRÜTER, J. (2005): Feuer und Beweidung. Instrumente zur Heidepflege – Ergebnisse eines Verbundforschungsvorhabens. – *Naturschutz- und Naturparke* **196**: 8-18; Bisingen.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2005): Zweiter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – *Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide* **13**: 9-20; Beedenb. b.
- KEIENBURG, T., PRÜTER, J. (2005): Forschung und Erhaltung von Offenlandschaften – zum niedersächsischen Beitrag im BMBF-Förderschwerpunkt. – *Mitteilungen aus der NNA* **16** (1): 23-25; Schneverdingen.
- KÖHLER, K.-H. (2005a): Avifaunistischer Jahresbericht 1990 bis 1999 für den Kreis Uelzen. – *Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen* **1**: 7-74; Uelzen.
- KÖHLER, K.-H. (2005b): Ringfundbericht für den Landkreis Uelzen. – *Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen* **1**: 101-104; Uelzen.

- KÖHLER, K.-H. (2005c): Gepflegte Vögel in der Auffangstation Bodenteich. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **1**: 107-110; Uelzen.
- KÖHLER, K.-H. (2005d): Alte naturkundliche Aufzeichnungen gefunden (Beitrag zur Avifauna des Landkreises Uelzen). – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **1**: 111-124; Uelzen.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2005): Neues aus der Flora des Landkreises Celle 2004. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **13**: 2-5; Beedenbostel.
- LANDKREIS CELLE (2005): Regionales Raumordnungsprogramm 2005. – 149 S. + Karte; Celle.
- MAGDEBURG, U. (2005a): Ziegen in der Landschaftspflege. – Naturschutz und Naturparke **198**: 19-22; Bispingen.
- MAGDEBURG, U. (2005b): Naturpark „Naturschutzpark Lüneburger Heide“. – Naturschutz und Naturparke **199**: 11-19; Schneverdingen.
- NIEMEYER, T., NIEMEYER, M., MOHAMED, A., FOTTNER, S., HÄRDTLE, W. (2005): Impact of prescribed burning on the nutrient balance of heathlands with particular reference to nitrogen and phosphorus. – Applied Vegetation Science **8**: 183-192; Uppsala.
- NMLR – Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.) (2005): Wild und Jagd – Landesjagdbericht 2004. – 96 S.; Hannover.
- PAILER, K. (2005): Erster Brutnachweis der Wiesenweihe im Kreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **1**: 105-106; Uelzen.
- PODLOUCKY, R. (2005): Verbreitung und Bestandssituation der Kreuzotter (*Vipera berus*) in Niedersachsen unter Berücksichtigung von Bremen und dem südlichen Hamburg. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **25** (2): 24-31; Hannover.
- PODLOUCKY, R., CLAUSNITZER, H.-J., LAUFER, H., TEUFERT, S., VÖLKL, W. (2005a): Anzeichen für einen bundesweiten Bestandseinbruch der Kreuzotter (*Vipera berus*) infolge ungünstiger Witterungsabläufe im Herbst und Winter 2002/2003 – Versuch einer Analyse. – Zeitschrift für Feldherpetologie **12** (1): 1-18; Bielefeld.
- PODLOUCKY, R., CLAUSNITZER, H.-J., LAUFER, H., TEUFERT, S., VÖLKL, W. (2005b): Anzeichen für einen bundesweiten Bestandseinbruch der Kreuzotter (*Vipera berus*) infolge ungünstiger Witterungsabläufe im Herbst und Winter 2002/2003 – Versuch einer Analyse. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **25** (2): 32-41; Hannover.
- PRÜTER, J., WÜBBENHORST, J. (2005): Langfristige Bestandserfassung ausgewählter Brutvogelarten als Beitrag zur Erfolgskontrolle im Projektgebiet „Lüneburger Heide“. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **22**: 155-167; Bonn.
- SCHMIDT, F.-U. (2005a): Schutzgebiete im Landkreis Soltau-Fallingb. (Folge 1). – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **11/12**: 9-20; Soltau.
- SCHMIDT, F.-U. (2005b): Neue Funde von Kleinkrebsen im Landkreis Soltau-Fallingb. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **11/12**: 49-52; Soltau.
- SCHMIDT, L., SPRICK, P., THEUNERT, R., HAHLEBOHM, H.-H., MENKE, N. (2005): 4. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen, ehemals Region Hannover (Insecta: Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen **21**: 1-24; Bielefeld.
- SIPPEL, U. (2005): Stand der Ausweisung von Naturschutzgebieten in Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **25** (3): 62-126; Hannover.
- SONNENBURG, H. (2005): Die Ameisenfauna (Hymenoptera: Formicidae) Niedersachsens und Bremens. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (2): 377-441; Braunschweig.
- STRASBURGER, K., SCHMIDT, F.-U. (2005): Der Weißstorch im Landkreis Soltau-Fallingb. (Teil II). – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **11/12**: 53-104; Soltau.
- STROHSCHNEIDER, R. (2005): Stoffliche Einträge in Fließgewässer – Probleme und Lösungsmöglichkeiten. – Mitteilungen aus der NNA **16** (1): 6-7; Schneverdingen.
- THIELE, K. (2005): Renaturierungsbeitrag in Eickelohr Alleraue bei Flusskilometer 51. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **11/12**: 3-8; Soltau.
- WÄHNER, H. (2005): Bemerkenswerte Pilzfunde 2004 im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **13**: 29-33; Beedenbostel.

- WELLMANN, L. (2005): Das EU-Vogelschutzgebiet „Ostheide südlich Himbergen“ – ein Schutzgebiet für Ortolan und Heidelerche im Landkreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **1**: 75-90; Uelzen.
- WILLCOX, J. (2005): Bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Landkreis Uelzen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **13**: 5-6; Beedenbostel.
- WORMANN, S. (2005a): Pietzmoor – Fortsetzung der Renaturierungsmaßnahmen. – Naturschutz und Naturparke **197**: 6-12; Bispingen.
- WORMANN, S. (2005b): Wiedehopf im Naturschutzgebiet beobachtet. – Naturschutz und Naturparke **197**: 28-29; Bispingen.
- ZANK, H., HECKENROTH, H., SÜDBECK, P. (2005): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen – Drosseln, Grasmücken, Fliegenschnäpper. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Sonderreihe **B 2** (9): 488 S.; Hannover.
- ZUCCHI, H., BRÜNING, M., REIMER, J. (2005): Nachweis der Wespenspine *Argiope bruennichi* (Arachnida: Araneae) in Sunder/Ldkrs. Celle. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **58** (2-3): 63-67; Peine.

2006 (wird fortgesetzt)

- ELLERMANN, G., KAISER, T. (2006): Der Schöne Ampfer (*Rumex pulcher* L.) in Celle, Ortsteil Klein Hehlen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 5-6; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2006): *Equisetum telmateia* L. (Riesen-Schachtelhalm) im Landkreis Uelzen und im übrigen Tiefland von Niedersachsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 14-21; Beedenbostel.
- HORN, K., GARVE, E. (2006): Zum Vorkommen der Bastard-Heidelbeere (*Vaccinium x intermedium* RUTHE) in Niedersachsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 23-35; Beedenbostel.
- KAISER, T., KAYSER, C. (2006): Die Schmalblättrige Lorbeerrose (*Kalmia angustifolia* L.) im Naturschutzgebiet „Wietzendorfer Moor“ (Landkreis Soltau-Fallingb.) – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 7-8; Beedenbostel.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2006): Dritter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 9-14; Beedenbostel.
- KEIENBURG, T., PRÜTER, J. (2006): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Erhaltung und Entwicklung einer alten Kulturlandschaft. – Mitteilungen aus der NNA **17** (Sonderheft 1): 65 S.; Schneverdingen.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2006): Neues aus der Flora des Landkreises Celle 2005. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 2-5; Beedenbostel.
- NIEDERSÄCHSISCHES UMWELTMINISTERIUM (Hrsg.) (2006): Eine Reise durch Niedersachsen – Die zwölf Naturparke stellen sich vor. – 27 S.; Hannover.
- SPRINGOB, G., DEETJEN, H., ZANDER, O. (2006): Nitratbelastung der Grundwasserneubildung nach Vollumbruch bzw. Streifenfräsung unter mineralisationsstarken Sandböden. – Forst und Holz **61** (1): 21-25; Alfeld.
- WILLCOX, J. (2006): Bemerkenswerte floristische Funde im Landkreis Uelzen 2005. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **14**: 21-22; Beedenbostel.

Herrn Dr. HERBERT REUSCH, Suhlendorf, danke ich für diverse Literaturhinweise.

Anschrift des Verfassers: Dr. Thomas Kaiser, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel.

Ältere Ausgaben der Floristischen Notizen aus der Lüneburger Heide

Aufgrund diverser Nachfragen wurden alle vergriffenen Hefte der Floristischen Notizen einschließlich der Beihefte nachgedruckt, so dass sie bei Interesse beim Herausgeber (siehe Seite 1) bestellt werden können.

Außerdem können die älteren Ausgaben als Pdf-Dateien aus dem Internet heruntergeladen werden (www.Kaiser-alw.de).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [BH_3](#)

Autor(en)/Author(s): Kaiser Thomas

Artikel/Article: [Naturkundliche Bibliografie, Folge 11 1-12](#)